

Calculations of gaseous and particulate emissions from German agriculture 1990 – 2018

Report on methods and data (RMD) Submission 2020

Berechnung von gas- und partikelförmigen Emissionen aus der deutschen Landwirtschaft 1990 – 2018

Report zu Methoden und Daten (RMD) Berichterstattung 2020

**Hans-Dieter Haenel, Claus Rösemann, Ulrich Dämmgen, Ulrike Döring,
Sebastian Wulf, Brigitte Eurich-Menden, Annette Freibauer, Helmut Döhler,
Carsten Schreiner, Bernhard Osterburg, Roland Fuß**

Thünen Report 77

Bibliografische Information:
Die Deutsche Nationalbibliothek
verzeichnet diese Publikationen
in der Deutschen National-
bibliografie; detaillierte
bibliografische Daten sind im
Internet unter
www.dnb.de abrufbar.

Bibliographic information:
The Deutsche Nationalbibliothek
(German National Library) lists
this publication in the German
National Bibliography; detailed
bibliographic data is available on
the Internet at www.dnb.de

Bereits in dieser Reihe erschie-
nene Bände finden Sie im Inter-
net unter www.thuenen.de

Volumes already published in
this series are available on the
Internet at www.thuenen.de

Zitationsvorschlag – Suggested source citation:

**Haenel H-D, Rösemann C, Dämmgen U, Döring U, Wulf S,
Eurich-Menden B, Freibauer A, Döhler H, Schreiner C, Osterburg
B, Fuß R (2020) Calculations of gaseous and particulate emissions
from German agriculture 1990 – 2018 : Report on methods and data
(RMD) Submission 2020. Braunschweig: Johann Heinrich von
Thünen-Institut, 448 p, Thünen Rep 77,
DOI:10.3220/REP1584363708000**

Die Verantwortung für die
Inhalte liegt bei den jeweiligen
Verfassern bzw. Verfasserinnen.

*The respective authors are
responsible for the content of
their publications.*



THÜNEN

Thünen Report 77

Herausgeber/Redaktionsanschrift – *Editor/address*

Johann Heinrich von Thünen-Institut
Bundesallee 50
38116 Braunschweig
Germany

thuenen-report@thuenen.de
www.thuenen.de

ISSN 2196-2324
ISBN 978-3-86576-210-8
DOI:10.3220/REP1584363708000
urn:nbn:de:gbv:253-202003-dn062152-4

Calculations of gaseous and particulate emissions from German agriculture 1990 – 2018

Report on methods and data (RMD) Submission 2020

Berechnung von gas- und partikelförmigen Emissionen aus der deutschen Landwirtschaft 1990 – 2018

Report zu Methoden und Daten (RMD) Berichterstattung 2020

**Hans-Dieter Haenel, Claus Rösemann, Ulrich Dämmgen, Ulrike Döring,
Sebastian Wulf, Brigitte Eurich-Menden, Annette Freibauer, Helmut Döhler,
Carsten Schreiner, Bernhard Osterburg, Roland Fuß**

Thünen Report 77

Hans-Dieter Haenel, Claus Rösemann, Ulrich Dämmgen, Roland Fuß

Thünen Institute of Climate-Smart Agriculture

Thünen-Institut für Agrarklimaschutz (TI-AK)

Bundesallee 50

38116 Braunschweig

Germany

Ulrike Döring

Federal Environment Agency

Umweltbundesamt (UBA)

Wörlitzer Platz 1

06844 Dessau-Roßlau

Germany

Sebastian Wulf, Brigitte Eurich-Menden

Association for Technology and Structures in Agriculture

Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL)

Bartningstraße 49

64289 Darmstadt

Germany

Annette Freibauer

Bavarian State Research Center for Agriculture

Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL)

Institut für Ökologischen Landbau, Bodenkultur und Ressourcenschutz

Lange Point 12

85354 Freising

Germany

Helmut Döhler

DoehlerAgrar

DoehlerAgrar

Schloßweg 7

96190 Untermerzbach

Germany

Carsten Schreiner

Federal Statistical Agency

Statistisches Bundesamt (DESTATIS)

Graurheindorfer Str. 198

53117 Bonn

Germany

Bernhard Osterburg

Coordination Units Climate and Soil

Stabsstellen Klima und Boden (TI-KB)

Bundesallee 49

38116 Braunschweig

Germany

Thünen Report 77

Braunschweig/Germany, March 2020

Acknowledgements / Danksagung

The authors would like to sincerely thank all the people who have helped with the preparation of this report through their input and assistance. The names are given in alphabetical order (in brackets the institution to which the persons concerned belong or belonged at the time of their contributions to this report).

Die Autoren möchten sich herzlich bei all denjenigen Personen bedanken, die bei der Erstellung dieses Berichts durch Zuarbeit und Mithilfe mitgewirkt haben. Die Angabe erfolgt in alphabetischer Ordnung (in Klammern die Institution, der die betreffenden Personen zum Zeitpunkt ihrer letzten Zuarbeit zum Bericht angehören bzw. angehört).

B. Amon (University of Natural Resources and Applied Life Sciences / Universität für Bodenkultur, Vienna, Austria)
A. Benndorf (Federal Environmental Agency / Umweltbundesamt, Dessau)
K.-H. Bodenstein, Aschera Landwirtschaftsgesellschaft, Aschera
W. Brade (Chamber of Agriculture Lower Saxony / Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Hannover)
G. Brehme (GB, Coswig)
J. Busche (Federal Environmental Agency / Umweltbundesamt, Berlin and Dessau)
M. Dieterle (Federal Statistical Office / Statistisches Bundesamt, Bonn)
N. Dreisbach (Association for Technology and Structures in Agriculture / Kuratorium für Technik und Bauwesen (KTBL), Darmstadt)
G. Flachowsky (Federal Agricultural Research Centre / Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft, Braunschweig)
M. Freier (Federal Statistical Office / Statistisches Bundesamt, Bonn)
S. Grebe (Association for Technology and Structures in Agriculture / Kuratorium für Technik und Bauwesen (KTBL), Darmstadt)
M. Grün (FOOD GmbH, Jena)
U. Häußermann (Association for Technology and Structures in Agriculture / Kuratorium für Technik und Bauwesen (KTBL), Darmstadt)
M. Henning (Friedrich-Löffler-Institut, Neustadt)
D. Höppner (Zentralverband der deutschen Geflügelwirtschaft e.V.)
J. Jaquemotte (Association for Technology and Structures in Agriculture / Kuratorium für Technik und Bauwesen (KTBL), Darmstadt)
J. Küsters (Chamber of Agriculture Lower Saxony / Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Northeim)
P. Lebzien (Friedrich-Löffler-Institut, Braunschweig)
H. Meyer (Moorgut Kartzfehn von Kameke, Bösel)
U. Meyer (Friedrich-Löffler-Institut, Braunschweig)
R. Müller (Main Association for Liming, Cologne / Düngerkalk-Hauptgemeinschaft, Köln)
M. Müller-Lindenlauf (Federal Statistical Office / Statistisches Bundesamt, Bonn)
H. Kleine-Klausing (deuka Deutsche Tiernahrung GmbH & Co. KG, Düsseldorf)
H. Luesink (Agricultural Economics Research Institute, LEI, Den Haag, The Netherlands)
E. Poddey (Johann Heinrich von Thünen-Institut, Braunschweig)
H. Prüße (Johann Heinrich von Thünen-Institut, Braunschweig)
J. Rogasik (Julius-Kühn-Institut, Braunschweig)
M. Rönsch (Aschera Landwirtschaftsgesellschaft, Aschera)
K. Schnabel (BEAG Agrar GmbH, Behringen)
R. Spielmanns (Federal Statistical Office / Statistisches Bundesamt, Bonn)
M. Thiele (German Buffalo Association, Penig / Deutscher Büffelverband, Penig)
The colleagues in the EAGER* Group

* EAGER: European Agricultural Gaseous Emissions Inventory Researchers Network. EAGER is a core group of international scientists trying to improve and harmonize national ammonia emission inventory calculations (www.eager.ch)

CONTENTS / INHALT

List of Figures / Abbildungsverzeichnis	XIII
List of Tables / Tabellenverzeichnis	XIV
Abbreviations and acronyms / Abkürzungen und Akronyme	XIX
Abstract / Zusammenfassung	XXIII
1 Introduction / Einführung	1
2 Emission results in Submission 2020 / Emissionsergebnisse in Submission 2020	5
2.1 GHG emissions (CH ₄ , CO ₂ and N ₂ O) / THG-Emissionen (CH ₄ , CO ₂ und N ₂ O)	6
2.2 NH ₃ emissions / NH ₃ -Emissionen	13
2.3 Comparison with Submission 2019 / Vergleich mit Submission 2019	19
2.4 Collection of input data and emission results / Sammlung von Eingangsdaten und Ergebnissen	21
3 Inventory preparation / Die Inventarerstellung	23
3.1 Symbols, units and definitions / Symbole, Einheiten und Definitionen	23
3.1.1 Symbols and units / Symbole und Einheiten	23
3.1.2 Definitions / Definitionen	25
3.1.2.1 Emissions, emission factors and activity data / Emissionen, Emissionsfaktoren und Aktivitätsdaten	25
3.1.2.2 Animal place and animal number / Tierplatz und Tierzahl	27
3.1.2.2.1 Animal related units / Tierbezogene Einheiten	27
3.1.2.2.2 Average annual population / Mittlere jährliche Tierpopulation	27
3.1.2.2.3 Relation to animal places in practice / Zusammenhang mit Tierplätzen in der Praxis	28
3.1.2.3 Lifespan and duration of production cycle / Lebensdauer und Durchgangsdauer	29
3.1.2.4 Start weight, final live weight and carcass weight / Anfangs-, Lebendend- und Schlachtgewicht	29
3.1.2.5 Weight gain and weight gain rate / Gewichtszuwachs und Zuwachsrate	30
3.1.2.6 Mean weight / Mittleres Tiergewicht	31
3.1.2.7 Metabolic weight / Metabolisches Gewicht	31
3.2 The inventory model GAS-EM / Das Inventar-Modell GAS-EM	32
3.2.1 Guidance documents / Handbücher	32
3.2.2 Structure of the GAS-EM model / Struktur des GAS-EM-Modells	32
3.2.3 Choice of methodologies / Methodenwahl	35
3.2.4 The GAS-EM EXCEL® calculation files / Die GAS-EM EXCEL®-Rechendateien	35
3.2.5 Resolution in time and space / Zeitliche und räumliche Auflösung	36
3.3 Basic methodologies / Grundlegende Methoden	37
3.3.1 Energy requirements and feed intake of animals / Tierischer Energiebedarf und Futteraufnahme	38
3.3.2 CH ₄ emissions from enteric fermentation / CH ₄ -Emissionen aus der Verdauung	40
3.3.3 Excretions / Ausscheidungen	41
3.3.3.1 Excretions of VS / VS-Ausscheidungen	41
3.3.3.2 Excretions of N and TAN (or UAN) / Ausscheidungen von N und TAN (bzw. UAN)	42
3.3.4 Emissions from manure management / Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management	45
3.3.4.1 CH ₄ emissions / CH ₄ -Emissionen	45
3.3.4.2 NMVOC emissions from manure management / NMVOC-Emissionen aus Wirtschaftsdünger-Management	46
3.3.4.2.1 NMVOC Tier 1 methodology / NMVOC-Tier-1-Methode	47
3.3.4.2.2 NMVOC Tier 2 methodology / NMVOC-Tier-2-Methode	47
3.3.4.2.3 Uncertainties / Unsicherheiten	48
3.3.4.3 N emissions / N-Emissionen	49
3.3.4.3.1 N mass flow concept / N-Massenfluss-Konzept	49
3.3.4.3.2 Bedding in solid-manure systems / Einstreu in Festmistsystemen	51
3.3.4.3.3 Air scrubbing (NH ₃ and particulate matter) / Abluftreinigung(NH ₃ und Partikel)	52
3.3.4.3.4 Transformation processes in the storage / Transformationsprozesse im Lager	53
3.3.4.3.5 The emission calculation procedure / Berechnung der Emissionen	54
3.3.4.3.6 Indirect N ₂ O from manure management / Indirektes N ₂ O aus dem Wirtschaftsdünger-Management	60
3.3.4.4 Digestion of manure and management of the digestate / Vergärung von Wirtschaftsdünger einschließlich Gärreste-Management	61
3.3.4.4.1 CH ₄ emissions / CH ₄ -Emissionen	63
3.3.4.4.2 Emissions of N ₂ O, NO and N ₂ / Emissionen von N ₂ O, NO und N ₂	66
3.3.4.4.3 NH ₃ emissions / NH ₃ -Emissionen	68
3.3.4.5 Emissions of particulate matter from animal husbandry / Partikelemissionen aus der Tierhaltung	72
3.3.5 Digestion of energy crops and management of the digestate / Vergärung von Energiepflanzen einschließlich Gärreste-Management	73

3.3.6	N ₂ O-Emissions from agricultural soils / N ₂ O-Emissionen aus der Nutzung landwirtschaftlicher Böden	73
3.3.7	Projections for 2020 / Projektionen für 2020	74
3.4	Input data / Eingangsdaten	75
3.4.1	Referencing formats for Official German Statistics / Zitierweise für deutsche Officialstatistiken	75
3.4.2	Animal numbers / Tierzahlen	75
3.4.2.1	Official surveys / Offizielle Erhebungen	76
3.4.2.2	Data used in the inventory / Im Inventar verwendete Daten	77
3.4.2.3	Comparison with livestock-population figures of the FAO / Vergleich mit Tierzahlen der FAO	81
3.4.3	Frequency distributions (housing, storage, spreading) and grazing data / Häufigkeitsverteilungen (Stall, Lager, Ausbringung) und Weidedaten	83
3.4.3.1	The years 1990 - 1999 (RAUMIS) / Die Jahre 1990 - 1999 (RAUMIS)	84
3.4.3.2	The year 2010 (LZ 2010) / Das Jahr 2010 (LZ 2010)	85
3.4.3.2.1	Housing systems, cattle / Haltungsverfahren, Rinder	86
3.4.3.2.2	Housing systems, pigs / Haltungsverfahren, Schweine	87
3.4.3.2.3	Housing systems, other animals / Haltungsverfahren, übrige Tiere	88
3.4.3.2.4	Slurry storage systems, cattle and pigs / Güllelagerverfahren, Rinder und Schweine	88
3.4.3.2.5	Other storage systems / Andere Lagerverfahren	89
3.4.3.2.6	Spreading of animal manures and digestate / Ausbringung von Wirtschaftsdünger und Gärresten	89
3.4.3.2.7	Grazing times / Weidezeiten	90
3.4.3.3	The year 2015 (ASE 2016) / Das Jahr 2015 (ASE 2016)	91
3.4.3.4	Closure of the temporal data gaps / Schließung der zeitlichen Datenlücken	92
3.4.4	Data on the digestion of animal manures and energy crops / Daten zur Vergärung von Wirtschaftsdünger und Energiepflanzen	94
3.4.4.1	Data bases used / Ausgangsdaten	94
3.4.4.2	Digestion of animal manures / Vergärung von Wirtschaftsdünger	94
3.4.4.2.1	Shares of digested manure and frequencies of gas tight residue storage / Anteile vergorenen Wirtschaftsdüngers und Häufigkeiten gasdichter Gärrestelager	94
3.4.4.2.2	Data for CH ₄ emission calculations / Daten für CH ₄ -Emissionsberechnung	96
3.4.4.2.3	Data for the calculation of N ₂ O, NO and N ₂ / Daten für die Berechnung von N ₂ O, NO and N ₂	98
3.4.4.2.4	Data for the calculation of NH ₃ / Daten für die Berechnung von NH ₃	100
3.4.4.3	Digestion of energy crops / Vergärung von Energiepflanzen	102
3.4.5	Other activity data in animal husbandry / Andere Aktivitätsdaten in der Tierhaltung	102
3.4.5.1	Use of protein in pig feeding / Proteineinsatz in der Schweinefütterung	102
3.4.5.2	Air scrubber systems / Abluftreinigungsanlagen	102
3.4.6	Data gaps and uncertainties / Datenlücken und Unsicherheiten	103
3.5	Quality management / Qualitätsmanagement	103
3.5.1	Quality management of emission inventory preparation at the Thünen Institute / Qualitätsmanagement der Emissionsinventarerstellung am Thünen-Institut	103
3.5.1.1	Quality checks at the Thünen Institute / Qualitätskontrolle am Thünen-Institut	104
3.5.1.2	Documentation and Archiving / Dokumentation und Archivierung	105
3.5.1.3	Quality assurance by the NaKo / Qualitätssicherung durch die NaKo	105
3.5.1.4	Quality assurance by external checks / Qualitätssicherung durch externe Überprüfungen	106
3.5.2	Changes with respect to the previous submission / Änderungen gegenüber der vorherigen Berichterstattung	106
4	Cattle and buffalo / Rinder und Büffel	114
4.1	Animal numbers / Tierzahlen	114
4.1.1	Formation of subcategories / Untergliederung in Subkategorien	114
4.1.1.1	Cattle / Rinder	114
4.1.1.2	Buffalo / Büffel	115
4.1.2	Uncertainties / Unsicherheiten	118
4.2	Parameters common to all cattle and buffalo / Gemeinsame Parameter aller Rinder und Büffel	119
4.2.1	Methane from manure management / Methan aus dem Wirtschaftdüngermanagement	119
4.2.2	Emission factors for nitrogen emissions / Emissionsfaktoren für Stickstoffemissionen	120
4.2.2.1	NH ₃ emission factors for housing and grazing / NH ₃ -Emissionsfaktoren für Stall und Weide	120
4.2.2.2	NH ₃ , N ₂ O and NO emission factors for storage / NH ₃ -, N ₂ O- und NO-Emissionsfaktoren der Lagerung	120
4.2.2.3	NH ₃ , N ₂ O and NO emission factors for spreading / NH ₃ -, N ₂ O- und NO-Emissionsfaktoren der Ausbringung	122
4.2.2.4	Uncertainties of the nitrogen emission factors / Unsicherheiten der Stickstoff-Emissionsfaktoren	123
4.3	Dairy cows / Milchkühe	125
4.3.1	Activity and performance data / Aktivitäts- und Leistungsdaten	125
4.3.1.1	Animal numbers / Tierzahlen	125
4.3.1.2	Milk yield and milk composition / Milchleistung und Milchinhaltsstoffe	125
4.3.1.3	Animal weights / Tiergewichte	127

4.3.1.4	Animal weight gains / Tiergewichtszunahmen	128
4.3.1.5	Pregnancy / Trächtigkeit	129
4.3.1.6	Duration of calving interval, lactation period, and dry period / Dauer von Zwischenkalbezeit, Laktationsperiode und Trockenstehzeit	129
4.3.2	Energy requirements / Energiebedarf	129
4.3.2.1	Overall annual NEL requirements / Jährlicher Gesamt-NEL-Bedarf	130
4.3.2.2	NEL requirement for maintenance / NEL-Bedarf für Erhaltung	130
4.3.2.3	NEL requirement to obtain feed / NEL-Bedarf für die Nahrungsaufnahme	130
4.3.2.4	NEL requirements for lactation / NEL-Bedarf für Laktation	130
4.3.2.5	NEL requirements for draft power / NEL-Bedarf für Zugleistungen	131
4.3.2.6	NEL requirements for pregnancy / NEL-Bedarf für die Trächtigkeit	131
4.3.2.7	NEL requirements for growth / NEL-Bedarf für Wachstum	131
4.3.2.8	Energy partitioning between lactation period and dry period / Energieaufteilung zwischen Laktationsperiode und Trockenstehzeit	132
4.3.3	Feed and energy intake / Futter- und Energieaufnahme	133
4.3.3.1	Linking feed intake with energy requirements / Die Kombination von Futter-Aufnahme und Energiebedarf	133
4.3.3.2	Total dry matter intake / Gesamttrockenmasse-Aufnahme	133
4.3.3.3	Dry matter intake during lactation / Trockenmasse-Aufnahme während der Laktation	134
4.3.3.4	Dry matter intake during the dry period / Trockenmasse-Aufnahme während der Trockenstehzeit	136
4.3.3.5	Partitioning of roughage intake between house and pasture / Aufteilung der Raufutteraufnahme zwischen Stall und Weide	137
4.3.3.6	Assessment of gross energy intake / Bestimmung der Gesamtenergie-Aufnahme	138
4.3.4	Feed composition / Futterzusammensetzung	138
4.3.4.1	Modelling concept / Modellkonzept	138
4.3.4.2	Feed properties / Futtereigenschaften	138
4.3.4.3	Composition of the mixed diet / Zusammensetzung der gemischten Ration	140
4.3.4.4	Composition of the grass based diet / Zusammensetzung der Ration auf Grassilage-Basis	141
4.3.4.5	Impact of grazing on mean roughage properties / Einfluss von Weidegang auf mittlere Raufutter-Eigenschaften	142
4.3.4.6	Calculation of digestibility and metabolizability / Berechnung von Verdaulichkeit und Umsetzbarkeit	142
4.3.5	Methane from enteric fermentation / Methan aus der Verdauung	144
4.3.6	Methane from manure management / Methan aus Wirtschaftsdünger-Management	144
4.3.7	NMVOC emissions / NMVOC-Emissionen	145
4.3.8	N balance and N emissions / N-Bilanz und N-Emissionen	145
4.3.8.1	N intake / N-Aufnahme	145
4.3.8.2	Overall nitrogen excretion / Gesamtausscheidung von Stickstoff	146
4.3.8.3	Renal and faecal nitrogen excretion and TAN content of excreta / Stickstoff-Ausscheidung mit Harn und Kot und TAN-Gehalte der Ausscheidungen	146
4.3.8.4	N inputs with straw / N-Einträge mit Stroh	148
4.3.8.5	Emissions during housing and grazing / Emissionen aus dem Stall und auf der Weide	148
4.3.8.5.1	N excreted in the house, the milking area and during grazing / N-Ausscheidungen im Stall, im Melkbereich und auf der Weide	148
4.3.8.5.2	Housing types and duration of grazing / Stalltypen und Dauer des Weidegangs	149
4.3.8.5.3	Partial emission factors "housing and grazing" / Partielle Emissionsfaktoren „Stall und Weide“	149
4.3.8.6	Emissions during storage / Emissionen aus dem Lager	149
4.3.8.7	Indirect N ₂ O from manure management / Indirektes N ₂ O aus dem Wirtschaftsdünger-Management	150
4.3.8.8	Emissions during spreading / Emissionen bei der Ausbringung	150
4.3.8.9	Uncertainties of emission factors and activity data / Unsicherheiten von Emissionsfaktoren und Aktivitätsdaten	150
4.3.9	Emissions of particulate matter / Partikelemissionen	150
4.3.10	International comparison / Internationaler Vergleich	150
4.3.10.1	Methane from enteric fermentation / Methan aus der Verdauung	151
4.3.10.2	Methane from manure management / Methan aus Wirtschaftsdünger-Management	152
4.3.10.3	Emissions of nitrogen species / Emissionen von Stickstoff-Spezies	152
4.3.10.4	Emissions of particulate matter and NMVOC / Partikel- und NMVOC-Emissionen	153
4.3.11	References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung	154
4.4	Calves / Kälber	155
4.4.1	Activity and performance data / Aktivitäts- und Leistungsdaten	155
4.4.1.1	Animal numbers / Tierzahlen	155
4.4.1.2	Animal weights and weight gains / Tiergewichte und Gewichtszunahmen	156
4.4.2	Feed and energy intake / Futter- und Energieaufnahme	156
4.4.3	Methane from enteric fermentation / Methan aus der Verdauung	156
4.4.4	Methane from manure management / Methan aus dem Wirtschaftdüngermanagement	156

4.4.5	NMVOC emissions / NMVOC-Emissionen	157
4.4.6	Emissions of nitrogen species / Emissionen von Stickstoff-Spezies	157
4.4.6.1	N excretion / N-Ausscheidung	157
4.4.6.2	N inputs with straw / N-Einträge mit Stroh	158
4.4.6.3	Emissions during housing and grazing / Emissionen aus dem Stall und auf der Weide	158
4.4.6.4	Emissions from storage and spreading / Emissionen aus Lager und Ausbringung	158
4.4.6.5	Indirect N ₂ O from manure management / Indirektes N ₂ O aus dem Wirtschaftsdünger-Management	158
4.4.6.6	Uncertainty of emission factors and activity data / Unsicherheit der Emissionsfaktoren und Aktivitätsdaten	158
4.4.7	Emission of particulate matter / Partikelemissionen	158
4.4.8	References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung	159
4.5	Heifers / Färsen	160
4.5.1	Activity and performance data /Aktivitäts- und Leistungsdaten	160
4.5.1.1	Animal numbers / Tierzahlen	160
4.5.1.2	Animal weights and weight gains / Tiergewichte und Gewichtszunahmen	161
4.5.1.2.1	Animal weights / Tiergewichte	161
4.5.1.2.2	Life span and mean weight gain / Dauer des Lebensabschnitts und mittlere Gewichtszunahme	162
4.5.2	Energy requirements / Energiebedarf	162
4.5.3	Feed and energy intake / Futter- und Energieaufnahme	164
4.5.4	Methane from enteric fermentation / Methan aus der Verdauung	166
4.5.5	Methane from manure management / Methan aus dem Wirtschaftdüngermanagement	167
4.5.6	NMVOC emissions / NMVOC-Emissionen	167
4.5.7	Emissions of nitrogen species / Emissionen von Stickstoff-Spezies	167
4.5.7.1	N excretion / N-Ausscheidung	167
4.5.7.2	N inputs with straw / N-Einträge mit Stroh	168
4.5.7.3	Emissions from housing and grazing / Emissionen aus Stall und Weide	168
4.5.7.4	Emissions from storage and spreading / Emissionen aus Lager und Ausbringung	168
4.5.7.5	Indirect N ₂ O from manure management / Indirektes N ₂ O aus dem Wirtschaftsdünger-Management	168
4.5.7.6	Uncertainties of emission factors and activity data / Unsicherheiten von Emissionsfaktoren und Aktivitätsdaten	169
4.5.8	Emissions of particulate matter / Partikelemissionen	169
4.5.9	References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung	169
4.6	Male beef cattle / Männliche Mastrinder	170
4.6.1	Activity and performance data /Aktivitäts- und Leistungsdaten	170
4.6.1.1	Animal numbers / Tierzahlen	170
4.6.1.2	Animal weights and weight gains / Tiergewichte und Gewichtszunahmen	170
4.6.2	Energy requirements / Energiebedarf	174
4.6.3	Feed and energy intake / Futter- und Energieaufnahme	174
4.6.4	Methane from enteric fermentation / Methan aus der Verdauung	175
4.6.5	Methane from manure management / Methan aus dem Wirtschaftdüngermanagement	175
4.6.6	NMVOC emissions / NMVOC-Emissionen	176
4.6.7	Emissions of nitrogen species / Emissionen von Stickstoff-Spezies	176
4.6.7.1	N excretion / N-Ausscheidung	176
4.6.7.2	N inputs with straw / N-Einträge mit Stroh	176
4.6.7.3	Emissions from housing and grazing / Emissionen aus Stall und von der Weide	177
4.6.7.4	Emissions from storage and spreading / Emissionen aus Lager und Ausbringung	177
4.6.7.5	Indirect N ₂ O from manure management / Indirektes N ₂ O aus dem Wirtschaftsdünger-Management	177
4.6.7.6	Uncertainties of emission factors and activity data / Unsicherheiten von Emissionsfaktoren und Aktivitätsdaten	177
4.6.8	Emissions of particulate matter / Partikelemissionen	177
4.6.9	References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung	178
4.7	Suckler cows / Mutterkühe	179
4.7.1	Activity and performance data /Aktivitäts- und Leistungsdaten	179
4.7.1.1	Animal numbers / Tierzahlen	179
4.7.1.2	Animal weight / Tiergewicht	180
4.7.2	Energy requirements and feed intake / Energiebedarf und Futteraufnahme	180
4.7.3	Methane from enteric fermentation /Methan aus der Verdauung	182
4.7.4	Methane from manure management / Methan aus dem Wirtschaftdüngermanagement	182
4.7.5	NMVOC emissions / NMVOC-Emissionen	183
4.7.6	Emissions of nitrogen species / Emissionen von Stickstoff-Spezies	183
4.7.6.1	N excretion / N-Ausscheidung	183
4.7.6.2	N input with straw / N-Einträge mit Stroh	183
4.7.6.3	Emissions from housing and grazing / Emissionen aus Stall und von der Weide	184
4.7.6.4	Emissions from storage and spreading / Emissionen aus Lager und Ausbringung	184

4.7.6.5	Indirect N ₂ O from manure management / Indirektes N ₂ O aus dem Wirtschaftsdünger-Management	184
4.7.6.6	Uncertainties of emission factors and activity data / Unsicherheiten der Emissionsfaktoren und Aktivitätsdaten	184
4.7.7	Emissions of particulate matter / Partikelemissionen	184
4.7.8	References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung	185
4.8	Mature males > 2 years / Männliche Rinder > 2 Jahre	186
4.8.1	Activity and performance data / Aktivitäts- und Leistungsdaten	186
4.8.1.1	Animal numbers / Tierzahlen	186
4.8.1.2	Animal weights and weight gains / Tiergewichte und Gewichtszunahmen	186
4.8.2	Energy requirements and feed intake / Energiebedarf und Futteraufnahme	186
4.8.3	Methane from enteric fermentation / Methan aus der Verdauung	187
4.8.4	Methane from manure management / Methan aus dem Wirtschaftsdüngermanagement	187
4.8.5	NMVOC emissions / NMVOC-Emissionen	188
4.8.6	Emissions of nitrogen species / Emissionen von Stickstoff-Spezies	188
4.8.6.1	N excretion / N-Ausscheidung	188
4.8.6.2	N input with straw / N-Eintrag mit Stroh	188
4.8.6.3	Emissions from housing and grazing / Emissionen aus Stall und von der Weide	188
4.8.6.4	Emissions from storage and spreading / Emissionen aus Lager und Ausbringung	188
4.8.6.5	Indirect N ₂ O from manure management / Indirektes N ₂ O aus dem Wirtschaftsdünger-Management	189
4.8.6.6	Uncertainties of emission factors and activity data / Unsicherheiten von Emissionsfaktoren und Aktivitätsdaten	189
4.8.7	Emissions of particulate matter / Partikelemissionen	189
4.8.8	References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung	189
4.9	Aggregated data for cattle except dairy cows (other cattle) / Zusammenfassung: Rinder ohne Milchkühe (übrige Rinder)	191
4.9.1	Animal numbers / Tierzahlen	191
4.9.2	Aggregation of IEF and animal characteristics / Aggregierung von IEF und Tiercharakteristika	191
4.9.2.1	Animal place-related quantities / Tierplatzbezogene Größen	192
4.9.2.2	Relative quantities / Relative Größen	193
4.9.2.3	Pregnancy / Trächtigkeit	195
4.9.3	International comparison / Internationaler Vergleich	195
4.9.3.1	Methane from enteric fermentation / Methan aus der Verdauung	195
4.9.3.2	Methane from manure management / Methan aus dem Wirtschaftsdünger-Management	196
4.9.3.3	Emissions of nitrogen species / Emissionen von Stickstoff-Spezies	197
4.9.3.4	Emissions of particulate matter and NMVOC / Partikel- und NMVOC-Emissionen	197
4.9.4	References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung	198
5	Pigs / Schweine	199
5.1	Animal numbers / Tierzahlen	199
5.1.1	Formation of subcategories / Zur Untergliederung in Subkategorien	199
5.1.2	Uncertainties / Unsicherheiten	199
5.2	Parameters common to all pigs / Gemeinsame Parameter aller Schweine	200
5.2.1	Methane from manure management / Methan aus dem Wirtschaftsdünger-Management	200
5.2.2	Emission factors for nitrogen emissions / Emissionsfaktoren für Stickstoffemissionen	201
5.2.2.1	NH ₃ emission factors for housing / NH ₃ -Emissionsfaktoren für Ställe	201
5.2.2.2	NH ₃ , N ₂ O and NO emission factors for storage / NH ₃ -, N ₂ O- und NO-Emissionsfaktoren der Lagerung	201
5.2.2.3	NH ₃ , N ₂ O and NO emission factors for spreading / NH ₃ -, N ₂ O- und NO-Emissionsfaktoren der Ausbringung	203
5.2.2.4	Uncertainties of the nitrogen emission factors / Unsicherheiten der Stickstoff-Emissionsfaktoren	205
5.3	Sows and suckling-pigs / Sauen und Saugferkel	206
5.3.1	Activity and performance data / Aktivitäts- und Leistungsdaten	206
5.3.1.1	Animal numbers / Tierzahlen	206
5.3.1.2	Animal weights and weight gains / Tiergewichte und Gewichtszunahmen	206
5.3.2	Energy requirements / Energiebedarf	207
5.3.3	Feed and energy intake / Futter- und Energieaufnahme	208
5.3.4	Methane from enteric fermentation / Methan aus der Verdauung	210
5.3.5	Methane from manure management / Methan aus dem Wirtschaftsdünger-Management	210
5.3.6	NMVOC emissions / NMVOC-Emissionen	210
5.3.7	Emissions of nitrogen species / Emissionen von Stickstoff-Spezies	211
5.3.7.1	N excretion / N-Ausscheidung	211
5.3.7.2	Nitrogen inputs with straw / Stickstoff-Einträge mit Stroh	212
5.3.7.3	Emissions from housing / Emissionen aus dem Stall	212
5.3.7.4	Emissions from storage and spreading / Emissionen aus Lager und Ausbringung	212
5.3.7.5	Indirect N ₂ O from manure management / Indirektes N ₂ O aus dem Wirtschaftsdünger-Management	212

5.3.7.6	Uncertainties of emission factors and activity data / Unsicherheiten von Emissionsfaktoren und Aktivitätsdaten	213
5.3.8	Emissions of particulate matter / Partikelemissionen	213
5.3.9	References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung	213
5.4	Weaners / Aufzuchtferkel	214
5.4.1	Activity and performance data / Aktivitäts- und Leistungsdaten	214
5.4.1.1	Animal numbers / Tierzahlen	214
5.4.1.2	Animal weights and weight gains / Tiergewichte und Gewichtszunahmen	215
5.4.1.3	Duration of weaner lifespan / Dauer der Aufzuchtferkel-Lebensphase	216
5.4.2	Energy requirements / Energiebedarf	217
5.4.3	Feed and energy intake / Futter- und Energieaufnahme	217
5.4.4	Methane from enteric fermentation / Methan aus der Verdauung	218
5.4.5	Methane from manure management / Methan aus dem Wirtschaftsdüngermanagement	218
5.4.6	NMVOC emissions / NMVOC-Emissionen	219
5.4.7	Emissions of nitrogen species / Emissionen von Stickstoff-Spezies	219
5.4.7.1	N excretion / N-Ausscheidung	219
5.4.7.2	N inputs with straw / N-Einträge mit Stroh	219
5.4.7.3	Frequency distribution of housing systems / Häufigkeitsverteilung der Stalltypen	220
5.4.7.4	Emissions from housing / Emissionen aus dem Stall	220
5.4.7.5	Emissions from storage and spreading / Emissionen aus Lager und Ausbringung	220
5.4.7.6	Indirect N ₂ O from manure management / Indirektes N ₂ O aus dem Wirtschaftsdünger-Management	220
5.4.7.7	Uncertainties of emission factors and activity data / Unsicherheiten von Emissionsfaktoren und Aktivitätsdaten	220
5.4.8	Emissions of particulate matter / Partikelemissionen	221
5.4.9	References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung	221
5.5	Fattening pigs / Mastschweine	222
5.5.1	Activity and performance data / Aktivitäts- und Leistungsdaten	222
5.5.1.1	Animal numbers / Tierzahlen	222
5.5.1.2	Animal weights and weight gains / Tiergewichte und Gewichtszunahmen	222
5.5.1.3	Duration of fattening / Mastdauer	224
5.5.2	Energy requirements / Energiebedarf	224
5.5.3	Feed and energy intake / Futter- und Energieaufnahme	227
5.5.4	Methane from enteric fermentation / Methan aus der Verdauung	230
5.5.5	Methane from manure management / Methan aus dem Wirtschaftsdüngermanagement	230
5.5.6	NMVOC emissions / NMVOC-Emissionen	231
5.5.7	Emissions of nitrogen species / Emissionen von Stickstoff-Spezies	231
5.5.7.1	N excretion / N-Ausscheidung	231
5.5.7.2	Nitrogen inputs with straw / Stickstoff-Einträge mit Stroh	231
5.5.7.3	Frequency distribution of housing systems / Häufigkeitsverteilung der Stalltypen	232
5.5.7.4	Emissions from housing / Emissionen aus dem Stall	232
5.5.7.5	Emissions from storage and spreading / Emissionen aus Lager und Ausbringung	232
5.5.7.6	Indirect N ₂ O from manure management / Indirektes N ₂ O aus dem Wirtschaftsdünger-Management	232
5.5.7.7	Uncertainties of emission factors and activity data / Unsicherheiten von Emissionsfaktoren und Aktivitätsdaten	232
5.5.8	Emissions of particulate matter / Partikelemissionen	233
5.5.9	References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung	233
5.6	Breeding boars / Zuchteber	234
5.6.1	Activity and performance data / Aktivitäts- und Leistungsdaten	234
5.6.1.1	Animal numbers / Tierzahlen	234
5.6.1.2	Animal weight / Tiergewicht	234
5.6.2	Energy requirements / Energiebedarf	234
5.6.3	Feed and energy intake / Futter- und Energieaufnahme	235
5.6.4	Methane from enteric fermentation / Methan aus der Verdauung	235
5.6.5	Methane from manure management / Methan aus dem Wirtschaftsdüngermanagement	235
5.6.6	NMVOC emissions / NMVOC-Emissionen	236
5.6.7	Emissions of nitrogen species / Emissionen von Stickstoff-Spezies	236
5.6.7.1	N excretion / N-Ausscheidung	236
5.6.7.2	N inputs with straw / N-Einträge mit Stroh	236
5.6.7.3	Housing and storage types / Stall- und Lager-Typen	236
5.6.7.4	Emissions from housing / Emissionen aus dem Stall	236
5.6.7.5	Emissions from storage and spreading / Emissionen aus Lager und Ausbringung	236
5.6.7.6	Indirect N ₂ O from manure management / Indirektes N ₂ O aus dem Wirtschaftsdünger-Management	236
5.6.7.7	Uncertainties of emission factors and activity data / Unsicherheiten von Emissionsfaktoren und Aktivitätsdaten	237

5.6.8	Emissions of particulate matter / Partikelemissionen	237
5.6.9	References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung	237
5.7	Pigs – collective description / Schweine – zusammenfassende Daten	238
5.7.1	Animal numbers / Tierzahlen	238
5.7.2	Aggregation of IEF and animal characteristics / Aggregierung von IEF und Tiercharakteristika	238
5.7.3	International comparison / Internationaler Vergleich	240
5.7.4	References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung	241
6	Small ruminants / Kleine Wiederkäuer	242
6.1	Animal numbers / Tierzahlen	242
6.1.1	Formation of subcategories / Untergliederung in Subkategorien	242
6.1.1.1	Sheep numbers / Schafzahlen	242
6.1.1.2	Goat numbers / Ziegenzahlen	243
6.1.2	Uncertainties / Unsicherheiten	243
6.2	Parameters common to all small ruminants / Gemeinsame Parameter für alle kleinen Wiederkäuer	243
6.2.1	Methane from manure management / Methan aus dem Wirtschaftsdünger-Management	243
6.2.2	Emissions of nitrogen species / Emissionen von Stickstoff-Spezies	244
6.3	Adult sheep / Erwachsene Schafe	245
6.3.1	Animal weights / Tiergewichte	245
6.3.2	Methane from enteric fermentation / Methan aus der Verdauung	245
6.3.3	Methane from manure management / Methan aus Wirtschaftsdünger-Management	246
6.3.4	NMVOC emissions / NMVOC-Emissionen	246
6.3.5	Emissions of nitrogen species / Emissionen von Stickstoff-Spezies	246
6.3.6	Emissions of particulate matter / Partikelemissionen	246
6.3.7	References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung	247
6.4	Lambs / Lämmer	248
6.4.1	Animal weights / Tiergewichte	248
6.4.2	Methane from enteric fermentation / Methan aus der Verdauung	249
6.4.3	Methane from manure management / Methan aus Wirtschaftsdünger-Management	249
6.4.4	NMVOC emissions / NMVOC-Emissionen	249
6.4.5	Emissions of nitrogen species / Emissionen von Stickstoff-Spezies	249
6.4.6	Emissions of particulate matter / Partikelemissionen	250
6.4.7	References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung	250
6.5	Sheep – collective description / Schafe - zusammenfassende Daten	251
6.5.1	Mean animal weight / Mittleres Tiergewicht	251
6.5.2	Mean excretion rates / Mittlere Ausscheidungen	251
6.5.3	International comparison / Internationaler Vergleich	251
6.5.4	References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung	252
6.6	Goats / Ziegen	254
6.6.1	Animal weights and management details / Tiergewichte und Haltungsdetails	254
6.6.2	Methane from enteric fermentation / Methan aus der Verdauung	254
6.6.3	Methane from manure management / Methan aus dem Wirtschaftsdünger-Management	254
6.6.4	NMVOC emissions / NMVOC-Emissionen	255
6.6.5	Emissions of nitrogen species / Emissionen von Stickstoff-Spezies	255
6.6.6	Emissions of particulate matter / Partikelemissionen	255
6.6.7	International comparison / Internationaler Vergleich	256
6.6.8	References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung	257
7	Horses, asses and mules / Pferde, Esel und Maultiere	258
7.1	Animal numbers / Tierzahlen	258
7.1.1	Formation of subcategories and consideration of mules and asses / Untergliederung in Subkategorien und Berücksichtigung von Maultieren und Eseln	258
7.1.2	Uncertainties / Unsicherheiten	258
7.2	Parameters common to all horses / Gemeinsame Parameter für alle Pferde	258
7.2.1	Methane from manure management / Methan aus dem Wirtschaftsdünger-Management	258
7.2.2	Emissions of nitrogen species / Emissionen von Stickstoff-Spezies	259
7.3	Heavy horses / Großpferde	260
7.3.1	Animal weight and energy intake / Tiergewicht und Energieaufnahme	260
7.3.2	Methane from enteric fermentation / Methan aus der Verdauung	260
7.3.3	Methane from manure management / Methan aus Wirtschaftsdünger-Management	261
7.3.4	NMVOC emissions / NMVOC-Emissionen	261
7.3.5	Emissions of nitrogen species / Emissionen von Stickstoff-Spezies	261
7.3.6	Emissions of particulate matter / Partikelemissionen	262
7.3.7	References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung	262
7.4	Light horses and ponies / Kleinpferde und Ponys	263

7.4.1	Animal weight and energy intake / Tiergewicht und Energieaufnahme	263
7.4.2	Methane from enteric fermentation / Methane aus der Verdauung	264
7.4.3	Methane from manure management / Methan aus Wirtschaftsdünger-Management	264
7.4.4	NMVOC emissions / NMVOC-Emissionen	264
7.4.5	Emissions of nitrogen species / Emissionen von Stickstoff-Spezies	264
7.4.6	Emissions of particulate matter / Partikelemissionen	265
7.4.7	References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung	265
7.5	Horses– collective description / Pferde - zusammenfassende Daten	266
7.5.1	Animal weight and energy intake / Tiergewicht und Energieaufnahme	266
7.5.2	Mean VS and N excretion rates / Mittlere VS- und N-Ausscheidungen	266
7.5.3	International comparison / Internationaler Vergleich	266
7.5.4	References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung	268
8	Poultry / Geflügel	269
8.1	Animal numbers / Tierzahlen	269
8.1.1	Formation of subcategories / Untergliederung in Subkategorien	269
8.1.2	Uncertainties / Unsicherheiten	269
8.2	Emission factors for nitrogen emissions / Emissionsfaktoren für Stickstoffemissionen	270
8.2.1	N ₂ O, NO and N ₂ from housing, storage and spreading / N ₂ O, NO und N ₂ aus Stall, Lager und Ausbringung	270
Table 8.2:	Poultry, partial emission factors for N ₂ O-N, NO-N, and N ₂ -N from housing and storage (applied to Nexcr + Nstraw)	270
8.2.2	NH ₃ emission factors / NH ₃ -Emissionsfaktoren	271
8.2.3	Uncertainties of emission factors and activity data / Unsicherheiten von Emissionsfaktoren und Aktivitätsdaten	271
8.3	Laying hens / Legehennen	272
8.3.1	Animal numbers / Tierzahlen	272
8.3.2	Data on laying hen husbandry and egg production / Haltungs- und Legeleistungsdaten	273
8.3.3	Energy requirements / Energiebedarf	275
8.3.3.1	Metabolisable energy / Umsetzbare Energie	275
8.3.3.2	Metabolisable energy required for maintenance / Erhaltungsenergie	275
8.3.3.3	Metabolisable energy needed to obtain food / Energiebedarf für Nahrungsaufnahme	276
8.3.3.4	Metabolisable energy needed for egg production / Energiebedarf für Eiproduktion	276
8.3.3.5	Metabolisable energy for growth / Energiebedarf für Wachstum	276
8.3.4	Feed and energy intake / Futter- und Energieaufnahme	276
8.3.5	Methane from enteric fermentation / Methan aus der Verdauung	277
8.3.6	Methane from manure management / Methan aus Wirtschaftsdünger-Management	277
8.3.7	NMVOC emissions / NMVOC-Emissionen	278
8.3.8	Emissions of nitrogen species / Emissionen von Stickstoff-Spezies	278
8.3.8.1	N excretion / N-Ausscheidung	278
8.3.8.2	N inputs with straw / N-Einträge mit Stroh	279
8.3.8.3	Partial emission factors / Partielle Emissionsfaktoren	280
8.3.8.4	Indirect N ₂ O from manure management / Indirektes N ₂ O aus dem Wirtschaftsdünger-Management	282
8.3.8.5	Uncertainties of emission factors and activity data / Unsicherheiten von Emissionsfaktoren und Aktivitätsdaten	282
8.3.9	Emissions of particulate matter / Partikelemissionen	282
8.3.10	References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung	282
8.4	Broilers / Masthähnchen und –hühnchen	283
8.4.1	Animal numbers / Tierzahlen	283
8.4.2	Meat production / Fleischproduktion	283
8.4.2.1	Mean duration of fattening / Mittlere Mastdauer	283
8.4.2.2	Animal weights / Tiergewichte	284
8.4.2.2.1	Live weight / Lebendgewicht	284
8.4.2.2.2	Broiler meat production and carcass weight / Hähnchenfleischproduktion und Ausschachtungsgrad	284
8.4.3	Energy requirements / Energiebedarf	285
8.4.4	Feed and energy intake / Futter- und Energieaufnahme	285
8.4.5	Methane from enteric fermentation / Methan aus der Verdauung	286
8.4.6	Methane from manure management / Methan aus Wirtschaftsdünger-Management	287
8.4.7	NMVOC emissions / NMVOC-Emissionen	287
8.4.8	Emissions of nitrogen species / Emissionen von Stickstoff-Spezies	287
8.4.8.1	N excretion / N-Ausscheidung	287
8.4.8.2	N intake with feed / N-Aufnahme über das Futter	288
8.4.8.3	N retention in the animal / N-Retention im Tierkörper	288
8.4.8.4	N inputs with straw / N-Einträge mit Stroh	289

8.4.8.5	Partial emission factors / Partielle Emissionsfaktoren	289
8.4.8.6	Indirect N ₂ O from manure management / Indirektes N ₂ O aus dem Wirtschaftsdünger-Management	290
8.4.8.7	Uncertainties of emission factors and activity data / Unsicherheiten von Emissionsfaktoren und Aktivitätsdaten	290
8.4.9	Emissions of particulate matter / Partikelemissionen	290
8.4.10	References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung	291
8.5	Pullets / Junghennen	292
8.5.1	Animal numbers / Tierzahlen	292
8.5.2	Animal weights and husbandry details / Tiergewichte und Haltungsdetails	293
8.5.3	Energy requirements / Energiebedarf	293
8.5.4	Feed and energy intake / Futter- und Energieaufnahme	293
8.5.5	Methane from enteric fermentation / Methan aus der Verdauung	295
8.5.6	Methane from manure management / Methan aus Wirtschaftsdünger-Management	295
8.5.7	NMVOC emissions / NMVOC-Emissionen	296
8.5.8	Emissions of nitrogen species / Emissionen von Stickstoff-Spezies	296
8.5.8.1	N excretion rates / N-Ausscheidungen	296
8.5.8.2	N inputs with straw / N-Einträge mit Stroh	297
8.5.8.3	Partial emission factors / Partielle Emissionsfaktoren	297
8.5.8.4	Indirect N ₂ O from manure management / Indirektes N ₂ O aus dem Wirtschaftsdünger-Management	298
8.5.8.5	Uncertainties of emission factors and activity data / Unsicherheiten von Emissionsfaktoren und Aktivitätsdaten	298
8.5.9	Emissions of particulate matter / Partikelemissionen	298
8.5.10	References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung	298
8.6	Geese / Gänse	299
8.6.1	Animal numbers / Tierzahlen	299
8.6.2	Animal weights / Tiergewichte	299
8.6.3	Methane from enteric fermentation / Methan aus der Verdauung	299
8.6.4	Methane from manure management / Methan aus Wirtschaftsdünger-Management	299
8.6.5	NMVOC emissions / NMVOC-Emissionen	300
8.6.6	Emissions of nitrogen species / Emissionen von Stickstoff-Spezies	300
8.6.7	Emissions of particulate matter / Partikelemissionen	301
8.6.8	References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung	302
8.7	Ducks / Enten	303
8.7.1	Animal numbers / Tierzahlen	303
8.7.2	Animal weights and duration of fattening period / Tiergewichte und Mastdauer	303
8.7.3	Energy requirements / Energiebedarf	303
8.7.4	Feed and energy intake / Futter- und Energieaufnahme	304
8.7.5	Methane from enteric fermentation / Methan aus der Verdauung	305
8.7.6	Methane from manure management / Methan aus Wirtschaftsdünger-Management	305
8.7.7	NMVOC emissions / NMVOC-Emissionen	305
8.7.8	Emissions of nitrogen species / Emissionen von Stickstoff-Spezies	306
8.7.8.1	N excretion rates / N-Ausscheidungen	306
8.7.8.2	N inputs with straw / N-Einträge mit Stroh	306
8.7.8.3	Partial emission factors / Partielle Emissionsfaktoren	307
8.7.8.4	Indirect N ₂ O from manure management / Indirektes N ₂ O aus dem Wirtschaftsdünger-Management	308
8.7.8.5	Uncertainties of emission factors and activity data / Unsicherheiten von Emissionsfaktoren und Aktivitätsdaten	308
8.7.9	Emissions of particulate matter / Partikelemissionen	308
8.7.10	References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung	308
8.8	Turkeys / Puten	310
8.8.1	Animal numbers / Tierzahlen	310
8.8.2	Animal performance and feed / Tierische Leistung und Fütterung	311
8.8.2.1	Animal weights and fattening period durations / Tiergewichte und Mastdauern	311
8.8.2.2	Energy requirements / Energiebedarf	312
8.8.2.3	Feed intake and feed properties / Futteraufnahme und Futtereigenschaften	313
8.8.3	Methane from enteric fermentation / Methan aus der Verdauung	314
8.8.4	Methane from manure management / Methan aus Wirtschaftsdünger-Management	314
8.8.5	NMVOC emissions / NMVOC-Emissionen	314
8.8.6	Emissions of nitrogen species / Emissionen von Stickstoff-Spezies	315
8.8.6.1	N excretion rates / N-Ausscheidungen	315
8.8.6.2	N inputs with straw / N-Einträge mit Stroh	315
8.8.6.3	Partial emission factors / Partielle Emissionsfaktoren	316
8.8.6.4	Indirect N ₂ O from manure management / Indirektes N ₂ O aus dem Wirtschaftsdünger-Management	317

8.8.6.5	Uncertainties of emission factors and activity data / Unsicherheiten von Emissionsfaktoren und Aktivitätsdaten	317
8.8.7	Emissions of particulate matter / Partikelemissionen	317
8.8.8	References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung	317
8.9	Poultry – collective description / Geflügel - zusammenfassende Daten	318
8.9.1	Aggregated data for poultry / Zusammenfassende Daten für Geflügel	318
8.9.1.1	Animal numbers / Tierzahlen	318
8.9.1.2	Animal weights / Tiergewichte	318
8.9.1.3	Calculation of mean VS and N excretions / Berechnung mittlerer VS- und N-Ausscheidungen	319
8.9.1.4	Implied emission factors (IEF) / Aggregierte Emissionsfaktoren (IEF)	319
8.9.2	International comparison / Internationaler Vergleich	319
8.9.3	References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung	322
9	Deer, rabbits, ostrich and fur-bearing animals / Gehegewild, Kaninchen, Strauße und Pelztiere	323
9.1	Overview / Überblick	323
9.2	Animal numbers / Tierplatzzahlen	324
9.3	CH ₄ from enteric fermentation / CH ₄ aus der Verdauung	324
9.4	CH ₄ from manure management and free range / CH ₄ aus Wirtschaftsdünger-Management und Freiland	325
9.5	N emissions from housing and storage / N-Emissionen aus Stall und Lager	325
9.5.1	Excretions of total N and TAN / Ausscheidungen von Gesamt-N und TAN	326
9.5.2	NH ₃ from housing and storage / NH ₃ aus Stall und Lager	327
9.5.3	Direct N ₂ O from housing and storage / Direktes N ₂ O aus Stall und Lager	327
9.5.4	NO and N ₂ from housing and storage / NO und N ₂ aus Stall und Lager	328
9.5.5	Indirect N ₂ O from housing and storage / Indirektes N ₂ O aus Stall und Lager	328
9.6	NH ₃ from spreading and free range / NH ₃ aus Ausbringung und Freilandaufenthalt	329
9.7	N ₂ O from agricultural soils / N ₂ O aus landwirtschaftlichen Böden	329
9.7.1	Direct N ₂ O / Direktes N ₂ O	329
9.7.2	Indirect N ₂ O / Indirektes N ₂ O	330
10	Digestion of energy crops / Vergärung von Energiepflanzen	331
10.1	Activity data and parameters / Aktivitätsdaten und Parameter	331
10.2	Calculation of emissions / Emissionsberechnung	333
10.2.1	Methodological Aspects and emission factors / Methodische Aspekte und Emissionsfaktoren	333
10.2.2	Uncertainties of the emission factors / Unsicherheiten der Emissionsfaktoren	336
10.3	References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung	336
11	Direct emissions from managed agricultural soils and cultures / Direkte Emissionen aus landwirtschaftlichen Nutzflächen und Kulturen	338
11.1	Application of mineral fertilizers / Mineraldüngerausbringung	340
11.1.1	Activity data: Amounts of fertilizers / Aktivitätsdaten: Düngermengen	340
11.1.2	Calculation of emissions / Emissionsberechnung	341
11.1.2.1	Emissions of NH ₃ / NH ₃ -Emissionen	341
11.1.2.2	Emissions of N ₂ O / N ₂ O-Emissionen	342
11.1.2.3	Emissions of NO / NO-Emissionen	342
11.1.2.4	Uncertainties of the N emissions / Unsicherheiten der N-Emissionen	343
11.2	Application of animal manures and digestates of animal manures / Ausbringung von Wirtschaftsdüngern und Wirtschaftsdünger-Gärresten	344
11.2.1	Activity data / Aktivitätsdaten	344
11.2.2	Calculation of emissions / Emissionsberechnung	345
11.3	Application of digestate from energy crops / Ausbringung der Gärreste aus der Energiepflanzen-Vergärung	346
11.3.1	Activity data / Aktivitätsdaten	346
11.3.2	Calculation of emissions / Emissionsberechnung	346
11.4	Application of sewage sludge / Ausbringung von Klärschlämmen	347
11.4.1	Activity data / Aktivitätsdaten	347
11.4.2	Calculation of emissions / Emissionsberechnung	349
11.4.2.1	Emissions of NH ₃ / NH ₃ -Emissionen	349
11.4.2.2	Emissions of N ₂ O / N ₂ O-Emissionen	349
11.4.2.3	Emissions of NO / NO-Emissionen	349
11.5	Grazing / Weidegang	350
11.5.1	Activity data / Aktivitätsdaten	350
11.5.2	Calculation of emissions / Emissionsberechnung	350
11.6	Management of drained organic soils / Bewirtschaftung drainierter organischer Böden	352
11.6.1	Activity data / Aktivitätsdaten	352
11.6.2	Calculation of emissions / Emissionsberechnung	352
11.7	Crop residues / Ernterückstände	354

11.7.1	Activity data / Aktivitätsdaten	354
11.7.1.1	Area under cultivation / Anbauflächen	354
11.7.1.2	Yields / Erträge	354
11.7.1.3	Constants for agricultural crops and grassland / Konstanten für Grünland und Ackerland	354
11.7.1.3.1	Nitrogen content of the above-ground crop residues ($x_{N, above, i}$) / Stickstoff-Gehalte der oberirdischen Ernterückstände ($x_{N, above, i}$)	355
11.7.1.3.2	Nitrogen content of below ground crop residues ($x_{N, below, i}$) / Stickstoff-Gehalte der unterirdischen Ernterückstände ($x_{N, below, i}$)	355
11.7.1.3.3	Dry matter content of yield and above ground residues ($x_{Y, DM, i} / x_{AGR, DM, i}$) / Trockenmassegehalte von Erntegut und oberirdischen Ernterückständen ($x_{Y, DM, i} / x_{AGR, DM, i}$):	355
11.7.1.3.4	Ratio of above ground crop residues to yield ($a_{above, i}$) / Verhältnis der oberirdischen Ernterückstände zur Ernte ($a_{above, i}$)	355
11.7.1.3.5	Ratio of below ground crop residues to above ground biomass ($a_{below, Bio, i}$) / Verhältnis der unterirdischen Ernterückstände zur oberirdischen Biomasse ($a_{below, Bio, i}$)	356
11.7.1.3.6	Duration of cropped system ($x_{renew, i}$) and frequency of harvesting ($x_{mow, i}$) / Dauer der Kultur ($x_{renew, i}$) und Erntefrequenz der Kultur ($x_{mow, i}$)	356
11.7.1.4	Constants needed for horticultural crops and Strawberries / Für Gemüse und Erdbeeren benötigte Konstanten	357
11.7.1.4.1	Ratio of crop residues to yield (a_i) / Verhältnis der Ernterückstände zur Ernte (a_i)	357
11.7.1.4.2	Nitrogen content of crop residues ($x_{N, i}$) and harvested crop products ($x_{N, yield, i}$) / Stickstoff-Gehalte der Ernterückstände ($x_{N, i}$) und der geernteten Produkte ($x_{N, yield, i}$):	357
11.7.1.4.3	Factor for not harvested horticultural crops (δ_{HC}) / Faktor für nicht geerntetes Gemüse (δ_{HC})	357
11.7.1.5	Overview of data used to estimate the activity data / Übersicht über die zur Aktivitätsdatenberechnung verwendeten Daten	358
11.7.1.6	Uncertainty of activity data / Unsicherheit der Aktivitätsdaten	359
11.7.2	Calculation of emissions / Emissionsberechnung	359
11.7.2.1	The method applied / Angewandte Methode	359
11.8	Mineralization of soil organic matter / Mineralisierung organischer Bodensubstanz	361
11.8.1	Activity data / Aktivitätsdaten	361
11.8.2	Calculation of emissions / Emissionsberechnung	361
11.9	Field burning of agricultural residues / Verbrennen von Ernterückständen	362
11.9.1	Overview / Übersicht	362
11.9.2	Details / Details	362
11.10	CO₂ from liming / CO₂ aus Kalkung	363
11.10.1	Activity data / Aktivitätsdaten	363
11.10.1.1	Official data / Offizielle Daten	363
11.10.1.2	Share of Dolomite / Dolomit-Anteil	364
11.10.1.3	Conversion of fertilizer amounts into emission factor units / Umrechnung der Düngermengen auf Emissionsfaktor-Einheiten	365
11.10.1.4	Uncertainties of the activity data / Unsicherheit der Aktivitätsdaten	365
11.10.2	Calculation of emissions / Emissionsberechnung	366
11.11	CO₂ from application of urea / CO₂ aus Harnstoffanwendung	367
11.11.1	Activity data / Aktivitätsdaten	367
11.11.2	Calculation of emissions / Emissionsberechnung	367
11.12	NMVOC from cultivated crops / NMVOC aus landwirtschaftlichen Kulturen	369
11.12.1	Activity data / Aktivitätsdaten	369
11.12.2	Calculation of emissions / Emissionsberechnung	370
11.13	Emissions of HCB / HCB-Emissionen	371
11.13.1	Activity data / Aktivitätsdaten	372
11.13.2	Calculation of emissions / Emissionsberechnung	375
11.13.3	Recalculation / Rekalkulationen	376
11.13.4	Uncertainty of activity data and emission factors / Unsicherheiten von Aktivitätsdaten und Emissionsfaktoren	376
11.14	Emissions of particulate matter / Partikelemissionen	377
11.14.1	Activity data / Aktivitätsdaten	377
11.14.2	Calculation of emissions / Emissionsberechnung	377
11.15	International comparison / Internationaler Vergleich	378
11.16	References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung	380
12	Indirect N₂O emissions from agricultural soils / Indirekte N₂O-Emissionen aus landwirtschaftlichen Nutzflächen	382
12.1	Deposition of reactive nitrogen / Deposition von reaktivem Stickstoff	382
12.1.1	Activity data / Aktivitätsdaten	382
12.1.2	Calculation of emissions / Emissionsberechnung	383
12.2	Leaching and runoff of nitrogen / Ausgewaschener und abgeflüssener Stickstoff	384

12.2.1	Activity data / Aktivitätsdaten	384
12.2.2	Calculation of emissions / Emissionsberechnung	385
12.3	International comparison of data / Internationaler Datenvergleich	385
12.4	References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung	385
13	Fractions / Verhältniszahlen	386
13.1	Fra _{C_{GASF}}	386
13.2	Fra _{C_{GASM}}	386
13.3	Fra _{C_{LEACH}}	386
13.4	International comparison of data / Internationaler Datenvergleich	387
13.5	References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung	387
14	Overall emission inventory uncertainty / Emissionsinventar-Gesamtunsicherheit	388
14.1	Overview / Überblick	388
14.2	Gaussian error propagation and 95 % confidence interval / Gaußsche Fehlerfortpflanzung und 95 %-Konfidenzintervall	389
14.3	IEF uncertainty for methane / IEF-Unsicherheit für Methan	390
14.3.1	Methane from enteric fermentation / Methan aus der Verdauung	390
14.3.2	Methane from manure management / Methan aus dem Wirtschaftsdünger-Management	391
14.4	IEF uncertainties for N ₂ O, NO and N ₂ / IEF-Unsicherheiten für N ₂ O, NO und N ₂	391
14.4.1	IEF uncertainty for N ₂ O from manure management / IEF-Unsicherheit für N ₂ O aus dem Wirtschaftsdünger-Management	391
14.4.2	IEF uncertainty for NO and N ₂ from manure management / IEF-Unsicherheit für NO und N ₂ aus dem Wirtschaftsdünger-Management	392
14.4.3	IEF uncertainty for N ₂ O from agricultural soils / IEF-Unsicherheit für N ₂ O aus landwirtschaftlichen Böden	392
14.5	IEF uncertainty for NH ₃ from manure management / IEF-Unsicherheit für NH ₃ aus dem Wirtschaftsdünger-Management	393
14.6	Total uncertainty of the German agricultural GHG inventory / Gesamtunsicherheit des deutschen landwirtschaftlichen THG-Inventars	395
14.6.1	Calculation methodology / Berechnungsmethodik	395
14.6.2	Special features of the uncertainties of activity data / Besonderheiten von Unsicherheiten der Aktivitätsdaten	395
14.6.3	Special features of the uncertainties of emission factors / Besonderheiten der Unsicherheiten von Emissionsfaktoren	395
14.6.4	Uncertainty table / Unsicherheitstabelle	395
14.7	Uncertainty of the German agricultural ammonia inventory / Unsicherheit des Ammoniak-Inventars für die deutsche Landwirtschaft	399
15	References / Quellenverzeichnis	401

List of Figures / Abbildungsverzeichnis

Figure 2.1:	Annual THG emissions from German agriculture (Submission 2020) ($GWP_{CH_4} = 25$, $GWP_{N_2O} = 298$)	6
Figure 2.2:	Development of CH_4 und N_2O emissions from manure management in % of 1990, Submission 2020 (enteric fermentation and manure management)	8
Figure 2.3:	Development of animal numbers in % of 1990, Submission 2020	9
Figure 2.4:	Total performance-related GHG emissions from enteric fermentation and manure management (housing, storage) for dairy cows (per kg of milk) and fattening pigs (per kg of daily growth), Submission 2020 ($GWP_{CH_4} = 25$, $GWP_{N_2O} = 298$)	10
Figure 2.5:	N_2O emissions from agricultural soils (in $Gg\ a^{-1}\ N_2O$), Submission 2020	11
Figure 2.6:	Interannual variations of annual N_2O emissions (direct plus indirect N_2O) from agricultural soils vs. interannual variations of mineral fertilizer N for the years 1990 to 2018 (Submission 2020)	12
Figure 2.7:	Annual NH_3 emissions from German agriculture for 1990 – 2018 (Submission 2020), National emission ceiling (NEC) at $550\ Gg\ a^{-1}$	13
Figure 2.8:	Dairy cows and fattening pigs (Submission 2020): Percentages of NH_3 emissions originating from housing, storage, manure application and grazing in 2018	15
Figure 2.9:	Broilers and all animals (Submission 2020): Percentages of NH_3 emissions originating from housing, storage, manure application and grazing in 2018	15
Figure 2.10:	Dairy cows and fattening pigs: Performance-related total NH_3 emissions from animal husbandry, including grazing for dairy cows (for dairy cows per kg milk, for fattening pigs per kg of daily growth), Submission 2020	17
Figure 2.11:	Application of mineral fertilizer N (amounts sold), amounts of N in urea and ANS applied, and the NH_3 emissions from the total application of mineral fertilizers (Submission 2020)	18
Figure 2.12:	Comparison of GHG emission results in Submission 2020 and Submission 2019	19
Figure 2.13:	Comparison of NH_3 emission results in Submission 2020 and Submission 2019	20
Figure 3.1:	Mass flow in agriculture	33
Figure 3.2:	Concept and thematic contents of the GAS-EM model	34
Figure 3.3:	GHG emissions from livestock husbandry (GAS-EM model)	37
Figure 3.4:	Energies considered in animal metabolism	39
Figure 3.5:	N flows in an animal subcategory (mammals)	49
Figure 3.6:	N flows in an animal subcategory (birds)	51
Figure 3.7:	Processes and quality control/assurance of the emission inventory preparation at Thünen Institute	104
Figure 4.1:	Standard mixed feeds, share of rapeseed expeller in concentrates (related to DM) as function of milk yield	140
Figure 4.2:	Standard grass based feeds, share of wheat in concentrates (related to DM) as function of milk yield	141
Figure 4.3:	Male beef cattle, comparison of weight gain data (ADR and HIT data sets on the national level)	173
Figure 5.1:	Weaners, weight gain as a function of live weight. Variable data: LfL (2004b); solid line: linear approximation.	216
Figure 8.1:	Laying hens, animal live weight data and related trends	274
Figure 8.2:	Turkeys, typical animal weight and weight gain developments	311
Figure 11.1:	Above and below ground parts of crops, tuber crops and grasses	355

List of Tables / Tabellenverzeichnis

Table 2.1:	GHG emissions from German agriculture in Tg CO _{2eq} (Submission 2020) ($GWP_{CH_4} = 25$, $GWP_{N_2O} = 298$)	7
Table 2.2:	Total national change of CH ₄ emissions from manure management due to anaerobic digestion of manure (also in percent of the total CH ₄ emissions from manure management to be obtained without anaerobic digestion; negative data: decrease of emissions), Submission 2020	10
Table 2.3:	Total national change of direct N ₂ O emissions from manure management due to anaerobic digestion of manure (also in percent of total direct N ₂ O emissions from manure management to be obtained without anaerobic digestion; negative data: decrease of emissions), Submission 2020	10
Table 2.4:	Ammonia emissions from German agriculture for 1990 - 2018 in Gg NH ₃ (Submission 2020)	14
Table 2.5:	Change of total NH ₃ emissions from "housing + storage + spreading + grazing" due to anaerobic digestion of manure (also in percent of NH ₃ emissions from the situation without anaerobic digestion; positive data: increase of emissions), Submission 2020	16
Table 3.1:	List of symbols frequently used for quantities	23
Table 3.2:	List of subscripts used to identify source categories and subcategories	24
Table 3.3:	Abbreviations used for the German Federal States	24
Table 3.4:	Tier 1 emission factors $EF_{NMVOC, MM}$ used for NMVOC emissions from manure management	47
Table 3.5:	Calculated total Tier 2 emission factors (IEF) for dairy cows and other cattle	48
Table 3.6:	Straw properties in animal husbandry	52
Table 3.7:	Digestion of manure, N ₂ O emissions	66
Table 3.8:	Digestion of manure, NH ₃ emissions	69
Table 3.9:	Reference dates of the surveys and methods of data gap filling used in the inventory	80
Table 3.10:	Number of animal places in the German emission inventory (in 1000, cattle including buffalo, horses including mules and asses)	81
Table 3.11:	Digestion of manures, percentages of animal manures used as feedstock	95
Table 3.12:	Digestion of manures, percentages of gas tight storage of digestate from animal manures	95
Table 3.13:	Digestion of manure, comparison of mean N ₂ O-N emission factors for the four different manure management categories in the German inventory (related to N available)	99
Table 3.14:	Digestion of manure, NH ₃ -N emission factors for pre-storage	100
Table 4.1:	Cattle, categorisation and characterization	114
Table 4.2:	Buffalo, animal numbers between 2000 and 2012 at national level	116
Table 4.3:	Buffalo, comparison of Italian buffalo data (Submission 2019) for 2012 with respective data from all cattle categories of the German inventory (Submission 2020)	118
Table 4.4:	Cattle, maximum methane producing capacity (B_0) and methane conversion factors (MCF)	119
Table 4.5:	Cattle, partial emission factors for NH ₃ -N from housing (related to TAN)	120
Table 4.6:	Cattle, partial emission factors for NH ₃ -N from storage (related to TAN)	120
Table 4.7:	Cattle, partial emission factors for direct N ₂ O-N from housing and storage (applied to $N_{excr} + N_{straw}$)	121
Table 4.8:	Cattle, NH ₃ -N emission factors for application of slurry and digested manure (related to TAN)	122
Table 4.9:	Cattle, NH ₃ -N emission factors for application of leachate ("Jauche") (related to TAN)	123
Table 4.10:	Cattle, NH ₃ -N emission factors for application of solid manure (FYM) (related to TAN)	123
Table 4.11:	Dairy cows, calculation methods applied	125
Table 4.12:	Dairy cows, milk yield (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹) (averaged district level data)	126
Table 4.13:	Dairy cows, fat content of milk (in % of mass)	126
Table 4.14:	Dairy cows, protein content of milk (in % of mass)	127
Table 4.15:	Dairy cows, carcass weights (in kg an ⁻¹)	128
Table 4.16:	Dairy cows, slaughter ages, ages at first calving and resulting life spans (in a)	128
Table 4.17:	Dairy cows, NEL intake during the dry period for a cow of 650 kg	132
Table 4.18:	Dairy cows, national distribution (fractions) of "mixed diet" (M) and "grass based diet" (G)	138
Table 4.19:	Dairy cows, diet constituent properties used in the inventory	139
Table 4.20:	Dairy cows, additional diet data needed for the calculation of CH ₄ from enteric fermentation	139
Table 4.21:	Dairy cows, N inputs with straw in solid-manure systems	148
Table 4.22:	Dairy cows, emission factors for particle emissions from housing	150
Table 4.23:	Dairy cows, 2017, international comparison of emission explaining variables and implied emission factors of CH ₄ from enteric fermentation	151

Table 4.24:	Dairy cows, 2017, international comparison of emission explaining variables and implied emission factors of CH ₄ from manure management	152
Table 4.25:	Dairy cows, 2017, international comparison of total N excretions and implied emission factors of NH ₃ from manure management (housing and storage, without spreading)	153
Table 4.26:	Dairy cows, 2017, international comparison of implied emission factors of TSP, PM and NMVOC	153
Table 4.27:	Dairy cows, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)	154
Table 4.28:	Calves, calculation methods applied	155
Table 4.29:	Calves, emission factors for particle emissions from housing	159
Table 4.30:	Calves, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)	159
Table 4.31:	Heifers, calculation methods applied	160
Table 4.32:	Heifers, carcass weights (in kg an ⁻¹)	161
Table 4.33:	Heifers, daily ME requirements as a function of animal weight and weight gain (in MJ an ⁻¹ d ⁻¹)	162
Table 4.34:	Heifers, diet constituent properties used in the inventory	165
Table 4.35:	Heifers, N inputs with straw in solid-manure systems	168
Table 4.36:	Heifers, emission factors for particle emissions from housing	169
Table 4.37:	Heifers, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)	169
Table 4.38:	Male beef cattle, calculation methods applied	170
Table 4.39:	Male beef cattle, carcass weight (in kg an ⁻¹)	171
Table 4.40:	Male beef cattle, mean weight gains $\Delta w_{bm, HIT}$ derived from HIT data (in g an ⁻¹ d ⁻¹)	172
Table 4.41:	Male beef cattle, mean weight gains $\Delta w_{bm, ADR}$ (g an ⁻¹ d ⁻¹)	172
Table 4.42:	Male beef cattle, correction factor f_j	173
Table 4.43:	Male beef cattle, diet characteristics used in the inventory	175
Table 4.44:	Male beef cattle, N inputs with straw in solid-manure systems	177
Table 4.45:	Male beef cattle, emission factors for particle emissions from housing (first estimates)	178
Table 4.46:	Male beef cattle, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)	178
Table 4.47:	Suckler cows, calculation methods applied	179
Table 4.48:	Suckler cows, N inputs with straw in solid-manure systems	183
Table 4.49:	Suckler cows, emission factors for particle emissions from housing	184
Table 4.50:	Suckler cows, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)	185
Table 4.51:	Mature males > 2 years, calculation methods applied	186
Table 4.52:	Mature males > 2 years, emission factors for particle emissions from housing (first estimates)	189
Table 4.53:	Mature males > 2 years, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)	190
Table 4.54:	Other cattle, calculation methods applied	191
Table 4.55:	Other cattle, 2017, international comparison of emission explaining variables and implied emission factors for CH ₄ from enteric fermentation	196
Table 4.56:	Other cattle, 2017, international comparison of emission explaining variables and implied emission factors for CH ₄ from manure management	196
Table 4.57:	Other cattle, 2017, international comparison of N excretion rates and implied emission factors of NH ₃ from manure management (housing and storage, without spreading)	197
Table 4.58:	Other cattle, 2017, international comparison of implied emission factors of TSP, PM and NMVOC	198
Table 4.59:	Other cattle, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)	198
Table 5.1:	Pigs, categorisation and characterisation	199
Table 5.2:	Pigs, maximum methane producing capacity (B_0) and methane conversion factors (MCF)	200
Table 5.3:	pigs, partial emission factors for NH ₃ -N from housing (related to TAN)	201
Table 5.4:	Pigs, partial emission factors for NH ₃ -N losses from storage (related to TAN)	202
Table 5.5:	Pigs, partial emission factors for N ₂ O-N from housing and storage (applied to $N_{excr} + N_{straw}$)	203
Table 5.6:	Pigs, NH ₃ -N emission factors for application of slurry (related to TAN)	204
Table 5.7:	Pigs, NH ₃ -N emission factors for application of leachate ("Jauche") (related to TAN)	205
Table 5.8:	Pigs, NH ₃ -N emission factors for application of solid manure (FYM) (related to TAN)	205
Table 5.9:	Sows, calculation methods applied	206
Table 5.10:	Sows, production cycle: Definition of phases and respective ME requirements	207
Table 5.11:	Sows, number of piglets raised per sow and year, $n_{piglets, year}$ (primary statistical information)	208
Table 5.12:	Sows, diets used in the inventory, and their properties	209
Table 5.13:	Sows, emission factors for particle emissions from housing	213
Table 5.14:	Sows, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)	213

Table 5.15:	Weaners, calculation methods applied	214
Table 5.16:	Weaners, diets used in the inventory, and their properties	218
Table 5.17:	Weaners, N inputs with straw in solid-manure systems	220
Table 5.18:	Weaners, emission factors for particle emissions from housing	221
Table 5.19:	Weaners, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)	221
Table 5.20:	Fattening pigs, calculation methods applied	222
Table 5.21:	Fattening pigs, weight at beginning of the fattening period (in kg an ⁻¹)	223
Table 5.22:	Fattening pigs, final weight after fattening (live weight, in kg an ⁻¹)	223
Table 5.23:	Fattening pigs, weight gain during fattening (in g an ⁻¹ d ⁻¹)	223
Table 5.24:	Fattening pigs, diets used, related energies, and crude protein contents	228
Table 5.25:	Fattening pigs, N inputs with straw in solid-manure systems	232
Table 5.26:	Fattening pigs, emission factors for particle emissions from housing	233
Table 5.27:	Fattening pigs, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)	233
Table 5.28:	Boars, calculation methods applied	234
Table 5.29:	Boars, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)	237
Table 5.30:	Pigs, 2017, international comparison of emission explaining variables and implied emission factors for enteric fermentation (ent) and manure management (MM)	240
Table 5.31:	Pigs, 2017, international comparison of implied emission factors of TSP, PM and NMVOC	241
Table 5.32:	Pigs, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)	241
Table 6.1:	Sheep and goats, maximum methane producing capacity (B_0) and methane conversion factors (MCF) for German temperature conditions	244
Table 6.2:	Adult sheep, calculation methods applied	245
Table 6.3:	Adult sheep, emission factors for particle emissions from housing	247
Table 6.4:	Adult sheep, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)	247
Table 6.5:	Lambs, calculation methods applied	248
Table 6.6:	Lambs, emission factors for particle emissions from housing	250
Table 6.7:	Lambs, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)	250
Table 6.8:	Sheep, 2017, international comparison of emission explaining variables and implied emission factors for regarding enteric fermentation (ent) and manure management (MM)	252
Table 6.9:	Sheep, collective description, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)	253
Table 6.10:	Goats, calculation methods applied	254
Table 6.11:	Goats, emission factors for particle emissions from housing	255
Table 6.12:	Goats, 2017, international comparison of emission explaining variables and implied emission factors for enteric fermentation (ent) and manure management (MM)	256
Table 6.13:	Goats, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)	257
Table 7.1:	Horses, Maximum methane producing capacity (B_0) and methane conversion factors (MCF)	259
Table 7.2:	Heavy horses, calculation methods applied	260
Table 7.3:	Heavy horses, emission factors for particle emissions from housing	262
Table 7.4:	Heavy horses, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)	262
Table 7.5:	Light horses and ponies, calculation methods applied	263
Table 7.6:	Light horses and ponies, emission factors for particle emissions from housing	265
Table 7.7:	Light horses and ponies, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)	265
Table 7.8:	Horses, 2017, international comparison of emission explaining variables and implied emission factors for enteric fermentation (ent) and manure management (MM)	267
Table 7.9:	Horses, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)	268
Table 8.1:	Poultry, categorisation and characterisation	269
Table 8.2:	Poultry, partial emission factors for N ₂ O-N, NO-N, and N ₂ -N from housing and storage	270
Table 8.3:	Poultry, emission factors for NH ₃ -N from application of poultry manure (related to UAN)	271
Table 8.4:	Laying hens, calculation methods applied	272
Table 8.5:	Laying hens, performance data	274
Table 8.6:	Laying hens, diets used in laying hen feeding, related energies and crude protein content	277
Table 8.7:	Laying hens, partial emission factors for NH ₃ losses from housing (in kg NH ₃ -N per kg N excreted)	281
Table 8.8:	Laying hens, emission factors for particle emissions from housing	282
Table 8.9:	Laying hens, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)	282
Table 8.10:	Broilers, calculation methods applied	283

Table 8.11:	Broilers, national total of German broiler meat production (in Gg a ⁻¹)	284
Table 8.12:	Broilers, time series of mean crude protein content in feed $x_{XP, feed}$ (kg kg ⁻¹), related to fresh matter	286
Table 8.13:	Broilers, derivation of partial emission factors for NH ₃ -N losses from housing	289
Table 8.14:	Broilers, emission factors for particle emissions from housing	291
Table 8.15:	Broilers, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)	291
Table 8.16:	Pullets, calculation methods applied	292
Table 8.17:	Pullets, phase-related diet mass intake (fresh matter) and ME contents of feed	294
Table 8.18:	Pullets, emission factors for particle emissions from housing	298
Table 8.19:	Pullets, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)	298
Table 8.20:	Geese, calculation methods applied	299
Table 8.21:	Geese, emission factors for particle emissions from housing	302
Table 8.22:	Geese, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)	302
Table 8.23:	Ducks, calculation methods applied	303
Table 8.24:	Ducks, emission factors for particle emissions from housing	308
Table 8.25:	Ducks, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)	309
Table 8.26:	Turkeys, calculation methods applied	310
Table 8.27:	Turkeys, animal performance and growth-related feed intake	312
Table 8.28:	Turkeys, phase feeding, feed nitrogen contents (x_N) and specific ME contents ($\eta_{ME, feed}$); amounts of feed in fresh matter, nitrogen contents and specific ME contents related to fresh matter	314
Table 8.29:	Turkeys, derivation of partial emission factors for NH ₃ losses from housing	316
Table 8.30:	Turkeys, emission factors for particle emissions from housing	317
Table 8.31:	Turkeys, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)	317
Table 8.32:	Poultry, 2017, international comparison of emission explaining variables and implied emission factors for manure management (MM)	320
Table 8.33:	Poultry, 2017, international comparison of implied emission factors for TSP, PM and NMVOC	321
Table 8.34:	Poultry, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)	322
Table 9.1:	GHG emissions of deer, rabbits, ostrich and fur-bearing animals	323
Table 9.2:	NH ₃ and NO emissions of deer, rabbits, ostrich and fur-bearing animals	324
Table 9.3:	Mean animal populations estimated by Federal Statistical Office	324
Table 9.4:	CH ₄ emissions from enteric fermentation of deer, rabbit and fur-bearing animals (GWP _{CH4} = 25)	325
Table 9.5:	CH ₄ from manure management (deer: free range) (GWP _{CH4} = 25)	325
Table 9.6:	N excretions and TAN contents used for German emission estimates	327
Table 9.7:	NH ₃ emission factors for housing and storage in kg NH ₃ -N per kg TAN	327
Table 9.8:	NH ₃ emissions from housing and storage	327
Table 9.9:	Direct N ₂ O emissionen from housing/storage (GWP _{N2O} = 298)	328
Table 9.10:	Indirect N ₂ O from deposition of reactive N from NH ₃ and NO lost from housing and storage (GWP _{N2O} = 298)	328
Table 9.11:	NH ₃ emission factors for spreading and free range in kg NH ₃ -N per kg TAN	329
Table 9.12:	NH ₃ from spreading and/or free range in Gg NH ₃ per year	329
Table 9.13:	Direct N ₂ O from soils after spreading and (for deer) free-range N excretions (GWP _{N2O} = 298)	329
Table 9.14:	Indirect N ₂ O from deposition of reactive N from NH ₃ and NO lost during spreading or (for deer) from free-range N excretions (GWP _{N2O} = 298)	330
Table 9.15:	Indirect N ₂ O from soils due to leaching and runoff (GWP _{N2O} = 298)	330
Table 10.1:	Digestion of energy crops, activity data (in Gg a ⁻¹)	332
Table 10.2:	Digestion of energy crops, percentages of storage types of energy-plant digestate (in %)	332
Table 10.3:	Digestion of energy crops, effective emission factor for CH ₄ , related to dry matter input (in kg kg ⁻¹)	334
Table 10.4:	Digestion of energy crops, effective emission factor for direct N ₂ O-N, related to N input (in kg kg ⁻¹)	335
Table 10.5:	Digestion of energy crops, effective emission factor for NH ₃ -N, related to N input (in kg kg ⁻¹)	335
Table 10.6:	Digestion of energy crops, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)	337
Table 11.1:	Agricultural soils, procedures used for the calculation of direct emissions	339
Table 11.2:	German classification of N fertilizers and corresponding EMEP (2016) categories	340
Table 11.3:	Mineral fertilizers, NH ₃ emission factors for the fertilizer categories applied in Germany	342
Table 11.4:	Sewage sludge applied within agriculture (in Gg a ⁻¹ , dry matter) (statistical data)	348
Table 11.5:	Sewage sludge, nitrogen content (in g kg ⁻¹ , related to dry matter) (statistical data)	348
Table 11.6:	Organic soils, German totals of areas of arable land and drained grassland (in 1000 ha)	352
Table 11.7:	Organic soils, overall N ₂ O-N emission factors (in kg kg ⁻¹)	353

Table 11.8:	Crop residues (agricultural crops and grassland), data used to calculate N ₂ O and N ₂ emissions	358
Table 11.9:	Crop residues (horticultural crops), data used to calculate N ₂ O emissions (N contents related to fresh matter)	358
Table 11.10:	Mineralization, total amounts of N from mineralization of soil organic matter	361
Table 11.11:	Liming (agriculture and forest), amounts of carbon-containing fertilizers applied (Gg a ⁻¹)	365
Table 11.12:	Amounts of urea sold in Germany (including urea solutions) (in Gg a ⁻¹)	367
Table 11.13:	Activity data and parameters for the calculation of NMVOC from agricultural crops	369
Table 11.14:	NMVOC emission factors	370
Table 11.15:	Pesticides, data on domestic sales of active substances (t a ⁻¹)	372
Table 11.16:	Pesticides, domestic sales of lindane 1990 – 1997 (t a ⁻¹)	374
Table 11.17:	Pesticides, maximum concentrations of HCB impurities in relevant active substances (g t ⁻¹)	374
Table 11.18:	Pesticides, HCB quantities in domestically sold active substances in pesticides (kg)	374
Table 11.19:	Soils and crops, 2017, international comparison of implied emission factors for N ₂ O and NH ₃	378
Table 11.20:	Soils and crops, 2017, international comparison of implied emission factors for CO ₂ and NMVOC	379
Table 11.21:	Soils and crops, 2017, international comparison of fractions	380
Table 11.22:	Direct emissions from agricultural soils, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)	381
Table 12.1:	Agricultural soils, procedures used for the calculation of indirect N ₂ O emissions	382
Table 12.2:	Indirect N ₂ O emissions from agricultural soils, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)	385
Table 13.1:	Fractions Frac _x , related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)	387
Table 14.1:	Uncertainty calculation for the German agricultural GHG inventory	397
Table 14.2:	Uncertainty calculation for the German agricultural ammonia inventory (without emissions from storage and spreading of digestate of energy crops)	400

Abbreviations and acronyms / Abkürzungen und Akronyme

For symbols of quantities used in equations as well as units and definitions see Chapter 3.1. Chapter 3.1 also provides a list of all German federal states.

Für Gleichungssymbole, Einheiten und Definitionen wird auf Kapitel 3.1 verwiesen. Dort findet sich auch eine Zusammenstellung der deutschen Bundesländer.

AC	activities	Aktivitäten
ADR	German working group on cattle breeding	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Rinderzüchter
AHL	ammonium nitrate solution	Ammoniumnitrat-Harnstoff-Lösung
AI	additional information	zusätzliche Informationen
AK	Institute of Climate-Smart Agriculture (former Institute of Agricultural Climate Research)	Institut für Agrarklimaschutz (ehemals: Institut für Agrarrelevante Klimaforschung)
ANS	ammonium nitrate solution	Ammoniumnitrat-Harnstoff-Lösung
AOE	Institute of Agroecology,	Institut für Agrarökologie, aktueller Name: AK
B.U.T.	British United Turkeys Ltd.	Britische Putenvereinigung mbH
BB	Brandenburg (German federal state)	Brandenburg
BBA	Federal Biological Office for Agriculture and Forestry	Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft
BImSchG	Federal law on immission control	Bundes-Immissionsschutzgesetz
BLE	Federal Office for Agriculture and Food	Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
BMEL	Federal Ministry of Food and Agriculture	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
BMELF	Federal Ministry of Food, Agriculture and Forestry	Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
BMELV	Federal Ministry of Food, Agriculture and Consumer Protection (as of 2014: Federal Ministry of Food and Agriculture, BMEL)	Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (ab 2014: Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, BMEL)
BMU	Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
BRS	German Livestock Association	Bundesverband Rind und Schwein
BVL	Federal Office of Consumer Protection and Food Safety	Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
BW	Baden-Württemberg (German federal state)	Baden-Württemberg
BY	Bavaria (German federal state)	Bayern
CEIP	EMEP Centre on Emission Inventories and Projections	EMEP Center für Emissionsinventare und Projektionen
CH ₄	Methane	Methan
CLRTAP	Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution	Übereinkommen über weiträumige grenzüberschreitende Luftverschmutzung
CO ₂	Carbon Dioxide	Kohlenstoffdioxid
CORINAIR	Core Inventory of Air emissions (European inventory and data base for air emissions)	Europäisches Luftemissionsinventar und –datenbanksystem
CRF	Common reporting format (Green house gas emission reporting) http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_httpsubmissions/items/6598.php	Berichtsformat für die Treibhausgas-Emissionsberichterstattung
DBFZ	German research centre for the use of biomass	Deutsches Biomasseforschungszentrum
DE	digestable energy	verdauliche Energie
DESTATIS	Federal Statistical Office	Statistisches Bundesamt
DLG	German Agricultural Society	Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft
DOM	digestibility of organic matter	Verdaulichkeit der organischen Substanz
DWA	German Association for Water, Wastewater and Waste	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.
DWD	German Weather Service	Deutscher Wetterdienst
EAGER	European Agricultural Gaseous Emissions Inventory Researchers Network, www.eager.ch	Europäische wissenschaftliche Arbeitsgruppe zu gasförmigen Emissionen aus der Landwirtschaft, www.eager.ch
EEA	European Environment Agency	Europäische Umweltagentur (EUA)
EEG	Renewable Energy Act	Erneuerbare-Energien-Gesetz
EMEP	European Monitoring and Evaluation Program (cooperation to solve transboundary air pollution problems)	Europäisches Programm zu Überwachung und Minderung grenzüberschreitender Luftverschmutzung
EU	European Union	Europäische Union
FAL	Federal Agricultural Research Centre	Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
FAL-TZ	FAL Institute of Animal Breeding, current name: FLI-ING	FAL-Institut für Tierzucht, aktueller Name: FLI-ING
FAO	Food and Agriculture Organization of the United Nations	Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen
FLI	Friedrich-Loeffler-Institute, Federal Research Institute for Animal Health	Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

FLI-ING	FLI Institute of Farm Animal Genetics	FLI-Institut Nutztiergenetik
Frac	Fraction	Relativer Anteil
FS	Technical report series of StatBA and StatLA	Fachserie der StatBA und StatLA
FYM	Farm yard manure	Wirtschaftsdünger
GAS-EM	Inventory model „Gaseous Emissions“	Inventar-Modell „Gasförmige Emissionen“
GE	gross energy	Brutto-Energie
GfE	Society of Nutrition Physiology	Gesellschaft für Ernährungsphysiologie
GHG	greenhouse gas	Treibhausgas
GWP	Global warming potential	Erderwärmungspotential
HCB	Hexachlorobenzene (pesticide/plant protection)	Hexachlorobenzol (Pflanzenschutzmittel)
HE	Hesse (German federal state)	Hessen
HIT	Data base for the origin of animals and other animal-related data	Herkunftssicherungs- und Informationssysteme für Tiere (Datenbank)
IEF	Implied Emission Factor	aggregierter Emissionsfaktor
IGEM	Interest group for asses and mules	Interessengemeinschaft für Esel und Maultiere
IGZ	Institute of vegetable and ornamental plant cultivation	Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change	Zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaänderungen
IUPAC	International Union of Pure and Applied Chemistry	Internationale Union für reine und angewandte Chemie
IUPAP	International Union of Pure and Applied Physics	Internationale Union für reine und angewandte Physik
KTBL	Association for Technology and Structures in Agriculture	Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft
LFBG	Law code on food and animal feed	Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch
LfL	Bavarian State Research Center for Agriculture	Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft
LR	Institute of Rural Studies	Institut für Ländliche Räume
LULUCF	Land Use and Land Use Change	Landnutzung und Landnutzungsänderung
LWK	Chamber of Agriculture	Landwirtschaftskammer
LZ2010	survey for the agricultural census in 2010	Landwirtschaftszählung 2010
MCF	methane conversion factor	Methanumwandlungsfaktor
ME	metabolizable energy	umsetzbare Energie
MEG	media service on poultry	Mediendienst Geflügel
MLF	Dairy concentrate	Milchleistungsfutter
MNULV	Ministry for Climate Protection, Environment, Agriculture, Nature Conservation and Consumer Protection of the State of North Rhine-Westphalia	Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen
MV	Mecklenburg-Western Pomerania (German federal state)	Mecklenburg-Vorpommern
N	nitrogen	Stickstoff
N ₂	dinitrogen	Distickstoff
N ₂ O	nitrous oxide (laughing gas)	Distickstoffmonoxid (Lachgas)
NA	notation key „not applicable“	Notationsschlüssel „nicht anwendbar“
NaKo	National Co-ordination Agency (Single Quantity)	Nationale Koordinierungsstelle
NaSE	National System of Emissions Inventories	Nationales System Emissionsinventare
NE	notation key „not estimated“	Notationsschlüssel „nicht berechnet“
NEC	European directive on national emission ceilings for air pollutants	Europäische Richtlinie über nationale Emissionshöchstmengen für Luftschadstoffe
NFR	Nomenclature for Reporting (reporting of air pollutant emissions)	Berichtsformat für die Luftschadstoffe-Emissionsberichterstattung
	http://www.ceip.at/overview-of-submissions-under-clrtap/	
NH ₃	ammonia	Ammoniak
NH ₄	ammonium	Ammonium
NI	Lower Saxony (German federal state)	Niedersachsen
NIR	National Inventory Report	Nationaler Inventarbericht
NMVOC	Non-Methane Volatile Organic Compounds	Flüchtige organische Verbindungen ohne Methan
NO	notation key „not occurring“	Notationsschlüssel „nicht vorkommend“
NO	nitric oxide	Stickstoffmonoxid
NO _x	nitrogen oxide	Stickstoffoxid
NO ₃	nitrate	Nitrat
NW	North Rhine-Westphalia (German federal state)	Nordrhein-Westfalen
PM	particulate matter	Partikel
PM _{2,5}	particulate matter (diameter: ≤ 2.5 µm)	Partikel (Durchmesser: ≤ 2.5 µm)
PM ₁₀	particulate matter (diameter: ≤ 10 µm)	Partikel (Durchmesser: ≤ 10 µm)
POP	Persistent organic pollutant	Persistenter organischer Schadstoff
QK	quality control	Qualitätskontrolle
QM	quality management	Qualitätsmanagement
QS	quality assurance	Qualitätssicherung
QSE	Quality System for Emissions Inventories	Qualitäts-System Emissionsinventare

R	series of the StatBA and StatLA	Reihe der StatBA und StatLA
RAM	diet with reduced nitrogen contents	Rohprotein-Angepasste-Mischung
RAUMIS	regionalised information system for agriculture and environment in Germany	Regionalisiertes Agrar- und UmweltInformationsSystem für Deutschland
RHG	Raiffeisen cooperative Hanover	Raiffeisen Hauptgenossenschaft Hannover
RMD	Report on Methods and data	Report zu Methoden und Daten
RP	Rhineland-Palatinate (German federal state)	Rheinland-Pfalz
SH	Schleswig-Holstein (German federal state)	Schleswig-Holstein
SI	International system of units	Internationales Einheitensystem
SL	Saarland (German federal state)	Saarland
SN	Saxony (German federal state)	Sachsen
SNAP	sources as classified in the Selected Nomenclature for Air Pollutants	Emittenten in der Ordnung der Selected Nomenclature for Air Pollutants
ST	Saxony-Anhalt (German federal state)	Sachsen-Anhalt
StatBA	Federal Statistical Office	Statistisches Bundesamt
StatLA	Federal State Statistical Office	Statistisches Landesamt
StMELF	Bavarian State ministry for Nutrition, Agriculture and Forestry	Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
StSt	So-called City States: Berlin, Bremen and Hamburg (expressed as sum or weighted mean of the respective StSt) (German federal state)	Stadtstaaten: Berlin, Bremen and Hamburg (ausgedrückt als Summe oder gewichtetes Mittel der entsprechenden StSt)
TAN	total ammonia nitrogen	Ammonium-Stickstoff
TH	Thuringia (German federal state)	Thüringen
TI	Johann Heinrich von Thünen-Institute, Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries (abbreviated designation: Thünen Institute)	Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei (Kurzbezeichnung: Thünen-Institut)
TSP	Total suspended particulate matter	Gesamtmasse an luftgetragenen Partikeln
UAN	Uric Acid Nitrogen	Harnsäure-Stickstoff
UBA	Federal Environment Agency	Umweltbundesamt
UFOP	Union for the Promotion of Oil and Protein Plants e.V.	Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e.V.
UK	United Kingdom	Vereinigtes Königreich (Großbritannien)
UNFCCC	United Nations Framework Convention on Climate Change	Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen
VDL	association of German sheep breeding organizations	Vereinigung deutscher Landesschafzuchtverbände
VS	Volatile solids (organic dry matter)	Organische Trockensubstanz
vTI	former abbreviation of the TI	frühere Abkürzung für das TI
XP	crude protein	Rohprotein
ZMP	Central Marketing and Price Reporting Unit for Products of Agriculture, Forestry and the Food Industry	Zentrale Markt- und Preisberichtsstelle für Erzeugnisse der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft GmbH
ZSE	Central System of Emissions (database)	Zentrales System Emissionsinventare (Datenbank)

Abstract / Zusammenfassung

The report at hand (including a comprehensive annex of data) serves as additional document to the National Inventory Report (NIR) on the German greenhouse gas emissions and the Informative Inventory Report (IIR) on the German emissions of air pollutants (especially ammonia). The report documents the calculation methods used in the German agricultural inventory model GAS-EM as well as input data, emission results and uncertainties of the emission reporting submission 2018 for the years 1990 - 2017.

In this context the sector Agriculture comprises the emissions from animal husbandry, the use of agricultural soils and anaerobic digestion of energy crops. As required by the guidelines, emissions from activities preceding agriculture, from the use of energy and from land use change are reported elsewhere in the national inventories.

The calculation methods are based in principle on the international guidelines for emission reporting and have been continually improved during the past years by the Thünen Institute working group on agricultural emission inventories, partly in cooperation with KTBL. In particular, these improvements concern the calculation of energy requirements, feeding and the N balance of the most important animal categories. In addition, technical measures such as air scrubbing (mitigation of ammonia emissions) and digestion of animal manures (mitigation of emissions of methane and laughing gas) have been taken into account. For the calculation of emissions from anaerobic digestion of animal manures and energy crops (including spreading of the digestate), the aforementioned working group developed, in cooperation with KTBL, a national methodology.

Total GHG emissions from German agriculture decreased from 79.3 Tg CO_{2eq} in 1990 to 63.6 Tg CO_{2eq} in 2018 (-19.8 %). This reduction is a consequence of the following emission changes of partial sources (rounded figures):

- decrease of 10.3 Tg CO_{2eq} (-29.1 %) as CH₄ from enteric fermentation,
- decrease of 2.0 Tg CO_{2eq} (-24.3 %) as CH₄ and N₂O from manure management,
- increase of 1.6 Tg CO_{2eq} as CH₄ and N₂O from anaerobic digestion of energy crops (digester + storage of digestate; 1990: 0 Tg),
- decrease of 4.1 Tg CO_{2eq} (14.3 %) as N₂O from agricultural soils,
- decrease of 0.36 Tg CO_{2eq} (-13.3 %) as CO₂ from liming (agriculture and forest),
- increase of 0.09 Tg CO_{2eq} (+18.8 %) as CO₂ from application of urea.

These changes are largely the result of the decline in animal numbers following reunification (reduction of oversized livestock numbers in Eastern Germany) and from the mid-2000s due to the limiting effect of the milk

Der vorliegende Berichtsband einschließlich des umfangreichen Datenanhangs dient als Begleitdokument zum National Inventory Report (NIR) über die deutschen Treibhausgas-Emissionen sowie zum Informative Inventory Report (IIR) über die deutschen Schadstoffemissionen (insbesondere Ammoniak). Der Bericht dokumentiert die im deutschen landwirtschaftlichen Inventarmodell GAS-EM integrierten Berechnungsverfahren sowie die Eingangsdaten, Emissionsergebnisse und Unsicherheiten der Berichterstattung 2018 für die Jahre 1990 bis 2017.

Der Bereich Landwirtschaft umfasst dabei die Emissionen aus der Tierhaltung und der Nutzung landwirtschaftlicher Böden sowie aus der Vergärung von Energiepflanzen. Emissionen aus dem Vorleistungsbereich, aus der Nutzung von Energie sowie Landnutzungsänderungen werden den Regelwerken entsprechend an anderer Stelle in den nationalen Inventaren berichtet.

Die Berechnungsverfahren beruhen in erster Linie auf den internationalen Regelwerken zur Emissionsberichterstattung und wurden durch die Arbeitsgruppe „Landwirtschaftliche Emissionsinventare“ des Thünen-Instituts in den vergangenen Jahren beständig weiterentwickelt, teilweise in Zusammenarbeit mit dem KTBL. Dies betrifft im Wesentlichen die Berechnung des Energiebedarfs, der Fütterung und der tierischen N-Bilanz bei den wichtigen Tierkategorien. Zusätzlich wurden technische Maßnahmen wie Abluftreinigung (Minderung von Ammoniakemissionen) und die Vergärung von Wirtschaftsdünger (Minderung von Methan- und Lachgasemissionen) berücksichtigt. Für die Berechnung von Emissionen aus der Vergärung von Wirtschaftsdünger und Energiepflanzen (einschließlich Gärrestausbringung) entwickelte die vorgenannte Arbeitsgruppe in Zusammenarbeit mit dem KTBL eine deutsche Methodik.

Die THG-Gesamtemissionen aus der deutschen Landwirtschaft sanken von 79,3 Tg CO_{2eq} im Jahr 1990 auf 63,6 Tg CO_{2eq} im Jahr 2018 (-19,8 %). Dieser Trend ergab sich aus Veränderungen folgender Teil-Emissionen (gerundet):

- Abnahme um 10,3 Tg CO_{2eq} (-29,1 %) als CH₄ aus der Verdauung,
- Abnahme um 2,0 Tg CO_{2eq} (-24,3 %) als CH₄ und N₂O aus dem Wirtschaftsdünger-Management,
- Zunahme um 1,6 Tg CO_{2eq} als CH₄ und N₂O aus der Vergärung von Energiepflanzen (Fermenter + Gärrestlager; 1990: 0 Tg),
- Abnahme um 4,1 Tg CO_{2eq} (-14,3 %) als N₂O aus landwirtschaftlich genutzten Böden,
- Abnahme um 0,36 Tg CO_{2eq} (-13,3 %) als CO₂ aus Kalkung (Landwirtschaft und Forst),
- Zunahme um 0,09 Tg CO_{2eq} (+18,8 %) als CO₂ aus Harnstoffanwendung.

Diese Veränderungen sind weitgehend Folge des Rückgangs der Tierzahlen nach der Wiedervereinigung (Abbau von Überbeständen in Ostdeutschland) und ab Mitte der 2000er Jahre wegen begrenzender Wirkungen

quota system (albeit with a renewed increase due to abolition of the milk quota system as of 31 May 2015). Increased nitrogen fertilization (mainly due to the application of increasingly larger amounts of digestate) led to an increase in greenhouse gas emissions from the mid-2000s. By contrast, the increasing use of manure in biogas plants has contributed to a reduction in methane emissions from manure storage.

The NH_3 time series as well is a result of counteracting processes. Here too, one of the important governing quantities is the animal number the decrease of which after the German reunification is the main reason for the considerable decrease of the emissions from 1991 to 1992. Mitigation measures like emission-reduced storage and application of manure led to a reduction of emissions in subsequent years. However, opposite trends are caused by increase of animal performance and, for some years, animal numbers. In addition, emissions from application of synthetic fertilizer are higher than in 1990, even though the amount of synthetic fertilizer applied decreased (in units of nitrogen). The observed increase of emissions is due to the increasing share of urea, as urea has a considerably higher emission factor than other synthetic fertilizers.

A major contributor to the increase in NH_3 emissions in recent years has been the increase in anaerobic digestion of energy crops. Although emissions from the anaerobic digestion of energy crops and the application of the resulting digestates are reported, they are, at the time being, not considered with regard to compliance with internationally agreed emission ceilings.

Omitting the emissions due to anaerobic digestion of energy crops (including spreading of digestates), the 2018 NH_3 emissions of the German agriculture were 547.8 Gg, which is 24.4 % lower than in 1990 where the emissions amounted to 724.8 Gg. Including anaerobic digestion of energy crops (including spreading of digestates) leads 2018 to total NH_3 emissions from agriculture of 606.7 Gg, which is 16.3 % less than 1990.

Key words: Emission inventory, agriculture, livestock husbandry, agricultural soils, anaerobic digestion, energy crops, renewable primary products, greenhouse gases, air pollutants, methane, laughing gas, ammonia, particulate matter

der Milchquotenregelung (allerdings mit Wiederanstieg der wegen Aufhebung der Milchquotenregelung zum 31. Mai 2015). Vermehrte Stickstoffdüngung (vor allem durch Ausbringung zunehmend größerer Gärrestmengen) führte ab Mitte der 2000er Jahre zu einem Anstieg der Treibhausgasemissionen. Dementgegen hat der zunehmende Einsatz von Wirtschaftsdüngern in Biogasanlagen zu einer Reduzierung der Methanemissionen aus der Wirtschaftsdüngerlagerung beigetragen.

Auch die zeitliche Entwicklung der NH_3 -Emissionen ist ein Ergebnis gegenläufiger Effekte. Eine wichtige Einflussgröße ist auch hier die Tierzahl. Ihre Abnahme nach der Wiedervereinigung ist der Hauptgrund für die deutliche Abnahme der Emissionen 1990/1991. Gründe für die Abnahme der Emissionen in späteren Jahren sind Minderungsmaßnahmen wie emissionsärmere Lagerung und Ausbringung von Wirtschaftsdünger. Gegenläufig wirkt hingegen die Zunahme der tierischen Leistung sowie zeitweilig anwachsende Tierbestände. Auch die Emissionen aus der Mineraldüngerausbringung sind höher als 1990, obwohl die ausgebrachte Mineraldüngermenge (in Stickstoff-Einheiten) abgenommen hat. Dies liegt am steigenden Harnstoffanteil, da Harnstoff einen deutlich höheren Emissionsfaktor aufweist als andere Mineraldünger.

Einen großen Anteil am Anstieg der NH_3 -Emissionen in den zurückliegenden Jahren hat die Zunahme der Vergärung von Energiepflanzen. Emissionen aus der Vergärung von Energiepflanzen und der Ausbringung von Energiepflanzengärresten werden zwar berichtet, bleiben im Hinblick auf die Einhaltung international vereinbarter Emissionsobergrenzen derzeit noch ohne Berücksichtigung (Adjustment).

Ohne Emissionen aus der Vergärung von Energiepflanzen (incl. Ausbringung der Gärreste) liegen die NH_3 -Emissionen aus der deutschen Landwirtschaft im Jahr 2018 bei 547,8 Gg und damit um 24,4 % niedriger als 1990 mit 724,8 Gg. Mit der Vergärung von Energiepflanzen (incl. Gärrestausbringung) liegen die Gesamt- NH_3 -Emissionen 2018 bei 606,7 Gg (- 16,3 % gegenüber 1990).

Schlüsselwörter: Emissionsinventar, Landwirtschaft, Tierhaltung, landwirtschaftliche Böden, anaerobe Vergärung, Energiepflanzen, nachwachsende Rohstoffe, Treibhausgase, Luftschadstoffe, Methan, Lachgas, Ammoniak, luftgetragene Partikel, Staub

1 Introduction / Einführung

In international conventions Germany has committed to the mitigation of emissions of green house gases and air pollution. These international regulations (protocols etc.) are the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC¹), the UNECE Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution (CLRTAP²), and within the European Union the Directive of the European Parliament and of the Council on national emission ceilings for certain atmospheric pollutants (NEC Directive³).

These regulations aim at the reduction of emissions that adversely affect

- the near-surface heat balance of the atmosphere,
- the existence of the stratospheric ozone layer,
- the amount of formation of secondary aerosols,
- terrestrial and aquatic ecosystems (acidification and eutrophication), as well as
- human health (limitations of air quality, air pollution by particulate matter, formation of near-surface ozone).

The forementioned conventions require annual calculations of the emissions of the respective gases and air pollutants. The results have to be documented in an emission inventory and to be reported to the organisations in charge.

While emission reporting includes emissions of NMVOCs and NO_x from manure management and the cultivation of agricultural soils, these emissions are not considered with regard to compliance of the total German emissions with the NEC and CLRTAP ceilings. The same holds for the NH₃ emissions that originate from the anaerobic digestion of energy crops (including spreading of the digestate from energy crops). This procedure is based on the fact that the forementioned emissions had not been part of the negotiations for the aforementioned national emission ceilings.⁴

The German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU) is responsible for the entire German emission reporting. However, the sector "Agriculture" is dealt with under the aegis of the Federal Ministry of Food and Agriculture (BMEL, formerly known as BMELV and BMELF). On behalf of BMEL, the Institute for Climate-Smart Agriculture (AK) (the former Institute of Agricultural Climate Research) of the Johann Heinrich von Thünen-Institut (TI, formerly known as vTI) establishes the annual agricultural emission inventory. In this inventory, the emissions

Deutschland hat sich auf internationaler Ebene zur Minderung von Emissionen von Treibhausgasen und luftverschmutzenden Stoffen verpflichtet. Hierbei handelt es sich um die Klimarahmenkonvention (UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC¹), die Konvention zur Verminderung und Vermeidung grenzüberschreitender Luftverunreinigungen (UNECE Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution, CLRTAP²) sowie in der Europäischen Union um die Festlegung von Emissionsobergrenzen für einige Stoffe, u. a. Ammoniak (NEC-Richtlinie³).

Hintergrund dieser internationalen Regelungen sind die negativen Auswirkungen von Emissionen auf

- den bodennahen Wärmehaushalt der Atmosphäre,
- den Bestand der stratosphärischen Ozonschicht,
- den Umfang der Bildung von Sekundäraerosolen,
- terrestrische und aquatische Ökosysteme (Versauerung und Eutrophierung), sowie
- die menschliche Gesundheit (Einschränkung der Luftqualität, Feinstaubbelastung, Bildung bodennahen Ozons).

Im Rahmen der internationalen Abkommen müssen die nationalen Emissionen der entsprechenden Gase und Luftschadstoffe jährlich berechnet und in Form des Emissionsinventars an die zuständigen Organisationen übermittelt werden.

Im Zusammenhang mit der Emissionsberichterstattung ist zu berücksichtigen, dass Emissionen von NMVOC und NO_x aus Wirtschaftsdünger-Management und der Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Böden zwar berichtet werden, im Hinblick auf die Einhaltung der NEC- und CLRTAP-Emissionsobergrenzen aber ohne Berücksichtigung bleiben. Gleiches gilt für NH₃ aus der Vergärung von Energiepflanzen (incl. Ausbringung der Gärreste). Hintergrund für dieses Vorgehen ist, dass diese Emissionen nicht Gegenstand der Festlegung der vorgenannten Emissionsobergrenzen waren.⁴

Die Verantwortung für die gesamte deutsche Emissionsberichterstattung liegt beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU). Dabei unterliegt der Bereich Landwirtschaft der Federführung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL, früher: BMELV, BMELF). Im Auftrag des BMEL erstellt das Institut für Agrarklimaschutz (AK) (vormals Institut für agrarrelevante Klimaforschung) des Johann Heinrich von Thünen-Instituts (TI, früher vTI) das jährliche landwirtschaftliche Emissionsinventar. In diesem werden die Emissionen aus der landwirtschaftlichen

¹ UN Framework Convention on Climate Change, 1992, and Kyoto Protocol on the reduction of greenhouse gas emissions of CO₂, CH₄, N₂O, HFC's, PFC's and SF₆ – see also: <http://unfccc.int>

² UNECE Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution (LRTAP), 1979 – see also: <http://www.unece.org/env/lrtap/>

³ Directive 2001/81/EC of the European Parliament and of the Council on national emission ceilings for certain atmospheric pollutants, Official Journal of the European Communities L 309/22, November 27, 2001

⁴ <https://iir-de.wikidot.com/adjustments>

from agricultural animal husbandry and from managed agricultural soils are regarded as agricultural emissions.⁵

The requirements for the preparation of the inventory as well as the emission reporting process are described for green house gases - especially methane and nitrous oxide - in the IPCC Guidelines (IPCC, 2006). For air pollutants – especially ammonia - the methods and rules are provided in the Emission Inventory Guidebook (EMEP, 2016). In a few specific cases, however, older guidelines must be used: EMEP (2007), EMEP (2009) and EMEP (2013).

The basic requirements with respect to the level of complexity to be applied for the emission calculations are predominantly determined by key source analysis. An emission source is a key source when it significantly contributes in amount, trend or uncertainty to the national total emission ((IPCC (2006), Kapitel 4; EMEP (2016), Part A/Chapter 2). Emissions from key sources have to be determined with detailed methods. Also with respect to policy advice (cf. DÄMMGEN et al., 2006; GAUGER et al., 2006) there is increasing interest in emission calculation methods as detailed as possible, for only detailed methods allow for the identification and assessment of options for emission mitigation.

On this account, the methods for the calculation of emissions from the German agriculture have been continually improved during the past years for the sector of animal husbandry. The development of methods also used results obtained from an international comparison of methods between neighboured countries (EAGER⁶). All methods used at present for the calculation of emissions from German agricultural animal husbandry satisfy or partly exceed by far the basic requirements specified in the guidelines.

Work is in progress in various research projects in order to improve also the calculations of green house gas emissions from agricultural soils. In the inventory, at the time being, these calculations can be performed only with the rather simple methods provided in the guidelines, even though the emissions from agricultural soils represent significant contributions to the national total of green house gas emissions from agriculture.

The quality of the emission calculation has to satisfy high demands: emission calculations and emission reporting must be transparent; the results must be comparable to those of other countries; the reported time series must be consistent; the emission calculations must be complete, i. e. take into account all relevant sources and sinks of emissions; the uncertainties of the emissions calculated must be determined. Responsibilities, procedures and the implementation of the international requirements for the quality management within

Tierhaltung und den bewirtschafteten Nutzflächen berichtet.⁵

Die Anforderungen an die Erstellung von Emissionsinventaren sowie die Emissionsberichterstattung werden für Treibhausgase - insbesondere Methan und Lachgas - in den IPCC Guidelines (IPCC, 2006) und für Luftschadstoffe - insbesondere Ammoniak - im Emission Inventory Guidebook (EMEP, 2016) beschrieben. In einigen wenigen Einzelfällen müssen allerdings auch ältere Richtlinien herangezogen werden: EMEP (2007), EMEP (2009) und EMEP (2013).

Die Mindestanforderungen an den Detaillierungsgrad der Emissionsberechnung werden vorrangig durch die Hauptquellgruppenanalyse bestimmt. Als Hauptquellgruppen werden diejenigen Quellgruppen bezeichnet, die wesentliche Anteile zu Höhe, Trend oder Unsicherheit der nationalen Gesamtemissionen beitragen (IPCC (2006), Kapitel 4; EMEP (2016), Part A/Kapitel 2)). Für Hauptquellgruppen besteht die Verpflichtung, detaillierte Berechnungsmethoden anzuwenden. Auch im Rahmen der Politikberatung (vgl. DÄMMGEN et al., 2006; GAUGER et al., 2006) besteht ein Interesse an möglichst detaillierten Berechnungsmethoden, um Optionen zur Emissionsminderung aufdecken und prüfen zu können.

Daher wurden in den vergangenen Jahren die Methoden zur Berechnung von Emissionen aus der deutschen Landwirtschaft im Bereich der Tierhaltung beständig weiterentwickelt. Dabei wurden auch Ergebnisse einbezogen, die im internationalen Vergleich benachbarter Staaten erarbeitet wurden (EAGER⁶). Die aktuell im Bereich der Tierhaltung verwendeten Emissionsberechnungsmethoden erfüllen die in den Richtlinien festgelegten Mindestanforderungen an den Detaillierungsgrad und gehen teilweise weit über darüber hinaus.

Aktuell laufende Forschungsprojekte sollen dazu beitragen, auch die Berechnung der Treibhausgas-Emissionen aus landwirtschaftlichen Böden verbessern zu können. Im Inventar können diese Emissionsberechnungen derzeit, trotz des großen Beitrags der landwirtschaftlichen Bodennutzung zu den Gesamt-Treibhausgasemissionen aus der deutschen Landwirtschaft, nur mit den in den Regelwerken vorgegebenen sehr einfachen Methoden erfolgen.

An die Qualität der Emissionsberechnung werden hohe Ansprüche gestellt. Sie bestehen in der Forderung nach Transparenz der Emissionsberechnung und Berichterstattung, Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit denen anderer Länder, Konsistenz der zu berichtenden Zeitreihen, Vollständigkeit (Einbeziehung aller relevanten Emissionsquellen und -senken) sowie Bestimmung der Genauigkeit der Emissionsergebnisse. Zuständigkeiten, Verfahrensabläufe und Umsetzung der internationalen Anforderungen an das Qualitätsmanagement

⁵ Emissions from activities preceding agriculture (e.g. the production and transport of mineral fertilizers), emissions from vehicles (including tractors) or stationary installations are dealt with under the categories "production processes", "other mobile sources" and "non-industrial combustion plants".

⁶ EAGER: European Agricultural Gaseous Emissions Inventory Researchers Network. EAGER is a core group of international scientists trying to improve and harmonize national ammonia emission inventory calculations (www.eager.ch)

the framework of emission inventory preparation at TI are described in two specific documents that are available in German only (BMEL, 2016; TI, 2016). These documents describe in detail the concept of the preparation of green house gas inventories for the source and sink sectors Agriculture and LULUCF within the responsibility of BMEL as well as the implementation improvisations and the quality management for these two source and sink sectors, see Chapter 3.5.

The report at hand documents calculation methods, data sources and emission results of the current emission reporting submission. It has been published in the online publication series „Thünen Report“ of the Johann Heinrich von Thünen-Institute and is available, along with a comprehensive EXCEL® file with input data and emission results (spatial resolution of federal states), on the website of the Thünen Institute of Climat-Smart Agriculture⁷. A print version is set up in very small numbers only for the institutions involved in the reporting. (Until the print version for Submission 2018 (Thünen-Report 57) a CD with the above mentioned data was enclosed. As of submission 2019, this supplement is no longer available.)

The report serves as additional document to the National Inventory Report 2018 (NIR) on the German green house gas emissions⁸ and to the Informative Inventory Report 2018 (IIR), the latter reporting German emissions of air pollutants (especially ammonia)⁹.

Changes, regarding data and methods, in comparison with the report of the last year's emission reporting (RÖSEMANN et al., 2017) are briefly described in Chapter 3.5.2.

Chapter 2 provides an overview of the calculated emission results and discusses the differences to the last-year emission reporting. (The modifications of methods and data underlying the differences between the present submission and the last-year submission are shortly described in Chapter 3.5.2.)

Chapter 2.4 describes the data collection available with the report at hand. It consists of an EXCEL® workbook with the emission results of the current submission along with additional information. The tables given in the EXCEL® workbook are addressed in the text volume in the respective paragraphs of chapters 4 to 13.

Chapter 3 describes the basics of the agricultural inventory preparation. Besides an overview of units and definitions, Chapter 3 comprises the choice of methods based on key source analysis, an overview of basic calculation concepts and approaches (including the calculation of projections for 2020), the description of the input

bei der Erstellung der Emissionsinventare am TI sind im „Konzept zur Erstellung von THG-Emissions- und Kohlenstoffinventaren der Quell- und Senkengruppen Landwirtschaft und LULUCF durch das Johann Heinrich von Thünen Institut (TI) im Zuständigkeitsbereich des BMEL“ (BMEL, 2016) und in der „Ausführungsbestimmung zur Erstellung von Emissions- und Kohlenstoffinventaren und deren Qualitätsmanagement für den Bereich der Quellgruppen Landwirtschaft und LULUCF“ (TI, 2016) beschrieben, siehe Kapitel 3.5.

Der vorliegende Bericht dokumentiert Berechnungsverfahren, Datenquellen und Emissionsergebnisse der aktuellen Emissionsberichterstattung aus der deutschen Landwirtschaft und ist in der Online-Publikationsreihe „Thünen Report“ des Johann Heinrich von Thünen-Instituts erschienen. Er kann zusammen mit einer umfangreichen EXCEL®-Datei mit Eingangsdaten und Emissionsergebnissen (in Bundesland-Auflösung) von der Website des Thünen-Instituts für Agrarklimaschutz heruntergeladen werden⁷. Eine Printversion wird in sehr kleiner Zahl nur für die an der Berichterstellung beteiligten Institutionen aufgelegt. (Bis zur Printversion für Submission 2018 (Thünen-Report 57) wurde eine CD mit den oben erwähnten Daten beigelegt. Diese Beilage entfällt ab Submission 2019.)

Der Bericht dient als Begleitdokument zum Nationalen Inventarbericht 2018 (NIR, National Inventory Report) über die deutschen Treibhausgas-Emissionen⁸, und zum Informative Inventory Report 2018 (IIR), der über die deutschen Schadstoffemissionen (insbesondere Ammoniak)⁹ berichtet.

Änderungen bei Daten und Methoden im Vergleich zum Bericht des Vorjahres (RÖSEMANN et al., 2017) werden in Kapitel 3.5.2 kurz beschrieben.

Kapitel 2 gibt einen Überblick über die berechneten Emissionsergebnisse und geht auf die Unterschiede zur letztjährigen Berichterstattung ein. (Die diesen Unterschieden zugrunde liegenden Änderungen bei Berechnungsverfahren und Eingangsdaten werden in Kapitel 3.5.2 kurz beschrieben.)

In **Kapitel 2.4** wird die umfangreiche EXCEL®-Datei der beiliegenden Datensammlung erläutert, die die Emissionsergebnisse sowie ergänzende Daten der aktuellen Submission enthält. (In den Kapiteln 4 bis 13 wird an den entsprechenden Stellen auf die in der EXCEL®-Datei enthaltenen Daten verwiesen.)

Kapitel 3 beschreibt die Grundlagen der landwirtschaftlichen Inventarerstellung. Dieses Kapitel umfasst neben einem Unterkapitel zu Einheiten und Begrifflichkeiten die Methodenauswahl nach Hautquellgruppenanalyse, eine Übersicht über grundlegende Konzepte und Berechnungsansätze (einschl. der Projektionserstel-

⁷ <https://www.thuenen.de/de/ak/arbeitsbereiche/emissionsinventare/>

⁸ National Inventory Report for the German Greenhouse Gas Inventory (NIR), <http://www.umweltbundesamt.de/publikationen.htm>

⁹ German Informative Inventory Report (IIR), <http://iir-de.wikidot.com/start>

data and an overview on the quality management. Chapter 3 also includes a sub-chapter that describes modifications of methodologies and input data.

Chapters 4 to 9 describe the emission calculations for the various animal categories. Whenever subcategories are formed, e.g. for “other cattle”, a collective description is given at the end of the description of the category providing the mean properties of the respective category.

Chapter 10 addresses the calculation of emissions from the anaerobic digestion of energy crops, including the management of the digestate.

Chapters 11 and 12 deal with the description of emissions from soils, grass land and arable land.

Chapter 13 describes the *Frac* quantities that have to be reported in the CRF tables.

The assessment of the uncertainties of the greenhouse gas emission inventory and the ammonia emission inventory is dealt with in **Chapter 14**.

Due to space limitations in the following text, equations, tables, figures, and maps are presented in an English Version only.

For technical reasons the German text uses related links that are named in English, i. e. Table instead of Tabelle and Figure instead of Abbildung.

lung für 2020), die Beschreibung der eingehenden Daten sowie einen Überblick über das Qualitätsmanagement (einschließlich der Änderungen bei Berechnungsverfahren und Eingangsdaten).

In den **Kapiteln 4 bis 9** wird die Emissionsberechnung für die verschiedenen Tierkategorien beschrieben. Werden in einer Tierkategorie (z.B. bei Rindern ohne Milchkühe) Unterkategorien gebildet, so folgt am Ende der Beschreibung der jeweiligen Unterkategorien eine Zusammenfassung der mittleren Kenngrößen.

Kapitel 10 befasst sich mit der Berechnung von Emissionen aus der Vergärung von Energiepflanzen einschließlich Gärreste-Management.

Kapitel 11 und 12 enthalten die Beschreibung der Emissionen aus Böden, Grünland und Ackerland.

Kapitel 13 geht auf die *Frac*-Größen ein, die in den CRF-Tabellen zu berichten sind.

Kapitel 14 beschreibt die Schätzung der Gesamtunsicherheiten von Treibhausgas- und Ammoniak-Inventar.

Aus Platzgründen werden im nachfolgenden Text neben Gleichungslegenden auch Tabellen, Abbildungen und Karten lediglich in englischer Fassung dargestellt.

Aus technischen Gründen werden im deutschen Text bei Verweisen auf Tabellen und Abbildungen die englischen Begriffe „Table“ bzw. „Figure“ verwendet.

2 Emission results in Submission 2020 / Emissionsergebnisse in Submission 2020

In the following, an overview of important results of the emission calculations for the emission reporting 2020 (Submission 2020) from German agriculture is presented. It shows emissions of CH₄, CO₂, N₂O und NH₃ from sources covered by the emission reporting for the sector "Agriculture", i. e. animal husbandry and managed agricultural soils. Emissions from the anaerobic digestion of energy crops (emissions from the digester, the storage of the digestate as well as spreading of the digestate) are accounted for, but there is an adjustment procedure for NH₃ (see Chapter 1).

Emissions from industrial processes (e. g. fertilizer production) as well as emissions from energy consumption associated with agriculture are not considered as they are reported elsewhere (according to IPCC and EMEP rules).

Detailed information on input data and emission results is provided in the chapters beginning with chapter 4 and in the data collection provided with this report (see Chapter 2.4).

Chapter 2.1 and Chapter 2.2 provide an overview of the calculated emission results. Chapter 2.3 discusses the differences to the last-year emission reporting. (The modifications of methods and data underlying the differences between the present submission and the last-year submission are shortly described in Chapter 3.5.2.)

For the uncertainties of the GHG and the NH₃ inventories see Chapter 14.

Im Folgenden wird eine Übersicht über wichtige Ergebnisse der Emissionsberechnungen für die Berichterstattung 2020 (Submission 2020) aus der deutschen Landwirtschaft gegeben. Gezeigt werden Emissionen von CH₄, CO₂, N₂O und NH₃ aus dem Bereich, der durch die Berichterstattung im Berichtssektor „Landwirtschaft“ abgedeckt wird, d. h. die Nutztierhaltung und landwirtschaftlich genutzte Böden. Die Vergärung von Energiepflanzen (Emissionen aus Fermenter, Gärrestlager und Gärrestausrückführung) wird mit berücksichtigt, wobei es aber für NH₃ ein Adjustmentverfahren gibt (siehe Kapitel 1).

Emissionen aus Vorleistungsbereich (z. B. Düngherstellung) und Energieverbrauch in der Landwirtschaft, die nach den IPCC- und EMEP-Regeln in gesonderten Sektoren berichtet werden, finden im Folgenden keine Berücksichtigung.

Umfassende Informationen zu Eingangsdaten und Emissionsergebnissen finden sich ab Kapitel 4 und in der beiliegenden Datensammlung (siehe Kapitel 2.4).

Kapitel 2.1 und Kapitel 2.2 geben einen Überblick über die berechneten Emissionsergebnisse. Kapitel 2.3 geht auf die Unterschiede zur letztjährigen Berichterstattung ein. (Die diesen Unterschieden zugrunde liegenden Änderungen bei Berechnungsverfahren und Eingangsdaten werden in Kapitel 3.5.2 kurz beschrieben.)

Hinsichtlich der Unsicherheit von Treibhausgas- und NH₃-Gesamtinventar wird auf Kapitel 14 verwiesen.

2.1 GHG emissions (CH₄, CO₂ and N₂O) / THG-Emissionen (CH₄, CO₂ und N₂O)

Figure 2.1 displays, for the different source sectors, the time series of GHG from German agriculture in CO_{2eq} units. For the data see Table 2.1.

The conversion from units of CH₄ and N₂O into units of CO_{2eq} was performed by multiplying with the GWP (Global Warming Potential) 25 kg kg⁻¹ for CH₄ and 298 kg kg⁻¹ for N₂O (for the GWP values see IPCC (2007)).


As regulated by the IPCC (2006) guidelines, the CO₂ emissions from liming comprise the CO₂ emission from liming in the forest sector.

Figure 2.1 zeigt gegliedert nach Quellbereichen die THG-Zeitreihen der deutschen Landwirtschaft in CO_{2eq}-Einheiten. Zu den Daten siehe Table 2.1.

Die Umrechnung von CH₄- und N₂O-Einheiten in CO_{2eq}-Einheiten erfolgte durch Multiplikation mit GWP (Global Warming Potential) 25 kg kg⁻¹ für CH₄ und 298 kg kg⁻¹ für N₂O (zum GWP siehe IPCC (2007)).

Aufgrund der Berichtsvorschriften von IPCC (2006) umfassen die CO₂-Emissionen aus der Kalkung auch die CO₂-Emissionen aus der Kalkung im Forstbereich.

Figure 2.1: Annual THG emissions from German agriculture (Submission 2020) (GWP_{CH4} = 25, GWP_{N2O} = 298)



Total GHG emissions from German agriculture decreased from 79.3 Tg CO_{2eq} in 1990 to 63.6 Tg CO_{2eq} in 2018 (-19.8 %). This reduction is a consequence of the following emission changes of partial sources (rounded figures):

- decrease of 10.3 Tg CO_{2eq} (-29.1 %) as CH₄ from enteric fermentation,
- decrease of 2.0 Tg CO_{2eq} (-24.3 %) as CH₄ and N₂O from manure management,
- increase of 1.6 Tg CO_{2eq} as CH₄ and N₂O from anaerobic digestion of energy crops (digester + storage of digestate; 1990: 0 Tg),
- decrease of 4.1 Tg CO_{2eq} (14.3 %) as N₂O from agricultural soils,
- decrease of 0.36 Tg CO_{2eq} (-13.3 %) as CO₂ from liming (agriculture and forest),
- increase of 0.09 Tg CO_{2eq} (+18.8 %) as CO₂ from application of urea.

These modifications of the Green House Gas emissions are mostly due to the following changes in German agriculture:

- Decrease of animal numbers after the German reunification because of reduction of oversized livestock numbers in Eastern Germany (see Figure 2.3);

Die THG-Gesamtemissionen aus der deutschen Landwirtschaft sanken von 79,3 Tg CO_{2eq} im Jahr 1990 auf 63,6 Tg CO_{2eq} im Jahr 2018 (-19,8 %). Dieser Trend ergab sich aus Veränderungen folgender Teil-Emissionen (gerundet):

- Abnahme um 10,3 Tg CO_{2eq} (-29,1 %) als CH₄ aus der Verdauung,
- Abnahme um 2,0 Tg CO_{2eq} (-24,3 %) als CH₄ und N₂O aus dem Wirtschaftsdünger-Management,
- Zunahme um 1,6 Tg CO_{2eq} als CH₄ und N₂O aus der Vergärung von Energiepflanzen (Fermenter + Gärrestlager; 1990: 0 Tg),
- Abnahme um 4,1 Tg CO_{2eq} (-14,3 %) als N₂O aus landwirtschaftlich genutzten Böden,
- Abnahme um 0,36 Tg CO_{2eq} (-13,3 %) als CO₂ aus Kalkung (Landwirtschaft und Forst),
- Zunahme um 0,09 Tg CO_{2eq} (+18,8 %) als CO₂ aus Harnstoffanwendung.

Diese Veränderungen der Treibhausgasemissionen sind zu einem großen Teil auf folgende Entwicklungen in der deutschen Landwirtschaft zurück zu führen:

- Rückgang der Tierzahlen nach der Wiedervereinigung im Zuge des Abbaus von Überbeständen in Ostdeutschland (siehe dazu Figure 2.3);

- additional decrease in cattle numbers up to the middle of the first decade of the current century because of the limiting effect of the milk quota system, and a recovery of cattle numbers after cancellation of the milk quota system as of 31 May 2015.

The increase of Green House Gas emissions as of the middle of the current century's first decade is, among other things, due to increased application of N fertilizing. This is mainly caused by increasing application of digestates from biogas production. On the other hand, increasing use of animal manures used as feedstock for biogas plants has led to a reduction of methane emissions from conventional storage of animal manures.

The drought in 2018 and the associated lower amounts of fertilizers applied and lower harvests led to a significant reduction in emissions compared to 2017.

- weiterer Rückgang bei den Rindern bis Mitte der 2000er Jahre wegen begrenzender Wirkungen der Milchquotenregelung, sowie Wiederanstieg u.a. wegen Aufhebung der Milchquotenregelung zum 31. Mai 2015.

Die Zunahme der Treibhausgasemissionen ab Mitte der 2000er Jahre ist u. a. auf steigende Lachgasemissionen infolge höherer Stickstoffdüngung zurückzuführen. Dies wurde vor allem durch die ansteigende Ausbringung von Gärresten der Biogasproduktion verursacht. Dementgegen hat der über das EEG geförderte verstärkte Einsatz von Wirtschaftsdüngern in Biogasanlagen zu einer Reduzierung der Methanemissionen aus der konventionellen Wirtschaftsdüngerlagerung beigetragen.

Die Trockenheit im Jahr 2018 und die damit verbundenen niedrigeren Dünger- und Erntemengen führten zu einer deutlichen Abnahme der Emissionen gegenüber 2017.

Table 2.1: GHG emissions from German agriculture in Tg CO_{2eq} (Submission 2020) (GWP_{CH₄} = 25, GWP_{N₂O} = 298)

year	Total GHG from German agriculture	CH ₄ enteric fermentation	CH ₄ manure management	N ₂ O manure management ^a	CH ₄ + N ₂ O energy crops ^b	N ₂ O soils ^c	CO ₂ liming	CO ₂ urea application
1990	79.305	35.353	8.100	3.913	0.000	28.755	2.704	0.480
1991	71.545	31.220	7.212	3.449	0.001	26.759	2.471	0.434
1992	69.341	30.312	7.163	3.427	0.001	25.833	2.206	0.398
1993	68.469	30.182	7.104	3.430	0.002	25.384	1.917	0.451
1994	66.829	30.170	7.436	3.468	0.002	23.817	1.519	0.417
1995	68.158	30.029	7.340	3.450	0.005	25.112	1.745	0.477
1996	68.548	30.206	7.423	3.490	0.008	25.196	1.744	0.481
1997	67.515	29.275	7.307	3.421	0.011	25.182	1.824	0.496
1998	67.841	28.911	7.478	3.444	0.024	25.463	2.005	0.516
1999	68.318	28.678	7.433	3.422	0.027	26.151	2.048	0.560
2000	68.264	28.101	7.289	3.404	0.042	26.625	2.225	0.579
2001	67.957	28.456	7.383	3.473	0.060	26.029	1.913	0.641
2002	65.711	27.289	7.187	3.391	0.086	25.120	1.992	0.645
2003	64.753	26.845	7.206	3.441	0.102	24.695	1.831	0.633
2004	64.640	26.078	6.981	3.364	0.131	25.596	1.819	0.672
2005	64.189	25.929	6.985	3.412	0.346	25.192	1.727	0.598
2006	63.402	25.423	6.793	3.377	0.472	25.024	1.659	0.654
2007	62.927	25.489	6.771	3.422	0.625	24.193	1.786	0.641
2008	65.071	25.849	6.742	3.425	0.706	25.867	1.835	0.648
2009	64.276	25.860	6.698	3.433	0.877	24.817	1.795	0.795
2010	63.626	25.754	6.462	3.374	1.067	24.644	1.738	0.587
2011	65.265	25.442	6.356	3.334	1.285	26.212	1.886	0.750
2012	64.886	25.481	6.419	3.320	1.294	25.798	1.949	0.625
2013	66.106	25.902	6.379	3.322	1.535	26.269	2.004	0.695
2014	67.472	26.103	6.422	3.343	1.582	27.081	2.242	0.698
2015	67.966	26.060	6.333	3.309	1.635	27.558	2.215	0.856
2016	66.491	25.770	6.307	3.285	1.623	26.734	1.952	0.820
2017	66.070	25.526	6.284	3.261	1.600	26.475	2.155	0.769
2018	63.565	25.069	6.132	3.197	1.607	24.646	2.344	0.570

^a N₂O from manure management includes indirect N₂O emissions due to deposition of NH₃-N and NO-N emitted from housing and storage
^b emissions from fermenter and storage of digestate from anaerobic digestion of energy crops
^c including N₂O due to field application of digestate from anaerobic digestion of energy crops

In 2018 the percentage of greenhouse gas emissions from German agriculture caused by soils (N₂O, including emissions due to application of digestate from anaerobic digestion of energy crops) amounted to 38.8 % (in CO₂

2018 betrug der Anteil des N₂O aus Böden (incl. N₂O infolge der Ausbringung von Gärresten aus Energiepflanzen-Vergärung) an den Treibhausgas-Emissionen aus der deutschen Landwirtschaft in CO_{2eq} 38,8 %, während der

equivalents), while the percentage of CH₄ emissions from enteric fermentation was 39.4 % (1990: 36.3 % and 44.6 %, respectively). The remaining 21.8 % (1990: 19.2 %) are caused by manure management (14.7 %; CH₄ + N₂O) with the ratio of CH₄ to N₂O (in CO₂ equivalents) between 1.9 and 2.1, digestion of energy crops (2.5 %: CH₄ + N₂O from digester and storage of digestate) and liming and application of urea (CO₂, in total 4.6 %).

In 2018 the GHG emissions from the emission sector "Agriculture" were about 2.5 Tg CO_{2eq} lower than in 2017 (-3.8 %). This decrease is essentially due to decreased CH₄ emissions from enteric fermentation (-1.8 %) and decreased N₂O emissions from agricultural soils (-6.9 %). That decrease of CH₄ from enteric fermentation is mainly due to the decrease of cattle numbers from 2017 to 2018. For N₂O from agricultural soils the decrease is predominantly caused by a reduced use of mineral fertilizers, but also by decreased harvests as a consequence of the draught conditions. The decreased application of urea led to a decrease of the pertinent CO₂ emissions. Two sectors showed increasing GHG emissions from 2017 to 2018, see Table 2.1: Anaerobic digestion of energy crops (+0.5 %) and increased liming (+8.8 %).


Figure 2.2 shows the decrease of the N₂O emissions from manure management and of the CH₄ emissions from enteric fermentation and manure management since 1990.

Anteil von CH₄ aus der tierischen Verdauung bei 39,4 % lag (1990: 36,3 % bzw. 44,6 %). Die restlichen 21,8 % (1990: 19,2 %) entfielen auf Wirtschaftsdünger-Management (14,7 %: CH₄ + N₂O, bei einem Verhältnis von CH₄ zu N₂O in CO₂-Äquivalenten zwischen ca. 1,9 : 1 und 2,1 : 1), Vergärung von Energiepflanzen (2,5 %: CH₄ + N₂O aus Fermenter und Gärrestlager) sowie Kalkung und Harnstoffanwendung (CO₂, zusammen 4,6 %).

2018 lagen die THG-Emissionen aus dem Sektor Landwirtschaft um 2,5 Tg CO_{2eq} unter denen von 2017 (-3,8 %). Diese Abnahme beruht im Wesentlichen auf Abnahmen bei CH₄ aus der Verdauung (-1,8 %) sowie bei N₂O aus landwirtschaftlich genutzten Böden (-6,9 %). Hierbei ist die Abnahme von CH₄ aus der Verdauung vor allem eine Folge der von 2017 zu 2018 zurückgegangenen Rinderzahlen. Bei N₂O aus landwirtschaftlich genutzten Böden liegt der Grund zum ganz überwiegenden Anteil in der Abnahme der ausgebrachten Mineraldüngermenge, aber auch in der Trockenheit der Witterung und den deshalb niedrigeren Erntemengen. Der Rückgang der Harnstoffausbringung führte zu einer Abnahme der entsprechenden CO₂-Emissionen. Eine Zunahme an THG-Emissionen von 2017 zu 2018 ist bei der Vergärung von Energiepflanzen sowie bei der vermehrten Kalkung zu finden (+0,5 % bzw. +8,8 %), siehe Table 2.1.

Figure 2.2 zeigt die Abnahme der N₂O-Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management und der CH₄-Emissionen aus Verdauung und Wirtschaftsdünger-Management seit 1990.

Figure 2.2: Development of CH₄ und N₂O emissions from manure management in % of 1990, Submission 2020 (enteric fermentation and manure management)



Largely constant over the years, 94% to 95% of total animal-related GHG emissions (in CO_{2eq}) from digestion and manure management (housing, storage) are from cattle and pigs. The emissions between cattle and pigs are divided in a ratio of around 11:1 in 1990, decreasing to around 9:1 in 2018.

Another 2 to 3% of total animal-related GHG emissions are accounted for by the other animals (poultry, sheep, goats, horses).

The remainder of the total GHG emissions from livestock husbandry are so-called indirect N₂O emissions

Weitgehend konstant über die Jahre stammen 94 bis 95 % der tierhaltungsbedingten THG-Gesamtemissionen (in CO_{2eq}) aus Verdauung und Wirtschaftsdünger-Management (Stall, Lager) von Rindern und Schweinen. Des Verhältnis dieser Emissionen zwischen Rindern und Schweinen fiel von ca. 11:1 (1990) auf ca. 9:1 (2018).

Weitere 2 bis 3 % der tierhaltungsbedingten THG-Gesamtemissionen entfallen auf die übrigen Tiere (Geflügel, Schafe, Ziegen, Pferde).

Beim Rest der tierhaltungsbedingten THG-Gesamtemissionen handelt es sich um so genannte


produced in the soil from the deposition of nitrogen, previously emitted as NH₃ and NO from the entirety of all housing and storage systems in livestock husbandry.

By far the greater part of CH₄ emissions comes from enteric fermentation, mostly from cattle. Therefore, the time course of CH₄ emissions in Figure 2.2 is largely determined by the evolution of cattle animal numbers. This is can be seen in Figure 2.3 which shows the numbers of animal categories important for emissions reporting in percentages from 1990.

indirekte N₂O-Emissionen, die im Boden aus der Deposition von Stickstoff entstehen, der zuvor als NH₃ und NO aus allen Ställen und Wirtschaftsdüngerlagern der gesamten Tierhaltung emittiert wurde.

Der weitaus größere Anteil der CH₄-Emissionen stammt aus der Verdauung, und dabei wiederum überwiegend von den Rindern. Daher wird der zeitliche Verlauf der CH₄-Emissionen in Figure 2.2 maßgeblich durch den Verlauf der Rinder-Tierzahlen bestimmt. Dieser geht aus Figure 2.3 hervor, die die Zahlen der für die Emissionsberichterstattung wichtigen Tierkategorien in Prozent von 1990 zeigt.

Figure 2.3: Development of animal numbers in % of 1990, Submission 2020



Like the CH₄ emissions, the N₂O emissions shown in Figure 2.2 follow the reduction in livestock numbers after the German reunification in 1990. Following this significant reduction in emissions, increases and decreases in livestock numbers partly counteract each other, with the result that no clear trend develops until about 2009. After 2009, there is an average decrease in N₂O emissions over the years.

The marked increase of pig numbers from 2010 to 2012 as shown in Figure 2.3 is partly due to the fact that the Federal Statistical Office modified, as of 2011, the survey regulations in order to include pigs from companies without agricultural land. In a similar way the official counting of poultry has been modified as of 2013, leading to drastically higher poultry numbers than in 2010. Nevertheless, emission contributions by poultry are only a small share of total emissions from animal husbandry.

An additional reason for the decrease of GHG emissions from livestock husbandry, in particular CH₄, is the increasing impact of the anaerobic digestion of slurry and the partly gastight storage of the residues especially since 2004 (see chapter 3.3.4.4). Table 2.2 and Table 2.3 show the amounts of CH₄ and N₂O not emitted due to anaerobic digestion of slurry and partly gastight residue storage. These tables also give the percentages of these

Wie die CH₄-Emissionen folgen die in Figure 2.2 gezeigten N₂O-Emissionen der Verringerung der Tierbestände nach der deutschen Wiedervereinigung 1990. Nach diesem deutlichen Emissionsrückgang wirken sich Zunahmen und Abnahmen der Tierbestände teilweise gegenläufig aus, so dass sich bis ca. 2009 kein eindeutiger Trend entwickelt. Nach 2009 zeigt sich im Mittel über die Jahre eine abnehmende Tendenz der N₂O-Emissionen.

Der in Figure 2.3 zu erkennende Anstieg der Schweinezahlen von 2010 zu 2012 geht zum Teil darauf zurück, dass das Statistische Bundesamt bis 2010 nicht erfasste landlose Mastbetriebe in die Erfassung ab 2011 einbezogen hat. In ähnlicher Weise führte die veränderte Erhebung der Geflügelzahlen 2013 zu drastisch höheren Werten als 2010. Geflügel trägt allerdings nur in geringem Maße zu den CH₄- und N₂O-Emissionen aus der Tierhaltung bei.

Ein weiterer Grund für den Rückgang der tierhaltungsbedingten Treibhausgase, insbesondere der CH₄-Emissionen, liegt in der ab 2004 zunehmenden Bedeutung der anaeroben Vergärung von Gülle und der teilweise gasdichten Lagerung der Gärreste (siehe Kapitel 3.3.4.4). Table 2.2 und Table 2.3 zeigen die durch Güllevergärung eingesparten CH₄- und N₂O-Emissionen sowie das Verhältnis der Minderung zur Gesamtemission, die sich ohne Güllevergärung aus dem Wirtschaftsdünger-

amounts in relation to the total emissions from manure management to be obtained in the absence of anaerobic digestion. It can be seen that anaerobic digestion leads to increased N₂O emissions up to 2007, which is due to low frequencies of gas tight storage of digestate.

Management aller im Inventar berücksichtigten Nutztier-
re ergäbe. Bei N₂O zeigen sich dabei bis 2007 Emissions-
erhöhungen infolge der Wirtschaftsdüngervergärung.
Sie sind auf die bis dahin noch geringe Verbreitung der
Abdeckung von Gärrestelagern zurückzuführen.

Table 2.2: Total national change of CH₄ emissions from manure management due to anaerobic digestion of manure (also in percent of the total CH₄ emissions from manure management to be obtained without anaerobic digestion; negative data: decrease of emissions), Submission 2020

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Gg a ⁻¹	-0.01	-0.02	-0.02	-0.03	-0.03	-0.08	-0.13	-0.17	-0.37	-0.43
%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Gg a ⁻¹	-0.7	-1.0	-1.4	-2.2	-2.9	-6.5	-9.4	-13.6	-16.4	-21.1
%	-0.2	-0.3	-0.5	-0.8	-1.0	-2.3	-3.4	-4.8	-5.7	-7.3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Gg a ⁻¹	-26.4	-32.4	-35.5	-40.0	-41.6	-42.0	-41.2	-41.9	-41.7	
%	-9.3	-11.3	-12.1	-13.5	-13.9	-14.2	-14.1	-14.3	-14.5	


Table 2.3: Total national change of direct N₂O emissions from manure management due to anaerobic digestion of manure (also in percent of total direct N₂O emissions from manure management to be obtained without anaerobic digestion; negative data: decrease of emissions), Submission 2020

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Gg a ⁻¹	0.00010	0.00023	0.00030	0.00038	0.00037	0.00085	0.00134	0.00162	0.00345	0.00371
%	0.001	0.003	0.004	0.005	0.005	0.011	0.017	0.020	0.044	0.047
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Gg a ⁻¹	0.006	0.007	0.010	0.010	0.011	0.035	0.020	-0.003	-0.040	-0.094
%	0.07	0.09	0.13	0.13	0.14	0.44	0.26	-0.04	-0.50	-1.17
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Gg a ⁻¹	-0.17	-0.26	-0.44	-0.52	-0.58	-0.59	-0.59	-0.59	-0.59	
%	-2.1	-3.3	-5.5	-6.5	-7.0	-7.3	-7.3	-7.4	-7.6	

The emission reducing effect of decreasing animal numbers for cattle and of the digestion of animal manures is partly compensated by constantly improving animal performance. Figure 2.4 shows the development of the calculated GHG emissions from enteric fermentation and manure management (housing and storage) for dairy cows and fattening pigs as related to performance data (dairy cows: milk yield per place and year; fattening pigs: daily weight gain per animal) using the emission data of each single year since 1990.

Die emissionsmindernde Wirkung sinkender Tierzahlen bei den Rindern und der Vergärung von Wirtschaftsdünger wird zum Teil durch beständige Leistungssteigerungen kompensiert. Figure 2.4 zeigt für Milchkühe und Mastschweine unter Verwendung der berechneten Emissionswerte aller Jahre seit 1990 die Treibhausgasemissionen aus Verdauung und Wirtschaftsdünger-Management (Stall, Lager) als Funktion der Leistung (bei Milchkühen: jährliche Milchleistung pro Tierplatz; bei Mastschweinen: täglicher Gewichtszuwachs pro Tier).

Figure 2.4: Total performance-related GHG emissions from enteric fermentation and manure management (housing, storage) for dairy cows (per kg of milk) and fattening pigs (per kg of daily growth), Submission 2020 (GWP_{CH₄} = 25, GWP_{N₂O} = 298)



For dairy cows, the emissions per kg milk have decreased steadily due to the increase in milk yields. However, the decrease does not occur to the same extent as the milk yield increases. This is due to the fact that the energy requirements for maintenance, which have an important share in the total energy requirements (40% for a milk yield of 6000 kg a⁻¹ and about 30 % for 10000 kg a⁻¹), is independent of the milk yield.

In principle, a similar picture is obtained for GHG emissions from pig production as related to animal performance. However, for pigs the trend is less pronounced and not as linear as for dairy cows.

The time series of the total of the N₂O emissions from agricultural soils (i.e. the sum of direct and indirect emissions) is provided in Figure 2.5.

Direct N₂O emissions from agricultural soils comprise emissions resulting from the application of animal manures, mineral fertilizers, digestate (from digestion of animal manures and energy crops) and sewage sludge, as well as emissions caused by grazing, cultivation of organic soils, degradation of crop residues and mineralization of organic matter (arable land).

Indirect emissions originate from the (atmospheric) deposition of reactive N species (NH₄ and NO₃ resulting from NH₃ and NO emissions in agriculture) as well as from nitrogen leaching and runoff into surface waters.

Bei den Milchkühen führen beständig zunehmende Milchleistungen zu einer Abnahme der Emissionen pro kg Milch. Die Abnahme ist jedoch nicht proportional zur Milchleistungszunahme. Dies liegt daran, dass der Erhaltungsenergiebedarf, der einen wichtigen Anteil am Gesamtenergiebedarf hat (40 % bei einer Milchleistung von 6000 kg a⁻¹ und ca. 30 % bei 10000 kg a⁻¹), von der Milchleistung unabhängig ist.


Ein prinzipiell ähnliches Bild ergibt sich bei den leistungsbezogenen Treibhausgasemissionen aus der Mast-schweinehaltung, wenn auch nicht so linear wie bei den Milchkühen und in geringerem Ausmaß.

Figure 2.5 zeigt die N₂O-Gesamtemissionen aus landwirtschaftlichen Böden, die sich aus direkten und indirekten Emissionen zusammensetzt.

Direkte N₂O-Emissionen aus landwirtschaftlichen Böden sind N₂O-Emissionen infolge der Ausbringung von Wirtschafts- und Mineraldünger, Gärresten (aus der Vergärung von Wirtschaftsdünger und Energiepflanzen) und Klärschlämmen sowie aufgrund von Weidegang, Bewirtschaftung organischer Böden, Zersetzung von Ernterückständen und Mineralisierung organischer Bodensubstanz (Ackerböden).

Indirekte N₂O-Emissionen resultieren aus der atmosphärischen Deposition von reaktivem Stickstoff (NH₄ und NO₃ als Reaktionsprodukte von landwirtschaftlichen NH₃- und NO-Emissionen) sowie aus Stickstoff-Auswaschung und -Oberflächenabfluss.


Figure 2.5: N₂O emissions from agricultural soils (in Gg a⁻¹ N₂O), Submission 2020



To a remarkable extent, interannual variations of total N₂O emissions from agricultural soils originate from interannual variations in mineral fertilizer application, see Figure 2.6.

Die jährlichen Schwankungen der Gesamt-N₂O-Emissionen aus landwirtschaftlich genutzten Böden sind zu einem beträchtlichen Teil Folge der Schwankungen in der Mineraldüngeranwendung, siehe Figure 2.6.

Figure 2.6: Interannual variations of annual N₂O emissions (direct plus indirect N₂O) from agricultural soils vs. interannual variations of mineral fertilizer N for the years 1990 to 2018 (Submission 2020)



2.2 NH₃ emissions / NH₃-Emissionen

Figure 2.7 shows the Submission 2020 time series of the NH₃ emissions from German agriculture. The time series comprise the years 1990 to 2018 as well as the results for the projection year 2020. Projection 2020 was calculated based on the data provided in Chapter 3.3.7.

According to the requirements of emission reporting the emissions presented in Figure 2.7 show the emissions separately for the major animal categories (emissions from housing and storage), grazing (the total for all grazing animals), organic fertilizers (NH₃ from spreading of animal manures and digestate of manures of all animal categories), application of synthetic fertilizers as well as anaerobic digestion of energy crops (NH₃ from storage and application of digestate). The data used for Figure 2.7 can be found in Table 2.4.

Figure 2.7 also shows the German national emission ceiling of 550 Gg NH₃ per year prescribed for the years from 2010 onwards by the NEC Directive (2001/81/EC) of the European Parliament of 23 October 2001. Negotiations for this directive did not include emissions from anaerobic digestion of energy crops, see Chapters 1 and 10. Hence Germany reports the total NH₃ emissions from agriculture including those from anaerobic digestion of energy crops, but the latter are not considered with regard to compliance of the total German emissions with the NEC ceiling for ammonia of 550 Gg per year.

Figure 2.7 shows that in the years after 2010 this national emission ceiling is considerably exceeded by agriculture only (even after discounting the emissions from energy crops), see also Chapter 2.3.

Figure 2.7 zeigt für Submission 2020 den zeitlichen Verlauf der NH₃-Emissionen aus der deutschen Landwirtschaft für 1990 - 2018 sowie die Projektion für 2020. Die Projektion für 2020 wurde auf Grundlage der Vorgaben in Kapitel 3.3.7 erstellt.

Die in Figure 2.7 dargestellten Emissionen gliedern sich gemäß den Anforderungen an die Emissionsberichterstattung nach den großen Tierkategorien (NH₃ aus Stall und Lager), Weidegang (alle Weidetiere zusammen), organischer Düngung (NH₃ aus der Ausbringung von Wirtschaftsdüngern und Wirtschaftsdünger-Gärresten aller Tierkategorien), Mineraldünger-Ausbringung sowie Vergärung von Energiepflanzen (NH₃ aus Gärrestlagerung und -ausbringung). Die zugrundeliegenden Zahlenwerte finden sich in Table 2.4.

Figure 2.7 zeigt zusätzlich die ab 2010 für die deutschen Gesamt-NH₃-Emissionen vorgegebene Obergrenze von jährlich 550 Gg (NEC-Richtlinie 2001/81/EG des Europäischen Parlaments vom 23. Oktober 2001), bei deren Aushandlung die Emissionsquelle „Energiepflanzen“ aber nicht berücksichtigt wurde, siehe Kapitel 1 und 10. Demzufolge berichtet Deutschland zwar die NH₃-Emissionen aus der Landwirtschaft einschließlich der energiepflanzenbedingten Emissionen; für die Einhaltung bzw. Nichteinhaltung des NEC-Schwellenwertes von 550 Gg a⁻¹ ist aber die NH₃-Emission nach Abzug des energiepflanzenbedingten Beitrags maßgeblich.

Aus Figure 2.7 geht hervor, dass in den Jahren nach 2010 der NEC-Schwellenwert allein schon durch die Landwirtschaft (ohne den energiepflanzenbedingten Beitrag) überschritten wird, siehe dazu auch Kapitel 2.3.

Figure 2.7: Annual NH₃ emissions from German agriculture for 1990 – 2018 (Submission 2020), National emission ceiling (NEC) at 550 Gg a⁻¹




Table 2.4: Ammonia emissions from German agriculture for 1990 - 2018 in Gg NH₃ (Submission 2020)

year	total	dairy cows (housing + storage)	other cattle (housing + storage)	pigs (housing + storage)	poultry (housing + storage)	other animals (housing + storage)	grazing (all animals)	spreading (manure + digestate of manure)	synthetic fertilizer	sewage sludge	energy crops (storage + spreading)
1990	724.8	75.0	101.3	117.1	22.7	9.4	14.5	302.6	78.4	3.7	0.0
1991	644.0	66.6	87.1	99.9	21.5	9.6	13.3	271.9	70.4	3.7	0.0
1992	631.0	64.7	86.0	102.5	20.6	9.7	13.1	266.0	64.8	3.5	0.0
1993	634.1	64.9	85.6	100.6	21.0	10.2	13.3	265.0	70.0	3.5	0.1
1994	605.2	65.9	87.3	92.7	21.4	10.6	11.4	247.6	64.6	3.5	0.1
1995	609.3	65.6	87.4	89.9	21.4	11.0	11.6	245.6	72.0	4.7	0.2
1996	616.2	66.0	87.8	92.1	21.9	11.4	11.9	248.1	72.1	4.7	0.3
1997	608.1	64.0	84.9	93.9	22.2	10.6	11.4	241.1	75.1	4.6	0.3
1998	615.4	63.7	85.2	98.9	22.7	9.8	11.2	241.3	77.5	4.2	0.7
1999	615.1	62.7	85.9	97.5	22.6	9.1	11.0	237.9	83.3	4.2	0.9
2000	611.4	61.9	86.2	95.1	23.9	9.2	10.7	233.2	85.5	4.4	1.4
2001	621.3	63.2	88.2	95.6	24.6	9.5	10.8	235.4	88.2	4.0	1.9
2002	606.1	62.0	83.4	96.3	24.8	9.6	10.3	225.9	87.2	3.8	2.8
2003	604.0	62.4	84.4	97.5	25.0	9.7	10.0	221.4	86.2	3.9	3.3
2004	594.4	62.3	81.1	94.5	25.5	9.5	9.7	214.2	89.5	3.8	4.3
2005	596.2	62.5	81.1	98.2	25.4	9.3	9.5	212.6	82.6	3.7	11.4
2006	597.8	61.3	80.6	96.5	25.5	9.5	9.3	208.3	87.0	3.6	16.2
2007	604.7	62.2	80.7	98.4	26.3	9.8	9.3	209.1	83.7	3.5	21.7
2008	609.1	63.5	81.6	96.2	26.0	9.3	9.3	207.9	86.9	3.4	25.0
2009	623.2	63.8	81.5	97.4	25.5	8.9	9.1	207.0	94.5	3.4	32.0
2010	605.2	64.2	80.8	93.2	24.5	8.3	8.9	205.5	75.9	3.5	40.3
2011	635.2	64.2	77.9	94.6	26.6	8.1	8.8	206.5	94.9	3.4	50.2
2012	624.4	63.8	77.5	97.5	28.8	8.1	8.8	203.8	81.1	3.3	51.7
2013	641.2	64.4	78.5	96.4	30.0	8.0	8.9	204.4	88.1	2.9	59.6
2014	643.5	65.3	78.7	97.4	30.3	7.9	8.9	203.6	88.7	2.8	59.8
2015	653.1	65.9	78.1	94.2	30.3	7.8	9.0	200.6	105.0	2.5	59.8
2016	644.8	65.4	77.2	93.4	30.2	7.7	8.9	199.9	100.0	2.5	59.4
2017	635.1	65.0	75.7	94.1	30.5	7.6	8.9	198.7	94.2	1.9	58.6
2018	606.7	64.2	73.7	90.6	30.9	7.5	8.7	196.6	73.5	1.9	58.9

As can be seen, there is a marked decrease of the NH₃ emissions from German agriculture in the years immediately after the German unification 1990/1991 (reduction of oversized livestock numbers). During the subsequent years the emissions from animal husbandry and fertilizer application do not show substantial trends. The development of NH₃ emissions from mineral fertilizer application as of 2014 is striking. This is mainly attributed to a marked increase in the proportion of urea fertilization, whereas in the years 2017 and 2018 adverse weather conditions (2017: high humidity, 2018: extreme drought) led to a sharp decline in the amounts of mineral fertilizer sold.

Almost a tenth (9.7% or 58.9 Gg) of the total NH₃ emissions from German agriculture in 2018 is due to the anaerobic digestion of energy crops (including digestates)), which was negligible in 1990.

Omitting the emissions due to anaerobic digestion of energy crops (including spreading of digestates), the 2018 NH₃ emissions of the German agriculture were 547.8 Gg, which is 24.4 % lower than in 1990 where the emissions amounted to 724.8 Gg. Including anaerobic digestion of energy crops (including spreading of digestates) leads 2018 to total NH₃ emissions from agriculture of 606.7 Gg, which is 16.3 % less than 1990.

Die Gesamt-NH₃-Emissionen aus der deutschen Landwirtschaft sind nach der deutschen Wiedervereinigung von 1990 zu 1991 deutlich gesunken (Abbau von übergroßen Tierbeständen in Ostdeutschland). Danach ist kein eindeutiger Trend mehr zu erkennen. Auffällig ist der Verlauf der NH₃-Emissionen aus der Mineraldüngerausbringung von 2014 an. Dieser wird vorrangig auf eine merkliche Zunahme des Anteils der Harnstoffdüngung zurück geführt, während in den Jahren 2017 und 2018 widrige Witterungsbedingungen (2017: große Feuchte, 2018: extreme Trockenheit) zu einem starken Rückgang der verkauften Mineraldüngermengen geführt haben.


Fast ein Zehntel (9,7 % oder 58,9 Gg) der Gesamt-NH₃-Emissionen aus der deutschen Landwirtschaft geht 2018 auf die Vergärung von Energiepflanzen (incl. Gärrestausbringung) zurück, die 1990 noch zu vernachlässigen war.

Ohne Emissionen aus der Vergärung von Energiepflanzen (incl. Ausbringung der Gärreste) liegen die NH₃-Emissionen aus der deutschen Landwirtschaft im Jahr 2018 bei 547,8 Gg und damit um 24,4 % niedriger als 1990 mit 724,8 Gg. Mit der Vergärung von Energiepflanzen (incl. Gärrestausbringung) liegen die Gesamt-NH₃-Emissionen 2018 bei 606,7 Gg (- 16,3 % gegenüber 1990).

For the main emission sources within the animal categories „cattle“ and „pigs“, i. e. for dairy cows and fattening pigs, Figure 2.8 shows for the example year 2018 the calculated percentages of NH₃ emissions originating from housing, storage and manure application (as well as grazing for dairy cows). It is obvious that for dairy cows the emissions from manure application are predominant, while for fattening pigs the major share of the emissions are originating from housing.

Für die Hauptemissionsquellen in der Rinder- und Schweinehaltung, d. h. Milchkühe und Mastschweine, verdeutlicht Figure 2.8 exemplarisch für 2018 die berechnete prozentuale Verteilung der NH₃-Emissionen aus Stall, Lager und Wirtschaftsdünger-Ausbringung (sowie Weidegang bei den Milchkühen). Es wird deutlich, dass bei Milchkühen die Emissionen aus der Wirtschaftsdünger-Ausbringung überwiegen, während dies bei den Mastschweinen für den Stallbereich gilt.


Figure 2.8: Dairy cows and fattening pigs (Submission 2020): Percentages of NH₃ emissions originating from housing, storage, manure application and grazing in 2018



In the same way, Figure 2.9 shows the calculated percentages of NH₃ emissions from housing, storage and manure application for broilers and for the total of all animals. For broilers, a little less than half the total emissions are caused by spreading, while a little less than a third originates from housing. For all animals, on average, emissions from housing and application are of similar size (both in the order of two fifth); the remaining emissions are somewhat lower than one fifth of the total emissions and subdivide into emissions from storage and grazing with the ratio of about 9:1.

Figure 2.9 zeigt in gleicher Weise für Masthähnchen sowie für die Gesamtheit aller im Inventar berücksichtigten Tiere die prozentuale Verteilung der NH₃-Emissionen. Bei den Masthähnchen resultiert etwas weniger als die Hälfte der Gesamtemission aus der Ausbringung, während etwas weniger als ein Drittel dem Stall zuzuordnen ist. Im Durchschnitt aller Tiere liegen die Emissionen aus Stall und Ausbringung in etwa gleichauf in der Größenordnung von je zwei Fünfteln der Emissionen, während sich das verbleibende knappe Fünftel im Verhältnis von ca. 9:1 auf Lager und Weidegang aufteilt.

Figure 2.9: Broilers and all animals (Submission 2020): Percentages of NH₃ emissions originating from housing, storage, manure application and grazing in 2018



The emissions described above also comprise the effect of anaerobic digestion of animal manures. Table 2.5 shows for the years 1990 to 2018 the changes of total NH₃ emissions from animal husbandry (housing + storage + application + grazing) caused by the anaerobic digestion of animal manures.

Die oben beschriebenen Emissionen beinhalten auch die Auswirkung der Wirtschaftsdünger-Vergärung. Table 2.5 zeigt für die Jahre 1990 bis 2018 die Veränderungen der Gesamt-NH₃-Emissionen der Tierhaltung (Stall + Lager + Ausbringung + Weidegang) durch die Wirtschaftsdünger-Vergärung.

Table 2.5: Change of total NH₃ emissions from "housing + storage + spreading + grazing" due to anaerobic digestion of manure (also in percent of NH₃ emissions from the situation without anaerobic digestion; positive data: increase of emissions), Submission 2020

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Gg a ⁻¹	-0.002	-0.004	-0.005	-0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.03
%	-0.0002	-0.0006	-0.001	-0.001	0.000	0.001	0.002	0.002	0.005	0.006
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Gg a ⁻¹	0.06	0.09	0.15	0.19	0.27	0.54	0.95	1.39	1.66	2.20
%	0.011	0.018	0.029	0.037	0.054	0.108	0.19	0.28	0.34	0.45
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Gg a ⁻¹	2.86	3.35	2.18	1.29	0.21	-0.87	-0.91	-0.85	-0.79	
%	0.59	0.69	0.45	0.26	0.04	-0.180	-0.19	-0.18	-0.17	

As can be seen, digestion mostly leads to slightly increased total emissions of NH₃. This is due to the increase of the share of TAN of the substrate's total N pool that takes place in the digester. This increase of TAN leads to a higher potential of NH₃ emissions during storage and application of the digestate. This effect is the more prominent the more animal manures are anaerobically digested. However, in the early 1990s, it was compensated as the application of digestate uses techniques producing lower emissions than the techniques used for undigested manures. Gastight storage leads to lower emissions as well. This becomes apparent in Table 2.5 especially in the change from 2011 to 2012 when the use of gastight storage drastically increased, but also in the subsequent years with still increasing use of gastight storage.

Wirtschaftsdünger-Vergärung führt i. d. R. zu einer leichten Erhöhung der NH₃-Gesamtemissionen. Dies liegt an dem im Fermenter stattfindenden Anstieg des TAN-Anteils an der Gesamt-N-Menge, mit der Folge eines erhöhten Potentials für NH₃-Emissionen aus Lagerung und Ausbringung der Gärreste. Je mehr Wirtschaftsdünger vergoren wird, um so deutlicher zeigt sich dieser Effekt. Er wurde anfangs der 1990er Jahre noch durch die im Vergleich zu unbehandeltem Wirtschaftsdünger emissionsärmeren Techniken zur Gärrestausbringung kompensiert. Die gasdichte Gärrestlagerung hat ebenfalls eine emissionsverringende Wirkung. Dies zeigt sich in Table 2.5 insbesondere beim Übergang von 2011 zu 2012, als die Verbreitung der gasdichten Lagerung sprunghaft zunahm, aber auch in den Jahren danach mit weiter zunehmender Verbreitung.

Total emissions from animal husbandry increase by increased animal performance (see above), while the opposite is true for product-related emissions. Ammonia emissions as related to unit of product (dairy cows: milk yield per place and year; fattening pigs: total weight gain per place and year) are visualized for the period from 1990 to 2018 in Figure 2.10. They comprise emissions from housing, storage and application of manures, as well as grazing for dairy cows.

Die Gesamtemissionen aus der Tierhaltung nehmen durch die Leistungssteigerung zu (siehe weiter oben), während die produktbezogenen Emissionen abnehmen. Figure 2.10 zeigt für Milchkühe und Mastschweine für die Jahre 1990 bis 2018 die aus der Tierhaltung (Stall + Lager + Ausbringung; bei Milchkühen auch incl. Weidegang) entstandenen produktbezogenen Ammoniakemissionen als Funktion der Leistung (bei Milchkühen: jährliche Milchleistung pro Tierplatz; bei Mastschweinen: täglicher Zuwachs pro Tier).

Figure 2.10: Dairy cows and fattening pigs: Performance-related total NH₃ emissions from animal husbandry, including grazing for dairy cows (for dairy cows per kg milk, for fattening pigs per kg of daily growth), Submission 2020




Figure 2.10 shows for dairy cows that the emissions per kg milk have decreased due to the steady increase in milk yields. However, the decrease does not occur to the same extent as the milk yield increases. This is due to the fact that the energy requirements for maintenance, which have an important share in the total energy requirements (40% for a milk yield of 6000 kg a⁻¹ and about 30% for 10000 kg a⁻¹), is independent of the milk yield. In addition the emissions are also affected by from-year-to-year changes of frequencies of housing types, storage types and spreading conditions (see Chapter 3.4.3).

A similar picture can be obtained for NH₃ emissions from pig production as related to animal performance. Here, trends are less distinct, as energy requirements for maintenance (in contrast to dairy cows) are related to animal performance and increase with increasing weight gains. Increased N intake with feeds is compensated by increased N retention. Hence, N excretion rates and as a consequence, NH₃ emission rates, increase at a somewhat slower rate than weight gain rates. Like for dairy cows the emissions are also affected by from-year-to-year changes of frequencies of housing types, storage types and spreading conditions (see Chapter 3.4.3). An additional effect is caused by the increasingly used phase feeding, which leads to reduced N inputs in pig fattening. This effect is modelled in the inventory from 1990 onwards.

If the number of animals remains unchanged, the increase in performance inevitably leads to an increase in the total emissions of the relevant animal population. At the same time, the increase in performance may reduce the product-related emission. However, as internationally and nationally agreed emission reduction targets relate to total and not product-related emissions, product-related emissions with unchanged numbers of animals are not suitable for verifying the implementation of emission reduction targets.

Nevertheless, consideration of product-related emissions can help compare production processes with respect to their specific emission potentials. This is, how-

Aus Figure 2.10 geht für die Milchkühe hervor, dass die beständig zunehmenden Milchleistungen zu einer Abnahme der Emissionen pro kg Milch führen. Die Abnahme erfolgt allerdings nicht im gleichen Maße wie die Milchleistung ansteigt. Dies liegt daran, dass der Erhaltungsenergiebedarf, der einen wichtigen Anteil am Gesamtenergiebedarf hat (40 % bei einer Milchleistung von 6000 kg a⁻¹ und ca. 30 % bei 10000 kg a⁻¹), von der Milchleistung unabhängig ist. Zum Anderen wirken sich die mit den Jahren erfolgten Änderungen der Haltungs-, Lager- und Ausbringungsbedingungen (siehe Kapitel 3.4.3) aus.

Ein ähnliches Bild ergibt sich bei den leistungsbezogenen NH₃-Emissionen aus der Mastschweinehaltung, auch wenn anders als bei der Milchkuh der Erhaltungsenergiebedarf nicht leistungsunabhängig ist, sondern mit größer werdendem Zuwachs ansteigt. Der damit ansteigenden N-Aufnahme mit dem Futter steht allerdings eine ebenfalls ansteigende erhöhte N-Retention gegenüber, so dass die N-Ausscheidung und damit die NH₃-Emission relativ langsamer ansteigt als das Tiergewicht. Wie bei den Milchkühen wirken sich auch hier zusätzlich die seit 1990 erfolgten Änderungen der Haltungs-, Lager- und Ausbringungsbedingungen (siehe Kapitel 3.4.3) aus. Ein zusätzlicher Effekt geht von der zunehmenden Verbreitung der Phasenfütterung aus, durch die der N-Input in der Schweinemast im Inventar ab 1990 allmählich abnehmend modelliert wurde.

Bei gleichbleibender Tierzahl führt Leistungssteigerung unweigerlich zu einem Anstieg der Gesamtemission der betreffenden Tierpopulation. Gleichzeitig kann es sein, dass durch die Leistungssteigerung die auf „kg Produkt“ bezogene Emission sinkt. Da sich international und national vereinbarte Emissionsminderungsziele aber auf die Gesamt- und nicht die produktbezogenen Emissionen beziehen, sind produktbezogene Emissionen bei gleichbleibenden Tierzahlen nicht geeignet, die Umsetzung von Emissionsminderungszielen zu überprüfen.

Die Betrachtung von produktbezogenen Emissionen kann dagegen helfen, Produktionsverfahren im Hinblick auf ihre spezifischen Emissionspotentiale miteinander zu


ever, not the task of the national emission reporting and will therefore not be further explored in the report at hand, but see e. g. “Standards for the calculation of a farm’s climate balance (BEK, in German)”.¹⁰

The NH₃ emissions from the application of mineral fertilizers are dominated by the application of urea and ANS. Figure 2.11 shows, in relation to 1990, the time series of the calculated NH₃ emissions from the application of mineral fertilizers, the total amount of mineral fertilizer N applied and the amount of N in urea and ANS applied. There is a clear correlation between the amount of urea and ANS applied and the NH₃ emissions from the total application of mineral fertilizers. This correlation is due to the fact that the emission factors of urea and ANS remarkably exceed those of other fertilizers.

vergleichen. Dies ist allerdings nicht Aufgabe der Emissionsberichterstattung und wird deshalb im vorliegenden Bericht nicht weiter verfolgt. Siehe dazu aber z. B. “Berechnungsstandard Klimabilanz (BEK)”.¹⁰

Die NH₃-Emissionen aus der Mineraldüngeranwendung sind maßgeblich durch die Anwendung von Harnstoff und AHL geprägt. Figure 2.11 zeigt relativ zu 1990 die Zeitreihen der berechneten NH₃-Emissionen, der mit Mineraldünger ausgebrachten N-Mengen und der darin enthaltenen Summe von Harnstoff-N und AHL-N. Es besteht eine deutliche Korrelation zwischen der gesamten NH₃-Emission aus der Mineraldüngeranwendung und der Menge an Harnstoff und AHL ($R^2 = 0,938$). Diese Korrelation ist eine direkte Folge der im Vergleich zu den übrigen Düngern erheblich größeren Emissionsfaktoren für Harnstoff und AHL.

Figure 2.11: Application of mineral fertilizer N (amounts sold), amounts of N in urea and ANS applied, and the NH₃ emissions from the total application of mineral fertilizers (Submission 2020)



¹⁰ <https://daten.ktbl.de/bek/#start>

2.3 Comparison with Submission 2019 / Vergleich mit Submission 2019

For the calculation of the current Submission 2020 some changes were made, with respect to Submission 2019 (RÖSEMANN et al., 2019), in the fields of input data and methodologies. All changes between Submissions 2017 and 2018 are listed in Chapter 3.5.2.

Figure 2.12 and Figure 2.13 illustrate the differences between the results of Green House Gas emissions and NH₃ emissions of current Submission 2020 and Submission 2019.


The greenhouse gas emissions from Submission 2020 shown in Figure 2.12 differ by -0.31 % (2017) to +0.19 % (2005) from the emissions reported in Submission 2019. Averaged over all time series years, the difference is +0.07 % or +0.05 Tg CO₂eq. These differences are mainly due to two methodological changes (increased N-excretion of suckler cows, consideration of different incorporation times for application with trailing hose) as well as a series of activity data updates.

Zur Berechnung der vorliegenden Submission 2020 wurden gegenüber Submission 2019 (RÖSEMANN et al., 2019) in den Bereichen „Eingangsdaten“ und „Methodiken“ einige Änderungen vorgenommen. Kapitel 3.5.2 gibt eine Übersicht über diese Änderungen.

Die sich aus den Änderungen ergebenden Unterschiede zwischen den Treibhausgas- und NH₃-Emissionsergebnissen der Submissionen 2020 und 2019 zeigen Figure 2.12 und Figure 2.13.

Die in Figure 2.12 gezeigten Treibhausgas-Emissionen der Submission 2020 unterscheiden sich von den in Submission 2019 berichteten Emissionen zwischen -0,31 % (2017) und +0,19 % (2005). Über alle Zeitreihenjahre gemittelt liegt der Unterschied bei +0,07 % bzw. +0,05 Tg CO₂eq. Diese Differenzen gehen im wesentlichen auf zwei methodische Änderungen (Anhebung der N-Ausscheidung der Mutterkühe; Berücksichtigung verschiedener Einarbeitungszeiten bei Schleppschlauch-Ausbringung) sowie eine Reihe von Aktivitätsdaten-Aktualisierungen zurück.

Figure 2.12: Comparison of GHG emission results in Submission 2020 and Submission 2019




The following NH₃ comparison in Figure 2.13 also covers the emission source "energy crops" (digestate storage and application), even if this source is not taken into account when compliance with the NEC threshold value is checked, see Chapter 1.

The NH₃ emissions of Submission 2020 differ by -0.24% (2016) to +0.23% (2004) from the emissions reported in Submission 2019. Averaged over all time series years, the difference is +0.06% and +0.55 Tg NH₃, respectively. The reasons for this are essentially the same as for the comparison of greenhouse gases in Figure 2.12.

Der nachfolgende NH₃-Vergleich in Figure 2.13 umfasst auch die Emissionsquelle „Energiepflanzen“ (Gärrestlagerung und -ausbringung), auch wenn diese bei der Überprüfung der Einhaltung des NEC-Schwellenwertes nicht berücksichtigt wird, siehe Kapitel 1.

Die NH₃-Emissionen der Submission 2020 unterscheiden sich um -0,24 % (2016) bis +0,23 % (2004) von den in Submission 2019 berichteten Emissionen. Über alle Zeitreihenjahre gemittelt liegt der Unterschied bei +0,06 % bzw. +0,55 Tg NH₃. Die Gründe dafür sind im Wesentlichen die gleichen wie beim Vergleich der Treibhausgase in Figure 2.12.

Figure 2.13: Comparison of NH₃ emission results in Submission 2020 and Submission 2019

2.4 Collection of input data and emission results / Sammlung von Eingangsdaten und Ergebnissen

Input data and results of the emission calculations described in the present report were published as an EXCEL® file on the OpenAgrar website (https://www.openagrar.de/receive/openagrar_mods_00056935; DOI: 10.3220/DATA20200312140923) and can therefore be cited separately.

The report and the data file are also accessible via the website of the Thünen Institute for Climate-Smart Agriculture¹¹.

A print version of the report is set up in very small numbers only for the institutions involved in the reporting. Until the print version for Submission 2018 (Thünen-Report 57) a CD with the above mentioned data was enclosed. As of submission 2019, this supplement is no longer available.

The arrangement and numbering of the tables contained in the data collection considers

- **data categories:**
 - emissions (EM),
 - implied emission factors (IEF),
 - activities (AC),
 - additional information (AI),
 - animal excretions (EXCR),
 - summary (summary),
 - uncertainties (UNC);
- **emission categories** sources (mostly as classified in the formerly used Selected Nomenclature for Air Pollutants, SNAP):
 - emissions from agricultural soils (1001),
 - methane emissions from enteric fermentation (1004),
 - emissions from manure management (CH₄) (1005),
 - emissions from manure management (NMVOC) (1007),
 - emissions from manure management regarding N species (1009),
 - emissions of particulate matter from manure management (TSP, PM₁₀, PM_{2.5}) (1010);
- **emissions listed in the sequence:**
 - ammonia (NH₃),
 - nitrous oxide (N₂O),
 - nitric oxide (NO),
 - methane (CH₄),
 - non-methane volatile organic compounds (NMVOC),
 - particulate matter (TSP, PM₁₀, PM_{2.5}),
 - carbon dioxide (CO₂);
- **emission sources of animal husbandry (buffalo included in cattle, see Chapter 4.1.1.2):**
 - dairy cows,
 - calves,
 - heifers,

Eingangsdaten und Ergebnisse der im vorliegenden Bericht beschriebenen Emissionsberechnungen wurden als EXCEL®-Datei auf der OpenAgrar-Website veröffentlicht (https://www.openagrar.de/receive/openagrar_mods_00056935; DOI: 10.3220/DATA20200312140923) und sind damit separat zitierbar.

Bericht und Datendatei sind auch über die Website des Thünen-Instituts für Agrarklimaschutz zugänglich¹¹.

Eine Printversion des Berichts wird in sehr kleiner Zahl nur für die an der Berichterstellung beteiligten Institutionen aufgelegt. Bis zur Printversion für Submission 2018 (Thünen-Report 57) wurde eine CD mit den oben erwähnten Daten beigelegt. Diese Beilage entfällt ab Submission 2019.

Die Ordnung und Nummerierung der in der Datensammlung enthaltenen Tabellen berücksichtigt

- **die Datenkategorien:**
 - Emissionen (EM),
 - aggregierter Emissionsfaktor (IEF),
 - Aktivitäten (AC),
 - zusätzliche Informationen (AI),
 - tierische Ausscheidungen (EXCR),
 - Zusammenfassung (Summary),
 - Unsicherheiten (UNC);
- **die Emissionskategorien** (in Anlehnung an die Ordnung der früher verwendeten Selected Nomenclature for Air Pollutants, SNAP):
 - Emissionen aus landwirtschaftlichen Nutzflächen (1001),
 - Methanemissionen aus der Verdauung (1004),
 - Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management (CH₄) (1005),
 - Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management (NMVOC) (1007),
 - Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management (N-Spezies) (1009),
 - Partikelemissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management (TSP, PM₁₀, PM_{2.5}) (1010);
- **die Emissionen in der Reihenfolge:**
 - Ammoniak (NH₃),
 - Lachgas (N₂O),
 - Stickstoffmonoxid (NO),
 - Methan (CH₄),
 - Flüchtige organische Verbindungen außer Methan (NMVOC),
 - Partikel (TSP, PM₁₀, PM_{2.5}),
 - Kohlenstoffdioxid (CO₂);
- **die Emissionsquellen der Tierhaltung (Büffel bei den Rindern enthalten, siehe Kapitel 4.1.1.2):**
 - Milchkühe,
 - Kälber,
 - Färsen,

¹¹ <https://www.thuenen.de/de/ak/arbeitsbereiche/emissionsinventare/>

male beef cattle,
suckler cows,
mature males > 2 years,
sows,
weaners,
fattening pigs,
boars,
sheep,
goats,
horses (including asses and mules),
laying hens,
broilers,
pullets,
geese,
ducks,
turkeys;

- **aggregation of animal groups:**

Where necessary for reporting purposes, data of various animal subcategories are aggregated to data of the main category.

The tables describing activities are ordered in the same way as the tables for emissions. However, all soil relevant activities are to be found under AC1001, all animal numbers under AC1005.

The order of tables containing implied emission factors (IEF) follows that of the tables of the respective emissions.

The tables containing additional information are ordered in the same way as the respective activities. They contain variables which are needed to calculate emissions. This list of tables is mostly restricted to data to be reported under the various conventions.

Additional Tables contain relevant data and frequency distributions of housing and storage facilities as well as application techniques (AI Tables: AI_1005FHO, AI_1005FST, AI_1005FSP) and with uncertainties of the GHG inventory and the ammonia inventory of the German agriculture (sheet „UNC“).

SI units and symbols are used throughout, see Chapter 3.1.1.

männliche Mastrinder,
Mutterkühe,
männliche Rinder > 2 Jahre,
Sauen,
Aufzuchtferkel,
Mastschweine,
Eber,
Schafe,
Ziegen,
Pferde (incl. Esel und Maultiere),
Legehennen,
Masthähnchen und –hühnchen,
Junghennen,
Gänse,
Enten,
Puten;

- **die Aggregation zu Tiergruppen:**

Wo für Berichtszwecke erforderlich, werden Daten einzelner Tierunterkategorien zu Daten der Gesamtkategorie aggregiert.

Die Tabellen der Gruppe „Aktivitäten“ folgen sinn­gemäß der Anordnung der Tabellen der Emissionen. Die bodenrelevanten Aktivitäten sind allerdings unter AC1001 zusammengefasst, die relevanten Tierzahlen unter AC1005.

Die Tabellen der Gruppe „aggregierte Emissionsfaktoren“ (IEF) weisen die gleiche Katalogisierung auf wie die dazu gehörenden Tabellen der Emissionen.

Die Tabellen der Gruppe „Zusätzliche Informationen“ orientieren sich an der Anordnung der Gruppe „Aktivitäten“ und enthalten Variablen, die zur Berechnung von Emissionen benötigt werden. Die Auflistung beschränkt sich weitestgehend auf die international zu berichtenden Daten.

Zusätzliche Tabellenblätter beinhalten emissionsrelevante Daten und Häufigkeitsverteilungen zu Haltungs-, Lager- und Ausbringungsverfahren (AI-Tabellenblätter: AI_1005FHO, AI_1005FST, AI_1005FSP) sowie Unsicherheiten des Treibhausgasinventars und des Ammoniakinventars der deutschen Landwirtschaft (Tabellenblatt „UNC“).

Es werden ausschließlich SI-Einheiten und -Symbole benutzt, siehe dazu Kapitel 3.1.1.

3 Inventory preparation / Die Inventarerstellung

The annual emission inventory for the sector “Agriculture” is prepared with the inventory model GAS-EM. Chapters 3.2 and 3.3 describe the model and the underlying methodologies. The symbols, units and definitions used for the inventory preparation are presented in Chapter 3.1. The emission calculations are performed separately for each source category using the respective input data. For the input data see Chapter 3.4. More details and special features of the source categories are described in Chapters 4 to 13. Chapter 14 deals with the uncertainties of the emission results. The preparation of the emission inventory includes quality control and assurance, see Chapter 3.5.1.

Das jährliche Emissionsinventar für den Sektor Landwirtschaft wird mithilfe des Modells GAS-EM erstellt. In den Kapiteln 3.2 und 3.3 werden das Modell und die verwendete Methodik erläutert. Die verwendeten Symbole, Einheiten und Definitionen werden in Kapitel 3.1 vorgestellt. Die Berechnung der Emissionen erfolgt getrennt nach Quellgruppen mit den entsprechenden Eingangsdaten. Zu den Eingangsdaten siehe Kapitel 3.4. Einzelheiten und Besonderheiten der Quellgruppen werden in den Kapiteln 4 bis 13 beschrieben. Kapitel 14 befasst sich mit den Unsicherheiten der Emissionsergebnisse. Zur Emissionsinventarerstellung gehört auch die Kontrolle und Sicherung der Qualität des Emissionsinventars, siehe dazu Kapitel 3.5.1.

3.1 Symbols, units and definitions / Symbole, Einheiten und Definitionen

3.1.1 Symbols and units / Symbole und Einheiten

Table 3.1 provides a list of symbols used frequently while Table 3.2 collates the subscripts used to characterise the various source categories. Table 3.3 shows the list of German Federal States (Bundesländer) and their abbreviations.

Table 3.1 zeigt eine Auflistung häufig gebrauchter Symbole. Table 3.2 gibt die Indizes an, die zur Charakterisierung von Quellen benutzt werden. Table 3.3 zeigt eine Zusammenstellung der deutschen Bundesländer und ihrer Kürzel.

Table 3.1: List of symbols frequently used for quantities

α	time units conversion factor	Umrechnungsfaktor für Zeiteinheiten
A	area	Fläche
B_o	maximum methane producing capacity	maximale Methanbildungs-Kapazität
β	mass units conversion factor	Umrechnungsfaktor für Masseneinheiten
γ	stoichiometric conversion factor of mass	Stöchiometrischer Umrechnungsfaktor für Massen
DM	dry matter	Trockensubstanz
E	emission	Emission
EF	emission factor	Emissionsfaktor
η	energy content	Energiegehalt
IEF	implied emission factor	aggregierter Emissionsfaktor
μ	molar mass	Molmasse
M	mass	Masse
N	amount of nitrogen	Stickstoffmenge
NE	net energy	Netto-Energie
NEL	net energy for lactation	Netto-Energie Laktation
T	temperature	Temperatur
TS	dry matter	Trockensubstanz
t	time span	Zeitdauer
w	Weight	(Tier-) Gewicht (Masse)
X, x	fraction	relativer Anteil

Table 3.2: List of subscripts used to identify source categories and subcategories

arable	arable land	Ackerland
bf	heifers	Färsen
bm	male beef cattle	männliche Mastrinder
bo	boars	Eber
br	broilers	Masthähnchen und –hühnchen
ca	calves	Kälber
CR	crop residues	Ernterückstände
crop	crop, cropped area	Pflanzenbestand
dc	dairy cows	Milchkühe
dep	depositions from reactive N stemming from agriculture	Deposition von reaktivem N aus der Landwirtschaft
du	ducks	Enten
ent	enteric fermentation	Verdauung
ew	ewes	Mutterschafe
fert	mineral fertilizer	Mineraldünger
fp	fattening pigs	Mastschweine
ge	geese	Gänse
go	goats	Ziegen
grass	grass land	Grünland
HC	harvested crop	geerntete Menge
HCB	Hexachlorobenzene (pesticide agent)	Hexachlorobenzol (Pestizid-Wirkstoff)
ho	horses (heavy horses)	Pferde (Großpferde)
la	lambs	Lämmer
leach	N leached and/or run off	ausgewaschenes bzw. abgeflossenes N
lh	laying hens	Legehennen
man	manure	Wirtschaftsdünger
mm	mature males > 2 years	männliche Rinder > 2 Jahre
MM	manure management	Wirtschaftsdünger-Management
oc	other cattle (cattle other than dairy cows)	Rinder ohne Milchkühe
os	other sheep (sheep other than lambs)	Schafe ohne Lämmer
po	ponies and light horses	Kleinpferde und Ponys
pu	pullets	Junghennen
sc	suckler cows	Mutterkühe
sh	sheep	Schafe
so	sows	Sauen
ss	sewage sludge	Klärschlamm
tf	turkeys (hens)	Putenhennen
tm	turkeys (cocks)	Putenhähne
tu	turkeys (both genders)	Puten (insgesamt)
urea	urea	Harnstoff
we	weaners	Aufzuchtferkel

Table 3.3: Abbreviations used for the German Federal States

BB	Brandenburg	Brandenburg
BW	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg
BY	Bavaria	Bayern
HE	Hesse	Hessen
MV	Mecklenburg-Western Pomerania	Mecklenburg-Vorpommern
NI	Lower Saxony	Niedersachsen
NW	North Rhine-Westphalia	Nordrhein-Westfalen
RP	Rhineland-Palatinate	Rheinland-Pfalz
SL	Saarland	Saarland
SN	Saxony	Sachsen
ST	Saxony-Anhalt	Sachsen-Anhalt
SH	Schleswig-Holstein	Schleswig-Holstein
TH	Thuringia	Thüringen
StSt	So-called City States: Berlin, Bremen and Hamburg (sum or weighted mean of the respective city states)	Stadtstaaten: Berlin, Bremen and Hamburg (Summe oder gewichtetes Mittel der entsprechenden Stadtstaaten)

If possible SI units referred to IUPAC¹² (1993) and IUPAP¹³ (1987) are used for standards, recommendations, symbols and units. Special units used in agricultural sciences and in micrometeorology are used according to Monteith (1984) and Reifsnnyder et al. (1991).

a	year
d	day
h	hour
ha	hectare
kg	kilogramme
kt	kiloton
t	ton
Mg	Megagramme (= t)
Gg	Gigagramme (= kt)
Tg	Teragramme (= million t)
MJ	mega joule

Additional units used:

pl	animal place, see Chapter 3.1.2.2.1
an	animal, see Chapter 3.1.2.2.1
eg	egg

Note: Instead of the "an" unit, deviating units are occasionally used, see Chapter 3.1.2.2.1.

The use of unspecified fractions (such as %) is restricted to those cases where the assignment is unambiguous. In any other case the use of fractions of units (such as kg kg⁻¹, MJ MJ⁻¹) is preferred.

3.1.2 Definitions / Definitionen

3.1.2.1 Emissions, emission factors and activity data / Emissionen, Emissionsfaktoren und Aktivitätsdaten

The term "emission" denotes the process of transferring matter from a source into the free atmosphere (German standard VDI 2450). In physics, there are two definitions of "emission":

- emission rate (mass emitted per time unit)
- emission rate density (mass emitted per time unit and area)

The annual total of German ammonia emissions (see e. g. Chapter 14.7, Table 14.2) is an example for an emission rate. The annual emissions of nitrous oxide per hectare of cultivated organic soils (see Chapter 11.6) is an example for an emission rate density.

The term „emission factor“ denotes a parameter that gives emissions relative to the amount of the emissions-generating quantity (activity data).

Equation (3.1) gives the basic relation between emission, emission factor and activity data:

$$E = EF \cdot AD$$

E	emission
EF	emission factor
AD	activity data

Wenn möglich werden SI-Einheiten und Symbole nach IUPAC¹² (1993) bzw. IUPAP¹³ (1987) benutzt. Spezielle Einheiten, die in den Agrarwissenschaften und der Mikrometeorologie verwendet werden, werden wie bei Monteith (1984) und Reifsnnyder et al. (1991) verwendet.

a	Jahr
d	Tag
h	Stunde
ha	Hektar
kg	Kilogramm
kt	Kilotonne
t	Tonne
Mg	Megagramm (= t)
Gg	Gigagramm (= kt)
Tg	Teragramm (= Mio. t)
MJ	Megajoule

Zusätzlich verwendete Einheiten:

pl	Tierplatz, siehe Kapitel 3.1.2.2.1
an	Tier, siehe Kapitel 3.1.2.2.1
eg	Ei

Anmerkung: Statt „an“ werden gelegentlich auch abweichende Einheiten verwendet, siehe Kapitel 3.1.2.2.1

Wenn die Möglichkeit besteht, dass unspezifische Angaben von Bruchteilen (wie in %) nicht eindeutig zugeordnet werden können, werden Brüche von Einheiten verwendet (etwa kg kg⁻¹, MJ MJ⁻¹).

Der Begriff „Emission“ beschreibt nach VDI 2450 den Vorgang des Übertritts eines Stoffes in die offene Atmosphäre. In physikalischer Hinsicht gibt es zwei Definitionen:

- Emissionsstrom (pro Zeiteinheit emittierte Masse)
- Emissionsstromdichte (pro Zeit- und Flächeneinheit emittierte Masse)

Ein Emissionsstrom-Beispiel ist die jährliche deutsche Gesamtemission an Ammoniak, siehe z. B. Kapitel 14.7, Table 14.2. Ein Beispiel für die Emissionsstromdichte ist die jährliche Lachgas-Emission pro Hektar kultivierten organischen Bodens, siehe Kapitel 11.6.

Als Emissionsfaktor bezeichnet man einen Parameter, der angibt, wie groß eine Emission pro Einheit der emissionserzeugenden Größe (Aktivitätsgröße) ist.

Gleichung (3.1) beschreibt den prinzipiellen Zusammenhang von Emission, Emissionsfaktor und Aktivität:

(3.1)

¹² IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry

¹³ IUPAP: International Union of Pure and Applied Physics

The units of E , EF and AD depend on the context of the emission calculations.

In agricultural emissions reporting, activity data can be e. g. areas, numbers of animal places (for the definition of animal places see Chapter 3.1.2.2) or amounts of nitrogen (e. g. nitrogen in fertilizers applied to the field).

The example of annual emissions of nitrous oxide per hectare of cultivated organic soils shows that it depends on the context of the emission calculations whether a quantity can be denoted as emission or emission factor: On the one hand it can be that the emissions per hectare are the quantity E , where the pertinent EF has the units of “emissions per fertilizer N units” and the activity data AD has the units “amount of fertilizer N per hectare”.

On the other hand, E can be the total annual emissions of nitrous oxide from all cultivated organic soils in Germany. Then the quantity “annual emissions of nitrous oxide per hectare of cultivated organic soils” becomes an emission factor while the pertinent AD is the total area of cultivated organic soils in Germany.

The descriptions of methods for the calculation of emissions from animal husbandry sometimes use the term “partial emission factor”. However, this emission factor is nothing else than an emission factor as defined by Equation (3.1). It describes the ratio of nitrogen emitted to the amount of nitrogen potentially available for nitrogen emissions. There are specific partial emission factors for housing, storage, spreading and grazing.

Another type of emission factor is the implied emission factor (IEF). It is defined as the ratio of aggregated emissions to aggregated activities. The IEF units depend on the units of E and AD :

$$IEF = \frac{\sum E_i}{\sum AD_i} \quad (3.2)$$

IEF implied emission factor
 E_i emission from source i
 AD_i activity of source i

The IEF concept can be illustrated by an example. The mean total annual emissions of ammonia per fattening pig place represents such an IEF and is calculated from the total of ammonia emissions from all fattening pig places, divided by the total number of fattening pig places. This IEF has the units “annual ammonia emissions per animal place”.

The chapters on agricultural emission sources (Chapters 4 bis 11) describe in detail the relevant emission factors and activity data.

Die Einheiten von E , EF und AD hängen vom jeweils betrachteten Zusammenhang ab.

In der Emissionsberichterstattung aus der Landwirtschaft können Aktivitätsgrößen z. B. Flächen sein, aber auch Tierplatzzahlen (zur Tierplatzzahl-Definition siehe Kapitel 3.1.2.2) oder Stickstoffmengen (z. B. aufs Feld ausgebrachte Mengen an Düngerstickstoff).

Das Beispiel der jährlichen Lachgas-Emission pro Hektar kultivierten organischen Bodens zeigt, dass es vom Zusammenhang abhängen kann, ob eine Größe als Emission oder als Emissionsfaktor zu bezeichnen ist. So kann es sein, dass die jährlichen Lachgas-Emission pro Hektar die Emissionsgröße E ist, wobei der zugehörige Emissionsfaktor EF die Einheit „Emission pro Düngerstickstoffmenge“ und die Aktivitätsgröße AD die Einheit „Düngerstickstoffmenge pro Hektar“ haben.

Geht es bei E aber um die Gesamtemission an Lachgas aller kultivierter organischen Böden in Deutschland, wird die Größe „jährliche Lachgas-Emission pro Hektar kultivierten organischen Bodens“ zum Emissionsfaktor, wobei AD dann die Gesamtfläche kultivierter organischen Böden in Deutschland ist.

In der Berechnung von Stickstoffemissionen aus der Tierhaltung wird auch der spezielle Begriff des „partiellen Emissionsfaktors“ verwendet. Dieser ist aber nichts anderes als ein Emissionsfaktor im Sinne von Gleichung (3.1). Er beschreibt das Verhältnis von emittierter Stickstoffmenge zu der für diese Emission potentiell verfügbare Stickstoffmenge, wobei allerdings für Stall, Lager, Ausbringung und Weidegang separate Emissionsfaktoren existieren.

Als IEF (implied emission factor) wird ein Quotient aus aggregierten Emissionen und aggregierten Aktivitätsdaten bezeichnet, wobei die Einheit des IEF von den Einheiten von E und AD abhängt:

Ein Beispiel für das IEF -Konzept stellt die mittlere jährliche Gesamt-Ammoniak-Emission pro Mastschwein-Platz dar, gebildet aus der Summe aller Ammoniak-Emissionen aus der Mastschweinhaltung dividiert durch die Gesamtzahl an Mastschweinplätzen. Dieser IEF hat die Einheit „jährliche Ammoniak-Emission pro Tierplatz“.

Die Kapitel zu den verschiedenen landwirtschaftlichen Emissionsquellen (Kapitel 4 bis 11) gehen im Detail auf Emissionsfaktoren und Aktivitätsgrößen ein.

3.1.2.2 *Animal place and animal number / Tierplatz und Tierzahl*

3.1.2.2.1 *Animal related units / Tierbezogene Einheiten*

The calculation of the emission inventory uses a resolution in time of one year making it impossible to take into account internannual variations of animal populations. Apart from this modelling aspect, the official German statistics do not provide enough data to keep track of such interannual variations. Hence, it is assumed for the inventory calculations that the numbers of animals counted at a certain reference date (see Chapter 3.4.2.1) represent the animal numbers at any other possible reference date in the same year.

In the German inventory, those animal place numbers have the unit "pl" (pl for place). The unit "head", which is frequently used in the English-language regulations of EMEP and IPCC, is not used because it could be identified with the term "animal". However, such an equalization is not always meaningful, as shown in the following remarks.

For data X referring to the animal place (such as X = energy requirements or X = emission), the units "X pl⁻¹" is usually used. However, for animals whose production cycles are shorter than one year (such as fattening pigs or sows in piglet production), calculations are first carried out per animal (equivalent to "per production cycle") before being converted to the year. The per-animal data X then have the units "X an⁻¹" (with "an" from "animal"). In special cases it may happen that the unit "an" is too general, so that a confusion of different animal categories would be possible. In such cases, "an" will be replaced by a more specific unit based on the English name of the respective animal category. The most important example for this is the calculation for sows including suckling piglets, see chapter 5.3. In this example, if necessary, the data X referring to the sow is given with the units "X sow⁻¹" and the information relating to the suckling pig Y with the unit "Y piglet⁻¹".

For quantities given per year (such as milk yield), the units "pl⁻¹" and "an⁻¹" (or sow⁻¹ or equivalent) are equivalent. This applies, for example, also for the sow's daily energy requirements averaged over the entire production cycle, because this energy requirements can be converted directly into the annual energy requirements by multiplying it by 365. For animal categories whose lifespan is less than one year (such as fattening pigs), there is no equivalence of "pl⁻¹" and "an⁻¹". (For the definition of „lifespan“ see Chapter 3.1.2.3.)

3.1.2.2.2 *Average annual population / Mittlere jährliche Tierpopulation*

According to Chapter 3.1.2.2.1, in the German inventory the number of occupied animal places (n_{op}, with op = occupied places) counted by the official statistics at a certain reference date is assumed to be constant over the whole year. Consistently with the definition of n_{op},

Die Berechnung des Emissionsinventars erfolgt mit einer zeitlichen Auflösung von einem Jahr. Schwankungen im Tierbestand innerhalb eines Jahres können nicht abgebildet werden. Abgesehen davon stellt die deutsche Officialstatistik nicht genügend Daten bereit, um solche Schwankungen nachzuvollziehen. Für die Inventarberechnungen wird daher davon ausgegangen, dass die durch die Officialstatistik zu einem bestimmten Stichtag (siehe Kapitel 3.4.2.1) erhobene Anzahl besetzter Tierplätze auch an jedem anderen Tag des Jahres anzutreffen ist.

Diese Tierplatzzahlen haben im deutschen Inventar die Einheit „pl“ (pl für place oder Platz). Die in den englischsprachigen Regelwerken von EMEP und IPCC häufig anzutreffende Einheit „head“ wird nicht verwendet, da sie mit dem Begriff „Tier“ gleichgesetzt werden könnte. Eine solche Gleichsetzung ist aber nicht immer sinnvoll, wie aus den nachfolgenden Ausführungen hervorgeht.

Bei Angaben X, die sich auf den Tierplatz beziehen (wie z. B. X = Energiebedarf oder X = Emission), wird i. d. R. die Einheit „X pl⁻¹“ verwendet. Bei Tieren, deren Produktionszyklen aber kürzer als ein Jahr sind (wie z. B. Mastschweinen oder Sauen in der Ferkelproduktion), werden die Berechnungen zunächst pro Tier ausgeführt (gleichbedeutend mit „pro Produktionszyklus“), ehe eine Umrechnung auf das Jahr erfolgt. Die pro-Tier-Angaben X haben dann die Einheit „X an⁻¹“ (mit „an“ von „animal“). In speziellen Fällen kann es vorkommen, dass die Einheit „an“ zu allgemein ist, so dass eine Verwechslung von verschiedenen Tierkategorien möglich wäre. In solchen Fällen wird „an“ durch eine spezifischere Einheit ersetzt (in Anlehnung an die englische Bezeichnung der Tierkategorie). Das wichtigste Beispiel sind die Sauen incl. Saugferkel, siehe Kapitel 5.3. In diesem Beispiel erfolgen bedarfsweise die auf die Sau bezogenen Angaben X mit der Einheit „X sow⁻¹“ und die auf die Saugferkel bezogenen Angaben Y mit der Einheit „Y piglet⁻¹“.

Bei Größen, die pro Jahr angegeben werden (wie z. B. die Milchleistung), sind die Einheiten „pl⁻¹“ und „an⁻¹“ (bzw. sow⁻¹ o. ä.) äquivalent. Dies gilt z. B. auch für den über den gesamten Produktionszyklus gemittelten täglichen Energiebedarf der Sau in der Ferkelproduktion, weil dieser Energiebedarf durch Multiplikation mit 365 direkt in den jährlichen Energiebedarf überführt werden kann. Bei Tierkategorien, deren Lebensdauer kürzer als ein Jahr ist (wie z. B. Mastschweinen), gibt es keine Äquivalenz von „pl⁻¹“ und „an⁻¹“. (Zur Definition der Lebensdauer siehe Kapitel 3.1.2.3.)

Nach Kapitel 3.1.2.2.1 wird im deutschen Inventar die durch die Officialstatistik zu einem bestimmten Stichtag erhobene Anzahl besetzter Tierplätze (n_{op}, mit op = occupied places) als konstant über das ganze Jahr angenommen. Konsistent mit der Definition von n_{op} wird

the number of animal places not occupied at the reference date is assumed to be constant throughout the year (n_{ep} , with ep = empty places).

As animal place number n_{op} is constant during one year, it is equivalent to the annual mean of the animal population and therefore consistent with the definition of AAP („average annual population“) in EMEP(2016)-3B-14 and EMEP(2016)-3B-20, or IPCC(2006)-10.8, Equation 10.1: $n_{op} = AAP$.¹⁴

An average animal place is, by definition, occupied on 365 days a year. As a consequence the inventory uses activity data (e. g. the N excretions) and calculates emissions for 365 days a year. The emission factors of IPCC and EMEP are adjusted to this definition. Empty times on animal places are, on average, represented by the aforementioned entity n_{ep} as for these n_{ep} animal places the emissions are set to zero. By doing so it is not necessary to take explicitly into account these n_{ep} animal places in the inventory.

Obviously, input data and emission results used and obtained for animal places occupied throughout a year are not directly comparable to data valid for animal husbandry in agricultural practice, where empty times are a feature of each single animal place rather than combined to a number of animal places that are empty throughout a year. The conversion between average animal place used in the inventory and an animal place in agricultural practice is discussed in Chapter 3.1.2.2.3.

Note: In the report at hand the number of animal places is often simply addressed as number of animals.

With sheep there is a strong interannual variation of lamb numbers. The numbers provided by official statistics are November numbers that are too low to represent mean annual lamb numbers. Hence the lamb numbers have to be corrected, see Chapter 6.1.1.1.

For animals that are not counted every year, the animal numbers are interpolated or extrapolated in order to close the data gaps.

Emission calculations by the more complex Tier 2 approaches (i. e. for cattle, pigs and some poultry categories) are first performed for the entire life time of the respective animal that is less than one year. The results (and the emission-relevant input data) are then divided by the lifetime (in days) and multiplied by 365 in order to obtain annual data consistent with the AAP definition. See also Chapter 3.1.2.3.

3.1.2.2.3 *Relation to animal places in practice / Zusammenhang mit Tierplätzen in der Praxis*

While the inventory is based on the concept of an average animal place that is occupied throughout the

die Anzahl der am Stichtag nicht besetzten Tierplätze (n_{ep} , mit ep = empty places) ebenfalls als konstant angenommen.

Da die Größe n_{op} über das Jahr konstant ist, ist sie per se identisch mit dem Jahresmittel der Tierzahl und damit konsistent mit der AAP-Definition („average annual population“) in EMEP(2016)-3B-14 und EMEP(2016)-3B-20, bzw. IPCC(2006)-10.8, Gleichung 10.1. Das heißt, dass $n_{op} = AAP$.¹⁴

Ein mittlerer Tierplatz ist definitionsgemäß 365 Tage im Jahr besetzt. Daher erfolgt im Inventar die Bereitstellung von Eingangsdaten (z. B. die N-Ausscheidungen) und Berechnung der Emissionen ebenfalls für 365 Tage im Jahr. Die IPCC- und EMEP-Emissionsfaktoren sind darauf abgestimmt. Der oben erwähnte, durch n_{ep} repräsentierte Leerstand von Tierplätzen wird berücksichtigt, in dem für die nicht besetzten Tierplätze null Emissionen für das ganze Jahr angesetzt werden. Damit ist es aber rechnerisch nicht erforderlich, die leerstehenden Tierplätze im Inventar explizit mitzuführen.

Es ist offensichtlich, dass Eingangsdaten und Ergebnisse für den ganzjährig besetzten mittleren Tierplatz nicht unmittelbar mit Daten aus der landwirtschaftlichen Tierhaltungspraxis vergleichbar sind, welche für einen realen Tierplatz einschließlich der auf diesem realen Tierplatz üblichen Leerstandszeiten erhoben wurden. Auf die Umrechnung zwischen mittlerem Tierplatz im Inventar und einem Tierplatz in der landwirtschaftlichen Praxis geht Kapitel 3.1.2.2.3 ein.

Anmerkung: Im vorliegenden Bericht wird die Tierplatzzahl oft auch vereinfachend als Tierzahl bezeichnet.

Bei den Schafen ist wegen der sehr starken intra-annuellen Schwankung der Lämmerzahl eine Korrektur der im November (und damit zu niedrig) erhobenen Lämmerzahlen erforderlich, siehe Kapitel 6.1.1.1.

Bei Tieren, deren Bestände nicht jedes Jahr erhoben werden, werden die Datenlücken durch lineare Interpolation bzw. Extrapolation geschlossen.

In der Modellierung der Emissionen werden in allen Fällen, in denen komplexere Tier-2-Verfahren zur Anwendung kommen (Rinder, Schweine, diverse Geflügelarten), die emissionsbestimmenden Größen zunächst für die Lebensdauer des betreffenden Tieres berechnet, durch die Lebensdauer (in Tagen) dividiert und durch Multiplikation mit 365 Tagen in einen mit der AAP-Definition konsistenten Jahreswert transformiert. Siehe hierzu auch Kapitel 3.1.2.3.

Während das Inventar auf dem Konzept des mittleren, ganzjährig besetzten Tierplatzes beruht (siehe Kapi-

¹⁴ Note that the 2016 EMEP/EEA Guidebook (EMEP, 2016) uses the acronym AAP not only to define animal populations but also in the sense of „per place“ (AAP^{-1}), see e. g. the NH_3 emission factors in EMEP (2016)-3B-16, Table 3.2, that are given in units of $kg\ AAP^{-1}\ a^{-1}$. Such usage of AAP is incorrect, as AAP represents an entire population and cannot simultaneously represent a single part of that population. The German inventory report at hand does not use the acronym AAP.

year (see Chapter 3.1.2.2.1), an animal place in practice (“real animal place”) is, in general, occupied for certain times, interrupted by empty times.

If the inventory model’s input data (e. g. N excretions) and results (emissions) calculated for an average animal place are to be compared with data obtained in practice for a real animal place, the inventory data have to be converted under consideration of the empty times met in practice. Such a conversion requires the number of days per year the real animal place is occupied to be divided by 365. The resulting factor (that is lower than or equal to 1) is then used to multiply the input data and emissions used and produced by the inventory model to obtain practice related input data and emissions.

tel 3.1.2.2.1), ist ein Tierplatz in der Praxis („realer Tierplatz“) im allgemeinen nur zeitweilig besetzt, unterbrochen durch Leerstandszeiten.

Sollen die mit dem Inventarmodell für einen mittleren Tierplatz berechneten Eingangsdaten (z. B. die N-Ausscheidungen) und Emissionen mit Daten für einen realen Tierplatz verglichen werden, müssen zuvor die Inventardaten unter Berücksichtigung der in der Praxis vorkommenden Leerstandszeiten umgerechnet werden. Dazu ist die Anzahl von Tagen im Jahr, an denen der reale Tierplatz tatsächlich besetzt ist, zu ermitteln und durch 365 zu dividieren. Mit dem sich daraus ergebenden Faktor, der kleiner oder gleich 1 ist, sind die Eingangsdaten und Emissionen des Inventars zu multiplizieren, um mit der Praxis vergleichbare Eingangsdaten und Emissionen zu erhalten.

3.1.2.3 *Lifespan and duration of production cycle / Lebensdauer und Durchgangsdauer*

In the inventory, the quantity „lifespan“ (τ_{lifespan}) denotes the duration of the time during which an animal is part of a given animal category. This definition is necessary to cope with the fact that one single animal can be part of more than one category during its life. For example, female cattle first belong to the category “calves” (having the lifetime of a calf), then are members of the category “heifers” (having the lifetime of a heifer), and finally can become dairy cows (having the lifetime of a dairy cow). Only for animals that belong to only one animal category during their life (like e. g. broilers), the value of the quantity „lifespan“ is identical to the duration of the entire life.

Die Größe „lifespan“ bzw. „Lebensdauer“ (τ_{lifespan}) bezeichnet im Inventar die Zeitdauer, während der ein Tier Teil der Population einer bestimmten Tierkategorie ist. Diese Definition ist erforderlich, da manche Tiere im Laufe ihres Lebens mehr als einer Tierkategorie angehören. So gehören weibliche Rinder zunächst der Tierkategorie „Kälber“ an (mit der Lebensdauer eines Kalbs), wechseln danach in die Kategorie der Färsen (mit Färsen-Lebensdauer) und können anschließend Milchkühe werden (mit Milchkuh-Lebensdauer). Nur bei Tieren, die im Laufe ihres Lebens nur einer einzigen Tierkategorie angehören, wie z. B. Masthähnchen, ist der Wert der Größe „lifespan“ bzw. „Lebensdauer“ identisch mit der tatsächlichen Lebensdauer.

The duration of a production cycle τ_{round} is related to the quantity „lifespan“ and is defined as the sum of τ_{lifespan} and the vacancy time or service time (τ_{service}) before the next production cycle. Due to the definition of the mean animal place (see Chapter 3.1.2.2), the duration of a production cycle τ_{round} isn’t used in the emission calculations, except for the definition of the animal subcategories of pullets and laying hens (see Chapters 8.3.1 and 8.5.1).

Eine zu τ_{lifespan} verwandte Größe ist die Durchgangsdauer τ_{round} . Sie ist die Summe aus der Lebensdauer innerhalb der Tierkategorie (τ_{lifespan}), und der Leerstands- oder Reinigungszeit (τ_{service}) vor dem nachfolgenden Durchgang. Die Durchgangsdauer geht aber aufgrund der Tierplatz-Definition (siehe Kapitel 3.1.2.2) nicht in die Emissionsberechnung ein. Sie wird nur bei Jung- und Legehennen zur Tierzahlen-Umrechnung benötigt (siehe Kapitel 8.3.1 und 8.5.1).

3.1.2.4 *Start weight, final live weight and carcass weight / Anfangs-, Lebendend- und Schlachtgewicht*

In general, animal start weight and final live weight w_{start} and w_{fin} are the animal’s masses at the beginning and the end of its membership in a specific animal category (see also Chapter 3.1.2.3). If during its life the animal belongs to only one animal category, then the start weight denotes the weight at birth or hatching. When animals are fattened, the final live weight may be called fattening weight (“Mastendgewicht”).

Allgemein bezeichnen Anfangsgewicht w_{start} und Lebendendgewicht w_{fin} die Masse des lebenden Tieres zu Beginn bzw. am Ende seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten Tierkategorie (siehe dazu auch Kapitel 3.1.2.3). Gehört das Tier im Laufe seines Lebens nur einer einzigen Tierkategorie an, steht „Anfangsgewicht“ für Geburts- bzw. Schlüpfgewicht. Das Lebendendgewicht heißt bei Masttieren auch Mastendgewicht.

Final live weight can be estimated from carcass weight (for the carcass weight see below) using Eq. (3.3).

Das Lebendendgewicht kann mithilfe von Gleichung (3.3) aus dem Schlachtgewicht (s. u.) geschätzt werden.

The German term “Schlachtgewicht” is used to describe the animal weight immediately after slaughtering and gutting (BUNDESGESETZESBLATT (2008) Teil I Nr. 52).

Das Schlachtgewicht ist laut BUNDESGESETZESBLATT (2008) Teil I Nr. 52 das Warmgewicht des geschlachteten und ausgeweideten Tieres. Somit ist das Gewicht nach

Therefore the weight after slaughtering is the animal weight without those parts of the body which are (have to be) removed.

Hence, the German term “Schlachtgewicht” is not equivalent to the seemingly similar English term “slaughter weight” (that refers to the animal weight immediately before slaughtering), but to the English term “carcass weight”.

The ratio between final live weight and carcass weight is called dressing percentage or slaughter yield c_w .

$$w_{\text{carcass}} = c_w \cdot w_{\text{fin}} \quad (3.3)$$

w_{carcass}	carcass weight (in kg an ⁻¹)
c_w	ratio of carcass weight to final live weight (in kg kg ⁻¹ , $0 < c_w < 1$)
w_{fin}	final live weight (in kg an ⁻¹)

The national mean carcass weight w_{carcass} for an animal category i is obtained from the cumulative carcass weights and the number of animals slaughtered.

$$w_{\text{carcass}, i} = \frac{m_{\text{slaughtered}, i}}{n_{\text{slaughtered}, i}} \cdot \beta \quad (3.4)$$

$w_{\text{carcass}, i}$	carcass weight of an animal in category i (in kg an ⁻¹)
$m_{\text{slaughtered}, i}$	sum of carcass weights of slaughtered animals of category i (in Mg a ⁻¹)
$n_{\text{slaughtered}, i}$	number of slaughtered animals of category i (in a ⁻¹)
β	mass units conversion factor ($\beta = 10^3 \text{ kg Mg}^{-1}$)

Schlachtung das um die Masse der nicht verwertbaren Tieranteile verminderte Lebendengewicht vor Schlachtung.

Der Begriff „Schlachtgewicht“ ist damit nicht gleichbedeutend mit dem scheinbar ähnlichen englischen Ausdruck „slaughter weight“ (der das Tiergewicht unmittelbar vor der Schlachtung kennzeichnet), sondern entspricht dem englischen Begriff „carcass weight“.

Das Verhältnis des Lebendengewichtes zum Schlachtgewicht wird als Schlachtausbeute-Faktor, Ausschachtung oder Ausschachtungsgrad c_w bezeichnet.

Das nationale w_{carcass} -Mittel einer Tierkategorie i errechnet sich aus der Summe der Gewichte nach Schlachtung und der Anzahl der geschlachteten Tiere.

3.1.2.5 Weight gain and weight gain rate / Gewichtszuwachs und Zuwachsrate

Weight gain is the difference between start weight and final live weight in a specific phase of life defined by the animal's membership in a specific animal category:

Als Zuwachs während der Zugehörigkeit eines Tieres zu einer bestimmten Tierkategorie bezeichnet man die Differenz von Anfangs- und Lebendengewicht dieser Tierkategorie:

$$\Delta w = w_{\text{fin}} - w_{\text{start}} \quad (3.5)$$

Δw	total weight gain (in kg an ⁻¹)
w_{fin}	final animal live weight (in kg an ⁻¹)
w_{start}	animal start weight (in kg an ⁻¹)

The ratio between weight gain and the duration of the respective life span of the respective animal category (see Chapter 3.1.2.2) is the weight gain rate $\Delta w/\Delta t$:

Das Verhältnis von Zuwachs zu Lebensspanne in der betreffenden Tierkategorie (siehe Kapitel 3.1.2.2) ergibt die mittlere Zuwachsrate $\Delta w/\Delta t$:

$$\frac{\Delta w}{\Delta t} = \frac{\Delta w}{\tau_{\text{lifespan}}} \quad (3.6)$$

$\Delta w/\Delta t$	mean daily weight gain (in kg an ⁻¹ d ⁻¹)
Δw	total weight gain (in kg an ⁻¹)
τ_{lifespan}	span of lifetime (in d)

3.1.2.6 *Mean weight / Mittleres Tiergewicht*

Mean animal weights have to be reported for various animal categories, such as “other cattle”, “pigs” or “poultry”. The calculation procedures to derive them are described in the respective chapters.

Für verschiedene zusammenfassende Tierkategorien („übrige Rinder“, „Schweine“, „Geflügel“) werden mittlere Tiergewichte benötigt. Die hierzu erforderlichen Berechnungen werden in den betreffenden Kapiteln beschrieben.

3.1.2.7 *Metabolic weight / Metabolisches Gewicht*

The calculation of the daily energy requirements for maintenance presupposes the knowledge of the metabolic animal weight. This is defined as follows:

Die Berechnung des täglichen Energiebedarfs für Erhaltung beruht auf der Kenntnis des metabolischen Tiergewichts. Dieses ist wie folgt definiert:

$$w_{m,j} = w_{\text{unit}} \cdot \left(\frac{w_j}{w_{\text{unit}}} \right)^m \quad (3.7)$$

$w_{m,j}$	metabolic animal weight on day j of lifespan (in kg an ⁻¹)
w_j	animal live weight on day j of lifespan (in kg an ⁻¹)
w_{unit}	unit weight ($w_{\text{unit}} = 1 \text{ kg an}^{-1}$)
m	exponent ($0.5 < m < 1$); as a rule $m = 0.75$

If the maintenance energy for a whole lifespan has to be assessed, eq. (3.7) has to be integrated. This results in a cumulative (an accumulated) metabolic weight as in eq. (3.8).

Gleichung (3.7) ist zu integrieren, wenn der Erhaltungsenergiebedarf einer gesamten Lebensspanne benötigt wird. Es ergibt sich das kumulierte (oder auch: kumulative) metabolische Gewicht:

$$\Sigma W_j = \sum_{j=1}^{k_{\text{fin}}} \tau_{\text{day}} \cdot w_{m,j} \quad (3.8)$$

ΣW_j	cumulative metabolic live weight (kg d an ⁻¹)
j	running index of day
k_{fin}	index of the final day of lifespan ($k_{\text{fin}} = \tau_{\text{lifespan}} \cdot \tau_{\text{day}}^{-1}$, with τ_{lifespan} the duration of lifespan in d)
τ_{day}	time period of one day ($\tau_{\text{day}} = 1 \text{ d}$)
$w_{m,j}$	metabolic animal weight on day j of lifespan (in kg an ⁻¹)

3.2 The inventory model GAS-EM / Das Inventar-Modell GAS-EM

GAS-EM is a modular EXCEL® spreadsheet programme (see Chapter 3.2.4) to estimate gaseous and particulate emissions from animal agriculture and crop production including professional horticulture.

GAS-EM was first described in DÄMMGEN et al. (2002) and has continuously been developed further since then.

The assessment of emissions within GAS-EM uses the definitions of agriculture according to the definitions of IPCC (see Chapter 3.2.2). All calculation procedures involved are based on the rules provided by the respective conventions and the current guidance documents (see Chapter 3.2.1).

In addition, the German agricultural inventory uses differing methods in specific circumstances in order to improve the description of national emission conditions. These national methods are described in detail in the respective chapters of the report at hand.

GAS-EM ist ein modulares EXCEL®-Tabellenkalkulationsprogramm (siehe Kapitel 3.2.4) zur Berechnung gas- und partikelförmiger Emissionen aus Tierhaltung und Pflanzenbau in der Landwirtschaft (einschl. des kommerziellen Gartenbaus). GAS-EM wurde erstmalig von DÄMMGEN et al. (2002) erstellt und seither kontinuierlich weiter entwickelt.

Zur Emissionsberechnung mit dem GAS-EM-Modell wird das System Landwirtschaft im Sinne der IPCC-Berichterstattung definiert (siehe Kapitel 3.2.2). Die Methoden zur Emissionsberechnung beruhen auf den Vorgaben der entsprechenden Konventionen und den aktuellen Regelwerken (siehe Kapitel 3.2.1).

Das deutsche landwirtschaftliche Inventar verwendet bisweilen abweichende Methoden, um die nationale Situation zutreffender abbilden zu können. Diese nationalen Methoden werden an entsprechender Stelle im vorliegenden Bericht beschrieben.

3.2.1 Guidance documents / Handbücher

The guidance documents used to calculate the inventory with the GAS-EM model are the IPCC Guidelines (IPCC, 2006) and the EMEP Guidebook (EMEP, 2016). The agricultural section of the EMEP Guidebook has been developed with the assistance of the German working group (e.g. DÄMMGEN and HUTCHINGS, 2005, and in 2016 during writing the EMEP Guidebook 2016).

In a few specific cases, however, older guidelines must be used: EMEP (2007), EMEP (2009) and EMEP (2013).

The IPCC 2006 Guidelines (IPCC, 2006) are referred to by quoting the page number, e.g. IPCC(2006)-10.39. The page number consists of two parts. The part before the point denotes the respective guideline chapter.

The EMEP/EEA Guidebook issued in 2013 is referenced as EMEP(2013)-XX-PP, where XX is the sector (e.g. 3B for animal husbandry and manure management) and PP the page. The same holds for the EMEP/EEA Guidebooks issued in 2009 and 2016.

The EMEP/EEA Guidebook issued in 2007 is referenced as EMEP(2007)-SN-PP, e.g. EMEP(2007)-B1010-7, where SN is the so called SNAP code denoting specific chapters (SNAP: Selected Nomenclature for Air Pollutants). PP denotes the page

Die den Berechnungen mit GAS-EM zugrunde liegenden Handbücher umfassen die IPCC-Guidelines (IPCC, 2006) und das EMEP-Guidebook (EMEP, 2016). Der die Landwirtschaft betreffende Teil des EMEP-Guidebook wurde unter Beteiligung der deutschen Arbeitsgruppe entwickelt (z.B. DÄMMGEN and HUTCHINGS, 2005, und 2016 bei der Erstellung des EMEP-Guidebook 2016).

In einigen wenigen Einzelfällen müssen allerdings auch ältere Richtlinien herangezogen werden: EMEP (2007), EMEP (2009) und EMEP (2013).

Bei den IPCC-2006-Guidelines (IPCC, 2006) wird die Seitenzahl mit Bindestrich an die Jahreszahl gehängt, z. B. IPCC(2006)-10.39. Die Seitenzahl ist zweiteilig, wobei die Zahl vor dem Punkt das Kapitel bezeichnet.

Das EMEP/EEA-Guidebook von 2013 wird als EMEP(2013)-XX-PP zitiert, wobei XX für den Quellsektor steht (z.B. 3B für Tierhaltung und Wirtschaftsdünger-Management) und PP für die Seitennummer. Das Gleiche gilt für die EMEP/EEA-Guidebooks von 2009 und 2016.

Das EMEP-Guidebook von 2007 wird als EMEP (2007)-SN-PP zitiert (z. B. EMEP(2007)-B1010-7), wobei SN eine sogenannte „SNAP“-Nummer ist, die abgegrenzte Kapitel bezeichnet (SNAP: Selected Nomenclature for Air Pollutants). PP ist die Seitenzahl.

3.2.2 Structure of the GAS-EM model / Struktur des GAS-EM-Modells

The assessment of emissions within GAS-EM uses the definitions of agriculture according to the definitions of IPCC. It comprises the sectors “animal production” (emissions from enteric fermentation and manure management) as well as emissions from agricultural soils and from commercial horticulture.

Figure 3.1 illustrates the agricultural system with its respective subsystems as well as related neighbouring systems. In addition the mass flows between the agri-

Zur Emissionsberechnung mit dem GAS-EM-Modell wird das System Landwirtschaft im Sinne der IPCC-Berichterstattung definiert. Es umfasst die Bereiche „Nutztierhaltung“ (Emissionen aus Verdauung und Wirtschaftsdünger-Management) sowie „landwirtschaftlich und für den kommerziellen Gartenbau genutzte Böden“.

Figure 3.1 zeigt das System „Landwirtschaft“ mit den dazugehörigen Subsystemen sowie benachbarte, nicht der Landwirtschaft direkt zugerechnete Systeme. Eben-


cultural subsystems and the subsequent emissions are shown. The following agricultural subsystems are considered:

- a soil/plant subsystem with primary production
- an animal subsystem, which describes metabolic processes
- a manure management subsystem which considers housing, the storage of animal manures as well as their treatment (e.g. bio gas production)
- the surface and groundwater subsystems as well as
- the natural and seminatural systems influenced by agricultural activities.

falls gezeigt werden die Massenflüsse zwischen den Subsystemen und die daraus resultierenden Emissionen. Landwirtschaftliche Subsysteme sind

- das Subsystem „Boden/Pflanze“ mit der Primärproduktion,
- das Subsystem „Tier“, in dem die Stoffwechselvorgänge im Tier beschrieben werden,
- das Subsystem „Wirtschaftsdünger-Management“, das die Stallungen, die Lagerung von Wirtschaftsdüngern und deren Aufbereitung (z.B. Biogas-Anlagen) umfasst,
- das Subsystem „Oberflächen und Grundwässer“ sowie
- das Subsystem „natürliche und naturnahe Flächen“.

Figure 3.1: Mass flow in agriculture



Narrow black arrows: mass flow between external sources and sinks and the agricultural subsystems; sloping broad black arrows: emissions to the atmosphere. Vertical broad grey arrows: fluxes between agricultural subsystems. Sloping broad grey arrows: emissions not accounted for as agricultural emissions (DÄMMGEN et al., 2003).

Fluxes of feeding material between subsystems “Soil/plant” and “animal” are not explicitly calculated in the inventory. It is simply assumed that the required amounts of feeding material are available.

Bedding material is assumed to be straw. The amounts of N imported by bedding material into the subsystem “animal” are subtracted from the N pools in subsystem “Soil/plant”.

N inputs upon and into soils result in N fluxes into non-agricultural systems: surface runoff and leaching transfer N into surface and ground waters. There these inputs are likely to result in N_2O formation. The conventions attribute these indirect emissions to agriculture as their original source.

Emissions of reactive N species (NH_3 , NO) are subject to atmospheric transport and deposition, after which they interact with the N dynamics of soils, and will eventually lead to the formation of N_2O . These N_2O emissions are also attributed to the agricultural sector as indirect agricultural emissions.

Figure 3.2 illustrates how and with which spatial resolution GAS-EM differentiates between animal categories and subcategories¹⁵ - provided that the respective data is available. It distinguishes the source categories 3.A and 3.B. For the latter, different housing, storage and spreading systems are taken into account.

CH_4 emissions for the source categories 3.A und 3.B are separately calculated for each animal subcategory used in the inventory (see Chapter 3.3.2 and 3.3.4.1). Emissions of the N species for 3.B and 3.D are calculated based on the N-flow concept (see Chapter 3.3.4.3).

For the temporal and spatial resolution of the emission calculations see Chapter 3.2.5

Flüsse von Futtermitteln zwischen dem Subsystem „Boden/Pflanze“ und dem Subsystem „Tiere“ werden im Inventar nicht explizit berechnet; bei der Tierfütterung wird davon ausgegangen, dass die erforderlichen Futtermengen vorhanden sind.

Einstreu wird als Stroh angesehen; die im Subsystem „Tiere“ durch Einstreu eingebrachten N-Mengen werden im Subsystem Boden/Pflanze abgezogen.


N-Einträge auf und in Böden führen zu N-Flüssen in nicht-landwirtschaftliche Systeme: Oberflächenabfluss in Oberflächenwässer und durch Auswaschung in Oberflächen- und Grundwässer. Sie verursachen dort z.B. die Bildung von N_2O . Die Konventionen ordnen diese indirekten Emissionen der Landwirtschaft als Quelle zu.

Die Emissionen reaktiver N-Verbindungen (NH_3 , NO) werden über die Luft verfrachtet, deponiert und greifen dort in die N-Dynamik der Böden ein. Sie führen dort schließlich zur Bildung von N_2O . Auch diese indirekten N_2O -Emissionen werden der Quelle „Landwirtschaft“ zugeordnet.

Figure 3.2 zeigt, wie und auf welcher räumlichen Ebene – soweit Daten vorhanden – das GAS-EM-Modell zunächst nach Tierkategorien und –unterkategorien¹⁵ für die Berechnungen der Quellgruppen 3.A und 3.B differenziert, und diese wiederum nach Stallsystemen, Lagerungssystemen und Ausbringungsverfahren für Wirtschaftsdünger aufteilt. CH_4 wird für 3.A und 3.B getrennt je Tier-Subkategorie berechnet (siehe Kapitel 3.3.2 und 3.3.4.1). Die Emissionen der N-Spezies wird für die Quellgruppen 3.B und 3.D auf der Basis eines N-Fluss-Konzeptes berechnet (siehe Kapitel 3.3.4.3).

Zur räumlichen und zeitlichen Auflösung der Emissionsberechnungen siehe Kapitel 3.2.5.

Figure 3.2: Concept and thematic contents of the GAS-EM model



¹⁵ Six animal categories for cattle; four for pigs; two for sheep; one for goats; two for horses; seven for poultry.

3.2.3 Choice of methodologies / Methodenwahl

From the decision trees for the choice of methodologies (see IPCC (2006), Figures 10.2, 10.3, 10.4, 11.2 and 11.3, and EMEP (2016)-3B, Figure 3.1, and EMEP (2016)-3D, Figure 3.1) follows that detailed calculation methodologies have to be used for key sources. Key sources are those emission sources that significantly contribute to height, trend or uncertainty of the national total emissions (IPCC (2006), Chapter 4; EMEP (2016), Part A/Chapter 2). The results of the key source analysis are documented for green house gases in the current NIR ((National Inventory Report, <http://www.umweltbundesamt.de/emissionen/publikationen.htm>) and for air pollutants in the current IIR (Informative Inventory Report, <http://iir-de.wikidot.com/agriculture>).

Calculation methodologies are distinguished according to their increasing level of complexity with Tier 1 being the lowest level (for the definitions of emissionsfactors and activity data see Chapter 3.1.2.1):

- **Tier 1 methodologies** that combine national activity data obtained by statistical surveys (e.g. animal numbers from the census) directly with emission factors provided in the IPCC or EMEP/CORINAIR guidance documents ("default emission factors");
- **Tier 2 methodologies** that rely on the use of national emission factors (e.g., for animals, derived from national data on feeding and husbandry systems);
- **Tier 3 methodologies** that go beyond Tier 2 methodologies with respect of the degree of detail involved.

All methods used at present in GAS-EM for the calculation of emissions from German agricultural animal husbandry satisfy or partly exceed by far the basic requirements specified in the guidelines (see Chapters 4 to 9). However, at the time being, the calculations of green house gas emissions from agricultural soils can be performed only with the rather simple methods provided in the guidelines, even though the emissions from agricultural soils represent considerable contributions to the national total of green house gas emissions from agriculture (see Chapter 11 and 12).

For an overview of the calculation methods involved see Chapter 3.1. Details can be found in those chapters dealing with single animal subcategories (Chapter 4 ff) and the chapters dealing with emissions from agricultural soils (Chapter 11 ff).

For the calculation of uncertainties for both the greenhouse gas and the NH₃ inventories see Chapter 14.

Aus den Entscheidungsbäumen für die Methodenwahl (siehe IPCC (2006), Abbildungen 10.2, 10.3, 10.4, 11.2 und 11.3, sowie EMEP(2016)-3B, Abbildung 3.1, und EMEP (2016)-3D, Abbildung 3.1) geht hervor, dass für Hauptquellgruppen detaillierte Berechnungsmethoden anzuwenden sind. Als Hauptquellgruppen werden diejenigen Quellgruppen bezeichnet, die wesentliche Anteile zu Höhe, Trend oder Unsicherheit der nationalen Gesamtemissionen beitragen (IPCC (2006), Kapitel 4; EMEP (2016), Part A/Kapitel 2). Die Ergebnisse der Hauptquellgruppenanalyse werden für die Treibhausgase im jeweils aktuellen NIR (National Inventory Report, <http://www.umweltbundesamt.de/emissionen/publikationen.htm>) und für die Luftschadstoffe im jeweils aktuellen IIR (Informative Inventory Report, <http://iirde.wikidot.com/agriculture>) dokumentiert.

Die Berechnungsverfahren werden nach ihrem stufenweise zunehmenden Detaillierungsgrad unterschieden (zur Definition von Emissionsfaktoren und Aktivitätsdaten siehe Kapitel 3.1.2.1):

- **Tier-1-Verfahren**, die sich auf statistisch erhobene nationale Aktivitätsdaten (z.B. Tierzahlen) sowie Emissionsfaktoren aus den Regelwerken von IPCC und EMEP/CORINAIR („default emission factors“) stützen;
- **Tier-2-Verfahren**, die nationale Emissionsfaktoren verwenden (bei Tieren z. B. abgeleitet aus nationalen Daten zu Fütterung und Haltungungsverfahren);
- **Tier-3-Verfahren**, die im Detaillierungsgrad der Beschreibung über ein Tier-2-Verfahren hinausgehen.

Im deutschen Inventarmodell GAS-EM erfüllen die im Bereich der Tierhaltung verwendeten Berechnungsmethoden die Mindestanforderungen an den Detaillierungsgrad und gehen teilweise weit über darüber hinaus (siehe Kapitel 4 bis 9). Dagegen erfolgt mangels detaillierterer Verfahren die Berechnung der Treibhausgas-Emissionen aus landwirtschaftlichen Böden trotz ihres großen Beitrags zu den Gesamtemissionen aus der deutschen Landwirtschaft nach wie vor nur mit den in den Regelwerken vorgegebenen Tier-1-Methoden (siehe Kapitel 11 und 12).

Für einen Überblick über die verwendeten Rechenmethoden wird auf Kapitel 3.1 verwiesen. Details finden sich in den Tier-Kapiteln ab Kapitel 4 und den Boden-Kapiteln ab Kapitel 11.

Auf die Berechnung der Unsicherheit von Gesamt-Treibhausgas-Inventar und Gesamt-NH₃-Inventar geht Kapitel 14 ein.

3.2.4 The GAS-EM EXCEL® calculation files / Die GAS-EM EXCEL®-Rechendateien

For each type of emission source in agricultural animal husbandry (e.g. dairy cows, fattening pigs) and for the emissions from agricultural soils GAS-EM comprises

GAS-EM umfasst für jeden Emittententyp aus dem Bereich der Tierhaltung (z. B. Milchkühe, Mastschweine) sowie für die Emissionen aus der Nutzung landwirt-

an EXCEL® file (calculation workbook) containing a title sheet, one input sheet for activity data and their frequency distributions, one input sheet for emission factors and additional modelling parameters, one output sheet compiling the results and one or several calculation sheets. In addition, sheets are added for supplementary calculations.

schaftlicher Böden eine EXCEL®-Datei (Rechen- oder Arbeitsmappe) mit einem Titelblatt, einem Eingabeblatt für Aktivitätsgrößen bzw. deren Häufigkeitsverteilungen, einem Eingabeblatt für Emissionsfaktoren und weitere Modellparameter, einem zusammenfassenden Ausgabeblatt und einem oder mehreren Tabellenblättern für Berechnungen. Zusätzliche Tabellenblätter dienen ergänzenden Berechnungen.

3.2.5 Resolution in time and space / Zeitliche und räumliche Auflösung

The basic time step in GAS-EM is one year. Hence, processes developing on a shorter time scale (e.g. interannual fluctuations of animal populations or the application of manure under different weather conditions) cannot be described in GAS-EM due to the lack of input data. Also processes with a duration of more than a year, e.g. a stockpiling of mineral fertilizers, cannot be dealt with in GAS-EM as the input data needed for modelling of stockpiling is generally unavailable. Hence, GAS-EM assumes for mineral fertilizers that the total of the fertilizer amounts sold in the quarters I and II of a given year Y and the quarters III and IV of the previous year are completely applied to the agricultural soils within year Y.

Emissions from animal husbandry are calculated for districts and subsequently aggregated to obtain emission results for federal states and the national level. Sometimes the data for the characterization of the animals and their performance (e.g. animal weight, growth, laying performance) are not available in a district resolution, but only as national or even as federal mean values. The latter are assigned to the corresponding districts before the emission calculations start at district level.

As the official survey of animal numbers does not account for the location where the animals are kept but for the residence of the owner of the animals, the emissions calculated for the emission inventory have to be assigned to the location of the animal owner's residence. This error can lead to a biased representation of emission results on a regional level, but is assumed of lesser influence on higher spatial aggregation levels, i. e. on federal state level. It is irrelevant on the level used for emission reporting, i. e. the national level.

Emissions from the management of agricultural soils are calculated on federal state level and then aggregated on national level. Unlike livestock, no calculation at the district level is made beforehand, because only the N-amounts of farm manure to be spreaded and the N excretions of grazing animals (both calculated in GAS-EM) are available in district resolution, while for all other input data the finest possible resolution is the federal state.

Der Zeitschritt in GAS-EM beträgt ein Jahr. Prozesse auf kürzeren Zeitskalen (wie z. B. interannuelle Schwankungen von Tierbeständen oder die witterungsabhängige Ausbringung von Wirtschaftsdünger) können mangels differenzierterer Daten nicht abgebildet werden. Auch über ein Jahr hinausreichende Prozesse, wie z. B. eine Vorratshaltung beim Mineraldünger, können in GAS-EM nicht abgebildet werden, da generell entsprechende Daten zur Modellierung der Speichereffekte fehlen. So wird in GAS-EM für den Mineraldünger angenommen, dass die in den ersten beiden Quartalen des aktuellen und in den letzten beiden Quartalen des Vorjahres insgesamt verkauften Düngermengen im aktuellen Jahr vollständig ausgebracht werden.

Die Berechnung der Emissionen aus der Tierhaltung erfolgt formal zunächst auf Kreisebene, bevor eine Aggregation auf Bundesland- und dann auf nationaler Ebene erfolgt. Dabei kommt es vor, dass Daten zur Charakterisierung der Tiere und ihrer Leistung (z. B. Tiergewicht, Zuwachs, Legeleistung) nicht in Kreisauflösung, sondern nur als Landes- oder sogar nur als Bundesmittelwerte vorliegen. Letztere werden den entsprechenden Kreisen zugeordnet, bevor die Emissionsberechnungen auf Kreisebene beginnen.

Da bei der amtlichen Tierzählung nicht die tatsächlichen Standorte der Tierhaltung erfasst werden, sondern die Wohnorte der Tierhalter, müssen die für das Emissionsinventar berechneten Emissionen demjenigen Kreis zugeordnet werden, der dem Wohnort des Tierhalters entspricht. Dieser Fehler kann zu Verzerrungen der Ergebnisdarstellung im regionalen Bereich führen, wird aber auf Länderebene als vernachlässigbar eingeschätzt und ist auf der für die Emissionsberichterstattung relevanten nationalen Ebene ohne Bedeutung.

Die Emissionen aus der Nutzung landwirtschaftlicher Böden werden auf Bundesland-Ebene berechnet und anschließend zum jeweiligen nationalen Ergebnis aggregiert. Anders als bei der Tierhaltung erfolgt zuvor keine Berechnung auf Kreisebene, weil lediglich die mit GAS-EM berechneten N-Mengen des auszubringenden Wirtschaftsdüngers und die N-Ausscheidung von Weidetieren in Kreisauflösung vorliegen, während für alle übrigen Eingangsdaten die feinstmögliche Auflösung die Bundeslandebene ist.

3.3 Basic methodologies / Grundlegende Methoden


The subsequent sub-chapters provide an overview of the basic methodologies for the preparation of the German agricultural inventory.

For the calculation of the emissions originating from animal husbandry animal sub-categories are defined that are homogeneous with respect to animal performance (weights, growth, Milk yield, etc.), age and utilisation (fattening or breeding), see Chapter 4.1. The figure below shows the concept for calculating greenhouse gas emissions from German livestock farming.

Die nachfolgenden Unterkapitel geben einen Überblick über grundlegende Methoden zur Erstellung des deutschen landwirtschaftlichen Emissionsinventars.

Für die Berechnung der Emissionen aus der Tierhaltung werden Tier-Unterkategorien definiert, die bzgl. Leistung (Gewicht, Gewichtszunahme, Milchleistung usw.), Alter und Nutzung (Mast oder Zucht) homogen sind (siehe z. B. Kapitel 4.1). Die nachfolgende Abbildung zeigt das Konzept für die Berechnung der Treibhausgasemissionen aus der deutschen Tierhaltung.

Figure 3.3: GHG emissions from livestock husbandry (GAS-EM model)



For the concept of calculating ammonia emissions from German livestock farming, see Chapter 3.3.4.3.1.

Chapter 3.3.4.4 deals with the calculation of greenhouse gas and other emissions related to the anaerobic digestion of manure in biogas plants.

For more detailed descriptions of methodologies for the various animal subcategories see Chapters 4 to 9.

The anaerobic digestion of energy crops is based in principle on the same concept as the digestion of animal manures, but is dealt with separately in Chapter 10.

The detailed description of the methods for calculating emissions in connection with the agricultural soils can be found in Chapters 11 and 12.

Modifications of methods with respect to previous year's submission are shortly discussed in Chapter 3.5.2.

Zum Konzept der Berechnung von Ammoniakemissionen der deutschen Tierhaltung siehe Kapitel 3.3.4.3.1.

Auf die Berechnung von Treibhausgas- und anderen Emissionen im Zusammenhang mit Wirtschaftsdünger-Vergärung in Biogasanlagen geht Kapitel 3.3.4.4 ein.

Zu detaillierteren Methodenbeschreibungen der einzelnen Tier-Unterkategorien siehe Kapitel 4 bis 9.

Die Vergärung von Energiepflanzen wird prinzipiell nach dem gleichen Konzept berechnet wie die von Wirtschaftsdünger, in Kapitel 10 aber gesondert behandelt.

Die detaillierte Beschreibung der Berechnung von Emissionen infolge der Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Böden findet sich in den Kapiteln 11 und 12.

Änderungen von Methoden gegenüber der Berichterstattung des Vorjahres sind in Kapitel 3.5.2 aufgelistet.

3.3.1 Energy requirements and feed intake of animals / Tierischer Energiebedarf und Futteraufnahme

Whenever the necessary process descriptions are available, the German inventory calculates the energy requirements of an agricultural animal. As a rule, the metabolizable energy (ME) is assessed. Dairy cows form an exception. Here the NEL system is used (NEL: net energy for lactation). For ME and NEL see also KIRCHGESSNER et al. (2008).

Overall energy requirements comprise the requirements for maintenance, the requirements related to performance (growth, production of milk or eggs) and the requirements for the production of offspring.

On the assumption that feed is primarily intended to meet the energy requirements, the energy contents of the diets (ME or NEL contents) can be used in connection with feed properties to derive the amount of feed taken in. As a rule, feed intake is estimated in units of dry matter.

The gross energy contents of the diet components then allow for the assessment of the gross energy (GE) intake. The latter is the base for the calculations of methane emissions from enteric fermentation (see Chapter 3.3.2) as well as for the derivation of the methane emissions from manure management (see Chapter 3.3.4.1) according to IPCC (2006).

However, for the assessment of methane emissions from manure management, the German inventory uses a national approach for the most important animal subcategories. According to DÄMMGEN et al. (2011a), the dry matter intake is used instead. For details see Chapter 3.3.3.1).

The crude protein (XP) content of the diet components is then used to derive the XP intake with feeds. The division of the result by 6.25 kg kg^{-1} leads to the N intake. This quantity is needed to establish the N balance which is needed to calculate the N excretion rates (see Chapter 3.3.3.2). All calculations assume that the XP or N requirements are met if the input is calculated using typical diet compositions. The comparison with national standards for N excretion rates can then be used to check the plausibility of the calculation procedure.

Diet compositions and the properties of the feed constituents then allow for the assessment of further effective quantities needed for the quantification of emission rates, such as the digestibility of energy (X_{DE}) for the calculation of methane from manure management according to IPCC. DÄMMGEN et al. (2011a) presuppose the knowledge of the digestibility of organic matter (X_{DOM}) to calculate these emissions.

Figure 3.4 illustrates the relations between the various relevant quantities described above. Here, NE also stands for NEL.

Soweit Prozessbeschreibungen verfügbar sind, wird im deutschen Inventar der tierische Energiebedarf berechnet. Dies geschieht i. d. R. im ME-System, d. h. unter Zugrundelegung der umsetzbaren Energie (metabolisierbare Energie). Lediglich bei den Milchkühen wird das NEL-System angewandt (NEL: Netto Energie Laktation). Zu ME und NEL siehe auch KIRCHGESSNER et al. (2008).

Der Energiebedarf gliedert sich in den Erhaltungsbedarf, den leistungsbedingten Bedarf (Wachstum, Produktion von Milch oder Eiern) und den Bedarf zur Produktion von Nachkommen.

Unter der Annahme einer energiebedarfsdeckenden Fütterung wird mithilfe der Energiegehalte der Futterkomponenten (ME- bzw. NEL-Gehalte) die Menge des aufgenommenen Futters berechnet. Dies geschieht in der Regel in Form von Trockenmasse.

Mithilfe des Bruttoenergiegehaltes der Futterkomponenten wird die mit dem Futter aufgenommene Bruttoenergie GE (gross energy) berechnet. GE ist Grundlage für die Berechnung der Methan-Emissionen aus der Verdauung (siehe Kapitel 3.3.2) sowie nach IPCC (2006) auch der Methan-Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management (siehe Kapitel 3.3.4.1).


Im Fall der Methan-Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management wurde das deutsche Inventar für die wichtigsten Tiere inzwischen auf die aktualisierte Methode nach DÄMMGEN et al. (2011a) umgestellt, die statt von GE von der Aufnahme an Futtertrockenmasse ausgeht, siehe Kapitel 3.3.3.1.

Mit dem Rohproteingehalt (XP) in den einzelnen Futterkomponenten wird schließlich die XP-Aufnahme mit dem Futter berechnet, aus der mit Division durch $6,25 \text{ kg kg}^{-1}$ unmittelbar die N-Aufnahme hervorgeht. Diese Größe wird in der tierischen N-Bilanz benötigt, um die N-Ausscheidung zu berechnen (siehe Kapitel 3.3.3.2). Es wird davon ausgegangen, dass der XP- bzw. N-Bedarf eines Tieres dann gedeckt ist, wenn seine N-Aufnahme anhand von Kennwerten typischer Futterkomponenten berechnet wird und die sich ergebende N-Ausscheidung dem nationalen Standard entspricht.

Anhand der Futterzusammensetzung und der Eigenschaften der Futterkomponenten werden effektive Mittelwerte zusätzlicher Größen abgeleitet, die für die Emissionsberechnung erforderlich sind. Dies ist im wesentlichen die Verdaulichkeit von Energie (X_{DE}) für den IPCC-Ansatz zur Methanberechnung aus dem Wirtschaftsdünger-Management, während der aktualisierte Ansatz nach DÄMMGEN et al. (2011a) die Verdaulichkeit von organischer Masse (X_{DOM}) benötigt.

Figure 3.4 illustriert die verschiedenen in dem oben skizzierten Konzept relevanten Energiegrößen und ihren Zusammenhang (NE steht hier auch für NEL):

Figure 3.4: Energies considered in animal metabolism



White rectangles: energies considered; shaded rectangles: energies lost. Figures in the white rectangles are exemplary data (upper figure: ruminants, lower figure: pigs).

Assuming that the energy contained in the diet meets the animals' requirements, the above diagram Figure 3.4 allows for the definition of the feed properties "digestibility of energy" (X_{DE}) and "metabolizability of energy" (X_{ME}), whereby the knowledge of X_{ME} and the metabolizable energy (ME) intake allow for the quantification of gross energy (GE) intake, as illustrated below.

Unter der Voraussetzung, dass die im Futter enthaltenen Energien den vom Tier benötigten Energien entsprechen, erlaubt das in Figure 3.4 gezeigte Schema die Definition der Futterkenngrößen „Verdaulichkeit von Energie“ (X_{DE}) und „Umsetzbarkeit von Energie“ (X_{ME}). Die Kenntnis von X_{ME} ermöglicht die Berechnung der Bruttoenergie (GE) aus der aufgenommenen umsetzbaren Energie (ME), wie weiter unten gezeigt wird.

$$X_{DE} = \frac{DE}{GE} \quad (3.9)$$

$$X_{ME} = \frac{ME}{GE} \quad (3.10)$$

X_{DE}	digestibility of energy (in MJ MJ ⁻¹)
X_{ME}	metabolizability of energy (in MJ MJ ⁻¹)
GE	gross energy intake (in MJ pl ⁻¹ a ⁻¹)
DE	digestible energy intake (in MJ pl ⁻¹ a ⁻¹)
ME	metabolisable energy intake (in MJ pl ⁻¹ a ⁻¹)

The digestibility of organic matter X_{DOM} is obtained in analogy to the digestibility of energy X_{DE} . X_{DOM} is the ratio between organic matter taken in and digested organic matter. As a rule, X_{DOM} slightly exceeds X_{DE} .

Die Verdaulichkeit organischer Substanz X_{DOM} ist eine zu X_{DE} analoge Größe. Sie beschreibt das Verhältnis zwischen verdauter und aufgenommener organischer Substanz. Der Wert von X_{DOM} liegt im Allgemeinen etwas über dem von X_{DE} .

The ME system allows for the calculation of GE intakes using the following equation:

Im ME-System lässt sich die Bruttoenergieaufnahme GE wie folgt berechnen:

$$GE = \frac{ME_m + ME_f + ME_l + ME_d + ME_p + ME_g}{X_{ME}} \quad (3.11)$$

GE	gross energy intake (in MJ pl ⁻¹ a ⁻¹)
ME_m	metabolisable energy required for maintenance (in MJ pl ⁻¹ a ⁻¹)
ME_f	metabolisable energy needed to obtain food (in MJ pl ⁻¹ a ⁻¹)
ME_p	metabolisable energy required for pregnancy (in MJ pl ⁻¹ a ⁻¹)
ME_l	metabolisable energy for lactation (in MJ pl ⁻¹ a ⁻¹)
ME_d	metabolisable energy required for draft power (in MJ pl ⁻¹ a ⁻¹)
ME_g	metabolisable energy consumed for growth (in MJ pl ⁻¹ a ⁻¹)
X_{ME}	metabolizability of feed (in MJ MJ ⁻¹)

The applicability of the ME terms in this equation depends on the different mammal types in agricultural animal husbandry. This issue is dealt with in the respec-

Nicht bei allen Säugetieren in der landwirtschaftlichen Tierhaltung sind alle aufgeführten ME-Terme von Bedeutung. Hierauf gehen die entsprechenden Unterka-

tice subchapters of the subsequent animal description chapters beginning with Chapter 4.4. The GE approach given above applies analogously to poultry.

An alternative approach to assess GE intake rates is the multiplication of feed intake amounts with the respective GE contents. This variant is made use of with dairy cows (see Chapter 4.3.4.6).

Dairy cows are the only subcategory where the energy requirements are not calculated using the NE, but the NEL system. The assessment of NEL requirements for dairy cows uses a national methodology as described in Chapter 4.3.2. The parametrization proposed in IPCC(2006)-10.21 is not used.

pitel in den nachfolgenden Tierbeschreibungen ab Kapitel 4.4 ein. Für Geflügel gilt der obige Ansatz in analoger Weise.

Eine alternative Möglichkeit zur GE-Berechnung besteht darin, die aufgenommene Futtermenge mit dem mittleren GE-Gehalt des Futters zu multiplizieren. Diese Variante kommt u. a. bei den Milchkühen zum Einsatz (siehe Kapitel 4.3.4.6).

Milchkühe sind die einzige Tierkategorie im Inventar, für die der Energiebedarf nicht nach dem ME-, sondern nach dem NEL-System berechnet wird. Die NEL-Berechnung für Milchkühe erfolgt dabei nach einem detaillierten nationalen Ansatz (siehe Kapitel 4.3.2), so dass die GE-Parameterisierung nach IPCC(2006)-10.21 nicht zum Einsatz kommt.

3.3.2 *CH₄ emissions from enteric fermentation / CH₄-Emissionen aus der Verdauung*

The calculation of methane emissions from enteric fermentation can be performed according to three different levels of complexity (Tiers), see IPCC(2006)-10.24 ff. For details of the procedures applied see the respective animal category chapters.

The choice of the complexity level depends on whether the animal category under consideration is considered a key source with respect to methane emissions from enteric fermentation (see Chapter 3.2.3). If this is the case, a Tier 2 or Tier 3 method has to be used.

Zur Ermittlung der Methanemissionen aus der Verdauung stehen unterschiedlich komplexe Berechnungsverfahren zur Verfügung (IPCC(2006)-10.24 ff). Die Einzelheiten zu den angewendeten Verfahren sind den entsprechenden Kapiteln der jeweiligen Tierkategorie zu entnehmen.

Die Auswahl des anzuwendenden Verfahrens hängt davon ab, ob die jeweilige Tierkategorie als Hauptquellen-Gruppe bzgl. der Methanemissionen aus der Verdauung eingestuft werden (siehe Kapitel 3.2.3). Ist Letzteres der Fall, muss mit Tier 2 oder Tier 3 gerechnet werden.

Tier 1 approach / Tier-1-Verfahren

For the assessment of emissions, the simple Tier 1 method combines animal numbers with default emission factors, irrespective of the energy requirements.

The calculations make use of the following equation for each animal category:

$$E_{\text{CH}_4, \text{ent}, i} = n_i \cdot EF_{\text{CH}_4, \text{ent}, i} \quad (3.12)$$

$E_{\text{CH}_4, \text{ent}, i}$	CH ₄ emission from enteric fermentation of animal category i (in kg a ⁻¹)
n_i	number of animal places for animal category i (in pl)
$EF_{\text{CH}_4, \text{ent}, i}$	default CH ₄ emission factor for animal category i (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)

Tier 2 approach / Tier-2-Verfahren

The more detailed Tier 2 methodology makes use of the above Tier 1 equation where the default emission factor is replaced with an emission factor based on national data for energy requirements.

According to IPCC(2006)-10.31, Equation 10.21, the methane emission factor is calculated using an animal-specific default value of the methane conversion factor (IPCC(2006)-10.30 ff, Table 10.12, Table 10.13) as follows:

Das einfache Tier-1-Verfahren kombiniert zur Berechnung von Emissionen Tierzahlen mit default-Emissionsfaktoren unabhängig vom Energiebedarf.

Die Berechnungen beruhen auf der Anwendung der folgenden Gleichung für jede Tierkategorie:

Das detailliertere Tier-2-Verfahren nutzt obige Tier-1-Gleichung, ersetzt den Default-Wert des Emissionsfaktors aber durch eine Berechnung mithilfe nationaler Werte des Gesamt-Energiebedarfs.

Nach IPCC(2006)-10.31, Gleichung 10.21, berechnet sich der Emissionsfaktor mithilfe eines tierspezifischen Standard-Wertes für den Methanumwandlungsfaktor (IPCC(2006)-10.30f, Table 10.12, Table 10.13):

$$EF_{CH_4,ent,i} = GE_i \cdot \frac{X_{CH_4,GE,i}}{\eta_{CH_4}} \quad (3.13)$$

$EF_{CH_4,ent,i}$	default CH_4 emission factor for animal category i (in $kg\ pl^{-1}\ a^{-1}$)
GE_i	gross energy intake per place of animal category i (in $MJ\ pl^{-1}\ a^{-1}$), see Chapter 3.3
$X_{CH_4,GE,i}$	methane conversion factor of animal category i (fraction of GE converted to methane) (in $MJ\ MJ^{-1}$)
η_{CH_4}	energy content of methane ($\eta_{CH_4} = 55.65\ MJ\ (kg\ CH_4)^{-1}$)

Tier 3 approach / Tier-3-Verfahren

The Tier 3 approach (IPCC(2006)-10.31 ff) makes use of the Tier 2 equation where the methane conversion factor ($X_{CH_4,GE}$) is determined on base of national or subnational data.

In the German inventory, the Tier 3 approach is available only for dairy cows, see Chapter 4.3.5. It calculates the CH_4 emission factor as a function of the intake of crude fibre, N-free extracts, crude protein and fat. From this emission factor and the intake of gross energy the methane conversion factor is back-calculated to be entered into the CRF tables.

Das Tier-3-Verfahren (IPCC(2006)-10.31 f) nutzt die Tier-2-Gleichung, wobei der Methanumwandlungsfaktor ($X_{CH_4,GE}$) aus nationalen oder regionalen Daten abgeleitet wird.

Das Tier-3-Verfahren ist im deutschen Inventar nur für Milchkühe verfügbar, siehe Kapitel 4.3.5. Dabei wird der CH_4 -Emissionsfaktor als Funktion der Aufnahme von Rohfaser, N-freien Extraktstoffen, Rohprotein und Fett) berechnet. Aus dem Emissionsfaktor wird mithilfe der Gesamtenergie-Aufnahme der in den CRF-Tabellen anzugebende Methanumwandlungsfaktor abgeleitet.

3.3.3 Excretions / Ausscheidungen

3.3.3.1 Excretions of VS / VS-Ausscheidungen

The assessment of CH_4 emissions from the manure management (see Chapter 3.3.4.1) presupposes the knowledge of the amount of "volatile solids" (VS) excreted. Volatile solids comprise the organic material in livestock manure that is oxidised at 800 °C. The respective equation is:

$$VS = DM_{excr} - m_{ash} \quad (3.14)$$

VS	volatile solids excreted (in $kg\ pl^{-1}\ a^{-1}$)
DM_{excr}	dry matter excreted (in $kg\ pl^{-1}\ a^{-1}$)
m_{ash}	amount of ash contained in excretions (in $kg\ pl^{-1}\ a^{-1}$)

Total VS is the sum of degradable VS (VS_d) and non-degradable VS (VS_{nd}):

$$VS = VS_d + VS_{nd} \quad (3.15)$$

In principle, CH_4 emissions from manure management are related to VS_d . However, in a first approach, VS_d is proportional to VS_{excr} . The factor relating the two is depending on the composition of the excreta. The methodology proposed by IPCC(2006), Equation 10.23, considers this in a "maximum methane producing capacity for manure" B_o (see Chapter 3.3.4.1). However, Equation 10.24 given in IPCC (2006) for the calculation of VS is not used in the German inventory as this equation represents only an approximation and the definition of the ash content is ambiguous as was shown by DÄMMGEN et al. (2011a). Instead, the German inventory uses the VS equation derived by DÄMMGEN et al. (2011a) (for contents see Chapters from Chapter 4 onwards):

Die Berechnung der CH_4 -Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management (siehe Kapitel 3.3.4.1) erfordert die Kenntnis der ausgeschiedenen Mengen an organischer Trockensubstanz, die als Glühverlust der Ausscheidungen bei 800 °C bestimmt wird (englischer Begriff: „volatile solids“ (VS)). Es gilt:

Die Gesamtmenge an VS teilt sich in abbaubare (VS_d) und nicht abbaubare VS (VS_{nd}):

Im Prinzip wären die CH_4 -Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management auf VS_d zu beziehen. In erster Näherung ist VS_d aber proportional zu VS_{excr} . Der Proportionalitätsfaktor ist von der Zusammensetzung der Exkremente abhängig. IPCC(2006) berücksichtigt dies in der „größtmöglichen Methan-Bildungskapazität für Wirtschaftsdünger“ B_o (siehe Kapitel 3.3.4.1). Die in IPCC (2006) angegebene Gleichung 10.24 zur Berechnung von VS wird im deutschen Inventar nicht verwendet, da sie nur eine Näherung darstellt, und die Definition des Aschegehaltes nicht eindeutig ist, wie DÄMMGEN et al. (2011a) aufzeigten. Stattdessen kommt die von DÄMMGEN et al. (2011a) abgeleitete VS-Gleichung zum Einsatz (zu den Aschegehalten siehe in den Tierkapiteln):

$$VS = m_{F, dm} \cdot (1 - X_{DOM}) \cdot (1 - X_{ash, feed}) \quad (3.16)$$

VS	excretion of volatile solids (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
$m_{F, dm}$	feed intake rate (dry matter) (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹), see Chapter 3.3
X_{DOM}	digestibility of organic matter (in kg kg ⁻¹)
$X_{ash, feed}$	ash content of feed (in kg kg ⁻¹)

If dry matter intake $m_{F, dm}$ is not known, it is approximated as described in IPCC (2006)-10.42 using the ratio GE/18.45, where GE is the intake of gross energy (in MJ pl⁻¹ a⁻¹).

If the ash content of the feed is not known, the ash content of the excretions as given in IPCC (2006) is used instead.

Wenn die Trockenmasseaufnahme $m_{F, dm}$ nicht bekannt ist, wird sie in Anlehnung an IPCC (2006)-10.42 mithilfe des Quotienten GE/18.45 approximiert, wobei GE für die Aufnahme an Gesamtenergie (in MJ pl⁻¹ a⁻¹) steht.

Ist der Aschegehalt des Futters nicht bekannt, wird stattdessen der Aschegehalt der Ausscheidungen verwendet, den IPCC (2006) angibt.

3.3.3.2 Excretions of N and TAN (or UAN) / Ausscheidungen von N und TAN (bzw. UAN)

For the calculation of NH₃, N₂O, NO and N₂ emissions from animal husbandry (see Chapter 3.3.4.3.1) the excretions of N and – for mammals - TAN are needed per animal place and year.

TAN (total ammonia nitrogen) is the total amount of nitrogen in the forms of NH₃ and NH₄⁺ in the excretions. It is the share of the total N excretions from which emissions of ammonia occur (see e.g. DÄMMGEN und ERISMAN, 2005). In the inventory, TAN is assumed to be equal to the amount of N excreted in urine.

For poultry, the excretion of uric acid nitrogen (UAN) is needed instead of TAN, see DÄMMGEN und ERISMAN (2005). At the time being, the use of UAN excretions is impossible in the inventory, as the hydrolysis of uric acid producing ammonium carbonate occurs outside the birds' bodies. In particular, it is difficult to model the influence of humidity on this process. Hence, emission inventories make use of mean potential TAN contents for their calculations which means that the UAN excreted is completely considered to be TAN.

Hence, the procedures described in the following apply equally to mammals and poultry. The description of the methodology aims at giving an overview of the principal calculation steps. For details see the animal chapters, beginning with Chapter 4.

For the excretions of animal categories that, like e. g. goats and sheep, are not a key source (see Chapter 3.2.3), default excretion values provided in the guidelines or national data sources are used. For key sources (like e. g. dairy cows and fattening pigs) the N and TAN excretions are calculated using the N mass balance of the animal.

Equation (3.19) describes the annual N mass balance for an average animal place as defined in Chapter 3.1.2.2 ($m_i = 0$ for all animals except dairy cows and laying hens; $m_p = 0$ for animals for meat production):

$$m_{excr} = m_{feed} - m_l - m_g - m_p \quad (3.17)$$

Für die Berechnung von NH₃-, N₂O-, NO- und N₂-Emissionen werden die Ausscheidungen von N und – bei Säugetieren - TAN pro Tierplatz und Jahr benötigt.

TAN (total ammonia nitrogen) ist die Gesamtmenge an Stickstoff in Form von NH₃ und NH₄⁺ in den Ausscheidungen. TAN stellt denjenigen Anteil der gesamten N-Ausscheidungen dar, aus dem Ammoniakemissionen erfolgen (siehe z.B. DÄMMGEN und ERISMAN, 2005). Im Inventar wird TAN mit der N-Menge gleichgesetzt, die mit dem Harn ausgeschieden wird.

Bei Geflügel wird statt der TAN-Ausscheidung die Harnsäure-Ausscheidung (uric acid nitrogen, UAN) benötigt, vgl. DÄMMGEN und ERISMAN (2005). Die Verwendung von UAN-Ausscheidungen im Inventar ist aktuell nicht möglich, da der Prozess der Hydrolyse der Harnsäure zu Ammoniumcarbonat außerhalb des Körpers stattfindet und der dabei wichtige Einfluss von Feuchte schwierig zu modellieren ist. Daher wird anstelle von UAN mit mittleren scheinbaren TAN-Gehalten gerechnet, wobei TAN = UAN angenommen wird.

Daher gelten die nachfolgenden Ausführungen für Säugetiere und Geflügel gleichermaßen. Es wird dabei ein Überblick über die prinzipielle Vorgehensweise vermittelt. Zu Details siehe Tierkapitel ab Kapitel 4.

Für Tierkategorien, die wie z. B. Ziegen und Schafe nicht zu den Hauptquellgruppen (siehe Kapitel 3.2.3) zählen, werden für die Ausscheidungen Standwerte aus den Richtlinien oder nationalen Datenquellen verwendet. Für Hauptquellgruppen (wie z.B. Milchkühe, Mastschweine) werden die N- und TAN-Ausscheidungen mithilfe der tierischen N-Massenbilanz berechnet.

Gleichung (3.19) beschreibt die jährliche N-Bilanz für einen mittleren Tierplatz, wie er in Kapitel 3.1.2.2 definiert wird ($m_i = 0$ für alle Tiere außer Milchkühen und Legehennen; $m_p = 0$ für Masttiere):

m_{excr}	amount of nitrogen in excreta (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
m_{feed}	amount of nitrogen intake with feed (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
m_l	amount of nitrogen secreted with milk or eggs (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
m_g	amount of nitrogen retained in the animal (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
m_p	amount of nitrogen in offspring produced (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)

The N intake with feed (m_{feed}) is determined by the intake of feed and the average crude protein content of the feed.

As a rule, the amount of feed intake is a function of the energy requirements of the animal and the energy content of the feed. The calculation is based on the assumption that the energy requirements be exactly satisfied. In the respective equation (3.18) the energy requirements and the energy content of the feed are given in ME units (ME = metabolizable energy). For dairy cows the units to be used are NEL units (NEL = net energy lactation), see Chapters 4.3.2 and 4.3.8.1.

For animals kept for meat production, the amount of feed needed annually per average animal place can be calculated using the feed conversion factor, see Equation (3.19):

Die N-Aufnahme mit dem Futter (m_{feed}) wird durch die aufgenommene Futtermenge und deren mittleren Rohproteingehalt bestimmt.

Die Futtermenge wird i. d. R. aus dem tierischen Energiebedarf und dem Energiegehalt des Futters berechnet, wobei davon ausgegangen wird, dass der tierische Energiebedarf exakt erfüllt wird. In der entsprechenden Gleichung (3.18) werden Energiebedarf und mittlerer Energiegehalt des Futters in ME-Einheiten angegeben (ME = umsetzbare Energie). Für Milchkühe sind NEL-Einheiten zu verwenden (NEL = Netto Energie Laktation), siehe dazu Kapitel 4.3.2 und 4.3.8.1.

Bei Masttieren kann die auf einem mittleren Tierplatz jährlich erforderliche Futtermenge auch mithilfe des Futterverwertungskoeffizienten berechnet werden, siehe Gleichung (3.19):

$$m_{\text{feed}} = x_N \cdot \sum_i DM_i \cdot x_{N,XP,i} = x_N \cdot [x_{XP}] \cdot m_{F,DM} = x_N \cdot [x_{XP}] \cdot \frac{\Sigma ME}{[\eta_{ME}]} \quad (3.18)$$

or (for animals kept for meat production)

$$m_{\text{feed}} = x_N \cdot [x_{XP}] \cdot x_{\text{feed}} \cdot \Delta w_{\text{annual}} \quad (3.19)$$

m_{feed}	amount of nitrogen intake with feed (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
x_N	nitrogen content of crude protein ($x_N = 1/6.25 \text{ kg kg}^{-1}$)
DM_i	amount of dry matter taken in with feed constituent i (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
$x_{N,XP,i}$	crude protein content of feed constituent i (in kg kg ⁻¹)
$[x_{XP}]$	mean crude protein content of the feed, related to dry matter (in kg kg ⁻¹)
$m_{F,DM}$	total amount of feed intake (dry matter) (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
ΣME	the animal's cumulative requirements of metabolizable energy (in MJ pl ⁻¹ a ⁻¹)
$[\eta_{ME}]$	mean content of metabolizable energy in the feed (dry mass) (in MJ kg ⁻¹)
x_{feed}	feed conversion factor, i. e. the amount of feed needed to achieve 1 kg of weight gain (in kg kg ⁻¹)
Δw_{annual}	annual weight gain per average animal place (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)

According to the definition of the average animal place given in Chapter 3.1.2.2, the annual weight gain Δw_{annual} of fattening animals with a lifespan shorter than one year is calculated as follows:

Entsprechend der Definition des mittleren Tierplatzes in Kapitel 3.1.2.2 wird für Masttiere, die kürzer als ein Jahr leben, der jährliche Gesamtzuwachs Δw_{annual} wie folgt berechnet:

$$\Delta w_{\text{annual}} = \Delta w_{\text{animal}} \cdot \frac{\alpha}{\tau_{\text{lifespan}}} \quad (3.20)$$

Δw_{annual}	annual weight gain per average animal place (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
Δw_{animal}	total per-place weight gain during one fattening period (in kg pl ⁻¹)
α	time units conversion factor (365 d a ⁻¹)
τ_{lifespan}	duration of fattening of one animal (in d, with $\tau_{\text{lifespan}} < 365 \text{ d}$)

The other components of the N balance are given by:

Die übrigen Bilanzglieder werden wie folgt bestimmt:

$$m_l = x_{N,\text{milk}} \cdot x_{XP,\text{milk}} \cdot Y_M \quad \text{for dairy cows} \quad (3.21)$$

$$m_l = x_{N,\text{egg}} \cdot n_{\text{eggs}} \cdot w_{\text{egg}} \quad \text{for laying hens} \quad (3.22)$$

$$m_l = 0 \quad \text{for all other animals} \quad (3.23)$$

m_l	amount of nitrogen secreted with milk or eggs (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
$X_{N, \text{milk}}$	nitrogen content of milk protein (in kg kg ⁻¹)
$X_{XP, \text{milk}}$	crude protein content of milk (in kg kg ⁻¹)
Y_M	annual milk yield (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
$X_{N, \text{egg}}$	nitrogen content of a single egg (in kg kg ⁻¹)
n_{eggs}	number of eggs (in eg pl ⁻¹ a ⁻¹)
w_{egg}	weight per egg (in kg eg ⁻¹)

$$m_g = X_{N, \text{animal}} \cdot \Delta w_{\text{annual}} \quad (3.24)$$

m_g	amount of nitrogen retained in growth (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
$X_{N, \text{animal}}$	nitrogen content of whole animal (in kg kg ⁻¹ N)
Δw_{annual}	annual weight gain per average animal place (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)

$$m_p = X_{N, \text{offspring}} \cdot w_{\text{offspring}} \quad (3.25)$$

m_p	amount of nitrogen in offspring produced (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹ N)
$X_{N, \text{offspring}}$	nitrogen content of whole offspring body (in kg kg ⁻¹ N)
$w_{\text{offspring}}$	weight of the total offspring produced annually per average animal place (calves, piglets) (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹), with $w_{\text{offspring}} = 0$ for animals kept for meat production

The amount of TAN needed for the assessment of the emissions of N species from mammals (see Chapter 3.3.4.3.1) is defined as the share of digestible N taken in with feeds that is not retained in the animal or excreted with milk or offspring. This definition presupposes the knowledge of the digestibility of crude protein (X_{DXP}).

Die für die Berechnung von N-Emissionen aus der Säugetierhaltung benötigte TAN-Menge (siehe Kapitel 3.3.4.3.1) ist derjenige Anteil der mit dem Futter aufgenommenen verdaulichen N-Menge, der nicht im Tier retiniert oder für die Produktion von Milch oder Nachkommen aufgewendet wird. Diese Definition setzt die Kenntnis der Verdaulichkeit von Rohprotein X_{DXP} voraus.

$$m_{\text{excr, TAN}} = X_{DXP} \cdot m_{\text{feed}} - m_l - m_g - m_p \quad (3.26)$$

$m_{\text{excr, TAN}}$	amount of TAN excreted (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
X_{DXP}	digestibility of crude protein (in kg kg ⁻¹)
m_{feed}	amount of nitrogen in feed (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
m_l	amount of nitrogen secreted with milk (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
m_g	amount of nitrogen retained in the animal (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
m_p	amount of nitrogen in offspring produced (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)

If X_{DXP} is not available, it may be approximated by the digestibility of energy (X_{DE}). For X_{DE} see Chapter 3.3.1.

Ist X_{DXP} nicht bekannt, ist eine Approximation durch die Verdaulichkeit von Energie (X_{DE}) möglich. Zu X_{DE} siehe Kapitel 3.3.1.

For dairy cows the amount of TAN is calculated differently. As shown in Chapter 4.3.8.3 it is a function of the amount of N excreted with faeces.

Bei den Milchkühen wird die TAN-Menge abweichend von obiger Gleichung über N-Ausscheidung im Kot berechnet, siehe Kapitel 4.3.8.3.

The relative TAN content x_{TAN} of the excreta is defined as:

Der relative TAN-Gehalt x_{TAN} der Ausscheidungen ergibt sich aus:

$$x_{TAN} = \frac{m_{\text{excr, TAN}}}{m_{\text{excr}}} \quad (3.27)$$

x_{TAN}	fraction of nitrogen excreted as TAN (in kg kg ⁻¹)
$m_{\text{excr, TAN}}$	amount of TAN excreted (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
m_{excr}	amount of total nitrogen excreted (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)

Note that the dairy-cow calculations take into account nitrogen losses by skin and hair. These losses are added to the organic N excretions. For other animals no methods are

Anmerkung: Bei Milchkühen wird auch der mit Hautpartikeln und Haaren abgegebene Stickstoff berücksichtigt. Er wird der organischen N-Ausscheidung hinzugerechnet. Für

available to take into account nitrogen losses by skin and hair.

As already mentioned above, for poultry the excretion uric acid nitrogen (UAN) should be considered instead of TAN excretions. However, the inventory considers the amount of UAN to be TAN. The calculation of UAN is performed in analogy to Equation (3.26), where the losses on the right-hand side are represented by N retention in case of pullets and by the sum of N retention and N in eggs in case of laying hens.

andere Tiere existieren keine vergleichbaren Berechnungsmethoden.

Wie oben bereits erwähnt wird bei Geflügel statt der TAN-Ausscheidung die Harnsäure-Ausscheidung (uric acid nitrogen, UAN) betrachtet. Im Inventar wird UAN näherungsweise mit TAN gleichgesetzt. Die Berechnung von UAN erfolgt analog zu Gleichung (3.26), wobei die Verlustterme auf der rechten Seite bei Junghennen und Mastgeflügel der N-Retention entsprechen und bei Legehennen der Summe aus N-Retention und N-Abgabe über die Eierproduktion.

3.3.4 Emissions from manure management / Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management

3.3.4.1 CH₄ emissions / CH₄-Emissionen

According to IPCC(2006)-10.35 ff there are three increasingly complex tiers for the calculation of the methane emissions from manure management. All methods are based on the following equation:

IPCC(2006)-10.35ff gibt für die Berechnung der Methanemissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management drei zunehmend komplexere Stufen an, die alle von der nachfolgenden Gleichung ausgehen.

$$E_{CH_4, MM, i} = n_i \cdot EF_{CH_4, MM, i} \quad (3.28)$$

$E_{CH_4, MM, i}$	CH ₄ emission from manure management of animal category i (in kg a ⁻¹)
n_i	number of animal places for animal category i (in pl)
$EF_{CH_4, MM, i}$	emission factor for CH ₄ from manure management for animal category i (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)

The methodologies provided by IPCC for the calculation of methane emissions from manure management are described in the following.

Die IPCC-Methoden zur Berechnung von Methanemissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management werden nachstehend beschrieben.

Tier 1 approach / Tier-1-Verfahren

The simple Tier 1 methodology (IPCC(2006)-10.37) uses the equation (3.28) with default emission factors.

Das einfache Tier-1-Verfahren (IPCC(2006)-10.37) nutzt Gleichung (3.28) mit Default-Emissionsfaktoren.

Tier 2 approach / Tier-2-Verfahren

The Tier 2 methodology (cf. Equation 10.23 in IPCC(2006)-10.41) uses equation (3.28) and calculates the emission factor $EF_{CH_4, MM, i}$ as a function of VS excreted, the maximum methane producing capacity B_o and the methane conversion factor MCF that describes for each single manure management system the fraction of B_o that is generated effectively.

Das Tier-2-Verfahren (vgl. Gleichung 10.23 in IPCC(2006)-10.41) verwendet Gleichung (3.28) und berechnet den Emissionsfaktor $EF_{CH_4, MM, i}$ als Funktion der ausgeschiedenen VS-Menge, der maximalen Methanbildungskapazität B_o und des Methanumwandlungsfaktors MCF , der für jedes Wirtschaftsdünger-Lagerverfahren angibt, welcher Anteil von B_o tatsächlich erzeugt wird.

$$EF_{CH_4, MM, i} = VS_i \cdot \alpha \cdot B_{o,i} \cdot \rho_{CH_4} \cdot \sum_{jk} MCF_{i,j,k} \cdot MS_{i,j} \quad (3.29)$$

$EF_{CH_4, MM, i}$	emission factor for CH ₄ from manure management for animal category i (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
VS_i	daily volatile solid excretion rate of animal category i (in kg pl ⁻¹ d ⁻¹)
α	time units conversion factor ($\alpha = 365 \text{ d a}^{-1}$)
$B_{o,i}$	maximum CH ₄ producing capacity (in m ³ kg ⁻¹)
ρ_{CH_4}	density of methane ($\rho_{CH_4} = 0.67 \text{ kg m}^{-3}$)
$MCF_{i,j,k}$	methane conversion factors for manure management system j and climate region k (in m ³ m ⁻³)
$MS_{i,j}$	fraction of animal category i whose manure is handled in a system j (in pl pl ⁻¹)

For the VS excretions see Chapter 3.3.3.1. B_o and MCF for the conventional manure storage types are provided in the animal chapters from Chapter 4 onwards. Chapter 3.3.4.4 deals with special details con-

Zu den VS-Ausscheidungen siehe Kapitel 3.3.3.1. Auf B_o sowie die MCF -Werte für die herkömmlichen Lagerverfahren wird in den Tierkapiteln ab Kapitel 4 eingegangen. Kapitel 3.3.4.4 befasst sich mit den Beson-

cerning the calculation of the *MCF* for the specific storage type „digestion of slurry and storage of residues“.

The amount of VS that enters manure management systems via bedding material is not explicitly accounted for in Equation (3.29). IPCC (2006)-10.41 indicates that methane emissions from bedding are not taken into account as they do not contribute significantly to the overall emissions. Until the development of a methodology internationally approved of to take into account explicitly the VS input by bedding material, Germany will apply the prescribed IPCC procedure (3.29).

The formation of CH₄ emissions from leachate during the storage of solid manure are assumed to be negligible, as the VS content in leachate is rather low. Hence, for the calculation of CH₄ emissions from manure management storage the formation of leachate is not considered in the inventory.

Tier 3 approach / Tier-3-Verfahren

IPCC (2006)-10.37 defines the Tier 3 approach as follows:

„The best way to determine emission factors is to conduct ... measurements of emissions in actual systems representative of those in use in the country. The field results can be used to develop models to estimate emission factors.“

The Tier 3 approach is not used in the German inventory.

derheiten bei der Berechnung des *MCF* für den speziellen Lagertyp „Güllevergärung und Gärrestelagerung“.

Die mit der Einstreu ins Wirtschaftsdünger-Management gelangende VS-Menge wird in Gleichung (3.29) nicht explizit berücksichtigt. IPCC (2006)-10.41 stellt dazu fest, dass Methanemissionen aus Einstreu nicht berücksichtigt werden, da sie nicht signifikant zur Gesamtemission beitragen. Deutschland wendet bis zur Entwicklung einer international konsensfähigen Methode zur expliziten Berücksichtigung von Einstreu-VS das vorgegebenen IPCC-Verfahren an (3.29).

CH₄-Emissionen aus Jauchebildung bei der Lagerung von Festmist werden als vernachlässigbar angesehen, da Jauche praktisch keine VS-Anteile enthält. Daher wird Jauchebildung im Inventar bei der Berechnung von CH₄-Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management nicht berücksichtigt.

IPCC (2006)-10.37 definiert Tier 3 wie folgt:

„Der beste Ansatz zur Bestimmung von Emissionsfaktoren besteht aus der ... Messung von Emissionen in realen Systemen, die repräsentativ für die im Land genutzten Systeme sind. Die Feldversuchsergebnisse können zur Entwicklung von Modellen zur Berechnung von Emissionsfaktoren genutzt werden.“

Der Tier-3-Ansatz kommt im deutschen Inventar nicht zum Einsatz.

3.3.4.2 NMVOC emissions from manure management / NMVOC-Emissionen aus Wirtschaftsdünger-Management

Non-methane volatile organic compounds (NMVOC) are a collection of organic compounds that differ widely in their chemical composition but display similar behaviour in the atmosphere (EEA, 2014). They produce photochemical oxidants by reaction with nitrogen oxides in the presence of sunlight (UNECE, 1991). Agricultural sources of NMVOCs are silage, manure in the barns, outside manure stores, field application of manure and grazing animals (EMEP (2016)-3B-10).

NMVOC emissions originating from the agricultural sector are reported. However, as they had not been included in the definition of the national emission ceiling (NEC Directive 2001/81/EC, 995 Gg a⁻¹) they are subtracted from the national total of NMVOC emissions by an adjustment procedure before checking the compliance with the German NMVOC emission ceiling, see Chapter 1.

Germany calculates NMVOC emissions by animal category. EMEP (2016) provides a Tier 1 and a Tier 2 methodology with the respective emission factors (EMEP (2016)-3B-17/18 and EMEP (2016)-3B-26 ff). Based on the TERT recommendation from the German IIR 2019 review, Germany calculates, as of the 2020 emission reporting, NMVOC emissions for dairy cows and other cattle using the Tier 2 methodology (EMEP (2016)-3B-26f). For all other animal categories Germany uses the Tier 1 methodology. The two methods are described below.

Flüchtige organische Verbindungen ohne Methan (NMVOC) weisen große Unterschiede in ihrer chemischen Zusammensetzung auf, zeigen aber ein ähnliches Verhalten in der Atmosphäre (EEA, 2014). Durch Reaktion mit Stickstoffoxiden unter Einfluss von Sonnenlicht bilden sie photochemische Oxidantien (UNECE, 1991). Landwirtschaftliche NMVOC-Quellen sind Silage, Wirtschaftsdünger (im Stall, in Außenlagern und bei der Ausbringung), sowie Weidegang (EMEP (2016)-3B-10).

Die NMVOC-Emissionen des Sektors Landwirtschaft werden zwar berichtet; da sie aber nicht Bestandteil der Festlegung der nationalen Obergrenze (NEC Richtlinie 2001/81/EC, 995 Gg a⁻¹) waren, werden sie für die Überprüfung der Einhaltung dieser Obergrenze durch ein Adjustementverfahren von der deutschen NMVOC-Gesamtemission wieder abgezogen, siehe Kapitel 1.

Deutschland berechnet die NMVOC-Emissionen getrennt nach Tierkategorien. EMEP (2016) stellt eine Tier-1- und eine Tier-2-Methodik mit den jeweils zugehörigen Emissionsfaktoren bereit (EMEP (2016)-3B-17/18 und EMEP (2016)-3B-26 f). Aufgrund der TERT-Empfehlung aus dem deutschem IIR-2019-Review berechnet Deutschland ab der Emissionsberichterstattung 2020 die NMVOC-Emissionen für Milchkühe und übrige Rinder mit der Tier-2-Methodik (EMEP (2016)-3B-26f). Für alle anderen Tierkategorien rechnet Deutschland mit der Tier-1-Methodik. Die beiden Methoden werden nachstehend beschrieben.

3.3.4.2.1 NMVOC Tier 1 methodology / NMVOC-Tier-1-Methode

In the simple Tier 1 methodology, the number of animals is multiplied by a Tier-related emission factor. EMEP (2016)-3B-18, Table 3.4, provides different emission factors for diets with and without silage. These emission factors are listed in the table below (Table 3.4); the factors used in the German inventory are printed in bold. For horses (including mules and asses) the German inventory uses the emission factors for diets with silage, for all other animals the emission factors for diets without silage.

Bei der einfachen Tier-1-Methodik wird die Tierzahl mit einem tierplatzbezogenen Emissionsfaktor multipliziert. EMEP (2016)-3B-18, Table 3.4, gibt unterschiedliche Emissionsfaktoren für Fütterung mit und ohne Silage an. Diese Emissionsfaktoren werden in der nachstehenden Tabelle (Table 3.4) aufgeführt, wobei die im Inventar verwendeten Werte fett gedruckt sind: Für Pferde (incl. Esel und Maultiere) werden im deutschen Inventar die Emissionsfaktoren für Silagefütterung verwendet, für alle anderen Tiere die Emissionsfaktoren für eine Fütterung ohne Silage.

Table 3.4: Tier 1 emission factors $EF_{\text{NMVOC, MM}}$ used for NMVOC emissions from manure management

Animal subcategories	Emission factor for NMVOC with silage feeding kg pl ⁻¹ a ⁻¹	Emission factor for NMVOC without silage feeding kg pl ⁻¹ a ⁻¹
Sows, breeding boars	-	1.704
Fattening pigs, weaners	-	0.551
Adult sheep	0.279 ^a	0.169
Lambs ^b	0.112 ^a	0.068
Goats	0.624 ^a	0.542
Heavy horses ^c	7.781	4.275 ^a
Light horses and ponies ^d	3.018	1.470 ^a
Laying hens	-	0.165
Broilers and pullets	-	0.108
Geese, ducks, turkeys	-	0.489

Source: EMEP (2016)-3B-18, Table 3.4; **bold figures are used in the inventory.**

^a EF not used in the German inventory

^b refers to 40 % of the sheep EF in the EMEP table

^c refers to horses in the EMEP table

^d refers to mules and asses in the EMEP table

For animal categories not considered in EMEP (2016), the emission factors have been estimated as follows:

In a conservative way the emission factors for boars and weaners are approximated by the emission factors for sows and fattening pigs, respectively.

The emission factor given in EMEP (2016) for sheep is interpreted as emission factor for adult sheep. According to the difference in N excretions between lambs and adult sheep (see Chapters 6.4.5 and 6.3.5) it has been assumed that the emission factor for lambs is 40 % of the emission factor for adult sheep.

The emission factor provided in EMEP (2016) for horses is interpreted as emission factor for heavy horses. Hence, for light horses and ponies the emission factor given in EMEP (2016) for mules and asses has been used. (As of Submission 2015, mules and asses are part of the animal category "horses", see Chapter 7.)

Because of the relative similarity of the housing systems between pullets and broilers the missing emission factor for pullets has been generated by adopting the emission factor for broilers.

Für Tierkategorien, die EMEP (2016) nicht berücksichtigt, werden die Emissionsfaktoren geschätzt:

In konservativer Weise wird für Eber der Emissionsfaktor von Sauen und für Aufzuchtferkel der von Mastschweinen übernommen.

Der in EMEP (2016) angegebene Emissionsfaktor für Schafe wird als Emissionsfaktor für erwachsene Schafe interpretiert. Entsprechend dem Unterschied in der N-Ausscheidung von Lämmern und erwachsenen Schafen (siehe Kapitel 6.4.5 und 6.3.5) wird für Lämmer angenommen, dass der Emissionsfaktor für Lämmer 40 % des Emissionsfaktors für erwachsene Schafe entspricht.

Der in EMEP (2016) angegebene Emissionsfaktor für Pferde wird als Emissionsfaktor für Großpferde interpretiert. Für Kleinpferde und Ponys wird der in EMEP (2016) angegebene Emissionsfaktor für Esel und Maultiere verwendet. (Esel und Maultiere werden ab Submission 2015 bei den Pferden mitberichtet, siehe Kapitel 7.)

Wegen der relativen Ähnlichkeit des Haltungsverfahrens wird für Junghennen der Emissionsfaktor von Masthähnchen übernommen.

3.3.4.2.2 NMVOC Tier 2 methodology / NMVOC-Tier-2-Methode

The Tier 2 methodology calculates the animal-related NMVOC emissions as the sum of the emissions from silage storage, from silage feeding, from housing, from manure management, from spreading and from pasture.

Die Tier-2-Methode berechnet die tierbezogenen NMVOC-Emissionen als Summe der Emissionen aus dem Silagelager, aus der Fütterung mit Silage, aus dem Stall, aus dem Wirtschaftsdünger-Management, aus der Aus-

The pertinent set of equations is given in EMEP (2016) - 3B-27.

Even though emissions from pasturage and pasturage would fit better into the source sector 3.D than into the sector 3.B, Germany follows the description of the Tier 2 methodology in EMEP (2016)-3B-26f and reports the total of calculated NMVOC emissions in sector 3.B (separately for dairy cows and other cattle).

An important input parameter for the Tier 2 methodology is the $\text{Frac}_{\text{silage}}$ parameter, which describes the ratio of actual silage content in the feed to maximum possible amount of silage in the feed. Following the instructions in EMEP (2016)-3B-27, Germany uses $\text{Frac}_{\text{silage}} = 1$.

The following table shows the calculated Tier 2 total emission factors for selected years:

Table 3.5: Calculated total Tier 2 emission factors (IEF) for dairy cows and other cattle

Animal subcategories	1990 kg pl ⁻¹ a ⁻¹	2005 kg pl ⁻¹ a ⁻¹	2018 kg pl ⁻¹ a ⁻¹
Dairy cows	36.49	39.54	41.43
Other cattle	12.73	12.86	12.92

The significant increase in the calculated dairy cattle Tier 2 emission factors (IEF) is a direct consequence of the increase in animal performance, which is included in the NMVOC calculations via GE intake. The trend of the IEF of other cattle is influenced by the performance increase of the fattening animals and a temporally varying composition of the total population of other cattle (because the IEF of the different subcategories varies).

The big difference between the emission factors in Table 3.5 and the Tier 1 emission factors for dairy cattle and other cattle (with silage feeding) is striking. The latter are, according to EMEP (2016)-3B-18, Table 3.4, at around 17.9 kg pl⁻¹ a⁻¹ and 8.9 kg pl⁻¹ a⁻¹ for dairy cows and other cattle, respectively. This large discrepancy can only be explained by the fact that the two methods are not consistent: The Tier 1 methodology relies on other data than the Tier 2 methodology, and may not include all the sub-sources included in the Tier 2 methodology.

3.3.4.2.3 *Uncertainties / Unsicherheiten*

EMEP(2016)-3B-35 emphasizes the high uncertainty of the emission factors, but no quantitative estimate is provided. Hence the German inventory assumes that the uncertainty of the NMVOC emission factors is in the range of the uncertainty of the PM emission factors (factor 3, see Chapter 3.3.4.5). As this uncertainty exceeds that of the animal numbers by far, the uncertainty of the resulting NMVOC emissions is of the same order of magnitude as the uncertainty of the emission-factor. The distribution is asymmetric (lognormal).

bringung und aus dem Weidegang. Der Gleichungssatz ist in EMEP (2016)-3B-27 angegeben.

Auch wenn die Emissionen aus Ausbringung und Weidegang thematisch besser in den Quellensektor 3.D passen würden als in den Sektor 3.B, berichtet Deutschland die mit der Tier-2-Methode berechneten NMVOC-Emissionen entsprechend der Darstellungsweise in EMEP (2016)-3B-26f insgesamt unter 3.B (getrennt nach Milchkühen und anderen Rindern).

Eine wichtige Eingangsgröße für die Tier-2-Methode ist der Parameter $\text{Frac}_{\text{silage}}$, der das Verhältnis von tatsächlichem Silageanteil im Futter zu maximal möglichem Silageanteil im Futter beschreibt. Der Anleitung in EMEP (2016)-3B-27 folgend rechnet Deutschland mit $\text{Frac}_{\text{silage}} = 1$.

Die nachstehende Tabelle zeigt für ausgewählte Jahre die berechneten Tier-2-Gesamtemissionsfaktoren:

Der deutliche Anstieg der berechneten Tier-2-Emissionsfaktoren (IEF) der Milchkühe ist eine direkte Folge des Leistungsanstiegs, der über die GE-Aufnahme Eingang in die NMVOC-Berechnung findet. Die zeitliche Entwicklung des IEF der übrigen Rinder unterliegt dem Einfluss von Leistungssteigerung bei den Masttieren und einer zeitlich variierenden Zusammensetzung der Gesamtpopulation der übrigen Rinder (da der IEF der verschiedenen Unterkategorien unterschiedlich hoch ist).

Auffällig ist der große Unterschied zwischen den Emissionsfaktoren in Table 3.5 und den Tier-1-Emissionsfaktoren für Milchkühe und übrige Rinder (mit Silagefütterung). Letztere liegen nach EMEP (2016)-3B-18, Table 3.4, bei rund 17,9 kg pl⁻¹ a⁻¹ (Milchkühe) bzw. 8,9 kg pl⁻¹ a⁻¹ (übrige Rinder). Diese große Diskrepanz kann legt den Schluss nahe, dass die beiden Methoden nicht konsistent sind: So beruht die Tier-1-Methode auf anderen Daten als die Tier-2-Methode und bezieht möglicherweise nicht alle in der Tier-2-Methode berücksichtigten Teilquellen mit ein.

EMEP(2016)-3B-35 betont die sehr große Unsicherheit der Emissionsfaktoren, macht aber keine quantitativen Angaben dazu. Für das deutsche Inventar wird angenommen, dass die Unsicherheit der NMVOC-Emissionsfaktoren im Bereich der Unsicherheit der PM-Emissionsfaktoren liegt (Faktor 3, siehe Kapitel 3.3.4.5). Da diese Unsicherheit erheblich größer ist als die Unsicherheit der Tierzahlen, ist die Unsicherheit der resultierenden NMVOC-Emissionen in der gleichen Größenordnung zu erwarten wie die Unsicherheit des Emissionsfaktors. Die Verteilung ist asymmetrisch (Lognormal-Verteilung).

3.3.4.3 N emissions / N-Emissionen

3.3.4.3.1 N mass flow concept / N-Massenfluss-Konzept

The N mass flow within the manure management system is treated according to DÄMMGEN and HUTCHINGS (2005), see also REIDY et al., 2008. Figure 3.5 depicts the general procedure.

Der N-Massenfluss im Wirtschaftsdünger-Management der Säugetiere wird nach DÄMMGEN und HUTCHINGS (2005) behandelt, siehe dazu auch REIDY et al., 2008. Figure 3.5 zeigt die allgemeine Vorgehensweise.




Figure 3.5: N flows in an animal subcategory (mammals)

m: mass from which emissions may occur. Narrow broken arrows: TAN; narrow continuous arrows: organic N. The horizontal arrows denote the process of immobilisation in systems with bedding occurring in the house, and the process of mineralization during storage, which occurs in any case. Broad hatched arrows denote emissions assigned to manure management: E_{yard} NH_3 emissions from yards; E_{house} NH_3 emissions from house; $E_{storage}$ NH_3 , N_2O , NO and N_2 emissions from storage; E_{applic} NH_3 emissions during and after spreading. Broad open arrows mark emissions from soils: E_{graz} NH_3 , N_2O , NO and N_2 emissions during and after grazing; $E_{returned}$ N_2O , NO and N_2 emissions from soil resulting from manure input. For further information see text.

For Germany the term „yards“ is used only in context with emission calculations for dairy cows; it means “milking area” and includes the milking parlour and the waiting yard. The calculation procedure pertaining to the N flux scheme is described in Chapter 3.3.4.3.5.

Starting point of the N flux scheme is the N excretion that is subdivided into organic N (excreted as faeces) and ammoniacal N (TAN, excreted as urine), see Chapter 3.3.3.2. However, differing from Figure 3.5, the different types of activity data for the emissions of NH_3 , N_2O , NO and N_2 (TAN for NH_3 , total N for N_2O , NO and N_2) require the two N pools “total N” (i. e. the sum of “organic N” and “TAN”) and “TAN” to be used throughout the entire the N flow concept rather than the pools of “organic N” and “TAN”.

In order to account for different emission factors, the N flow concept partitions the N excretions of an animal between housing and pasture if grazing has to be considered. For dairy cows the milking area has to be

Anzumerken ist, dass „yards“ in Deutschland für „Melkbereich“ beim Milchvieh steht, (Melkstand und Vorwartehof), sonst im Inventar aber nicht vorkommt. Die Umsetzung des Schemas in eine Berechnungsmethodik wird in Kapitel 3.3.4.3.5 beschrieben.

Ausgangspunkt des N-Fluss-Konzeptes ist die N-Ausscheidung, unterteilt in organisches N (ausgeschieden als Kot) und TAN (total ammoniacal nitrogen, ausgeschieden als Harn), siehe Kapitel 3.3.3.2. Aufgrund der unterschiedlichen Arten von Aktivitätsdaten für NH_3 -, N_2O -, NO - und N_2 -Emissionen (TAN für NH_3 , Gesamt-N für N_2O , NO - und N_2) werden für die Inventarberechnungen allerdings abweichend von Figure 3.5 die beiden N-Pools „Gesamt-N“ (Summe von organischem N und TAN) und „TAN“ benötigt.

Im N-Fluss-Konzept werden, sofern Weidegang zu berücksichtigen ist, die tierischen Ausscheidungen zur Berücksichtigung unterschiedlicher Emissionsfaktoren auf Stall und Weide aufgeteilt; bei Milchkühen ist zusätz-

taken into account in the excretion portioning. For an exemplary calculation of the excretion partitioning see Chapter 4.3.8.5.1.

Along the chain housing – storage – spreading, emissions of NH_3 , N_2O , NO and N_2 are calculated based on the contents of the two forementioned N pools (see Chapter 3.3.4.3.5). Along the chain these emissions gradually diminish the amount available of total N and TAN. For solid manure systems the contributions by bedding material are also taken into account; for details see Chapter 3.3.4.3.2. Transformation processes in the storage are described in Chapter 3.3.4.3.4.

In former emission reporting submissions (including that of 2012) the emissions of N_2O -N, NO -N and N_2 from storage had been subtracted from the TAN pool alone. With this method, the introduction of the new and markedly higher N_2O emission factor for solid manure storage in submission 2013 in some cases led to negative TAN amounts for the field application of solid manure. In order to avoid this problem, from submission 2013 onwards the nitrogen emitted with N_2O , NO and N_2 is subtracted from the TAN and N_{org} pools proportionally to the contents of the pools (see Chapter 3.3.4.3.5, Equations (3.58) and

(3.59)). Nitrogen emitted with NH_3 is still subtracted from the TAN pool only.

For animals that spend certain times on pasture, the calculation of emissions from grazing are calculated proportionally to the total N excretion and the time spent on pasture. These emissions are reported in the sector of managed agricultural soils, see Chapter 11.5.

For sake of clarity, Figure 3.5 does not distinguish between specific types of housing, storage and application. The types used in Germany are listed in the animal chapters from Chapter 4 onwards (see sub-chapters for the methane conversion factors and emission factors). It was also refrained from showing the flow of the nitrogen filtered by air scrubbing systems (see Chapter 3.3.4.4). (The inventory assumes that the nitrogen filtered by air scrubbing systems can be considered TAN and is added to the amount of TAN to be spread (without considering any N losses during storage).

Digestion of manure and the storage of the residues (i. e. the combination of digester and residue storage) is considered a separate storage type. It is described in detail in Chapter 3.3.4.4.

In the emission reporting according to IPCC (2006) the manure management is assigned indirect N_2O emissions that result from transformation processes in soils forming indirect N_2O from the deposition of reactive nitrogen (NH_3 and NO) emitted from the manure management (housing and storage, including digestate of manure digestion) as well as indirect N_2O from leaching and runoff of N from the manure management (including anaerobic digestion of manure). For details see Chapter 3.3.4.3.6.

Birds excrete N in the form of undigested organic N and in uric acid (uric acid nitrogen, UAN). The latter is

lich der Melkbereich zu berücksichtigten. Zur Berechnung der Aufteilung der N-Ausscheidungen siehe beispielhaft Kapitel 4.3.8.5.1.

Entlang der Kette Stall - Lager - Ausbringung werden aus den vorgenannten Pools NH_3 -, N_2O -, NO - und N_2 -Emissionen berechnet (siehe Kapitel 3.3.4.3.5). Dabei verringern sich verfügbares N und TAN von Bereich zu Bereich. Bei Festmistsystemen wird neben den tierischen Ausscheidungen zusätzlich noch der N-Eintrag durch das Einstreumaterial berücksichtigt, worauf Kapitel 3.3.4.3.2 noch näher eingeht. Transformationsprozesse im Lager werden in Kapitel 3.3.4.3.4 beschrieben.

Bis zur Berichterstattung 2012 einschließlich wurden N_2O -, NO - und N_2 -Emissionen aus dem Bereich Stall/Lager allein vom TAN-Pool subtrahiert. Durch die Einführung des neuen, erheblich höheren nationalen N_2O -Emissionsfaktors für Festmistlagerung zur Berichterstattung 2013 ergab sich, dass damit negative TAN-Mengen bei der Mist-Ausbringung auftreten konnten. Um dies zu verhindern, wird seit der Berichterstattung 2013 das als N_2O , NO und N_2 emittierte N anteilmäßig von TAN-Pool und N_{org} -Pool subtrahiert (proportional zum Inhalt der Pools, siehe Kapitel 3.3.4.3.5, Gleichungen (3.58) und

(3.59)). Als NH_3 emittierter Stickstoff wird weiterhin nur vom TAN-Pool subtrahiert.

Bei Tieren mit Weidegang werden die weidebedingten Emissionen proportional zu N-Ausscheidung und anteiliger Verweildauer auf der Weide berechnet. Sie werden im Bereich „Emissionen aus der Nutzung landwirtschaftlicher Böden“ in Kapitel 11.5 berichtet.

Um in Figure 3.5 die Übersichtlichkeit zu wahren, wurde darauf verzichtet, spezielle Stall- und Lagerformen sowie Ausbringungstechniken darzustellen. Details hierzu gehen aus den Unterkapiteln in den Tierbeschreibungen ab Kapitel 4 hervor, in denen Methanumwandlungsfaktoren und Emissionsfaktoren beschrieben werden. Ebenso wurde darauf verzichtet, den aus der Abluftreinigung im Stall (siehe Kapitel 3.3.4.4) resultierenden Stickstoff-Pfad abzubilden. (Das Inventar geht davon aus, dass das in Abluftreinigungsanlagen abgeschiedene N als TAN angesehen werden muss und ohne Lagerungsverluste mit unbehandelter Gülle ausgebracht wird.)

Auf die als eigenständiger Lagertyp betrachtete Vergärung von Wirtschaftsdünger incl. Gärrestelagerung sowie die Ausbringung von Gärresten aus vergorener Gülle geht Kapitel 3.3.4.4 ein.


In der Berichterstattung nach IPCC (2006) werden dem Wirtschaftsdünger-Management auch indirekte N_2O -Emissionen zugeordnet. Diese entstehen bei Umsetzungsprozessen in Böden aus reaktivem Stickstoff, der aus der Deposition von NH_3 und NO aus dem Wirtschaftsdünger- und Gärreste-Management stammt, (Stall, Lager) sowie infolge von Auswaschung oder Oberflächenabfluss aus dem Wirtschaftsdünger- und Gärreste-Management. Auf Details geht Kapitel 3.3.4.3.6 ein.

Vögel scheiden N in Form von unverdaulichem organischen N und Harnsäure aus (uric acid nitrogen, UAN).

hydrolysed to form ammonium carbonate (see DÄMMGEN and ERISMAN, 2005). Thus, in principle, three fractions of N would have to be traced, as shown in Figure 3.6. However, the assumption made in the emission calculations that UAN can be treated as TAN (see Chapter 3.3.3.2) reduces the number of pools that need to be considered to the two pools “total N” and “TAN”. Hence, the inventory treats poultry according to Figure 3.5.

Letztere hydrolysiert zu Ammoniumcarbonat (vgl. DÄMMGEN und ERISMAN, 2005). Es müssten also prinzipiell drei N Fraktionen im Massenfluss berücksichtigt werden. Figure 3.6 veranschaulicht dies. Durch die Annahme, dass UAN als TAN berücksichtigt werden kann (siehe Kapitel 3.3.3.2), reduziert sich in der Emissionsberechnung die Anzahl der zu berücksichtigenden N-Pools aber auf die zwei Pools „Gesamt-N“ und „TAN“. Daher wird Geflügel ebenfalls nach Figure 3.5 behandelt.

Figure 3.6: N flows in an animal subcategory (birds)



m : mass from which emissions may occur. Narrow broken arrows: TAN; narrow broken and dotted line: UAN; narrow continuous arrows: organic N. The horizontal arrows denote the process of immobilisation in systems with bedding occurring in the house, and the process of mineralization during storage, which occurs in any case. Broad hatched arrows denote emissions assigned to manure management: E_{yard} NH₃ emissions from yards; E_{house} NH₃ emissions from house; E_{storage} NH₃, N₂O, NO and N₂ emissions from storage; E_{applic} NH₃ emissions during and after spreading. Broad open arrows mark emissions from soils: E_{graz} NH₃, N₂O, NO and N₂ emissions during and after grazing; E_{returned} N₂O, NO and N₂ emissions from soil resulting from manure input. For further information see text.

3.3.4.3.2 Bedding in solid-manure systems / Einstreu in Festmistsystemen

In the inventory, N input by bedding material is accounted for as N input with straw. The straw N amounts entering the system depend on animal categories and housing systems and will be listed in the subsequent animal chapters (s. Chapter 4 and subsequent chapters). An overview is given in the data collection provided with this report (see Chapter 2.4) in Table AI_1005FHO.

Emission calculations for animals grazing all day (cattle except dairy cows, sheep) are based on the assumption that no bedding material is used during the grazing period.

Das Inventar berücksichtigt N-Einträge durch Einstreu als N-Einträge durch Stroh. Die Einstreu-N-Mengen hängen von Tierart und Haltungssystem ab und werden in den nachfolgenden Tier-Kapiteln angegeben (s. ab Kapitel 4). Eine Übersicht findet sich in der beiliegenden Datensammlung (siehe Kapitel 2.4) in Tabelle AI_1005FHO.

Bei der Emissionsberechnung wird bei Tieren mit überwiegend ganztägigem Weidegang (Rinder ohne Milchkühe, Schafe) berücksichtigt, dass für die Zeit der Weideperiode keine Einstreu erfolgt.

N balance calculations are based on a mean dry matter content of straw of 0.86 kg kg⁻¹ (Faustzahlen, KTBL, 2009, p. 213) and a mean fresh matter-related N content of 0.005 kg kg⁻¹ N. These values are obtained from the German Fertilizer Ordinance (DÜNGEVERORDNUNG, 2017). Hence, the N content of dry matter is close to 0.0058 kg kg⁻¹. This N content is consistent with the N content used for the calculation of emissions from crop residues (see Table 11.8 in Chapter 11.7.1.5).

Under the influence of animal excretions, a certain proportion of the N introduced with straw mineralizes to TAN. Due to the lack of a suitable process description, the degree of this N-transformation cannot be calculated explicitly in the inventory. Based on an expert judgment (DÖHLER H, KTBL), however, it is assumed that 50% of the originally organically bound N mineralize to TAN.

Table 3.6 summarizes the parameters used in the inventory in the context of bedding material.

Table 3.6: Straw properties in animal husbandry

dry matter content (DM) ^a	0.86	kg kg ⁻¹
N content (related to DM) ^b	0.0058	kg kg ⁻¹
of which TAN ^c	50	%

Source: ^a KTBL (2009), p. 213; ^b DÜNGEVERORDNUNG (2017), p. 9 and 10; ^c Döhler (KTBL, expert judgement)

Es wird von einer mittleren Stroh-Trockenmasse von 0,86 kg kg⁻¹ (Faustzahlen, KTBL, 2009, S. 213) und einem mittleren N-Gehalt von 0,005 kg kg⁻¹ in der Frischmasse ausgegangen (DÜNGEVERORDNUNG, 2017). Dementsprechend liegt der N-Gehalt in der Trockenmasse bei 0,0058 kg kg⁻¹. Der N-Gehalt ist konsistent zu dem für die Berechnung von Emissionen aus Ernterückständen verwendeten N-Gehalt (siehe Table 11.8 in Kapitel 11.7.1.5).

Unter dem Einfluss der tierischen Ausscheidungen mineralisiert ein gewisser Anteil des Stroh-N zu TAN. Mangels einer geeigneten Prozessbeschreibung kann der Umfang dieser N-Transformation im Inventar nicht explizit berechnet werden. Basierend auf einem Expertenurteil (DÖHLER H, KTBL) wird aber davon ausgegangen, dass 50 % des ursprünglich organisch gebundenen N zu TAN mineralisieren.

Table 3.6 zeigt eine Übersicht der im Inventar im Zusammenhang mit der Einstreu verwendeten Parameter.

3.3.4.3.3 Air scrubbing (NH₃ and particulate matter) / Abluftreinigung(NH₃ und Partikel)

The inventory model has the technical option of taking into account a reduction of the emissions of NH₃ and particulate matter from housing by air scrubbing. A distinction is made between certified and non-certified air scrubbing systems. Unlike certified systems, non-certified systems are considered to safely remove only particles from the house exhaust air so that for these systems the inventory does not consider removal of NH₃ emissions.

Air scrubbing only makes sense in closed stalls of large animal populations, i.e. for pigs (except boars), laying hens and broilers. Since, for pigs, the distribution of air scrubbing systems between solid manure and straw-based housing systems is not known, it is plausibly assumed for all years that only large, i. e. slurry based housing systems are equipped with air scrubber systems.

In the case of those categories of animals where air scrubbing is taken into account in the course of the emission calculations, this is mentioned in the present report in the description of the NH₃ and particle emissions calculations of the respective animal categories.

The methodology for calculating the effect of air scrubbing systems is described below for NH₃ emissions. It also applies, by analogy, to particulate matter emissions. For the input data see Chapter 3.4.5.2.

Das Inventarmodell besitzt die technische Option, eine Minderung von NH₃- und Partikelemissionen aus dem Stall durch Abluftreinigung zu berücksichtigen. Dabei wird zwischen zertifizierten und nicht-zertifizierten Abluftreinigungsanlagen unterschieden. Anders als für zertifizierte Anlagen wird für die nicht zertifizierten Anlagen davon ausgegangen, dass sie nur Partikel sicher aus der Stallabluft entfernen, so dass das Inventar keine NH₃-Abscheidung berücksichtigt.

Abluftreinigung ist nur bei geschlossenen Ställen großer Tierbestände sinnvoll, also bei Schweinen (außer Ebern), Legehennen und Masthähnchen. Da bei Schweinen die Verteilung von Abluftreinigungsanlagen zwischen gülle- und strohbasierten Haltungssystemen nicht bekannt ist, wird in plausibler Weise für alle Jahre angenommen, dass nur große, d. h. güllebasierte Haltungssysteme mit Abluftreinigungsanlagen ausgestattet sind.

Bei denjenigen Tierkategorien, bei denen Abluftreinigung im Zuge der Emissionsberechnungen berücksichtigt wird, wird darauf im vorliegenden Berichtsband bei der Beschreibung der NH₃- und Partikelemissionsberechnungen hingewiesen.

Die Methodik zur Berechnung des Effekts von Abluftreinigungsanlagen wird nachstehend für NH₃ beschrieben. Sie gilt sinngemäß auch für Partikel. Für die Eingangsdaten siehe Kapitel 3.4.5.2.

$$E_{\text{house,eff}} = E_{\text{house}} \cdot (1 - \varphi_{\text{as}}) \quad (3.30)$$

$E_{\text{house, eff}}$	ammonia emissions per place and year from the house after air scrubbing (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
E_{house}	ammonia emissions per place and year from the house before air scrubbing (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
φ_{as}	removal efficiency of the air scrubber system (kg kg ⁻¹), see Chapter 3.4.5.2

The calculation of national total emissions from emissions per animal place $E_{\text{house, eff}}$ takes into account the fraction of animal places equipped with air scrubbers.

Für die Berechnung der nationalen Gesamtemission aus der tierplatzbezogenen Emission $E_{\text{house, eff}}$ wird der relative Anteil der mit Abluftreinigungsanlagen ausgestatteten Tierplätze berücksichtigt:

$$E_{\text{house, nat}} = n_{\text{animal}} \cdot [E_{\text{house, eff}} \cdot x_{\text{as}} + E_{\text{house}} \cdot (1 - x_{\text{as}})] \quad (3.31)$$

$E_{\text{house, nat}}$	national total of ammonia emissions from housing (in kg a ⁻¹)
$E_{\text{house, eff}}$	ammonia emissions per place and year from the house after air scrubbing (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
E_{house}	ammonia emissions per place and year from the house before air scrubbing (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
x_{as}	fraction of animal places equipped with air scrubbers (pl pl ⁻¹), see Chapter 3.4.5.2

The inventory assumes that the N removed by air scrubber systems is to be regarded as TAN and is applied to the field without storage losses in liquid form like liquid manure. This application leads to NH₃ emissions, which are added to the sum of the remaining NH₃ emissions from the housing after air scrubbing and the NH₃ emissions from storage and manure application. It can be shown that the total emission thus formed is always lower than if there were no air scrubbing. (The only but unrealistic exception: With an NH₃ emission factor of 100 %, the entire NH₃ potential would emit, irrespective of the fact whether an air scrubbing system is used in the housing or not.)

Das in Abluftreinigungsanlagen abgeschiedene N als wird im Inventar als TAN angesehen und ohne Lagerungsverluste in flüssiger Form wie Gülle ausgebracht. Diese Ausbringung führt zu NH₃-Emissionen, die zur Summe aus den nach der Abluftreinigung verbleibenden NH₃-Emissionen aus dem Stall und den NH₃-Emissionen aus Lager und Wirtschaftsdüngerausbringung hinzuaddiert werden. Es lässt sich zeigen, dass die so gebildete Gesamtemission stets niedriger ist, als wenn es keine Abluftreinigung gäbe. (Einzige, aber unrealistische Ausnahme: Bei einem NH₃-Emissionsfaktor der Ausbringung von 100 % würde unabhängig davon, ob im Stall eine Abluftreinigungsanlage eingesetzt wird oder nicht, das gesamte NH₃-Potential emittieren.)

The fate of particulate matter filtered out with an air scrubbing system is not tracked in the inventory.

Der Verbleib der mit einer Abluftreinigungsanlage ausgefilterten Partikel wird im Inventar nicht weiter verfolgt.

3.3.4.3.4 Transformation processes in the storage / Transformationsprozesse im Lager

For untreated slurry, it is assumed that 10 % of the TAN entering storage is converted to N_{org}, while 10 % of the N_{org} entering storage is converted to TAN. (Due to lack of data, treatment of slurry is not considered in the inventory).

According to expert judgement of the EAGER working group it is assumed that in solid manure management systems of mammals 40 % of the TAN entering the storage will be immobilized, if enough bedding material is available (which is assumed to be true in the inventory).

In contrast to that, it is assumed that in poultry husbandry with bedding there is no immobilisation of UAN, because the preferably dry conditions in poultry husbandry impede the respective chemical processes.

In solid systems of mammals (except deep bedding) there is an effluent, which in German is called "Jauche" and will be addressed as "leachate" in the English part of the report at hand. Due to the lack of a suitable process description, the formation of this leachate cannot be calculated in the inventory. Based on an expert judgment (DÖHLER H, KTBL), however, it is assumed that in sloped floor systems 13 % of excreted N goes into leachate, while for the other solid manure systems

Für unbehandelte Gülle wird angenommen, dass von den in das Lager gelangenden TAN- und N_{org}-Fraktionen je 10 % in die jeweils andere Fraktion umgewandelt werden. (Güllebehandlung wird mangels Daten im Inventar nicht berücksichtigt.)

Nach Expertenurteil der EAGER-Arbeitsgruppe wird bei Säugetieren für Festmistsysteme angenommen, dass 40 % der ins Lager gelangenden TAN-Menge immobilisiert werden, sofern ausreichend Einstreu vorhanden ist (was im Inventar als gegeben vorausgesetzt wird).

In der Geflügelhaltung mit Einstreu wird dagegen davon ausgegangen, dass keine Immobilisierung von UAN erfolgt, da durch die möglichst trockenen Haltungsbedingungen die entsprechenden chemischen Prozesse verhindert werden.

In Festmistsystemen von Säugetieren (ausgenommen Tiefstreu) entsteht Jauche. Mangels einer geeigneten Prozessbeschreibung kann die Bildung von Jauche im Inventar nicht explizit berechnet werden. Basierend auf einem Expertenurteil (DÖHLER H, KTBL) wird daher im Inventar angenommen, dass bei Tretmist 13 % der N-Ausscheidungen im Stall abzgl. der NH₃-N-Emissionen aus dem Stall als Jauche-N gelagert werden, während bei den übrigen Festmistsystemen (ausgenommen Tief-

(except deep bedding) this percentage is 25 %. For deep bedding the calculation scheme in the inventory uses a percentage of 0 %.

According to Table 2.14 in DÖHLER et al. (2002), the TAN content of *leachate* is set to 90 %.

streu) dieser Anteil bei 25 % liegt. Dass es bei Tiefstreu keine Jauche gibt, wird im Inventar berücksichtigt, indem der relative N-Anteil mit 0 % angesetzt wird.

Der TAN-Gehalt von Jauche wird nach Tabelle 2.14 in DÖHLER et al. (2002) mit 90 % angenommen.

3.3.4.3.5 *The emission calculation procedure / Berechnung der Emissionen*

Tier 1 approach / Tier-1-Verfahren

In order to assess emissions, the Tier 1 approach combines animal numbers with default emission factors, irrespective of the national N excretion data and the national characteristics in animal husbandry:

$$E_{\text{NH}_3, \text{MM}, i} = EF_{\text{NH}_3, \text{MM}, i} \cdot n_i \quad (3.32)$$

$$E_{\text{N}_2\text{O}, \text{MM}, i} = EF_{\text{N}_2\text{O}, \text{MM}, i} \cdot n_i \quad (3.33)$$

$$E_{\text{NO}, \text{MM}, i} = EF_{\text{NO}, \text{MM}, i} \cdot n_i \quad (3.34)$$

$$E_{\text{N}_2, \text{MM}, i} = EF_{\text{N}_2, \text{MM}, i} \cdot n_i \quad (3.35)$$

$E_{\text{NH}_3, \text{MM}, i}$ NH_3 emission from manure management of animal category i (in kg a^{-1})
 $EF_{\text{NH}_3, \text{MM}, i}$ NH_3 emission factor for animal category i (in $\text{kg pl}^{-1} \text{a}^{-1}$)
 n_i number of animal places for animal category i (in pl)
 etc.

The N_2O mentioned in this chapter is direct N_2O . For indirect N_2O from the deposition of reactive N emitted from housing and storage see Chapter 3.3.4.3.6.

Details for each animal category will be presented in the respective chapters as of Chapter 4.

Das Tier-1-Verfahren kombiniert zur Berechnung von Emissionen Tierzahlen mit default-Emissionsfaktoren ohne Berücksichtigung der nationalen Ausscheidungen und Haltungsverfahren:

Bei N_2O handelt es sich um direkte N_2O -Emissionen. Zu den indirekten N_2O -Emissionen als Folge des Wirtschaftsdünger-Managements in Stall und Lager siehe Kapitel 3.3.4.3.6.

Zu Details siehe Tier-Kapitel ab Kapitel 4.

Tier 2 and Tier 3 approach / Tier-2- und Tier-3-Verfahren

The equations described in the following are primarily based on equations given in EMEP (2016) for the Tier 2 methodology. This approach can be transformed into a Tier 3 methodology by using detailed methods to calculate the N excretions and/or national emission factors. The German inventory uses detailed methods for the calculation of N excretions for the important animal categories (e.g. dairy cows, fattening pigs, fattening poultry) and relies in many cases on national emission factors. According to EMEP (2016) a calculation scheme also qualifies as Tier 3 methodology if it considers mitigation measures. In the German inventory this is the case for NH_3 by taking into account emission reductions by air scrubbing.

Figure 3.5 shows the N flow system that is used to calculate the annual NH_3 , N_2O , NO and N_2 emissions from each animal subcategory. This method reconciles the requirements of both the Atmospheric Emission Inventory Guidebook for NH_3 emissions EMEP (2016) and the IPCC for greenhouse gas emissions (DÄMMGEN and HUTCHINGS, 2008).

Initially the amount of the annual N excreted (see Chapter 3.3.3.2) that is deposited in the animal house, in yards and during grazing is calculated, based on the total

Die im Folgenden beschriebenen Gleichungen beruhen zunächst auf den in EMEP (2016) angegebenen Gleichungen für das Tier-2-Verfahren. Ein Tier-3-Verfahren wird daraus, wenn – wie im deutschen Inventar für alle wichtigen Tierkategorien (z.B. Milchkühe, Mastschweine, Mastgeflügel) - detaillierte Verfahren zur Berechnung der N-Ausscheidungen verwendet werden und/oder nationale Emissionsfaktoren eingesetzt werden, wie das im deutschen Inventar vielfach der Fall ist. Ein weiterer Grund für eine Einstufung als Tier-3-Verfahren ist nach EMEP (2016) die Berücksichtigung von Minderungsmaßnahmen, wie das im deutschen Inventar bei NH_3 durch die Berücksichtigung von Abluftreinigungsanlagen geschieht.

Das in Figure 3.5 illustrierte N-Flussschema wird zur Berechnung der Emissionen von NH_3 , N_2O , NO und N_2 für jede Tier-Unterkategorie angewendet. Dieses Verfahren berücksichtigt sowohl die Erfordernisse des Atmospheric Emission Inventory Guidebook für NH_3 EMEP (2016) als auch der IPCC Guidelines für die Treibhausgase (DÄMMGEN und HUTCHINGS, 2008).

Für die Berechnung der Emissionen erfolgt zunächst die Berechnung der N-Mengen, die im Stall, auf befestigten Flächen oder während des Weidegangs ausgeschie-

annual excretion and the fractions of excreta deposited in these locations (x_{house} , x_{yards} and x_{graz} , respectively). These proportions depend on the fraction of the year the animals spend grazing, in yards and in the animal housing.

$$m_{\text{graz}} = x_{\text{graz}} \cdot m_{\text{excr}} \quad (3.36)$$

$$m_{\text{yard}} = x_{\text{yard}} \cdot m_{\text{excr}} \quad (3.37)$$

$$m_{\text{house}} = x_{\text{house}} \cdot m_{\text{excr}} \quad (3.38)$$

m_{graz}	amount of nitrogen excreted on pasture (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
x_{graz}	share of nitrogen excreted on pasture (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
m_{excr}	amount of total nitrogen excreted (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹), see Chapter 3.3.3.2
m_{yard}	amount of nitrogen excreted in the yards (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
x_{yard}	share of nitrogen excreted in the yards (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
m_{house}	amount of nitrogen excreted in the house (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
x_{house}	share of nitrogen excreted in the house (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)

The fraction of TAN in N excreted is to use to calculate the amounts of N readily convertible to ammonia (TAN) and organic N deposited during grazing, in yards and in the animal house.

den werden (siehe Kapitel 3.3.3.2). Hierzu werden die Gesamtausscheidungen mit Anteilen x_{house} , x_{yards} bzw. x_{graz} multipliziert. Diese Anteile hängen davon ab, welche Zeiteile die Tiere auf der Weide, auf den befestigten Flächen und im Stall verbringen.

Mit dem TAN-Anteil der N-Ausscheidungen werden die Gehalte an rasch in Ammoniak umwandelbarem N (TAN) und organischem N berechnet, die auf der Weide, den befestigten Flächen und im Stall abgesetzt werden.

$$m_{\text{graz, org}} = (1 - x_{\text{TAN}}) \cdot m_{\text{graz}} \quad (3.39)$$

$$m_{\text{graz, TAN}} = x_{\text{TAN}} \cdot m_{\text{graz}} \quad (3.40)$$

$$m_{\text{yard, org}} = (1 - x_{\text{TAN}}) \cdot m_{\text{yard}} \quad (3.41)$$

$$m_{\text{yard, TAN}} = x_{\text{TAN}} \cdot m_{\text{yard}} \quad (3.42)$$

$$m_{\text{house, org}} = (1 - x_{\text{TAN}}) \cdot m_{\text{house}} \quad (3.43)$$

$$m_{\text{house, TAN}} = x_{\text{TAN}} \cdot m_{\text{house}} \quad (3.44)$$

$m_{\text{graz, org}}$	amount of organic nitrogen excreted by faeces on pasture (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
x_{TAN}	fraction of nitrogen excreted as TAN (in kg kg ⁻¹)
m_{graz}	amount of nitrogen excreted on pasture (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
etc.	

For dairy cows the milking parlour has to be considered in addition to pasture and housing (and possibly yard). See Chapter 4.3.8.5.1.

Bei Milchkühen ist neben Weide und Stall (und evtl. Laufhof) zusätzlich noch der Melkstall zu berücksichtigen. Siehe dazu Kapitel 4.3.8.5.1.

By multiplying the amount of TAN $m_{\text{TAN, house}}$ with the TAN related emission factor EF_{house} and the amount of TAN $m_{\text{TAN, yard}}$ with the related emission factor EF_{yard} the NH₃-N losses from the animal house, E_{house} , and yard, E_{yard} , are calculated:

Durch Multiplikation der TAN-Menge mit den TAN-bezogenen Emissionsfaktoren für den Stall EF_{house} und befestigte Flächen EF_{yard} werden die NH₃-N-Verluste aus dem Stall, E_{house} , und den befestigten Flächen, E_{yard} , berechnet:

$$E_{\text{house}} = m_{\text{TAN, house}} \cdot EF_{\text{house}} \quad (3.45)$$

$$E_{\text{yard}} = m_{\text{TAN, yard}} \cdot EF_{\text{yard}} \quad (3.46)$$

E_{house}	NH ₃ -N emission from the house (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
$m_{\text{TAN, house}}$	amount of TAN excreted in the house (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
EF_{house}	NH ₃ -N ammonia emission factor for housing (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
etc.	

The calculation of the emissions from grazing is described in Chapter 11.5.

Optionally, the inventory calculation procedure can take into account a mitigation of the NH_3 emissions (and of particulate matter emissions) from housing by a scrubber system (see Chapter 3.3.4.3.3). The filtered N is added to the TAN pool of slurry to be spread, see further down.

For housing systems with bedding the bedding material is dealt with as straw and considered part of the nitrogen budget. For the properties of straw see Chapter 3.3.4.3.2. The amount of N contained in the bedding material (m_{bedding}) is considered N_{org} in straw.

$$m_{\text{straw,org}}^* = m_{\text{bedding}}$$

(3.47)

$m_{\text{straw,org}}^*$ amount of organic nitrogen in straw used as bedding material (in $\text{kg pl}^{-1} \text{a}^{-1}$)
 m_{bedding} amount of nitrogen contained in bedding material (in $\text{kg pl}^{-1} \text{a}^{-1}$)

It is assumed that a certain fraction of the organic N in straw mineralizes to TAN (for the fraction x_{min} see Chapter 3.3.4.3.2):

$$m_{\text{straw,org}} = m_{\text{straw,org}}^* \cdot (1 - x_{\text{min, straw}})$$

(3.48)

$$m_{\text{straw,TAN}} = m_{\text{straw,org}}^* \cdot x_{\text{min, straw}}$$

(3.49)

$m_{\text{straw,org}}$ amount of organic nitrogen in straw used as bedding material, after mineralization (in $\text{kg pl}^{-1} \text{a}^{-1}$)
 $m_{\text{straw,org}}^*$ amount of organic nitrogen in straw used as bedding material (in $\text{kg pl}^{-1} \text{a}^{-1}$)
 $m_{\text{straw,TAN}}$ amount of TAN originating from straw used as bedding material (in $\text{kg pl}^{-1} \text{a}^{-1}$)
 $x_{\text{min, straw}}$ rate of mineralization for straw used as bedding material (in kg kg^{-1})

For each animal category the N excretions dropped in the house and in the yards are reduced by the amount of N emissions and then transferred to the storage. This is done according to the fractions of slurry-based and solid manure systems, which, for sake of simplicity, is not demonstrated here. Instead, in the following each type of storage systems is described as if it took all the N input from housing and yards.

In addition, slurry-based systems are distinguished according whether there is a storage of untreated slurry or a storage of digested slurry (including the digester).

For untreated slurry, it is assumed that a fraction $x_{\text{tra,sto}}$ of the TAN entering storage is converted to N_{org} , while a fraction $x_{\text{tra,sto}}$ of the N_{org} entering storage is converted to TAN.

$$m_{\text{storage,org}} = (m_{\text{house,org}} + m_{\text{yard,org}}) \cdot (1 - x_{\text{tra,sto}}) + [(m_{\text{house,TAN}} - E_{\text{house}}) + (m_{\text{yard,TAN}} - E_{\text{yard}})] \cdot x_{\text{tra,sto}}$$

(3.50)

$$m_{\text{storage,TAN}} = [(m_{\text{house,TAN}} - E_{\text{house}}) + (m_{\text{yard,TAN}} - E_{\text{yard}})] \cdot (1 - x_{\text{tra,sto}}) + (m_{\text{house,org}} + m_{\text{yard,org}}) \cdot x_{\text{tra,sto}}$$

(3.51)

Die Berechnung der Emissionen aufgrund von Weidegang ist in Kapitel 11.5 beschrieben.

Das Inventar bietet die Option, die Minderung von NH_3 -Emissionen (sowie von Partikelemissionen) aus dem Stall durch ein Abluftreinigungssystem zu berücksichtigen (siehe Kapitel 3.3.4.3.3), wobei die ausgefilterte N-Menge als TAN in die Gülle-Ausbringung eingeht, siehe weiter unten.

Bei Haltungssystemen mit Einstreu wird die Einstreu als Stroh angesehen und in der N-Bilanz berücksichtigt. Zu den Eigenschaften von Stroh siehe Kapitel 3.3.4.3.2. Die in der Einstreu enthaltene N-Menge (m_{bedding}) wird zunächst als N_{org} in Stroh berücksichtigt.

Es wird eine Mineralisierung von organischem Stroh-N zu TAN angenommen (zur Mineralisierungsrate x_{min} siehe Kapitel 3.3.4.3.2):

Getrennt für jede Tierkategorie gelangen die N-Mengen aus dem Stall und von den befestigten Flächen nach Abzug der dort emittierten N-Mengen in die entsprechenden Lagersysteme. Dies erfolgt getrennt nach Flüssigmist- und Festmistsystemen. Der Einfachheit halber werden im Folgenden diese beiden verschiedenen Systemkategorien so beschrieben, als wenn sie allein auftreten würden.

Bei güllebasierten Systemen wird zwischen der Lagerung von unbehandelter Gülle und der Vergärung von Gülle mit Gärrestelagerung unterschieden.

Für unbehandelte Gülle wird angenommen, dass von den in das Lager gelangenden TAN- und N_{org} -Fraktionen je ein relativer Anteil $x_{\text{tra,sto}}$ in die jeweils andere Fraktion umgewandelt werden.

$m_{\text{storage, org}}$	the amount of organic N entering storage (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
$m_{\text{house, org}}$	the amount of organic N that was dropped in the house (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
$m_{\text{yard, org}}$	the amount of organic N that was dropped in the yards (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
$x_{\text{tra, sto}}$	fraction of transformation of N to TAN and vice versa (in kg kg ⁻¹), see Chapter 3.3.4.3.4
$m_{\text{house, TAN}}$	the amount of TAN that was dropped in the house (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
E_{house}	the amount of N emitted during housing (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
$M_{\text{yard, TAN}}$	the amount of TAN that was dropped in the yards (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
E_{yard}	the amount of N emitted from the yards (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
$m_{\text{storage, TAN}}$	amount of TAN in the storage (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)

In case animal manures are anaerobically digested the process of mineralization in the digester leads to an increase of the amount of TAN on the expense of the amount of N_{org} . In addition to this, anaerobic digestion needs consideration of other important aspects. Hence digestion is not explicitly accounted for in the equations presented here. The methodology for the calculation of emissions from anaerobic digestion is described in Chapter 3.3.4.4.

With mammals in solid manure systems it is assumed that the bedding material effects the immobilization of a certain fraction of TAN to N_{org} in the housing. For poultry husbandry with bedding it is assumed that there is no immobilisation of UAN.

Additionally, the N amount contributed by bedding material (i. e. straw) has to be taken into account.

These processes are described by the subsequent equations that calculate the amounts of N_{org} and TAN that enter storage.

Wenn Wirtschaftsdünger in der Biogasanlage vergoren wird, steigt durch den Mineralisierungsprozess im Fermenter der relative Anteil von TAN auf Kosten von N_{org} . Da bei der Vergärung von Wirtschaftsdünger noch weitere Sonderbedingungen zu beachten sind, wird hier darauf verzichtet, die Vergärung in die Methodik-Gleichungen aufzunehmen. Zur Berechnung von Emissionen aus der Vergärung von Wirtschaftsdünger wird stattdessen auf Kapitel 3.3.4.4 verwiesen.

Bei Säugetieren in Festmistsystemen wird davon ausgegangen, dass im Stall ein Teil der TAN-Menge durch die Einwirkung der Einstreu zu N_{org} immobilisiert. Bei Geflügel mit Einstreu wird von fehlender UAN-Immobilisierung ausgegangen.

Zusätzlich ist der N_{org} - und TAN-Beitrag aus der als Stroh angenommenen Einstreu zu berücksichtigen.

Diese Vorgänge werden durch die nachfolgenden Gleichungen beschrieben, die damit auch die N_{org} - und TAN-Mengen berechnen, die ins Lager gehen.

$$m_{\text{storage, org}} = m_{\text{house, org}} + m_{\text{yard, org}} + [(m_{\text{house, TAN}} - E_{\text{house}}) + (m_{\text{yard, TAN}} - E_{\text{yard}})] \cdot x_{\text{imm}} + m_{\text{straw, org}} \quad (3.52)$$

$$m_{\text{storage, TAN}} = [(m_{\text{house, TAN}} - E_{\text{house}}) + (m_{\text{yard, TAN}} - E_{\text{yard}})] \cdot (1 - x_{\text{imm}}) + m_{\text{straw, TAN}} \quad (3.53)$$

$m_{\text{storage, org}}$	amount of organic nitrogen in the storage (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
$m_{\text{house, org}}$	the amount of organic N that was dropped in the house (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
$m_{\text{yard, org}}$	the amount of organic N that was dropped in the yards (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
$m_{\text{house, TAN}}$	the amount of TAN that was dropped in the house (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
E_{house}	the amount of N emitted during housing (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
$M_{\text{yard, TAN}}$	the amount of TAN that was dropped in the yards (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
E_{yard}	the amount of N emitted from the yards (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
x_{imm}	rate of immobilisation (in kg kg ⁻¹), see Chapter 3.3.4.3.4
$m_{\text{storage, TAN}}$	amount of TAN in the storage (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
$m_{\text{straw, org}}$	amount of organic N input with straw (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹), see Chapter 3.3.4.3.2
$m_{\text{straw, TAN}}$	amount of TAN input with straw (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹), see Chapter 3.3.4.3.2

When the N amount in a storage system is known, the N emission from that storage system can be calculated. Any calculation has to take into account that all emission factors for N_2O , NO and N_2 are related to the overall N inputs (i.e. the inputs with faeces, urine and bedding material) and hence describe the overall emission from housing and storage.

According to IPCC (2006), i. e. as of Submission 2015, the fraction of indirect N_2O emissions that is caused by emissions of NH_3 and NO from housing and storage is no longer reported among the emissions from agricultural soils but as a contribution by animal husbandry, see also Chapter 3.3.4.3.6. IPCC (2006) also requires the calculation of indirect N_2O emissions from nitrogen leaching

Mit Kenntnis der N-Mengen im entsprechenden Lagersystem können die N-Emissionen aus diesem Lager berechnet werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Emissionsfaktoren für N_2O , NO und N_2 auf die Summe der im Stall ausgeschiedenen N-Menge und des N-Eintrags durch Einstreu beziehen und jeweils die Gesamtemission aus Stall und Lager beschreiben.

Der Anteil der indirekten N_2O -Emissionen, der auf Emissionen von NH_3 und NO aus Stall und Lager zurückgeht, wird nach IPCC (2006) ab Submission 2015 nicht mehr in den Boden-Kapiteln beschrieben und berichtet, sondern in den Tier-Kapiteln, siehe dazu auch Kapitel 3.3.4.3.6. IPCC (2006) sieht ein analoges Vorgehen auch für die indirekten N_2O -Emissionen durch Versickerung

and runoff from storage. However, as leaching from storage is forbidden by law, it is not taken into account in the German inventory.

The calculations of emissions from untreated and digested manure are done separately, because the pertaining emission factors are different. The calculation is proportional to the amounts of N in manure that are transferred to the various storage types. For N emissions from digestion and storage of digestion residues see Chapters 3.3.4.4.2 and 3.3.4.4.3. Chapter 3.4.4.2.1 describes the relative share of manure N that is treated by anaerobic digestion.

$$E_{\text{storage, NH}_3\text{-N}} = m_{\text{storage, TAN}} \cdot EF_{\text{storage, NH}_3\text{-N}} \quad (3.54)$$

$$E_{\text{storage, N}_2\text{O-N}} + E_{\text{storage, NO-N}} + E_{\text{storage, N}_2} = (m_{\text{house}} + m_{\text{bedding}}) \cdot (EF_{\text{storage, N}_2\text{O-N}} + EF_{\text{storage, NO-N}} + EF_{\text{storage, N}_2}) \quad (3.55)$$

$E_{\text{storage, NH}_3\text{-N}}$	NH ₃ -N emissions from storage (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
$m_{\text{storage, TAN}}$	modified amount of TAN passed to the storage (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
$EF_{\text{storage, NH}_3\text{-N}}$	NH ₃ -N emission factor for storage (in kg kg ⁻¹)
$E_{\text{storage, N}_2\text{O-N}}$	N ₂ O-N emissions from storage (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
$E_{\text{storage, NO-N}}$	NO-N emissions from storage (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
$E_{\text{storage, N}_2}$	N ₂ emissions from storage (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
m_{house}	amount of nitrogen excreted in the house (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
m_{bedding}	amount of nitrogen contained in bedding material (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
$EF_{\text{storage, N}_2\text{O-N}}$	N ₂ O-N emission factor (combined for house and storage!) (in kg kg ⁻¹)
$EF_{\text{storage, NO-N}}$	NO-N emission factor (combined for house and storage!) (in kg kg ⁻¹)
$EF_{\text{storage, N}_2}$	N ₂ emission factor (combined for house and storage!) (in kg kg ⁻¹)

For the values of the emission factors for NH₃ and N₂O see the respective sections from Chapter 4 onwards.

IPCC does not provide NO emission factors. A list of Tier 2 emission factors is given in EMEP(2016)-3B-30, Table 3.10. However, their origin cannot be found in the reference given. Hence, according to HAENEL et al. (2012), a NO-N emission factor is chosen that is one tenth of the N₂O-N emission factor.

Following JARVIS and PAIN (1994), the emission factor for N₂ is taken to be three times the N₂O-N emission factor.

Altogether, the following relation of N₂O-N, NO-N and N₂ emission factors for housing and storage is used in the German emission inventory:

$$EF_{\text{storage, NO-N}} = 0.1 \cdot EF_{\text{storage, N}_2\text{O-N}} \quad (3.56)$$

$$EF_{\text{storage, N}_2} = 3 \cdot EF_{\text{storage, N}_2\text{O-N}} \quad (3.57)$$

$EF_{\text{storage, N}_2\text{O-N}}$	N ₂ O-N emission factor (combined for house and storage!) (in kg kg ⁻¹)
$EF_{\text{storage, NO-N}}$	NO-N emission factor (combined for house and storage!) (in kg kg ⁻¹)
$EF_{\text{storage, N}_2}$	N ₂ emission factor (combined for house and storage!) (in kg kg ⁻¹)

NO emissions originating from the agricultural sector are reported (as NO_x). However, as they had not been accounted for in the definition of the national emission ceiling (NEC Directive 2001/81/EC, 1051 Gg a⁻¹) they are

während der Lagerung vor (Auswaschung). Eine solche Versickerung ist nach deutschen Gesetzen verboten und wird daher in Inventar nicht berechnet.

Die Berechnung der Emissionen aus unbehandeltem und vergorenem Wirtschaftsdünger erfolgt wegen unterschiedlicher Emissionsfaktoren getrennt und proportional zu den Gülle-N-Mengen, die in diese beiden verschiedenen Lagertypen eingebracht werden. Zu N-Emissionen aus Wirtschaftsdünger-Vergärung und Gärrestelagerung siehe Kapitel 3.3.4.4.2 und 3.3.4.4.3. Auf die Anteile der in die Vergärung eingehenden N-Mengen am Gesamt-N-Aufkommen geht Kapitel 3.4.4.2.1 ein.

Für die Werte der NH₃- und N₂O-Emissionsfaktoren siehe die entsprechenden Unterkapitel ab Kapitel 4.

IPCC gibt keine Emissionsfaktoren für NO an. In EMEP(2016)-3B-30, Table 3.10, findet sich eine Liste von NO-Emissionsfaktoren für das Tier-2-Verfahren, deren Herkunft anhand der angegebenen Quelle aber nicht nachvollziehbar ist. Für den NO-N-Emissionsfaktor wird daher nach HAENEL et al. (2012) ein NO-N-Emissionsfaktor angesetzt, der einem Zehntel des N₂O-N-Emissionsfaktors entspricht.

Der Emissionsfaktor für N₂ wird nach JARVIS & PAIN (1994) als das Dreifache der N₂O-N-Emissionsfaktoren angesetzt.

Insgesamt gilt damit im deutschen Inventar für die Verhältnisse der N₂O-N-, NO-N- und N₂-Emissionsfaktoren für Stall und Lager zueinander:

Die NO-Emissionen aus dem Sektor Landwirtschaft werden zwar berichtet (als NO_x); da sie aber nicht Bestandteil der Festlegung der nationalen Obergrenze (NEC Richtlinie 2001/81/EC, 1051 Gg a⁻¹) waren, werden

subtracted from the national total of NO_x emissions by adjustment before the national total of NO_x is checked for compliance with the emission ceilings, see Chapter 1.

During storage of solid manure the formation of leachate is possible, see Chapter 3.3.4.3.4. The amounts of N_{org} and TAN that are diverted into leachate are subtracted from the respective amounts produced in the storage of solid manure and treated separately as spreading of leachate and solid manure is different.

The following equations are used to calculate N_{org} and TAN that is applied to the field, remembering to subtract the emissions of NH₃, N₂O, NO and N₂ from the storage. The NH₃ emissions are completely subtracted from the TAN pool, while the emissions of N₂O-N, NO-N and N₂ are partitioned between TAN and N_{org} using a partitioning factor f_{TAN} ($0 \leq f_{\text{TAN}} \leq 1$). For f_{TAN} it is plausible to choose the relative TAN content, i. e. the amount of TAN divided by the amount of total N which is the sum of TAN and N_{org}.

$$m_{\text{applic,org}} = m_{\text{storage,org}} - (1 - f_{\text{TAN}}) \cdot (E_{\text{storage,N2O-N}} + E_{\text{storage,NO-N}} + E_{\text{storage,N2}}) \quad (3.58)$$

$$m_{\text{applic,TAN}} = m_{\text{storage,TAN}} - E_{\text{storage,NH3-N}} - f_{\text{TAN}} \cdot (E_{\text{storage,N2O-N}} + E_{\text{storage,NO-N}} + E_{\text{storage,N2}}) \quad (3.59)$$

$m_{\text{applic,org}}$	amount of organic nitrogen passed to application (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
$m_{\text{applic,TAN}}$	amount of TAN passed to application (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
E_{storage}	total N emissions (NH ₃ , N ₂ O, NO and N ₂) from storage (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
f_{TAN}	fraction of N ₂ O-N, NO-N and N ₂ emitted from the TAN pool

The emissions of N₂O are calculated as follows (emissions of NO and N₂ by analogy):

$$E_{\text{N2O-N}} = (m_{\text{house}} + m_{\text{bedding}}) \cdot EF_{\text{N2O-N}} \quad (3.60)$$

$E_{\text{storage,N2O-N}}$	N ₂ O-N emissions from storage (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
m_{house}	amount of nitrogen excreted in the house (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
m_{bedding}	amount of nitrogen contained in bedding material (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
$EF_{\text{N2O-N}}$	N ₂ O-N emission factor (combined for house and storage) (in kg kg ⁻¹)

This calculation procedure applies separately to the various storage types, which requires to attribute fractions of $m_{\text{storage,org}}$ and $m_{\text{storage,TAN}}$ to the various storage systems according to their respective frequency. It is taken into account that the digestion of slurry and the storage of the residues (i. e. the combination of digester and residue storage) is considered a separate storage type (see Chapter 3.3.4.4).

All nitrogen leaving the various storage systems (separately for the different animal categories and separately for untreated and digested manure) is added up and redistributed to the different types of spreading according to the respective frequencies. The N filtered by air scrubbing systems in the housing is added to the TAN pool of untreated slurry to be spreaded. The emission of NH₃-N during and immediately after field applica-

sie vor Prüfung der deutschen NO_x-Gesamtemission auf Einhaltung der Emissionsobergrenzen durch ein Adjustementverfahren wieder abgezogen, siehe Kapitel 1.

Im Festmistlager kann Jauche entstehen, siehe Kapitel 3.3.4.3.4. Die in die Jauche gehenden Mengen von N_{org} und TAN sind von den im Festmistlager insgesamt angefallenen Mengen von N_{org} und TAN zu subtrahieren und separat weiterzuverfolgen, da Jauche und Festmist bei der Ausbringung unterschiedlich behandelt werden.

Die folgenden Gleichungen ermitteln unter Berücksichtigung von NH₃-, N₂O-, NO- und N₂-Emissionen aus dem Lager die zur Ausbringung gelangenden N_{org} und TAN-Mengen. Dabei werden die NH₃-Emissionen vollständig aus dem TAN-Pool abgezogen, während die übrigen Emissionsverluste mithilfe eines Faktors f_{TAN} ($0 \leq f_{\text{TAN}} \leq 1$) auf N_{org}- und TAN-Pool aufgeteilt werden. Für f_{TAN} wird in plausibler Weise der relative TAN-Gehalt gewählt, der sich als Quotient von TAN zu Gesamt-N-Menge (= TAN + N_{org}) ergibt.

Die N₂O-Emissionen aus dem Lager werden dafür wie folgt berechnet (analog für NO- und N₂-Emissionen):

Diese Berechnung ist für die verschiedenen Lagerverfahren getrennt vorzunehmen, wozu $m_{\text{storage,org}}$ und $m_{\text{storage,TAN}}$ entsprechend der relativen Häufigkeit der Lagerverfahren auf diese aufgeteilt werden. Dabei wird im GAS-EM-Modell berücksichtigt, dass die Güllevergärung (incl. Gärrestelagerung) nach dem Konzept in IPCC (2006) einen eigenständigen Typ von Lagerverfahren darstellt (siehe Kapitel 3.3.4.4).

Die aus den Lagersystemen zur Ausbringung kommenden N-Mengen (getrennt für jede Tierkategorie und für unbehandelten und vergorenen Wirtschaftsdünger) werden zusammengefasst und nach den gegebenen Häufigkeiten auf die verfügbaren Ausbringungstechniken verteilt. Das von Abluftreinigungsanlagen im Stall ausgefilterte N wird zu der zur Ausbringung vorgesehenen TAN-Menge von unbehandelter Gülle addiert. Die

tion is calculated as follows (for the emissionfactor see animal descriptions in Chapters 4 ff):

$$E_{\text{applic, NH}_3} = m_{\text{applic, TAN}} \cdot EF_{\text{applic, NH}_3} \quad (3.61)$$

$E_{\text{applic, NH}_3}$	NH ₃ -N emissions from application (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
$m_{\text{applic, TAN}}$	amount of TAN passed to the application (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
$EF_{\text{applic, NH}_3}$	NH ₃ -N emission factor for application (in kg kg ⁻¹)

The NH₃ emissions during grazing are calculated proportionally to the amount of TAN excreted on pasture:

NH₃-N-Emissionen, die sich unmittelbar aus der Ausbringung ergeben, werden dann wie folgt berechnet (zum Emissionsfaktor siehe Tierbeschreibungen ab Kapitel 4):

Die NH₃-Emissionen aus dem Weidegang werden proportional zu der auf der Weide ausgeschiedenen TAN-Menge berechnet:

$$E_{\text{graz, NH}_3} = m_{\text{graz, TAN}} \cdot EF_{\text{graz, NH}_3} \quad (3.62)$$

$E_{\text{graz, NH}_3}$	NH ₃ -N emissions during grazing (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
$m_{\text{graz, TAN}}$	amount of TAN excreted during grazing (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
$EF_{\text{graz, NH}_3}$	NH ₃ -N emissions during grazing (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)

According to IPCC (2006) The N₂O emissions from agricultural soils are to be calculated proportionally the amounts of N applied to the soils. This means that N losses by NH₃ emissions during spreading must not be subtracted before calculating N₂O from the soils. Hence the N flux scheme is no longer applicable. For details regarding the calculation of N emissions from agricultural soils (including emissions of NO and N₂) see Chapter 11.

Die N₂O-Emissionen aus landwirtschaftlich genutzten Böden sind laut IPCC (2006) proportional zur N-Menge zu berechnen, die zur Ausbringung kommt, also ohne Abzug der bei der Ausbringung entstehenden NH₃-N-Emissionen. Damit kann in diesem Bereich das N-Fluss-Prinzip nicht konsequent fortgesetzt werden. Zu Details im Zusammenhang mit der Berechnung von N-Emissionen (einschließlich NO- und N₂) aus der Nutzung landwirtschaftlicher Böden siehe Kapitel 11.

3.3.4.3.6 Indirect N₂O from manure management / Indirektes N₂O aus dem Wirtschaftsdünger-Management

In the emission reporting according to IPCC (2006) the manure management is assigned indirect N₂O emissions that result from transformation processes in soils forming indirect N₂O from the deposition of reactive nitrogen (NH₃ and NO) emitted from the manure management (housing and storage, including digestate of manure digestion) as well as indirect N₂O from leaching and runoff of N from manure management (including anaerobic digestion of manure). However, leaching and/or uncontrolled surface runoff from manure management (including management of digestate) is forbidden by law on grounds of protection of inshore waters (EU Nitrate Directive (EU, 1991)). Hence, no indirect N₂O from leaching and runoff was calculated for the manure management. This was done so for all years since 1990, meaning a conservative assumption as the nitrogen not emitted by indirect N₂O from leaching and runoff is spreaded and causes therefore higher N₂O emissions.

In der Berichterstattung nach IPCC (2006) werden dem Wirtschaftsdünger-Management (Sektor 3.B) auch indirekte N₂O-Emissionen zugeordnet. Diese entstehen bei Umsetzungsprozessen in Böden aus reaktivem Stickstoff, der aus der Deposition von NH₃ und NO aus dem Wirtschaftsdünger- und Gärreste-Management stammt, sowie infolge von Auswaschung oder Oberflächenabfluss aus dem Wirtschaftsdünger- und Gärreste-Management. Allerdings sind Versickerung oder unkontrollierter oberirdischer Abfluss aus dem Wirtschaftsdünger- und Gärreste-Management aus Gründen des Gewässerschutzes zu vermeiden (EU-Nitrat-Richtlinie 1991 (EU, 1991)). Daher wurden keine indirekten N₂O-Emissionen aus Auswaschung/ Oberflächenabfluss berechnet. Dies erfolgte für alle Jahre ab 1990, was bzgl. der Gesamt-N₂O-Emissionen aus der deutschen Landwirtschaft eine konservative Annahme darstellt, da der nicht durch N₂O aus Auswaschung/Oberflächenabfluss verloren gegangene Stickstoff ausgebracht wird und dabei höhere N₂O-Emissionen verursacht.

The indirect N₂O emissions from deposition of NH₃ and NO from manure management (housing and storage; spreading excluded) are calculated proportionally to the amount of N deposited as described in IPCC (2006)-11.21:

Die indirekten N₂O-N-Emissionen als Folge der Deposition von NH₃ und NO aus Wirtschaftsdünger- und Gärreste-Management (ohne Ausbringung) werden nach IPCC (2006)-11.21 proportional zur deponierten N-Menge berechnet:

$$E_{\text{N}_2\text{O-N, indirect, MM}} = (E_{\text{NH}_3\text{-N, MM}} + E_{\text{NO-N, MM}}) \cdot EF_{\text{N}_2\text{O-N, dep}} \quad (3.63)$$

$E_{\text{N}_2\text{O-N, indirect, MM}}$	indirect $\text{N}_2\text{O-N}$ emissions due to deposition of $\text{NH}_3\text{-N}$ und NO-N emitted from manure management (including digestate of manures), without spreading ($\text{kg pl}^{-1} \text{ a}^{-1}$)
$E_{\text{NH}_3\text{-N, MM}}$	total $\text{NH}_3\text{-N}$ emissions from manure management (including digestate of manures), without spreading ($\text{kg pl}^{-1} \text{ a}^{-1}$)
$E_{\text{NO-N, MM}}$	total NO-N emissions from manure management (including digestate of manures), without spreading ($\text{kg pl}^{-1} \text{ a}^{-1}$)
$EF_{\text{N}_2\text{O-N, dep}}$	emission factor of indirect $\text{N}_2\text{O-N}$ due to deposition (kg kg^{-1}), see below

For the calculation of emissions of NH_3 and NO from housing and storage (including storage of digestate from manure) see Chapter 3.3.4.3.5 and the animal chapters as of Chapter 4.

The emission factor $EF_{\text{N}_2\text{O-N, dep}}$ is given as $0.01 \text{ kg kg}^{-1} \text{ N}_2\text{O-N}$ (IPCC(2006)-11.24, Table 11.3).

In IPCC(2006)-11.11, Table 11.3, an uncertainty range of 0.002 kg kg^{-1} to 0.05 kg kg^{-1} is given for the $\text{N}_2\text{O-N}$ emission factor. This interval is assumed to be the 95 % confidence interval. The difference between the upper limit of the confidence interval and the emission factor amounts to 400 % of the emission factor. The difference between the lower limit of the confidence interval and the emission factor is 80 % of the emission factor. According to IPCC(2006)-3.29 the higher percentage (400 %) has to be used to estimate derive the overall uncertainty (see Chapter 14.6). Due to the asymmetry a lognormal distribution is assumed.

The uncertainty of the activity data, i. e. of the sum $E_{\text{NH}_3\text{-N, MM}} + E_{\text{NO-N, MM}}$ in the equation given above, is estimated as follows: For the NH_3 emissions from manure management the uncertainty estimate derived in Chapter 14.5 is 36 %. There is no such estimate for the NO-N emissions, but that unknown uncertainty will be in the same order of magnitude like that of the NH_3 emissions. However, the NO-N emissions are quite small compared to the $\text{NH}_3\text{-N}$ emissions; hence, according to Chapter 14.2, the uncertainty of the NO-N uncertainty can be considered almost negligible. As a consequence it seems reasonable to conservatively estimate the total uncertainty of the activity data with 40 %. The exact value is of no concern due to the fact that the uncertainty of the resulting emissions is dominated by the high uncertainty of the emission factor (see above and Table 14.1).

Indirect N_2O emissions as a consequence of spreading of manure (including and digestate of manure) are reported in Sector 3.D. For the calculation procedures see Chapter 12.

Zur Berechnung der $\text{NH}_3\text{-N}$ und NO-N -Emissionen aus Stall und Wirtschaftsdüngerlager (incl. Wirtschaftsdünger-Gärreste) siehe Kapitel 3.3.4.3.5 und in den Tierkapiteln ab Kapitel 4.

Der Emissionsfaktor $EF_{\text{N}_2\text{O-N, dep}}$ wird mit $0,01 \text{ kg kg}^{-1} \text{ N}_2\text{O-N}$ angesetzt (IPCC(2006)-11.24, Table 11.3).

In IPCC(2006)-11.11, Table 11.3, wird für den Emissionsfaktor ein Unsicherheitsbereich von $0,002 \text{ kg kg}^{-1}$ bis $0,05 \text{ kg kg}^{-1}$ angegeben. Dieser wird als 95 %-Konfidenzintervall aufgefasst. Dabei entspricht das Intervall zwischen oberer Konfidenzintervall-Grenze und verwendetem Emissionsfaktor 400 % des Emissionsfaktors, das Intervall zwischen unterer Konfidenzintervall-Grenze und Emissionsfaktor 80 %. Nach IPCC(2006)-3.29 geht in die Gesamtunsicherheit des deutschen Treibhausgasinventars (siehe Kapitel 14.6) der größere Prozentwert ein, d. h. 400 %. Aufgrund der Asymmetrie wird Lognormalverteilung angenommen.

Die Unsicherheit des Aktivitätswertes, d. h. der Summe $E_{\text{NH}_3\text{-N, MM}} + E_{\text{NO-N, MM}}$ in obiger $\text{N}_2\text{O-N}$ -Gleichung wird wie folgt geschätzt: Für die $\text{NH}_3\text{-N}$ -Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management ergibt die Abschätzung in Kapitel 14.5 eine Unsicherheit von 36 %. Eine vergleichbare Abschätzung für die NO-N -Emissionen gibt es zwar nicht, die Unsicherheit wird aber in der gleichen Größenordnung wie für NH_3 liegen. Wegen der im Vergleich zu $\text{NH}_3\text{-N}$ aber sehr geringen NO-N -Emissionen fällt die NO-N -Unsicherheit nach Kapitel 14.2 allerdings kaum ins Gewicht. Es erscheint deshalb sinnvoll, die gesuchte Gesamtunsicherheit des Aktivitätswertes konservativ mit 40 % abzuschätzen. Der genaue Wert ist wegen der Dominanz der Unsicherheit des Emissionsfaktors (s. o. und Table 14.1) unerheblich für die Gesamtunsicherheit des deutschen Treibhausgasinventars.

Indirekte N_2O -Emissionen als Folge der Ausbringung von Wirtschaftsdüngern und Wirtschaftsdünger-Gärresten werden im Sektor 3.D berichtet. Zur Berechnung siehe Kapitel 12.

3.3.4.4 *Digestion of manure and management of the digestate / Vergärung von Wirtschaftsdünger einschließlich Gärreste-Management*

According to IPCC (2006), Tabelle 10.17, the combination of anaerobic digestion of animal manures and the storage of the resulting digestates represent a particular type of storage. For reasons of consistency, this IPCC

Nach IPCC (2006), Tabelle 10.17, gilt die Kombination anaerober Vergärung von Wirtschaftsdünger und der Lagerung der resultierenden Gärreste als eigenständiger Lager-Typ. Dieses für die Treibhausgase CH_4 und N_2O

concept, which is specified for the greenhouse gases CH_4 and N_2O , was also adopted in the German inventory for the calculations of NH_3 and other N species.

The calculation methodology provided in EMEP (2016)-5B2 is a simple Tier 1 methodology for NH_3 only and could therefore not be applied in the German inventory. Hence Germany developed a Tier 2 methodology for the consistent calculation of the emissions of CH_4 , NH_3 , N_2O , NO and N_2 originating in the context of anaerobic digestion of animal manures. This methodology is described in the following. However, parameter values and input data are discussed in Chapter 3.4.4

In practice, animal manures are anaerobically digested along with energy crops and different types of organic waste in varying combinations (co-fermentation). However, as the digestion of organic waste is not a part of the agricultural inventory, it is not taken into account in the following.

The agricultural inventory considers the anaerobic digestion of the following categories of manures: cattle and pig slurry, cattle farmyard manure and poultry manure. The digestion of pig farmyard manure is irrelevant with respect to its relative share of total manure; in addition data is scarce. Hence digestion of pig farmyard manure is neglected in the inventory.

The co-fermentation of manure and energy crops influences the emission-relevant parameters of the digestate during storage and spreading. However, the emission calculations are done separately for manure and digestion of energy crops in order to be able to report these emissions separately. The digestion of manure is described in the following; for the digestion of energy crops see Chapter 3.3.5. Both for manure and energy crops the methodology is based on a national concept (HAENEL und WULF, 2016), that represents a widened version of the IPCC concept for green house gas emissions and an approach for NH_3 emissions that works by analogy to the green house gas concept.

The concept of anaerobic digestion of animal manures takes into account emissions from pre-storage of the substrates, from the digester and from the management of the digestate (storage and spreading). For the storage of digestate two different types of storage are considered: open storage and (technically) gastight storage. Technically gastight storage is defined as gastight storage where, however, inadvertent emissions due to leakage cannot be excluded. Hence a so-called leakage rate is considered in the emission calculations. In order to simplify notation the technically gastight storage will simply be denoted in the following as gastight storage.

For the emissions of CH_4 see Chapter 3.3.4.4.1; emissions of N_2O , NO and N_2 are dealt with in Chapter 3.3.4.4.2 behandelt; Chapter 3.3.4.4.3 describes the emissions of NH_3 .

The amounts of N_2O emitted from agricultural soils due to spreading of digestate are calculated along with

vorgegebene IPCC-Konzept wurde im deutschen Inventar aus Konsistenzgründen auch für die Berechnungen von NH_3 und anderen N-Spezies übernommen.

Die in EMEP (2016)-5B2 beschriebene einfache Tier-1-Berechnungsmethodik befasst sich nur mit NH_3 und kam deshalb für das deutsche Inventar nicht in Betracht. Deutschland entwickelte stattdessen eine nationale Tier-2-Methodik zur konsistenten Berechnung der vergärungsbedingten Emissionen von CH_4 , NH_3 , N_2O , NO und N_2 . Diese Methodik wird im Folgenden beschrieben. Zu Parameterwerten und Eingangsdaten der deutschen Methodik siehe dagegen Kapitel 3.4.4.

In der Praxis wird Wirtschaftsdünger in unterschiedlichen Mischungsverhältnissen zusammen mit Energiepflanzen und verschiedenen organischen Abfällen vergoren (Ko-Fermentierung). Die Vergärung organischer Abfälle ist nicht Gegenstand des landwirtschaftlichen Inventars und wird daher im Folgenden nicht berücksichtigt.

Das landwirtschaftliche Inventar berücksichtigt die Vergärung folgender Wirtschaftsdüngerarten: Rinder- und Schweinegülle, Rindermist und Geflügelkot. Die mengenmäßig unbedeutende und daher mit Daten schlecht belegte Vergärung von Schweinemist wird im Inventar nicht berücksichtigt.

Die Ko-Fermentierung von Wirtschaftsdünger und Energiepflanzen beeinflusst die emissionsrelevanten Kennwerte der Gärreste bei Lagerung und Ausbringung. Für das Inventar erfolgt die Emissionsberechnung allerdings getrennt für Wirtschaftsdünger und Energiepflanzen, damit die substratspezifischen Emissionen separat ausgewiesen werden können. Im Folgenden wird die Vergärung von Wirtschaftsdünger beschrieben; zur Vergärung von Energiepflanzen siehe Kapitel 3.3.5. In beiden Fällen basiert die Methodik auf einem nationalen Konzept (HAENEL und WULF, 2016), das im Bereich der Treibhausgase eine Erweiterung des IPCC-Konzeptes darstellt und für NH_3 einen analogen Ansatz ableitet.

Im Zusammenhang mit der Vergärung von Wirtschaftsdünger werden Emissionen aus der Vorlagerung des Gärsubstrats, der anschließenden Vergärung sowie dem Gärreste-Management (Lagerung und Ausbringung) berücksichtigt. Bei der Gärrestlagerung wird zwischen offener Lagerung und technisch gasdichter Lagerung unterschieden. Die technisch gasdichte Lagerung ist eine gasdichte Lagerung, bei der unbeabsichtigte Emissionen aufgrund von Leckage nicht ausgeschlossen werden können. Eine entsprechende Leckagerate wird in den Emissionsberechnungen berücksichtigt. Im Folgenden wird das technisch gasdichte Lager aber der Einfachheit halber als gasdichtes Lager bezeichnet.

Zu den Emissionen von CH_4 siehe Kapitel 3.3.4.4.1; N_2O -, NO - und N_2 -Emissionen werden in Kapitel 3.3.4.4.2 behandelt; Kapitel 3.3.4.4.3 geht auf die Emissionen von NH_3 ein.

Die als Folge der Gärreste-Ausbringung entstehenden bodenbürtigen N_2O -Emissionen werden im Sektor

the emission originating from spreading of untreated animal manures (see Chapter 11.2).

For the activity data needed for the calculation of emissions from digestion of animal manures and the management of digestate see Chapter 3.4.4.

3.3.4.4.1 *CH₄ emissions / CH₄-Emissionen*

According to IPCC (2006), Tabelle 10.17, the combination of anaerobic digestion of animal manures and the storage of the resulting digestate represent a particular type of storage. For this storage type the emissions of CH₄ are calculated as described in Chapter 3.3.4.1.

The methane conversion factor *MCF* needed for this methodology is to be calculated with Formula 1 provided in the footnote of Tabelle 10.17 in IPCC (2006). This *MCF* is an overall quantity that represents the emissions from two separate emission sources: Digester and storage of digestate. Formula 1 does not incorporate emissions that occur from storage of feedstock before being fed into the digester. However, an essential drawback of the IPCC (2006) Formula 1 is that the identical potential for CH₄ emission production (i. e. $VS \cdot B_0$) is used for the digester and the storage of digestate. This approach ignores that the CH₄ potential for the storage of digestate must be much lower due to the great amount CH₄ removed from the digester (CH₄ used for energy generation or CH₄ losses by leakage).

This problem is avoided when using the Formula 1 presented in IPCC (2000), pg. 4.36 (footnote). Like IPCC (2006) Formula 1 the IPCC (2000) Formula 1 describes the system "digester + storage of digestate". Hence IPCC (2000) Formula 1 continues to be used in the German emission calculations. It reads, adopting the way of notation used in the report at hand, as follows:

$$MCF = \frac{v_{CH_4, \text{ prod}} - v_{CH_4, \text{ used}} - v_{CH_4, \text{ flared}} + MCF_{\text{residues}} \cdot (B_0 - v_{CH_4, \text{ prod}})}{B_0} \quad (3.64)$$

<i>MCF</i>	effective methane conversion factor for the combination "digester + storage" (in m ³ m ⁻³)
$v_{CH_4, \text{ prod}}$	specific volume of methane produced in the digester (related to VS input) (in m ³ kg ⁻¹)
$v_{CH_4, \text{ used}}$	specific volume of methane used for energy production (related to VS input) (in m ³ kg ⁻¹)
$v_{CH_4, \text{ flared}}$	specific volume of methane flared (related to VS input) (in m ³ kg ⁻¹)
MCF_{residues}	methane conversion factor for the storage of digested manure (in m ³ m ⁻³)
B_0	maximum methane producing capacity, per kg of VS input (in m ³ kg ⁻¹)

In the German emission model, "digester" represents the system where the production of usable gas takes place. (In the inventory model GAS-EM, the fate of CH₄ produced in biogas plants for energy generation is not traced because this not required by the reporting guidelines.)

Hence, the model digester represents the total gas producing system found in practice, including all fermenters and all compartments with secondary digestion from where the gas produced is returned to use (e. g. in a local heating plant). This includes gastight storage

Boden in Zusammenhang mit der Ausbringung von Wirtschaftsdünger berechnet (siehe Kapitel 11.2).

Auf die zur Emissionsberechnung im Zusammenhang mit der Vergärung von Wirtschaftsdünger erforderlichen Aktivitätsdaten geht Kapitel 3.4.4 ein.

Nach IPCC (2006), Tabelle 10.17, gilt die Kombination anaerober Vergärung von Wirtschaftsdünger und der Lagerung der resultierenden Gärreste als eigenständiger Lager-Typ, für den die Berechnung der CH₄-Emissionen prinzipiell wie in Kapitel 3.3.4.1 beschrieben erfolgt.

Der dafür benötigte Methanumwandlungsfaktor *MCF* soll nach Formula 1 in der Fußnote zu Tabelle 10.17 in IPCC (2006) berechnet werden. Dieser *MCF* stellt eine effektive Größe für zwei Emissionsbereiche dar: Fermenter und Gärrestlager. Eine vor dem Fermenter angeordnete Zwischen- oder Vorlagerung des Wirtschaftsdüngers ist in dieser Formula 1 nicht vorgesehen. Ein entscheidender Mangel von Formula 1 in IPCC (2006) ist allerdings, dass ein- und dasselbe CH₄-Bildungspotential (d. h. $VS \cdot B_0$) sowohl für den Fermenter als auch für das Gärrestlager zugrunde gelegt wird. Damit wird ignoriert, dass das CH₄-Bildungspotential für das Gärrestlager aufgrund der aus dem Fermenter (für Energieproduktion oder durch Leckage) entzogenen großen CH₄-Menge viel kleiner sein muss.

Dieses Problem weist Formula 1 in IPCC (2000) S. 4.36 (Fußnote), die ebenfalls den *MCF* für das System „Fermenter + Gärrestlager“ beschreibt, nicht auf. Sie ist daher weiterhin Grundlage für die Emissionsberechnungen im deutschen Inventar. In der in diesem Bericht üblichen Schreibweise lautet Formula 1 von IPCC (2000):

Mit „Fermenter“ wird im deutschen Berechnungsmodell das System bezeichnet, in dem die Produktion von nutzbarem Gas stattfindet. (Im Inventarmodell GAS-EM wird der Verbleib dieser Gasmenge nicht weiter verfolgt, weil dies nicht zu den Berichtspflichten gehört.)

Der Modell-Fermenter entspricht damit dem in der Praxis vorzufindenden „gasführenden System“, also allen Fermentern und Nachgäreinheiten einer Biogasanlage, in denen das entstandene Gas kontrolliert der Nutzung (z. B. durch ein Blockheizkraftwerk) zugeführt wird. Ein gasdichtes Gärrestlager, sofern vorhanden, ist

compartments if they are connected to the gas collection system. Storage of digestate in the meaning of the IPCC concept is assumed to be a separate open storage.

In order to use Equation (3.64) for the calculation of the MCF of the system “digester + storage of digestate”, the quantities $U_{CH_4, prod}$, $U_{CH_4, used}$ and $U_{CH_4, flared}$ that are unknown a priori have to be derived from known quantities. This is described in the following.

In practice the residence time necessary to fully exploit the maximum possible methane production B_o is not reached in the gas collection system. In the following the difference, i. e. the potentially still purgeable amount of gas ($B_o - U_{CH_4, prod}$), is denoted as “potential of residual gas” that is assumed to be known and the ratio of which to B_o is described by the parameter μ_{rg} :

$$\mu_{rg} = \frac{B_o - U_{CH_4, prod}}{B_o} \quad (3.65)$$

μ_{rg}	relative potential of residual gas, related to B_o (with $0 \leq \mu_{rg} \leq 1 \text{ m}^3 \text{ m}^{-3}$)
B_o	maximum methane producing capacity per kg of VS (in $\text{m}^3 \text{ kg}^{-1}$)
$U_{CH_4, prod}$	specific volume of methane produced in the digester (related to VS input) (in $\text{m}^3 \text{ kg}^{-1}$)

The units of μ_{rg} take into account that nominator as well as denominator in the equation given above equally relate to the amount of VS put into the biogas plant which means that it is not necessary to keep the VS unit (kg). For the value of μ_{rg} used in the inventory see Chapter 3.4.4.2.2.

Equation (3.65) directly leads to:

$$U_{CH_4, prod} = (1 - \mu_{rg}) \cdot B_o \quad (3.66)$$

$U_{CH_4, prod}$	specific volume of methane produced in the digester (related to VS input) (in $\text{m}^3 \text{ kg}^{-1}$)
μ_{rg}	relative potential of residual gas, related to B_o (with $0 \leq \mu_{rg} \leq 1 \text{ m}^3 \text{ m}^{-3}$)
B_o	maximum methane producing capacity, related to VS (in $\text{m}^3 \text{ kg}^{-1}$)

This means that $U_{CH_4, prod}$ is predominantly determined by B_o . By multiplication with μ_{rg} it is taken into account that, in practice, the maximum possible production of CH_4 is not attained.

The term $U_{CH_4, prod} - U_{CH_4, used} - U_{CH_4, flared}$ in equation (3.64) is part of the digester's methane balance (related to VS input) which can be completed by the methane loss $U_{CH_4, leak}$ due to leakage.

$$U_{CH_4, prod} - U_{CH_4, used} - U_{CH_4, flared} - U_{CH_4, leak} = 0 \quad (3.67)$$

$U_{CH_4, prod}$	specific volume of methane produced in the digester (related to VS input) (in $\text{m}^3 \text{ kg}^{-1}$)
$U_{CH_4, used}$	specific volume of methane used for energy production (related to VS input) (in $\text{m}^3 \text{ kg}^{-1}$)
$U_{CH_4, flared}$	specific volume of methane flared (related to VS input) (in $\text{m}^3 \text{ kg}^{-1}$)
$U_{CH_4, leak}$	specific volume of methane due to leakage and maintenance works (related to VS input) (in $\text{m}^3 \text{ kg}^{-1}$)

The loss of methane $U_{CH_4, leak}$ due to leakage is calculated as part of the total amount of CH_4 produced in the

ebenfalls Teil dieses gasführenden Systems. Unter Gärrestelager im Sinne des IPCC-Konzeptes wird dagegen ein separates offenes Gärrestelager verstanden.

Um den MCF für das System „Fermenter + Gärrestlager“ nach Gleichung (3.64) zu berechnen, müssen die a priori nicht bekannten Größen $U_{CH_4, prod}$, $U_{CH_4, used}$ und $U_{CH_4, flared}$ auf bekannte Größen zurückgeführt werden. Dies wird im Folgenden beschrieben.

In der Praxis wird im gasführenden System die notwendige Verweilzeit zum vollständigen Ausschöpfen der maximal möglichen Methanproduktionskapazität B_o nicht erreicht. Die daher potentiell noch freisetzbare Gasmenge $B_o - U_{CH_4, prod}$ wird im Folgenden als „Restgaspotential“ bezeichnet, das als bekannt vorausgesetzt wird und dessen Verhältnis zu B_o durch die Größe μ_{rg} beschrieben wird:

Bei der Einheit von μ_{rg} ist berücksichtigt, dass sich sowohl Nenner als auch Zähler in obiger Gleichung in gleicher Weise auf die in die Biogasanlage eingebrachte VS-Menge beziehen, so dass die VS-Einheit (kg) nicht weiter mitgeführt werden muss. Zu dem für das Inventar verwendeten Wert von μ_{rg} siehe Kapitel 3.4.4.2.2.

Aus Gleichung (3.65) folgt direkt:

Die Größe $U_{CH_4, prod}$ wird also im Wesentlichen durch B_o bestimmt, wobei durch Multiplikation mit μ_{rg} berücksichtigt wird, dass in der Praxis die maximal mögliche CH_4 -Ausbeute nicht erreicht wird.

Die Differenz $U_{CH_4, prod} - U_{CH_4, used} - U_{CH_4, flared}$ in Gleichung (3.64) ist Teil der Methan-Bilanz des Fermenters (bezogen auf den VS-Eintrag), die durch den leakagebedingten CH_4 -Verlust $U_{CH_4, leak}$ vervollständigt wird:

Der leakagebedingte CH_4 -Verlust $U_{CH_4, leak}$ wird als Teil der im Fermenter insgesamt produzierten CH_4 -Menge

digester. The ratio of these two quantities is defined as the leakage rate L_{dig} of the digester. L_{dig} is assumed to be known.

$$v_{\text{CH}_4, \text{leak}} = L_{\text{dig}} \cdot v_{\text{CH}_4, \text{prod}} \quad (3.68)$$

$v_{\text{CH}_4, \text{leak}}$	specific volume of methane due to leakage and maintenance works (related to VS input) (in $\text{m}^3 \text{kg}^{-1}$)
L_{dig}	leakage rate of the digester, related to CH_4, prod (with $0 \leq L_{\text{dig}} \leq 1 \text{ m}^3 \text{m}^{-3}$)
$v_{\text{CH}_4, \text{prod}}$	specific volume of methane produced in the digester (related to VS input) (in $\text{m}^3 \text{kg}^{-1}$)

The units of L_{dig} take into account that nominator as well as denominator in the equation given above equally relate to the amount of VS put into the biogas plant which means that it is not necessary to keep the VS unit (kg). For the value of L_{dig} used in the inventory see Chapter 3.4.4.2.2.

Using equations (3.66) to (3.68), the difference of the three v_{CH_4} quantities in the nominator of Equation (3.64) can be transformed as follows:

$$v_{\text{CH}_4, \text{prod}} - v_{\text{CH}_4, \text{used}} - v_{\text{CH}_4, \text{flared}} = v_{\text{CH}_4, \text{leak}} = L_{\text{dig}} \cdot (1 - \mu_{\text{rg}}) \cdot B_o \quad (3.69)$$

$v_{\text{CH}_4, \text{prod}}$	specific volume of methane produced in the digester (related to VS input) (in $\text{m}^3 \text{kg}^{-1}$)
$v_{\text{CH}_4, \text{used}}$	specific volume of methane used for energy production (related to VS input) (in $\text{m}^3 \text{kg}^{-1}$)
$v_{\text{CH}_4, \text{flared}}$	specific volume of methane flared (related to VS input) (in $\text{m}^3 \text{kg}^{-1}$)
$v_{\text{CH}_4, \text{leak}}$	specific volume of methane due to leakage and maintenance works (related to VS input) (in $\text{m}^3 \text{kg}^{-1}$)
L_{dig}	leakage rate of the digester, related to CH_4, prod (with $0 \leq L_{\text{dig}} \leq 1 \text{ m}^3 \text{m}^{-3}$)
μ_{rg}	relative potential of residual gas, related to B_o (with $0 \leq \mu_{\text{rg}} \leq 1 \text{ m}^3 \text{m}^{-3}$)
B_o	maximum methane producing capacity (related to VS input) (in $\text{m}^3 \text{kg}^{-1}$)

The term $MCF_{\text{residues}} \cdot (B_o - v_{\text{CH}_4, \text{prod}})$ in Equation (3.64) is transformed using equation (3.65):

$$MCF_{\text{residues}} \cdot (B_o - v_{\text{CH}_4, \text{prod}}) = MCF_{\text{residues}} \cdot \mu_{\text{rg}} \cdot B_o \quad (3.70)$$

MCF_{residues}	methane conversion factor for the storage of digested manure (in $\text{m}^3 \text{m}^{-3}$)
B_o	maximum methane producing capacity, per kg of VS input (in $\text{m}^3 \text{kg}^{-1}$)
$v_{\text{CH}_4, \text{prod}}$	specific volume of methane produced in the digester (related to VS input) (in $\text{m}^3 \text{kg}^{-1}$)
μ_{rg}	relative potential of residual gas, related to B_o (with $0 \leq \mu_{\text{rg}} \leq 1 \text{ m}^3 \text{m}^{-3}$)

Using equations (3.69) and (3.70) equation (3.64) becomes:

$$MCF = (1 - \mu_{\text{rg}}) \cdot L_{\text{dig}} + \mu_{\text{rg}} \cdot MCF_{\text{residues}} \quad (3.71)$$

MCF	effective methane conversion factor for the combination "digester + storage" (in $\text{m}^3 \text{m}^{-3}$)
μ_{rg}	relative potential of residual gas, related to B_o (with $0 \leq \mu_{\text{rg}} \leq 1 \text{ m}^3 \text{m}^{-3}$)
L_{dig}	leakage rate of the digester, related to CH_4, prod (with $0 \leq L_{\text{dig}} \leq 1 \text{ m}^3 \text{m}^{-3}$)
MCF_{residues}	methane conversion factor for the storage of digested manure (in $\text{m}^3 \text{m}^{-3}$), see below

This allows the MCF to be calculated using the known parameters μ_{rg} , L_{dig} und MCF_{residues} . For μ_{rg} and L_{dig} see Chapter 3.4.4.2.2. The calculation of MCF_{residues} is described in the following.

The German concept assume that even a gastight storage of digestate has a certain leakage. This leakage rate is described by the storage-specific leakage rate $L_{\text{sto, gt}}$ ($\text{m}^3 \text{m}^{-3}$), see Chapter 3.4.4.2.2. Taking into account

berechnet. Das Verhältnis der beiden Größen wird durch die Leckagerate L_{dig} des Fermenters definiert, die als bekannt vorausgesetzt wird.

Bei der Einheit von L_{dig} wurde berücksichtigt, dass sich sowohl Nenner als auch Zähler in obiger Gleichung in gleicher Weise auf die in die Biogasanlage eingebrachte VS-Menge beziehen, so dass die VS-Einheit (kg) nicht weiter mitgeführt werden muss. Zu dem für das Inventar verwendeten Wert von L_{dig} siehe Kapitel 3.4.4.2.2.

Mithilfe der Gleichungen (3.66) bis (3.68) lässt sich die Differenz der drei v_{CH_4} -Größen im Zähler des Bruches in Gleichung (3.64) wie folgt umformen.

Der Term $MCF_{\text{residues}} \cdot (B_o - v_{\text{CH}_4, \text{prod}})$ in Gleichung (3.64) wird mit Gleichung (3.65) umgeformt zu:

Mit Gleichung (3.69) und (3.70) wird Gleichung (3.64) zu:

Damit kann der MCF mithilfe der bekannten Parameter μ_{rg} , L_{dig} und MCF_{residues} berechnet werden. Zu μ_{rg} und L_{dig} siehe Kapitel 3.4.4.2.2. Die Ermittlung von MCF_{residues} wird nachfolgend beschrieben.

Das deutsche Konzept geht davon aus, dass beim gasdichten Gärrestelager eine gewisse Leckage unterstellt werden muss, die durch die Leckagerate $L_{\text{sto, gt}}$ ($\text{m}^3 \text{m}^{-3}$) beschrieben wird. Zu $L_{\text{sto, gt}}$ siehe Kapitel 3.4.4.2.2.

the leakage rate and the relative share of gastight storage of digestate (x_{gts} , see Chapter 3.4.4.2.1), the resulting MCF_{residues} is given by:

$$MCF_{\text{residues}} = x_{\text{gts}} \cdot L_{\text{sto, gt}} + (1 - x_{\text{gts}}) \cdot MCF_{\text{ngts}} \quad (3.72)$$

MCF_{residues}	methane conversion factor for the storage of digested manure (in $\text{m}^3 \text{m}^{-3}$)
x_{gts}	share of gastight storage of the digestate (with $0 \leq L_{\text{sto, gt}} \leq 1 \text{ m}^3 \text{m}^{-3}$)
$L_{\text{sto, gt}}$	leakage rate of the gastight storage (with $0 \leq L_{\text{sto, gt}} \leq 1 \text{ m}^3 \text{m}^{-3}$)
MCF_{ngts}	methane conversion factor for the non-gastight storage of digestate (in $\text{m}^3 \text{m}^{-3}$)

For the MCF of the non-gastight storage (MCF_{ngts}) see Chapter 3.4.4.2.2.

Biogas plants that are fed with animal manures have, as a rule, a pre-storage for the feedstock before it enters the digester. The CH_4 losses from the pre-storage reduce the CH_4 production potential in the digester and the storage of the digestate. This is taken into account in the German inventory model by modifying the IPCC (2000) Formula 1. As a consequence Equation (3.71) is transformed to the final MCF equation used in the inventory, i. e. Equation (3.73), see below. Note that, for sake of simplicity, both in Equation (3.71) and Equation (3.73) the symbol MCF is used on the left hand side, even though those MCF quantities are different, because Equation (3.73) includes pre-storage (for MCF_{ps} see Chapter 3.4.4.2.2).

Damit und unter Berücksichtigung des relativen Anteils der gasdichten Lagerung (x_{gts} , siehe Kapitel 3.4.4.2.1) ergibt sich für MCF_{residues} :

Zur Wahl des MCF für das nicht gasdichte Lager (MCF_{ngts}) siehe Kapitel 3.4.4.2.2.

Biogasanlagen, in denen Wirtschaftsdünger vergoren wird, verfügen i. d. R. über eine Vorlagerung des Substrats, bevor es in den Fermenter gelangt. Die aus der Vorlagerung des Gärsubstrats erfolgenden CH_4 -Emissionen reduzieren das Potential der CH_4 -Entstehung in Fermenter und Gärrestelager. Dies wird im deutschen Inventarmodell über eine Ergänzung der IPCC-(2000)-Formula 1 berücksichtigt. Damit wird Gleichung (3.71) zu der schließlich im Inventar verwendeten Gleichung (3.73), siehe unten. Der Einfachheit halber wurde auf der linken Seite der Gleichung das gleiche Symbol (MCF) verwendet wie in Gleichung (3.71). Es handelt sich wegen der Berücksichtigung des Vorlagers in Gleichung (3.73) aber um zwei verschiedene MCF -Größen (zu MCF_{ps} siehe Kapitel 3.4.4.2.2).

$$MCF = MCF_{\text{ps}} + (1 - MCF_{\text{ps}}) \cdot [(1 - \mu_{\text{rg}}) \cdot L_{\text{dig}} + \mu_{\text{rg}} \cdot MCF_{\text{residues}}] \quad (3.73)$$

MCF	effective methane conversion factor for the combination "pre-storage + digester + storage" (in $\text{m}^3 \text{m}^{-3}$)
MCF_{ps}	methane conversion factor for pre-storage (in $\text{m}^3 \text{m}^{-3}$)
μ_{rg}	relative potential of residual gas, related to B_0 (with $0 \leq \mu_{\text{rg}} \leq 1 \text{ m}^3 \text{m}^{-3}$)
L_{dig}	leakage rate of the digester, related to CH_4 , prod (with $0 \leq L_{\text{dig}} \leq 1 \text{ m}^3 \text{m}^{-3}$)
MCF_{residues}	methane conversion factor for the storage of digested manure (in $\text{m}^3 \text{m}^{-3}$), see above

Chapter 3.4.4.2.2 provides an assessment of the resulting MCF values in relation to MCF values obtained without digestion, and of the impact of anaerobic digestion on CH_4 emissions from manure management.

Eine Bewertung der resultierenden MCF -Werte im Verhältnis zu MCF -Werten ohne Vergärung einschließlich der Auswirkung auf die CH_4 -Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management findet sich in Kapitel 3.4.4.2.2.

3.3.4.4.2 Emissions of N_2O , NO and N_2 / Emissionen von N_2O , NO und N_2

Table 3.7 gives an overview of what N_2O emissions the German inventory calculates for the various subsystems of a biogas plant:

Table 3.7 vermittelt einen Überblick darüber, welche N_2O -Emissionen das deutsche Inventar für die verschiedenen Biogasanlagen-Teilsysteme berechnet.

Table 3.7: Digestion of manure, N_2O emissions

	slurry	farmyard manure / poultry manure
pre-storage	0	Equation (3.74)
digester	0	0
storage	0	0
	gastight	
	non gastight	Equation (3.75)

As a rule, during the short time of pre-storage of slurry along with effective mixing no natural crust can

Bei Gülle-Vorlagerung wird i. d. R. durch kurze Verweilzeit und gute Durchmischung keine Schwimmdecke

develop. In case a natural crust has developed there is no time to dry. As only a dry crust allows for nitrification of NH_4 to NO_3 as pre-stage for N_2O , the formation of emissions of N_2O , NO and N_2 from pre-storage of slurry is neglected in the inventory ($EF_{\text{N}_2\text{O-N, dig, ps}} = 0$; index PS meaning pre-storage).

On the other hand, N_2O emissions from pre-storage of farmyard manure and poultry manure cannot be neglected. These emissions are calculated proportionally to the amount of N fed into the digestion (i. e. the sum of N excretions and N contributions by bedding material):

$$E_{\text{N}_2\text{O-N, dig, ps}} = x_{\text{dig}} \cdot (N_{\text{excr}} + N_{\text{straw}}) \cdot EF_{\text{N}_2\text{O-N, dig, ps}} \quad (3.74)$$

$E_{\text{N}_2\text{O-N, dig, ps}}$	$\text{N}_2\text{O-N}$ emissions from pre-storage of farmyard manure or poultry manure to be digested, per place and year (in $\text{kg pl}^{-1} \text{a}^{-1}$)
x_{dig}	fraction of farmyard manure or poultry manure that is digested (in kg kg^{-1})
N_{excr}	total amount of N excreted per place and year in solid manure systems or poultry housing (in $\text{kg pl}^{-1} \text{a}^{-1}$)
N_{straw}	total amount of N added by bedding material, per place and year (in $\text{kg pl}^{-1} \text{a}^{-1}$)
$EF_{\text{N}_2\text{O-N, dig, ps}}$	$\text{N}_2\text{O-N}$ emission factor for pre-storage of farmyard manure or poultry manure (in kg kg^{-1})

The calculation of emissions of NO and N_2 are performed by analogy. For the emission factors of N_2O , NO and N_2 see Chapter 3.4.4.2.3.

The amounts of N lost by emissions of N_2O , NO , N_2 and NH_3 (for NH_3 see Chapter 3.3.4.4.3) from pre-storage are subtracted from the amount of N fed into the pre-stored. The remaining amount of N (N_{digester}) enters the digester.

Despite the assumed leakage (see Chapter 3.3.4.4.1) it is generally assumed that there are no emissions of N_2O , NO and N_2 from the fermenter: N_2O can be formed only if oxygen is available since in the beginning there is only NH_4 . NH_4 can be transformed into N_2O only by nitrification and denitrification of the resulting NO . For the nitrification oxygen is needed that, however, is not available in the digester in practice.

In addition, there are no NH_3 emissions from the digester, see Chapter 3.3.4.4.3. Hence the total amount of N fed into the digester (N_{digester}) leaves the fermenter unabated and enters the storage of digestate.

Despite the assumed leakage (see Chapter 3.3.4.4.1) it is assumed for the gastight storage that, for the same reasons as for the digester (see above), there are no emissions of N_2O , NO and N_2 . Hence, emissions of N_2O , NO and N_2 from non-gastight storage represent the total emissions of N_2O , NO and N_2 from the storage of digestate.

Like for the calculation of CH_4 emissions, it is assumed for the non-gastight storage of digestate that a natural crust can develop. The N_2O emission factor of this natural crust is different from zero. Like for untreated manure the emission factors for NO and N_2 are assumed to be proportional to the emission factor of N_2O .

ausgebildet. Eine eventuell existierende Schwimmdecke trocknet nicht aus. Da nur in abtrocknenden Schwimmdecken Nitrifikation von NH_4 zu NO_3 als Vorstufe zur N_2O -Bildung stattfinden kann, wird die Bildung von N_2O -, NO - und N_2 -Emissionen aus Gülle-Vorgruben vernachlässigt ($EF_{\text{N}_2\text{O-N, dig, ps}} = 0$; der Index PS steht für pre-storage).

Bei der Vorlagerung von Mist und Geflügelkot sind die N_2O -Emissionen dagegen nicht vernachlässigbar. Sie werden proportional zu der in die Vergärung gehenden Summe von N-Ausscheidungen und Einstreu-N berechnet:

Die Berechnung der NO - und N_2 -Emissionen erfolgt analog. Zu den Emissionsfaktoren für N_2O , NO - und N_2 siehe Kapitel 3.4.4.2.3.

Die N-Mengen, die aus dem Vorlager durch N_2O -, NO - und N_2 -Emissionen sowie NH_3 -Emissionen (siehe Kapitel 3.3.4.4.3) verloren gehen, werden von der ins Vorlager eingebrachten N-Menge subtrahiert. Die verbleibende N-Menge (N_{digester}) gelangt in den Fermenter.

Für den Fermenter wird trotz der unterstellten Leckage (siehe Kapitel 3.3.4.4.1) generell davon ausgegangen, dass keine N_2O -, NO - und N_2 -Emissionen entstehen: N_2O kann nur in Anwesenheit von Sauerstoff gebildet werden, da zunächst nur NH_4 vorliegt. Aus diesem kann N_2O nur über Nitrifikation und anschließender Denitrifikation des NO gebildet werden. Für die Nitrifikation ist Sauerstoff notwendig, der im Fermenter praktisch nicht vorhanden ist.

Da aus dem Fermenter auch keine NH_3 -Emissionen erfolgen (siehe Kapitel 3.3.4.4.3), gelangt die gesamte N-Menge, die in den Fermenter eingebracht wurde (N_{digester}), unvermindert in das Gärrestelager.

Beim gasdichten Lager wird trotz der unterstellten Leckage (siehe Kapitel 3.3.4.4.1) aus den gleichen Gründen wie beim Fermenter (s. o.) davon ausgegangen, dass keine N_2O -, NO - und N_2 -Emissionen entstehen. Die Emissionen von N_2O , NO und N_2 aus der nicht gasdichten Lagerung stellen damit die Gesamtemissionen von N_2O , NO und N_2 aus der Gärrestelagerung dar.

Für das nicht gasdichte Gärrestelager wird wie bei der Berechnung der CH_4 -Emission eine Schwimmdecke angenommen. Deren N_2O -Emissionsfaktor ist von Null verschieden. Wie beim unbehandelten Wirtschaftsdünger (siehe Kapitel 3.3.4.3.5) werden die Emissionsfaktoren von NO - und N_2 proportional zum N_2O -Emissionsfaktor angesetzt.

Emissions of N_2O , NO and N_2 from non-gastight storage are calculated using the amount of N having passed the digester and entering the storage (N_{digester}) and the relative share of gastight storage (x_{gts}), see Equation (3.75).

$$E_{N_2O-N, \text{dig, st}} = (1 - x_{\text{gts}}) \cdot N_{\text{digester}} \cdot EF_{N_2O-N, \text{dig, st}} \quad (3.75)$$

$E_{N_2O-N, \text{dig, st}}$	total N_2O -N emissions from the storage of digestate, per place and year (in $\text{kg pl}^{-1} \text{a}^{-1}$)
x_{gts}	relative share (fraction) of gastight storage of digestion residues (in kg kg^{-1})
N_{digester}	total amount of N entering and leaving the digester, per place and year (in $\text{kg pl}^{-1} \text{a}^{-1}$)
$EF_{N_2O-N, \text{dig, st}}$	N_2O -N emission factor for the non-gastight storage of digestate (in kg kg^{-1})

The calculation of emissions of NO and N_2 are performed by analogy. For the emission factors of N_2O , NO and N_2 see Chapter 3.4.4.2.3.

Chapter 3.4.4.2.3 also provides an assessment of the resulting N_2O -N emission factors in relation to emission factors obtained without digestion, and of the impact of anaerobic digestion on N_2O emissions from manure management.

Anaerobic digestion of animal manures (pre-storage and storage of digestate) can lead to emissions of reactive nitrogen (NH_3 and NO , see Chapters 3.3.4.4.2 and 3.3.4.4.3) the deposition of which causes indirect N_2O emissions from the soil (IPCC (2006)-11.19 ff). The indirect emissions reported in the CRF Tables (Sector 3.B) include these emissions as well as indirect emissions from the management of untreated manure. (Indirect N_2O emissions occurring due to deposition of NH_3 and NO from the application of animal manures and digestate are described in Chapter 11.2.

No indirect N_2O emissions from leaching and runoff is calculated as leaching and/or uncontrolled surface runoff from manure management including digestate is forbidden by law on grounds of protection of inshore waters (see “JGS-Anlagenverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen” (JGS-ANLAGENV, 1998) und “Wasserhaushaltsgesetz” (WHG, 2010).

3.3.4.4.3 NH_3 emissions / NH_3 -Emissionen

EMEP (2016) describes a Tier 1 methodology for the calculation of NH_3 emissions from anaerobic digestion of animal manures including storage of the digestate, see EMEP (2016)-3B-24 und EMEP (2016)-5B2-1. However, Germany developed a more detailed methodology and uses it in the emission inventory. This methodology is based on the following specifications:

- Pre-storage of slurry: pre-storage facilities are often equipped with concrete drive-on covers. As there is no information on the frequencies of such covers, it is assumed that slurry pre-storages are covered and that NH_3 emissions from pre-storages can be neglected.
- Pre-storage of farmyard manure and poultry manure: missing coverage allows for NH_3 emissions.

Die Emissionen von N_2O , NO und N_2 aus der nicht gasdichten Lagerung werden mithilfe der N-Menge berechnet, die aus dem Fermenter ins Lager gelangt (N_{digester}), sowie dem relativen Anteil der gasdichten Lagerung (x_{gts}), siehe Gleichung (3.75).

Die Berechnung der NO - und N_2 -Emissionen erfolgt analog. Zu den Emissionsfaktoren für N_2O , NO - und N_2 siehe Kapitel 3.4.4.2.3.

In Kapitel 3.4.4.2.3 findet sich auch eine Bewertung der aus den obigen Gleichungen resultierenden N_2O -N-Emissionsfaktoren im Verhältnis zu N_2O -N-Emissionsfaktoren ohne Vergärung (einschließlich der Auswirkung auf die N_2O -Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management).

Wirtschaftsdünger-Vergärung (Vorlager und Gärrestlager) kann zu Emissionen reaktiven Stickstoffs führen (NH_3 und NO , siehe Kapitel 3.3.4.4.2 und 3.3.4.4.3), dessen Deposition indirekte N_2O aus dem Boden verursacht (IPCC (2006)-11.19 ff). Diese indirekten N_2O -Emissionen werden in den CRF-Tabellen zusammen mit ebensolchen N_2O -Emissionen von unbehandeltem Wirtschaftsdünger berichtet (Sektor 3.B). (Zum Indirekten N_2O - aufgrund von NO und NH_3 aus der Wirtschaftsdünger-Ausbringung incl. Wirtschaftsdünger-Gärreste siehe Kapitel 11.2.)

Indirekte N_2O -Emissionen infolge von Auswaschung oder Oberflächenabfluss von N aus dem Substrat-Vorlager oder dem Gärrestlager werden nicht berechnet, da Versickerung oder unkontrollierter oberirdischer Abfluss aus Gründen des Gewässerschutzes zu vermeiden sind (siehe dazu u. a. JGS-Anlagenverordnung NRW 1998, Wasserhaushaltsgesetz WHG 2010).

EMEP (2016) beschreibt eine Tier-1-Methodik zur Berechnung von NH_3 -Emissionen aus der Vergärung von Wirtschaftsdünger incl. Lagerung der Gärreste, siehe EMEP (2016)-3B-24 und EMEP (2016)-5B2-1. Deutschland hat dagegen eine differenziertere nationale Methodik entwickelt und verwendet diese im Emissionsinventar. Diese Methodik beruht auf folgenden Vorgaben:

- Vorlagerung von Gülle: Vorgruben sind häufig mit befahrbaren Betondecken ausgestattet. Da keine Informationen zur Verbreitung vorliegen, wird für das Emissionsinventar von einer Abdeckung der Vorgruben ausgegangen, so dass NH_3 -Emissionen aus Vorgruben vernachlässigt werden können.
- Vorlagerung von Mist und Geflügelkot: Fehlende Abdeckung führt zu NH_3 -Emissionen.

- Co-substrates like energy crops are, in general, not stored in pre-storage facilities but directly fed into the digester. Hence, no pre-storage NH_3 emissions are considered in the inventory.
- During fermentation in the digester, organic substance is degraded (especially protein compounds), leading to mineralization of organic nitrogen and hence to an increase of the relative TAN content in the digester.
- By analogy to the CH_4 methodology described in Chapter 3.3.4.4.1, two types of storage are distinguished: gastight storage, and non-gastight storage with natural crust.
- It is assumed that NH_3 emitted through leakage of digester and gastight storage can be neglected ($\text{EF}_{\text{NH}_3-\text{N}} = 0$) ¹⁶.
- No NH_3 emission factor is available for the non-gastight storage of digestate with natural crust. Hence the emission factor for the open-tank storage of untreated cattle slurry with natural crust is adopted.
- N losses in connection with NH_3 emissions from storage are subtracted from the TAN pool of the digestate. This is in line with the N flow concept, see Chapter 3.3.4.3.1.
- Emissions from spreading of digestate and untreated manure are calculated separately, because the frequencies for spreading techniques and incorporation times differ for these two types of organic fertilizer (special survey for 2010 and Agricultural Structure Survey 2016 by the Federal Statistical Agency).
- Emission factors for spreading of digestes are not available. As the viscosity of untreated cattle slurry is similar to that of the digestate, the cattle-slurry emission factors are adopted.
- The methodology is equally applied to digestate of slurry and farmyard manure (due to co-fermentation in practice).
- Kosubstrate wie Energiepflanzen werden meist nicht über Vorgruben, sondern direkt in den Fermenter eingebracht. In diesem Fall werden keine NH_3 -Emissionen aus Vorgruben berücksichtigt.
- Es wird berücksichtigt, dass während der Vergärung organische Substanz abgebaut wird (speziell Eiweißverbindungen). Dies führt zur Mineralisierung von organisch gebundenem Stickstoff, d. h. zu einem Anstieg des relativen TAN-Gehaltes.
- Konsistent mit der CH_4 -Methodik (siehe Kapitel 3.3.4.4.1) wird zwischen zwei Lagertypen unterschieden: Gasdichtes Lager sowie offener Tank mit Schwimmdecke.
- Es wird davon ausgegangen, dass über Leckagen aus Fermenter und gasdichtem Lager freigesetzte NH_3 -Mengen vernachlässigbar sind ($\text{EF}_{\text{NH}_3-\text{N}} = 0$) ¹⁶.
- Für die nicht gasdichte Lagerung mit Schwimmdecke wird mangels spezifischer Daten für die Gärreste-Lagerung der Emissionsfaktor für die Lagerung unvergorener Rinder-Gülle mit natürlicher Kruste übernommen.
- Die mit NH_3 -Emissionen aus dem Lager einhergehenden N-Verluste werden in Übereinstimmung mit dem N-Fluss-Konzept (siehe Kapitel 3.3.4.3.1) aus dem TAN-Pool der Gärreste abgezogen.
- Die Ausbringung von Gärresten und unvergorenem Wirtschaftsdünger wird getrennt gerechnet, da sich nach den vorliegenden Daten (StatBA-Sondererhebung für 2010 und Agrarstrukturerhebung 2016) die Häufigkeiten der Ausbringungstechniken und die Einarbeitungszeiten unterscheiden.
- Für die Ausbringung der Gärreste werden die Emissionsfaktoren von unvergorener Rindergülle verwendet, da diese bzgl. der Viskosität den Gärresten am meisten ähnelt.
- Die Methodik wird für Gärreste aus Gülle und Mist in gleicher Weise angewendet (aufgrund der Ko-Fermentierung in der Praxis).

Table 3.8 gives an overview of how the German inventory calculates NH_3 emissions from the various sub-systems of a biogas plant („calculation“).

Table 3.8 gibt einen Überblick darüber, für welche Teilbereiche das deutsche Inventar NH_3 -Emissionen berechnet werden („calculation“).

Table 3.8: Digestion of manure, NH_3 emissions

		slurry	farmyard manure / poultry manure
pre-storage		0	calculation
digester		0	0
storage	gastight	0	0
	non gastight	calculation	calculation
spreading		calculation	calculation

¹⁶ Under the plausible assumption of equilibrium in the digester, $\text{pH} = 8$ and a temperature of about 40°C cause ca. 20 % of NH_4 to be dissociated as NH_3 . In an example calculation with simple application of the Henry constant, a gas yield of 200 liters per kg freshmatter (maize) is connected with about 0.1 g NH_3 per kg of digestate. (There are about 3 g NH_4 per kg of digestate.) However, the NH_3 yield may even be lower as these considerations do not take into account that the gas yield can be lower and that the concentration of the gas phase can be overestimated by the forementioned simple application of the dissociation constant and the Henry constant.

In the following, the equations needed for these calculations are given in a general form, i.e. including pre-storage, though pre-storage is not relevant in the case of slurry with regard to NH_3 .

The equations are based on the concept of the two N pools used in the inventory (see Chapter 3.3.4.3.1): First, the pool of total N and, second, the pool of TAN that is part of the total N pool. If needed, the share of organic N in the total N pool is calculated as difference (total N minus TAN).

The NH_3 emissions from the pre-storage are calculated proportionally to the amount of TAN available:

$$E_{\text{NH}_3\text{-N, dig, ps}} = \text{TAN}_{\text{dig}} \cdot EF_{\text{NH}_3\text{-N, dig, ps}} \quad (3.76)$$

$E_{\text{NH}_3\text{-N, dig, ps}}$	$\text{NH}_3\text{-N emissions from pre-storage (in kg a}^{-1}\text{)}$
TAN_{dig}	amount of TAN contained in the substrate to be digested (in kg a ⁻¹)
$EF_{\text{NH}_3\text{-N, dig, ps}}$	$\text{NH}_3\text{-N emission factor for the pre-storage, related to TAN (in kg kg}^{-1}\text{)}$

If no NH_3 emissions from pre-storage have to be considered, the respective emission factor in Equation (3.76) is to be set to zero.

After pre-storage, i. e. when the substrate enters the digester, the amounts of TAN and N_{org} are calculated by the equations below that follow the general principles used in the emission inventory and take into account the emissions of N_2O , NO and N_2 from anaerobic digestion (see Chapter 3.3.4.4.2):

$$N_{\text{tot, dig, ps}} = N_{\text{tot, dig}} - E_{\text{NH}_3\text{-N, dig, ps}} - E_{\text{N}^*, \text{dig, ps}} \quad (3.77)$$

$$\text{TAN}_{\text{dig, ps}} = \text{TAN}_{\text{dig}} - E_{\text{NH}_3\text{-N, dig, ps}} - E_{\text{N}^*, \text{dig, ps}} \cdot \frac{\text{TAN}_{\text{dig}}}{N_{\text{org, dig}} + \text{TAN}_{\text{dig}}} \quad (3.78)$$

$N_{\text{tot, dig, ps}}$	total amount of N contained in the substrate leaving pre-storage to enter the digester (in kg a ⁻¹)
$N_{\text{tot, dig}}$	total amount of N contained the substrate to be digested (in kg a ⁻¹)
$E_{\text{N}^*, \text{dig, ps}}$	total of non-ammonia N emissions ($\text{N}_2\text{O-N}$, NO-N and N_2) from pre-storage (in kg a ⁻¹)
$\text{TAN}_{\text{dig, ps}}$	amount of TAN contained in the substrate leaving pre-storage to enter the digester (in kg a ⁻¹)
TAN_{dig}	amount of TAN contained in the substrate to be digested (in kg a ⁻¹)
$E_{\text{NH}_3\text{-N, dig, ps}}$	$\text{NH}_3\text{-N emissions from pre-storage (in kg a}^{-1}\text{)}$

According to the model assumptions, the amount of total N remains unchanged during the process of digestion in the digester, while the share of TAN increases by mineralization on the expense of N_{org} :

$$N_{\text{tot, dig, ferm}} = N_{\text{tot, dig, ps}} \quad (3.79)$$

$$\text{TAN}_{\text{dig, ferm}} = \text{TAN}_{\text{dig, ps}} + g_{\text{TAN}} \cdot N_{\text{org, dig, ps}} = \text{TAN}_{\text{dig, ps}} + g_{\text{TAN}} \cdot (N_{\text{tot, dig, ps}} - \text{TAN}_{\text{dig, ps}}) \quad (3.80)$$

$N_{\text{tot, dig, ferm}}$	total amount of N in digestion residues leaving the digester (in kg a ⁻¹)
$N_{\text{tot, dig, ps}}$	total amount of N contained in the substrate leaving pre-storage to enter the digester (in kg a ⁻¹)
$\text{TAN}_{\text{dig, ferm}}$	amount of TAN in digestion residues leaving the digester (in kg a ⁻¹)
$\text{TAN}_{\text{dig, ps}}$	amount of TAN contained in the substrate leaving pre-storage to enter the digester (in kg a ⁻¹)
g_{TAN}	relative share of organic N entering the digester that is mineralized to TAN in the digester ($0 < g_{\text{TAN}} < 1 \text{ kg kg}^{-1}$)
$N_{\text{org, dig, ps}}$	amount of organic N contained in the substrate leaving pre-storage to enter the digester (in kg a ⁻¹)

Die für diese Berechnungen erforderlichen Gleichungen sind im Folgenden in allgemeiner Form angegeben, d. h. unter Einschluss des Vorlagers, auch wenn dieses bei Gülle bzgl. NH_3 nicht relevant ist.

Die Gleichungen basieren auf den beiden im Inventar betrachteten N-Pools (siehe Kapitel 3.3.4.3.1): Einerseits Gesamt-N und andererseits die TAN-Teilmenge des Gesamt-N-Pools. Der Anteil des organischen N am Gesamt-N-Pool wird bei Bedarf als Differenz berechnet (Gesamt-N abzüglich TAN).

Die NH_3 -Emissionen aus dem Vorlager werden proportional zur verfügbaren TAN-Menge berechnet:

Für den Fall, dass aus dem Vorlager keine NH_3 -Emissionen zu berücksichtigen sind, ist in Gleichung (3.76) der Emissionsfaktor null zu setzen.

Nach dem Vorlager, d. h. bei Eintritt des Substrats in den Fermenter, gilt für TAN- und N_{org} -Menge entsprechend der generellen Vorgehensweise im Emissionsinventar (siehe Kapitel 3.3.4.3.5) und unter Berücksichtigung der vergärungsbedingten Emissionen von N_2O , NO und N_2 (siehe Kapitel 3.3.4.4.2):

Während des Gärprozesses im Fermenter bleibt entsprechend den Modellannahmen die Gesamt-N-Menge unverändert, während die TAN-Teilmenge aufgrund der Mineralisierung von N_{org} zu TAN ansteigt:

The NH_3 emissions from the storage of digestate are calculated as follows (taking into account that $\text{EF}_{\text{NH}_3\text{-N}} = 0$ for gastight storage):

$$E_{\text{NH}_3\text{-N, dig, st}} = \text{TAN}_{\text{dig, ferm}} \cdot (1 - x_{\text{gts}}) \cdot \text{EF}_{\text{NH}_3\text{-N, dig, st, crust}} \quad (3.81)$$

$E_{\text{NH}_3\text{-N, dig, st}}$	$\text{NH}_3\text{-N}$ emissions from storage of digestion residues (in kg a^{-1})
$\text{TAN}_{\text{dig, ferm}}$	amount of TAN in digestion residues leaving the digester (in kg a^{-1})
x_{gts}	relative share (fraction) of gastight storage of digestion residues (in kg kg^{-1})
$\text{EF}_{\text{NH}_3\text{-N, dig, st, crust}}$	$\text{NH}_3\text{-N}$ emission factor for the storage of digestion residues in an open tank with natural crust related to TAN (in kg kg^{-1})

Die bei der Lagerung der Gärreste entstehenden $\text{NH}_3\text{-N}$ -Emissionen werden wie folgt berechnet (unter Berücksichtigung von $\text{EF}_{\text{NH}_3\text{-N}} = 0$ für gasdichte Lager):

The N losses from storage by emissions of NH_3 , N_2O , NO and N_2 reduce the amount of TAN in the digestate before being spread (calculations by analogy to Equation (3.78)):

$$\text{TAN}_{\text{dig, st}} = \text{TAN}_{\text{dig, ferm}} - E_{\text{NH}_3\text{-N, dig, st}} - E_{\text{N}^*, \text{dig, st}} \cdot \frac{\text{TAN}_{\text{dig, ferm}}}{N_{\text{tot, dig, ferm}}} \quad (3.82)$$

$\text{TAN}_{\text{dig, st}}$	amount of TAN in digestion residues leaving the storage (in kg a^{-1})
$\text{TAN}_{\text{dig, ferm}}$	amount of TAN in digestion residues leaving the digester (in kg a^{-1})
$E_{\text{NH}_3\text{-N, dig, st}}$	$\text{NH}_3\text{-N}$ emissions from storage of digestion residues (in kg a^{-1})
$E_{\text{N}^*, \text{dig, st}}$	total of annual non-ammonia N emissions ($\text{N}_2\text{O-N}$, NO-N and N_2) from storage of digestion residues (in kg a^{-1})
$N_{\text{tot, dig, ferm}}$	total amount of N in digestion residues leaving the digester (in kg a^{-1})

Infolge der Emissionen von NH_3 , N_2O , NO und N_2 aus dem Gärrestelager verringert sich die TAN-Menge in den Gärresten, bevor sie ausgebracht werden (Berechnung analog zu Gleichung (3.78)):

As the calculation of the total N pool is not relevant for the following considerations it is not shown here. The NH_3 emissions from spreading of digestate is given by:

$$E_{\text{NH}_3\text{-N, dig, spr}} = \text{TAN}_{\text{dig, st}} \cdot \sum_{j=1}^k (\text{EF}_{\text{NH}_3\text{-N, dig, spr, j}} \cdot x_{\text{spr, j}}) \quad (3.83)$$

$E_{\text{NH}_3\text{-N, dig, spr}}$	total $\text{NH}_3\text{-N}$ emissions from spreading of digestion residues (in kg a^{-1})
$\text{TAN}_{\text{dig, st}}$	amount of TAN in digestion residues leaving the storage (in kg a^{-1})
$\text{EF}_{\text{NH}_3\text{-N, dig, spr, j}}$	$\text{NH}_3\text{-N}$ emission factor for spreading technique j (in kg kg^{-1})
$x_{\text{spr, j}}$	relative share of digested slurry spreaded with technique j where
$\sum_{j=1}^k x_{\text{spr, area, j}} = 1$	

Die Berechnung des Gesamt-N-Pools ist für das Folgende nicht relevant und wird daher hier nicht dargestellt. Die $\text{NH}_3\text{-N}$ -Emissionen aus der Gärreste-Ausbringung ergeben sich schließlich aus:

For TAN_{dig} , $N_{\text{org, dig}}$, g_{TAN} , $x_{\text{spr, j}}$ and the emission factors see Chapter 3.4.4.2.4.

Chapter 3.4.4.2.4. provides an assessment of the resulting NH_3 emissions in relation to NH_3 emissions from manure management obtained without digestion.

Emissions of NH_3 and NO (for NO see Chapter 3.3.4.4.2) that occur in connection with anaerobic digestion of manure and the storage of the digestate lead to deposition of reactive nitrogen and therefore indirect N_2O from soils. For details see Chapter 3.3.4.4.2.

Spreading of residues from digestion of manures leads to N_2O emissions from soils. The calculation of these emissions is described in Chapter 11.2 in context with spreading of untreated manures.

Zu TAN_{dig} , $N_{\text{org, dig}}$, g_{TAN} , $x_{\text{spr, j}}$ und den Emissionsfaktoren siehe Kapitel 3.4.4.2.4.

Eine Bewertung der aus den obigen Gleichungen resultierenden NH_3 -Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management im Verhältnis zu NH_3 -Emissionen ohne Vergärung findet sich in Kapitel 3.4.4.2.4.

Die im Zusammenhang mit der Vergärung von Wirtschaftsdünger und dem Gärrestelager entstehenden Emissionen von NH_3 und NO (zu NO siehe Kapitel 3.3.4.4.2) führen zur Deposition von reaktivem Stickstoff, woraus N_2O aus dem Boden entsteht. Näheres dazu siehe in Kapitel 3.3.4.4.2.

Die Ausbringung von Wirtschaftsdünger-Gärresten führt zu N_2O -Emissionen aus dem Boden, deren Berechnung im Zusammenhang mit der Ausbringung von Wirtschaftsdünger in Kapitel 11.2 behandelt wird.

3.3.4.5 Emissions of particulate matter from animal husbandry / Partikelemissionen aus der Tierhaltung

This chapter deals with emissions of particulate matter from animal husbandry. Emissions of particulate matter from agricultural soils are addressed in Chapter 11.14.

Particulate matter is microscopic matter (solid or liquid) that is suspended in the Earth's atmosphere and can adversely affect human health. Emission reporting is required for three categories of particulate matter (see also EMEP (2013)-3D-35 und EMEP (2016)-3D-32):

- TSP (total suspended matter, aerodynamic diameter $\leq 57 \mu\text{m}$);
- PM₁₀ (particles that are respirable, with aerodynamic diameter of $\leq 10 \mu\text{m}$ or less);
- PM_{2.5} (particles that penetrate deeper into the lungs, with aerodynamic diameter of $\leq 2.5 \mu\text{m}$).

According to EMEP (2016)-3B-6 the main sources of PM emissions from animal husbandry are animal housings. The emissions originate mainly from feed, but also from bedding material, excretions, skin particles or feathers. Other sources cannot be accounted for in current emission reporting due to lack of information (EMEP (2016)-3B-15).

In EMEP (2016) only a Tier 1 methodology is provided for the calculation of PM emissions (EMEP (2016)-3B-15 und EMEP (2016)-3B-19). This methodology does not differentiate between slurry and solid manure systems.

Contrary to that the old Guidebook (EMEP (2013) described in Chapter 3.3 ("Tier 2 technology-specific approach") a methodology that extended the Tier 1 approach in order to enable the use of different emission factors for slurry and solid manure systems and was therefore used in the past German emission reporting (see RÖSEMANN et al., 2017):

Gegenstand dieses Kapitels sind Partikelemissionen aus der Tierhaltung. Partikelemissionen aus der Nutzung landwirtschaftlicher Böden werden in Kapitel 11.14 behandelt.

Bei zu den berichtenden Partikelemissionen geht es um mikroskopische Partikel (fest oder flüssig) in der irdischen Atmosphäre, die der menschlichen Gesundheit schaden können. Es interessieren drei Kategorien (siehe auch EMEP (2013)-3D-35 und EMEP (2016)-3D-32):

- TSP (total suspended matter, aerodynamischer Durchmesser $\leq 57 \mu\text{m}$);
- PM₁₀ (Partikel, die eingeatmet werden können; aerodynamischer Durchmesser $\leq 10 \mu\text{m}$);
- PM_{2.5} (Partikel, die tief in die Lunge eindringen können; aerodynamischer Durchmesser $\leq 2.5 \mu\text{m}$).

Nach EMEP (2016)-3B-6 werden Partikelemissionen aus der Tierhaltung vorrangig in Ställen generiert, und dort wiederum überwiegend aus Futter, aber auch aus Einstreu, Ausscheidungen und Hautschuppen bzw. Federbestandteilen. Andere Quellen können bei der Emissionsberechnung mangels Informationen derzeit nicht berücksichtigt werden (EMEP (2016)-3B-15).

EMEP (2016) gibt für Partikelemissionen nur ein Tier-1-Rechenverfahren vor (EMEP (2016)-3B-15 und EMEP (2016)-3B-19). Dieses Rechenverfahren differenziert nicht nach Flüssigmist- und Festmistverfahren.

Dagegen wurde im Vorläufer-Guidebook EMEP (2013) in Kapitel 3.3 ("Tier 2 technology-specific approach") ein Rechenverfahren angegeben, das über den Tier-1-Ansatz hinausgehend bei Rindern und Schweinen eine Differenzierung nach Flüssigmist und Festmistverfahren ermöglichte, und deshalb auch in der bisherigen deutschen Berichterstattung (siehe RÖSEMANN et al., 2017) angewendet wurde:

$$E_{\text{PM},i} = n_i \cdot x_{\text{house},i} \cdot \beta \cdot [x_{\text{slurry},i} \cdot EF_{\text{slurry},i} + (1 - x_{\text{slurry},i}) \cdot EF_{\text{solid},i}] \quad (3.84)$$

$E_{\text{PM},i}$	TSP, PM ₁₀ or PM _{2.5} emission for animal category i (in Gg a ⁻¹)
n_i	number of animal places for animal category i (in pl)
$x_{\text{house},i}$	share of time the animals spend in the house (in a a ⁻¹)
β	mass units conversion factor ($\beta = 10^{-6}$ Gg kg ⁻¹)
$x_{\text{slurry},i}$	share of population kept in slurry based systems (in pl pl ⁻¹)
$EF_{\text{slurry},i}$	emission factor for slurry based system (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
$EF_{\text{solid},i}$	emission factor for solid manure system (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)

In spite of providing only a Tier 1 methodology, EMEP (2016) in case of cattle still gives emissions factors for particulate matter emissions that differentiate between slurry and solid manure systems (EMEP (2016)-3B-53 with TSP = ID). Hence Equation (3.84) continues to be used for cattle in the German emission inventory.

However, Equation (3.84) is also used for the other animal categories as for them it simply reduces to the EMEP (2016) Tier 1 approach provided in EMEP (2016)-3B-15. This happens for instance for all animals that are kept only in solid manure systems: Then the parameter

Obwohl, wie oben erwähnt, EMEP (2016) nur ein Tier-1-Rechenverfahren bereitstellt, werden für Rinder weiterhin Partikelemissionsfaktoren angegeben, die die Differenzierung nach Flüssigmist- und Festmistverfahren erlauben (EMEP (2016)-3B-53 mit TSP = ID). Daher wird Gleichung (3.84) im deutschen Inventar für Rinder weiterhin angewendet.

Gleichung (3.84) wird aber auch für alle anderen Tierkategorien weiterhin angewendet. Dabei reduziert sich die Gleichung für alle Tiere, die nur in Festmistverfahren gehalten werden (Kälber, Schafe, Ziegen, Pferde,

x_{slurry} is zero so that no emission factor is needed for slurry systems.

Other than for cattle EMEP (2016) does not provide differentiated emission factors for slurry and solid manure systems, but only overall Tier 1 emission factors (EMEP (2016)-3B-19, Table 3.5). Equation (3.84) effectively reduces to the Tier 1 approach by using those Tier 1 emission factors both for slurry and solid manure systems (which means for TSP that $EF_{\text{slurry, TSP}} = EF_{\text{solid, TSP}} = EF_{\text{Tier 1, TSP}}$, and the same for PM_{10} and $PM_{2.5}$).

The emission factors for TSP, PM_{10} and $PM_{2.5}$ used in the German inventory for the different animal categories are given in the respective animal sub-chapters 4 to 8.

EMEP (2016), like EMEP (2013), does not quantify the uncertainties of the emission factors. EMEP(2009)-4B-66 ff estimates the range of uncertainty (95 % confidence interval) of the EMEP (2009) emission factors by a factor of 3 (rounded data). Due to lack of better information this uncertainty estimate is assumed to hold also for the EMEP (2016)/EMEP (2013) methodology. Hence, the difference between the lower boundary of the 95 % confidence interval and the mean emission factor is 67 % of the mean emission factor, while the difference between the upper boundary and the mean emission factor is 200 % of the mean emission factor. This means an asymmetric distribution (lognormal).

The inventory calculation procedure takes into account the mitigation of PM emissions from housing by a scrubber system. The methodology described for NH_3 in Chapter 3.3.4.3.3 is applied by analogy. KTBL made an inquiry on the frequency of air scrubbers in pig production (sows, weaners and fatteners) for all German rural districts (see Chapter 3.4.5.2).

3.3.5 Digestion of energy crops and management of the digestate / Vergärung von Energiepflanzen einschließlich Gärreste-Management

In terms of emission reporting, the anaerobic digestion of energy crops (including the spreading of the digestate) represents a separate source of emissions even if, due to the usual co-fermentation with animal manures, the basic data pool is the same like for the digestion of animal manures (see Chapter 3.4.4.1). The methodology for and the emissions from anaerobic digestion of energy crops are described in Chapter 10.

3.3.6 N_2O -Emissions from agricultural soils / N_2O -Emissionen aus der Nutzung landwirtschaftlicher Böden

Microbial transformations of N compounds (nitrification and denitrification) lead to emissions of N_2O . A distinction is made between direct and indirect N_2O emissions from soils. Direct emissions comprise N_2O emissions resulting from manure application, pasturing, application of mineral fertilizer and sewage sludge,

Geflügel), wegen $x_{\text{slurry}} = 0$ automatisch auf das Tier-1-Verfahren nach EMEP (2016)-3B-15.

Auch für Schweine reduziert sich Gleichung (3.84) auf ein Tier-1-Verfahren, da EMEP (2016) für Schweine anders als bei Rindern keine nach Festmist- und Flüssigmistverfahren differenzierten Partikelemissionsfaktoren bereitstellt. Stattdessen werden nur Tier-1-Emissionsfaktoren angegeben (EMEP (2016)-3B-19, Table 3.5), die unabhängig vom Verfahrenstyp eingesetzt werden (für TSP also $EF_{\text{slurry, TSP}} = EF_{\text{solid, TSP}} = EF_{\text{Tier 1, TSP}}$; analog für PM_{10} und $PM_{2.5}$).

Die im deutschen Inventar für die einzelnen Tierkategorien verwendeten Emissionsfaktoren für TSP, PM_{10} und $PM_{2.5}$ werden in den betreffenden Unterkapiteln der Tierkapitel 4 bis 8 angegeben.

EMEP (2016) macht wie EMEP (2013) keine quantitativen Angaben zur Unsicherheit der Emissionsfaktoren. EMEP(2009)-4B-66 ff schätzt die Unsicherheit (95 %-Konfidenzintervall) der EMEP (2009)-Emissionsfaktoren mit Faktor 3 (gerundet). Mangels besserer Informationen wird angenommen, dass dieses Unsicherheitsmaß auch für die EMEP (2016)/ EMEP (2013)-Methodik gilt. Demzufolge liegen zwischen dem mittleren Emissionsfaktor und der Untergrenze des 95 %-Konfidenzintervalles 67 % und zwischen mittlerem Emissionsfaktor und der Intervall-Obergrenze 200 % des mittleren Emissionsfaktors. Es liegt damit eine asymmetrische Verteilung vor (Lognormal-Verteilung).

Die Minderung von Partikelemissionen aus dem Stall durch Abluftreinigung wird im Inventar berücksichtigt. Dies erfolgt analog zur NH_3 -Methodik (siehe Kapitel 3.3.4.3.3). Durch KTBL wurde eine Erhebung zur Verteilung der Abluftreinigungsanlagen in der Schweinehaltung (Sauen, Ferkel, Mastschweine) auf Kreisebene durchgeführt (siehe Kapitel 3.4.5.2).

Die Vergärung von Energiepflanzen (incl. Ausbringung der Gärreste) ist für die Emissionsberichterstattung eine eigenständige Quelle, auch wenn die Datengrundlage wegen der in der Praxis vorherrschenden Ko-Fermentierung mit Wirtschaftsdünger für beide Substratkategorien gleich ist (siehe Kapitel 3.4.4.1). Methodik und Emissionsergebnisse für die Vergärung von Energiepflanzen werden in Kapitel 10 beschrieben.

Mikrobielle Umsetzungen (Nitrifikation und Denitrifikation) von N-Verbindungen führen zu N_2O -Emissionen. Es wird zwischen direkten und indirekten N_2O -Emissionen aus Böden unterschieden. Die direkten Emissionen umfassen die N_2O -Emissionen als Folge von Wirtschaftsdünger-Ausbringung, Weidegang, Mineraldünger-

biological N-fixation, crop residues and cultivation of organic soils. So-called indirect N_2O emissions result from deposition of reactive nitrogen and via leaching and surface runoff.

For the description of methodologies see Chapter 11 and 12.

3.3.7 Projections for 2020 / Projektionen für 2020

Since the 2009 emission reporting (DÄMMGEN et al., 2009a), projections have also been calculated. For this purpose, the same methods as for the rest of the emission calculation must be used. The input data for the projection calculations are based on the baseline projection of the agro-economic institutes of the Thünen Institute. The last baseline projection was prepared in 2018 for 2027 (OFFERMANN et al., 2018) and used for the 2019 emission reporting (RÖSEMANN et al., 2019). The 2020 emission reporting, on the other hand, would have to be based on the baseline projection for 2020 for 2029. Since this was not yet available at the time of the preparation of the present Thünen report, there are no projection calculations for the 2020 emission reporting.

und Klärschlamm-Anwendung, biologischer N-Fixierung, Ernterückständen und der Bewirtschaftung organischer Böden. So genannte indirekte N_2O -Emissionen ergeben sich als Folge von Deposition reaktiven Stickstoffs sowie Auswaschung und Oberflächenfluss.

Zur Berechnung siehe Kapitel 11 und 12.

Seit der Emissionsberichterstattung 2009 (DÄMMGEN et al., 2009a) werden auch Projektionen berechnet. Dazu sind die gleichen Methoden wie für die übrige Emissionsberechnung zu verwenden. Die Eingangsdaten für die Projektionenberechnung basieren auf der Baseline-Projektion der agrarökonomischen Institute des Thünen-Instituts. Die letzte Baseline-Projektion wurde 2018 für das Jahr 2027 erstellt (OFFERMANN et al., 2018) und für die Emissionsberichterstattung 2019 verwendet (RÖSEMANN et al., 2019). Der Emissionsberichterstattung 2020 müsste dagegen die Baseline-Projektion des Jahres 2020 für das Jahr 2029 zugrunde gelegt werden. Da diese bei Erstellung des vorliegenden Thünen-Reports noch nicht verfügbar war, entfällt die Projektionsberechnung für die Emissionsberichterstattung 2020.

3.4 Input data / Eingangsdaten

The data required for the application of the inventory model GAS-EM are model parameters and emission factors on the one hand and so-called input data on the other hand. Apart from emissions from agricultural soils, GAS-EM calculates emissions for single districts. At present, districts are used according to their division in 1996. In a second step these results are aggregated to yield data sets for single federal states and finally national data. Emissions from soils are calculated for federal states and then aggregated on national level.

For the description of animal husbandry, input data comprise animal numbers, frequency distributions of housing and storage facilities as well as application techniques and times before incorporation, feeding practices including diet composition and feed properties, animal performance data (milk yield, eggs produced, animal weight and weight gain, number of offspring) and information on the duration of grazing. Further data comprise number and properties of air scrubbing facilities.

Input data for the calculations of emissions from agricultural soils comprise the amounts of fertilizers applied (synthetic fertilizers, liming, animal manures, digestate of energy crops, sewage sludge), the areas of agricultural soils and the yields of agricultural crops.

Model parameters and emission factors are dealt with in detail in the sections Chapter 4 that describe the respective sources. For animal numbers see Chapter 3.4.2. The input data for the calculation of emissions from anaerobic digestion of energy crops are described in Chapter 10, the input data for emissions from agricultural soils can be found in Chapters 11 and 12. For all other GAS-EM input data see Chapters 3.4.3 to 3.4.5.

Chapter 3.4.6 contains details concerning data gap closure procedures and data uncertainties.

Die zum Betrieb des Inventarmodells GAS-EM erforderlichen Daten umfassen Modellparameter und Emissionsfaktoren einerseits und sogenannte Eingabedaten andererseits. GAS-EM berechnet außer für Böden die Emissionen zunächst auf Kreisebene (Stand der Kreiseinteilung: 1996), bevor sie zu Ergebnissen auf Bundesland- und nationaler Ebene aggregiert werden. Die Emissionen aus landwirtschaftlichen Böden werden auf Bundeslandebene berechnet und anschließend auf nationaler Ebene aggregiert.

Die Eingabedaten gliedern sich für die Nutztierhaltung in Tierzahlen, Häufigkeitsverteilungen zu Stall- und Lagerformen sowie Ausbringungsverfahren und Einarbeitungszeiten, in Angaben zu Fütterungsverfahren incl. Futterkennwerten, zu Leistungsdaten (Milchleistung, Legeleistung, Gewicht und Gewichtszunahme, Anzahl der Nachkommen) und zur Weidedauer. Ergänzende Daten werden zur Berücksichtigung von Abluftreinigungsanlagen benötigt.

Die Eingabedaten zur Berechnung von Emissionen aus landwirtschaftlich genutzten Böden umfassen die zur Ausbringung gebrachten Düngermengen (Mineraldünger, Kalkdünger, Wirtschaftsdünger, Gärreste von Energiepflanzen, Klärschlamm), die landwirtschaftlichen Flächen sowie Erträge der landwirtschaftlichen Kulturen.

Modellparameter und Emissionsfaktoren werden in den Emissionsquellenbeschreibungen ab Kapitel 4 beschrieben. Zu den Tierzahlen siehe Kapitel 3.4.2. Eingabedaten zur Berechnung der Emissionen aus der Vergärung von Energiepflanzen werden in Kapitel 10 beschrieben, für die Emissionen aus landwirtschaftlichen Böden in Kapitel 11 und 12. Die übrigen GAS-EM-Eingabedaten werden in den nachfolgenden Kapiteln 3.4.3 bis 3.4.5 beschrieben.

Hinweise zu Datenlückenschließung und Datenunsicherheit finden sich in Kapitel 3.4.6.

3.4.1 Referencing formats for Official German Statistics / Zitierweise für deutsche Officialstatistiken

Data available from official German statistics are characterised by their editor (Statistisches Bundesamt, StatBA, the respective Statistische Landesämter, StatLA), their technical report series (Fachserie, FS) and their sub-series (Reihe, R) according to the nomenclature of Statistisches Bundesamt (e.g. StatBA FS3 R3.2.1). For details of these sources see the list of references.

Bei Datensätzen aus der deutschen Officialstatistik werden die Herausgeber aufgeführt (Statistisches Bundesamt, StatBA, die jeweiligen Statistischen Landesämter, StatLA), deren Fachserie (FS) und Reihe (R) in der Form, wie sie beim Statistischen Bundesamt üblich ist (Beispiel: StatBA FS3 R3.2.1). Details dieser Quellen finden sich in üblicher Weise im Literaturverzeichnis.

3.4.2 Animal numbers / Tierzahlen

The German inventory uses a time step of one year as there is no data available to allow for a more differentiated description. This is especially of concern for the animal numbers. Hence it is necessary to assume the animal numbers counted at a certain reference date to be constant throughout the year. This assumption is consistent with the IPCC definition of mean animal places that are used 365 days a year ("AAP", see Chapter 3.1.2.2).

Das deutsche Inventar rechnet mit einem Zeitschritt von einem Jahr, weil i. d. R. keine Daten für eine zeitlich differenziertere Beschreibung verfügbar sind. Dies trifft insbesondere auf die Tierzahlen zu. Das Inventar kommt daher nicht umhin, die zu einem bestimmten Stichtag erhobenen Tierzahlen als konstant für das ganze Jahr anzunehmen. Diese Annahme ist konsistent mit der Definition des mittleren, das ganze Jahr über besetzten Tierplatzes nach IPCC („AAP“, siehe Kapitel 3.1.2.2).

The animal numbers used in the inventory are dealt with in detail in subsequent chapters (Chapter 4 onwards). In the following, a description of the origin of these data is provided (Chapter 3.4.2.1). Chapter 3.4.2.2 gives a description of the data finally used in the inventory. Finally, a comparison is made between FAOSTAT animal numbers and German figures (Chapter 3.4.2.3).

3.4.2.1 *Official surveys / Offizielle Erhebungen*

The Federal Statistical Office and the Statistical Agencies of the federal states carry out agricultural structure surveys¹⁷ in order to collect, along with other data, the head counts of cattle, pigs, sheep, horses (from 2010 onwards: equids) and poultry. These agricultural structure surveys took place every other year for the years 1990 – 1996 and 1999 – 2007, in the year 2010 in the context of the more comprehensive 2010 agricultural census (LZ 2010)¹⁸, and 2013 and 2016.

The Surveys 1990, 1994 and 1996 referenced to 3 December, while the surveys 1999 – 2007 referenced to 3 May. The surveys 2010, 2013 and 2016 referenced to 1 March.

In addition to the agricultural structure surveys, annual animal head count censuses are carried out (STATBA FS3 R4.1). Up to and including 1998 these censuses took place every six months for cattle and sheep (June, December), every four months for pigs (April, August, December), and in even years in December for all animal categories, i. e. also for horses and poultry. Reference day was always the third day of the respective month. Since 1999 the animal head count censuses for cattle and pigs take place two times a year: 3 May and 3 November. For sheep the reference day was 3 May in 1999 – 2009, 3 November in 2010, and 1 March in subsequent years.

For cattle, pigs, and sheep official animal numbers are available for all years since 1990. This means that the inventories up to and including 1998 used the data collected in December (in June for sheep), while afterwards the inventories up to and including 2010 used the data from May (sheep: 1 March 2010 as no data were available in May or November). According to the Federal Statistical Office the animal numbers for the inventories from 2011 onwards have to be referenced to November. These figures are in keeping with the figures the Federal Statistical Office has provided to EUROSTAT. The change in the reference date (to 3 November) does not significantly affect the population figures of cattle and swine. Among the figures for sheep, livestock-population figures had to be corrected; cf. Chapter 6.1.1.1.

The numbers of goats in Germany were not surveyed between 1977 and 2010. Until 2004, the Federal Minis-

Auf die dem Inventar zugrunde liegenden Tierplatzzahlen wird in den nachfolgenden Tierkapiteln (ab Kapitel 4) eingegangen. Im Folgenden wird eine Übersicht über die Datenquellen gegeben (Kapitel 3.4.2.1). Kapitel 3.4.2.2 gibt eine Beschreibung der schließlich im Inventar verwendeten Daten. Abschließend erfolgt ein Vergleich zwischen FAOSTAT-Tierzahlen und deutschen Zahlen (Kapitel 3.4.2.3).

Das Statistische Bundesamt und die Statistischen Landesämter führen Agrarstrukturhebungen¹⁷ durch, bei denen zusammen mit anderen Daten die Tierzahlen für Rinder, Schweine, Schafe, Pferde (ab 2010: Equiden) und Geflügel erfasst werden. Diese Agrarstrukturhebungen fanden 1990 - 1996 und 1999 - 2007 jedes zweite Jahr statt, danach 2010 im Rahmen der umfangreicheren Landwirtschaftszählung 2010 (LZ 2010)¹⁸ sowie 2013 und 2016.

Die Erhebungen 1990, 1992, 1994 und 1996 erfolgten am 3. Dezember, während der Stichtag in den Jahren 1999 - 2007 am 3. Mai und in den Jahren 2010, 2013 und 2016 am 1. März war.

Neben den Agrarstrukturhebungen finden jährlich Viehbestandserhebungen statt (STATBA FS3 R4.1). Bis 1998 einschließlich erfolgten diese Erhebungen halbjährlich für Rinder und Schafe (Juni, Dezember), viermonatlich für Schweine (April, August, Dezember), sowie alle zwei Jahre im Dezember der geraden Jahre für alle Tierarten, d. h. auch für Pferde und Geflügel. Stichtag war jeweils der dritte Kalendertag im Monat. Seit 1999 erfolgt die Viehbestandserhebung für Rinder und Schweine zweimal jährlich zum Stichtag 3. Mai und 3. November. Für Schafe gilt 1999 bis 2009 der Stichtag 3. Mai und ab 2011 der 3. November, während 2010 die Erhebung am 1. März erfolgte.

Für Rinder, Schweine und Schafe liegen somit für alle Jahre seit 1990 Tierzahlen aus offiziellen Erhebungen vor. Dabei wurden im Inventar bis 1998 einschließlich die Daten von Dezember (für Schafe im Juni) und danach bis 2010 einschließlich die Daten von Mai verwendet (Schafe: 1. März 2010, da weder Mai- noch November-Daten verfügbar waren), während in Absprache mit dem Statistischen Bundesamt ab 2011 der November-Stichtag zu verwenden ist. Diese Zahlen entsprechen den vom Statistischen Bundesamt an EUROSTAT übermittelten Zahlen. Der Wechsel des Stichtages zum 3. November hat bei Rindern und Schweinen keinen signifikanten Einfluss auf die Tierzahlen. Bei den Schafzahlen erwies sich dagegen eine Tierzahlkorrektur als erforderlich, siehe Kapitel 6.1.1.1.

Die Anzahl der Ziegen in Deutschland wurde zwischen den Jahren 1977 und 2010 nicht erfasst. Bis 2004

¹⁷ <https://www.destatis.de/Migration/DE/ZahlenFakten/Wirtschaftsbereiche/LandForstwirtschaftFischerei/Agrarstrukturhebung2016/Agrarstrukturhebung2016.html;jsessionid=EAB8F1AF6D6DD78AC06FA516B912A52D.internet741>

¹⁸ <https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Wirtschaftsbereiche/LandForstwirtschaft/Landwirtschaftszaehlung2010/Ergebnisse.html>

try of Food and Agriculture (BMEL) estimated goat populations at the national level. As of 2005, the pertinent time series was continued via estimation by the Federal Statistical Office. In 2010, the total number of goats was officially determined for the first time (reference day: 1 March), in the framework of the 2010 agricultural census (LZ 2010). That figure is considerably lower than the estimates used for earlier years. By agreement with the Federal Statistical Office, those estimates, which are also reported to EUROSTAT, continue to be used in the inventory. For 2013 and 2016 the Federal Statistical Office provided goat-population figures (reference day: 1 March).

For horses/equids, and for poultry, population figures are available only at intervals of two to three years, from agricultural structure surveys (reference dates: 1990 - 1998, 3 December; 1999 - 2007, 3 May; 2010, 2013 and 2016, 1 March). By agreement with the Federal Statistical Office, the population figures have not been adjusted to take account for the variations in reference dates.

In previous surveys (in 2010 for the last time) significant numbers of poultry had not been counted as they were held by companies that did not need to report poultry numbers. Hence, the rules of poultry counting were adjusted for the 2013 survey. As a consequence, the official 2013 poultry numbers are much higher than to be expected after the trend in earlier years. As the Federal Statistical Office do not intend to correct poultry numbers of earlier years, the poultry numbers used in the inventory exhibit a steep upward trend between 2010 and 2013. This trend does not reflect any real development in poultry numbers due to the different numbers of animals collected for 2010 and 2013. The increase in poultry numbers from 2013 to 2016 is significantly flatter.

For the calculation of the inventory, data gaps had to be closed and the given figures of animal places had partly to be modified to meet the requirements of emission reporting. This is discussed in Chapter 3.4.2.2, along with the way of how buffalo, asses and mules are accounted for.

3.4.2.2 *Data used in the inventory / Im Inventar verwendete Daten*

Since the calendar year 2008, cattle head counts have been taken from a special database ("origin-tracing and information system for animals" HIT - Herkunftssicherungs- und Informationssystem für Tiere; <http://www.hi-tier.de>) in which every animal is registered. This leads to systematically higher animal head counts result for years from 2008 onwards as in the years before not all animals had been counted due to survey thresholds. A comparison carried out by the Federal Statistical Office for 2007 reveals that the cattle head counts shown in HIT are 2.9 % higher than those resulting via the conventional survey method (for dairy cows alone, the head counts are 2.8 % higher). Pursuant to the Federal Statistical Office, it is not possible to esti-

schätzte das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) die Ziegenzahlen auf nationaler Ebene. Diese Zeitreihe wurde ab 2005 durch Schätzungen des Statistischen Bundesamtes ergänzt. Die 2010 im Rahmen der Landwirtschaftszählung 2010 (LZ 2010) erstmalig wieder offiziell erfasste Gesamtzahl der Ziegen (Stichtag 1. März) liegt deutlich unter den Schätzungen der Vorjahre. Diese Schätzungen, die auch an EUROSTAT berichtet wurden, werden nach Abstimmung mit dem Statistischen Bundesamt weiter im Inventar verwendet. Für 2013 und 2016 liegen offizielle Ziegenzahlen des Statistischen Bundesamtes vor (Stichtag 1. März).

Für Pferde bzw. Equiden und Geflügel sind Tierzahlen nur alle zwei bis drei Jahre aus den Agrarstrukturerhebungen verfügbar (Stichtage: bis 1998 einschließlich 3. Dezember, 1999 - 2007 der 3. Mai, sowie der 1. März in den Jahren 2010, 2013 und 2016). Es erfolgten in Absprache mit dem Statistischen Bundesamt keine Tierzahlkorrekturen wegen der variierenden Stichtage.

Der Erhebung der Geflügelzahlen 2013 durch das Statistische Bundesamt und die Statistischen Landesämter lag eine Berichtskreisrevision zugrunde. Diese war erforderlich geworden, da in den Erhebungen zuvor (letztmalig 2010) aufgrund der seinerzeitigen Regeln zur Auswahl der zu befragenden Betriebe größere Geflügelbestände nicht erfasst wurden. Die 2013 erhobenen Geflügelzahlen sind damit deutlich höher, als dies aufgrund der Erhebungen in den Jahren zuvor zu erwarten war. Da das Statistische Bundesamt die offiziellen Geflügelzahlen der Vorjahre bis 2010 nicht korrigiert, weisen die im Inventar verwendeten Geflügelzahlen zwischen 2010 und 2013 einen markanten Anstieg auf. Dieser Trend spiegelt wegen der für 2010 und 2013 unterschiedlich erhobenen Tierzahlen keine reale Entwicklung der Geflügelzahlen wieder. Der Anstieg der Geflügelzahlen von 2013 bis 2016 ist erheblich flacher.

Für die Inventarberechnung mussten die Datenlücken geschlossen und die verfügbaren Tierplatzzahlen teilweise modifiziert werden, um den Erfordernissen der Emissionsberichterstattung zu entsprechen. Hierauf sowie auf Berücksichtigung von Büffeln, Eseln und Maultieren geht Kapitel 3.4.2.2 ein.

Die Rinderbestände werden seit dem Kalenderjahr 2008 aus einer speziellen Datenbank (HIT, Herkunftssicherungs- und Informationssystem für Tiere, <http://www.hi-tier.de>) entnommen, in der jedes Tier registriert ist. Als Folge der neuen Erhebungsmethode ergeben sich für die Jahre ab 2008 allerdings systematisch höhere Tierzahlen als in den Jahren zuvor, in denen aufgrund von Erfassungsgrenzen nicht alle Tiere berücksichtigt wurden. Ein Vergleich des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2007 zeigt, dass die Rinderzahlen aus HIT 2,9 % höher als nach der herkömmlichen Erhebungsmethode sind (für Milchkühe allein 2,8 %). Da es laut Statistischem Bundesamt nicht möglich ist, diese Abweichung für die zurückliegenden Jahre zu schätzen,

mate the discrepancy for earlier years. Consequently, the cattle time series for 1990 to 2007 have not been adjusted. As a result, emissions from cattle husbandry are slightly underestimated for 1990 to 2007.

In order to obtain homogeneous animal categories, some of the cattle categories used in the official survey have been modified for the inventory.

As of the time-series year 2013, the cattle population data provided by the Federal Statistical Office also include bison and buffalo, although the applicable buffalo numbers cannot be extracted from such aggregate cattle data. As a result, as of the time-series year 2013 the buffalo emissions are included in the cattle emissions. Consequently, as of the 2015 submission buffalo are no longer treated as a separate category in the inventory. The emissions produced by buffalo in the time-series years 1990 through 2012 are taken into account in the inventory by adding the buffalo populations to the numbers of suckler cows. For further details see chapter 4.1.1.2.

For pigs as well, several of the categories used in official surveys have been modified with a view to obtaining maximally homogeneous animal categories. The official animal counts for piglets weighing up to 20 kg animal⁻¹, and for young pigs and fattening pigs weighing at least 20 kg animal⁻¹, have been converted, using the procedure described in HAENEL et al. (2011), into animal counts for the inventory categories "weaners" and "fattening pigs". This transformation of animal numbers has no impact on the total number of pigs. However, as the transformation algorithm uses animal weights, modifications of animal weights can lead to certain animal number trade-offs between the two categories "weaners" and "fattening pigs". However, for purposes of emission calculation, the number of piglets weighing up to 8 kg is deducted from that total number. This is done for the reason that piglets weighing up to 8 kg are considered suckling piglets that, with regard to their emissions, are implicitly included in emission calculations for sows.

The official population numbers for sheep were been corrected for all years as of 2010 in order to take account of the change in the relevant survey date from spring (until 2009, May/June) to 1 March (2010) and to 3 November (since 2011). The correction compensates for the apparent reduction in the number of lambs that this change entails (as well as the corresponding reduction in the total number of sheep), see Chapter 6.1.1.1.

The official goat-population figures available for 2010, 2013 and 2016 were used to estimate the missing data for 2011, 2012, 2014 and 2015 by linear interpolation. The animal numbers for 2017 and 2018 were estimated by extrapolating the trend between 2013 and 2016.

In the inventory, horse numbers are subdivided into the two categories "heavy horses" and "light horses and ponies", to take account of the differences in emissions behaviour between the two categories. In the 2010 agricultural census and the agricultural-structure surveys 2013 and 2016 numbers of equids, rather than numbers

wurden die Rinder-Zeitreihen von 1990 bis 2007 nicht angepasst. Als Folge werden die Emissionen aus der Rinderhaltung in den Jahren 1990 bis 2007 leicht unterschätzt.

Um möglichst homogene Tierkategorien zu bilden, wurden einige der in den amtlichen Erhebungen verwendeten Rinderkategorien für das Inventar modifiziert.

Ab dem Zeitreihenjahr 2013 umfassen die vom Statistischen Bundesamt bereitgestellten Rinderzahlen auch Bisons und Büffel, ohne dass die Büffel aus diesen Zahlen herausgerechnet werden könnten. Da auf diese Weise ab dem Zeitreihenjahr 2013 die Emissionen der Büffel in den Emissionen der Rinder enthalten sind, werden Büffel im Inventar seit Submission 2015 nicht mehr als eigenständige Kategorie behandelt. Die in den Zeitreihenjahren 1990 bis 2012 von den Büffeln ausgehenden Emissionen werden im Inventar dadurch berücksichtigt, dass die Büffelnzahl in diesen Jahren der Mutterkuhzahl zugeschlagen wird. Für weitere Details wird auf Kapitel 4.1.1.2 verwiesen.

Auch bei den Schweinen wurden einige der in den amtlichen Erhebungen verwendeten Kategorien modifiziert, um möglichst homogene Tierkategorien zu bilden. Die offiziellen Tierzahlen für Ferkel bis 20 kg Tier⁻¹ sowie Jung- und Mastschweine ab 20 kg Tier⁻¹ werden nach dem in HAENEL et al. (2011) beschriebenen Verfahren zu Tierzahlen für die Inventarkategorien „Aufzuchtferkel“ und „Mastschweine“ umgerechnet. Diese Umrechnung beruht u. a. auf Gewichtsdaten, so dass deren Aktualisierung zu einer gewissen Verschiebung der Tierzahlen zwischen den beiden Kategorien „Aufzuchtferkel“ und „Mastschweine“ führen kann. Die Tierzahlumrechnung bleibt aber ohne Auswirkung auf die Gesamtzahl der Schweine. Letztere wird für die Emissionsberechnung allerdings um die Zahl der Ferkel verringert, die bis 8 kg wiegen. Dieses Vorgehen beruht auf dem Inventarkonzept, dass Ferkel bis 8 kg als Saugferkel zu werten sind, deren Emissionen implizit bei den Sauen mitgerechnet werden, siehe Kapitel 5.1 und 5.3.

Bei den Schafen werden für alle Jahre ab 2010 die amtlichen Schafzahlen korrigiert. Grund ist der Wechsel des Erhebungstermins vom Frühjahr (bis 2009 Mai bzw. Juni) zum 1. März (2010) bzw. zum 3. November (seit 2011). Die mit diesem Wechsel verbundene scheinbare Abnahme der Lämmer (und damit der Schafe-Gesamtzahl) wird durch die Korrektur ausgeglichen (siehe Kapitel 6.1.1.1).

Die amtlichen Ziegenzahlen für 2010, 2013 und 2016 wurden dazu verwendet, die nicht verfügbaren Zahlen von 2011, 2012, 2014 und 2015 durch lineare Interpolation zu berechnen. Die Tierzahlen für 2017 und 2018 wurden durch Extrapolation des Trends zwischen 2013 und 2016 geschätzt.

Die Pferdezahlen werden im Inventar zur Berücksichtigung unterschiedlichen Emissionsverhaltens in „Großpferde“ und „Kleinpferde und Ponys“ unterteilt. In der Landwirtschaftszählung 2010 sowie den Zählungen 2013 und 2016 wurden statt Pferdezahlen Equidenzahlen erhoben. Deren Zahl schließt in nicht separierbarer

of horses, were counted. The equid figures inseparable include the counts for mules and asses. Hence, as of the 2015 submission, the inventory no longer includes "mules and asses" as a separate category; until the year 2009, the counts for mules and asses were added to the counts for light horses and ponies. In keeping with data of the INTERESSENGEMEINSCHAFT FÜR ESEL UND MAULTIERE (Interest association for mules and asses – IGEM)(personal communication, Bernd Schmutz, 28 Sept 2009) the applicable number for mules and asses has been estimated at 8,500 mules and asses. Data gaps within the time series of the animal numbers are closed by linear using interpolation. The animal numbers for 2017 and 2018 were estimated by extrapolating the trend between 2013 and 2016.

In official surveys including 2007, pullets up to the age of six months were counted, although in common husbandry practice pullets are considered laying hens when they complete their 18th week of life. For the inventory, therefore, a fraction of the pullets was shifted into the laying-hen category up to and including the year 2007. At the same time, the total sum of pullets and laying hens was not changed. The next official survey after 2007 took place in 2010. As of this survey the animal number shifting between both categories is no longer needed as the animals are now counted according to husbandry practice.

For all poultry categories the data gaps in the time series were closed by linear interpolation. For 2017 and 2018, the 2016 figures have been maintained, as extrapolation of trends between 2013 and 2016 would have led, at least in part, to implausible (partly negative) animal numbers in 2017 and 2018. For laying hens, the figures for 2017 and 2018 were estimated on the basis of the 2016 figures and the trends of the data published by the Federal Statistical Office on numbers of housing places (StatBA, FS 3, R 4.2.3).

In the inventory, the official data for turkeys were broken down by the categories "turkeys, males" and "turkeys, females", for all years since 1990, to take account of the differences in emissions behaviour.

Table 3.9 shows the data gaps left by official animal number since 1990 and names the methods used for data gaps closure.

Weise Esel und Maultiere ein (included elsewhere, IE). Seit Submission 2015 entfällt daher im Inventar die separate Kategorie „Esel und Maultiere“. Die Zahl der Esel- und Maultiere wurde bis zum Jahr 2009 zu der Zahl der Kleinpferde und Ponys addiert. Diese Zahl wurde nach Daten der INTERESSENGEMEINSCHAFT FÜR ESEL UND MAULTIERE (IGEM) (persönliche Mitteilung, Bernd Schmutz, 28.09.2009) auf 8.500 Esel und Maultiere pro Jahr geschätzt. Datenlücken innerhalb der Zeitreihen der Tierzahlen in den Kategorien in „Großpferde“ und „Kleinpferde und Ponys“ wurden durch lineare Interpolation geschlossen. Die Tierzahlen für 2017 und 2018 wurden durch Extrapolation des Trends zwischen 2013 und 2016 geschätzt.

Junghennen wurden bis 2007 entgegen der Haltingspraxis (Aufstallung als Legehennen bereits nach der 18. Woche, wie es im Inventar auch berücksichtigt ist) offiziell bis zu einem Alter von 6 Monaten gezählt. Daher wurde für das Inventar bis 2007 einschließlich ein Teil der Junghennen in die Legehennen-Kategorie verschoben, wobei die Gesamtsumme aus Jung- und Legehennen nicht verändert wurde. Die nächste Geflügelzählung nach 2007 fand 2010 statt. Ab dieser Zählung entfällt die Umrechnung zwischen Junghennen und Legehennen, da die Tierzahlen entsprechend der Haltingspraxis erhoben wurden.

Für alle Geflügelkategorien wurden die Lücken in den Tierzahlzeitreihen durch lineare Interpolation geschlossen. Außer bei den Legehennen wurden für 2017 und 2018 die Werte von 2016 beibehalten, weil eine Extrapolation der Trends zwischen 2013 und 2016 in manchen Fällen zu unplausibel hohen oder niedrigen (teilweise negativen) Tierzahlen für 2017 und 2018 geführt hätte. Bei Legehennen wurden die Zahlen für 2017 und 2018 auf Grundlage der 2016er Zahlen und der Trends der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlen der Haltingsplätze (StatBA, FS 3, R 4.2.3) geschätzt.

Die offiziell erhobenen Putenzahlen wurden im Inventar zur Berücksichtigung unterschiedlichen Emissionsverhaltens für alle Jahre seit 1990 in Hähne und Hennen aufgeteilt.

Table 3.9 zeigt die Datenlücken, die ab 1990 bei den offiziellen Zählungen entstanden, sowie die zu ihrer Schließung verwendeten Methoden.

Table 3.9: Reference dates of the surveys and methods of data gap filling used in the inventory

	cattle, pigs	sheep	horses, poultry	goats
1990	3 Dec	3 June	3 Dec	annual estimates by BMELV
1991			interpolation	
1992			3 Dec	
1993			interpolation	
1994			3 Dec	
1995			interpolation	
1996			3 Dec	
1997			interpolation	
1998	3 May	3 May	3 May	annual estimates by Federal Statistical Office
1999			interpolation	
2000			3 May	
2001			interpolation	
2002			3 May	
2003			interpolation	
2004			3 May	
2005			interpolation	
2006			3 May	
2007			interpolation	
2008			3 May	
2009			interpolation	
2010	3 Nov	1 March (numbers corrected)	1 March	1 March
2011		3 Nov (numbers corrected)	interpolation	interpolation
2012			1 March	1 March
2013			interpolation	interpolation
2014			1 March	1 March
2015			extrapolation	extrapolation
2016			extrapolation	extrapolation
2017				
2018				

Table 3.10 summarizes the resulting time series of national numbers of animal places. The animal numbers of the various subcategories covering other cattle, pigs and poultry can be found in the data collection provided with this report (see Chapter 2.4) on sheet „AC_1005“).

In Table 3.10 finden sich die resultierenden nationalen Tierplatzzahlen. Die Zahlen der Unterkategorien bei den übrigen Rinder, den Schweinen und beim Geflügel finden sich in der beiliegenden Datensammlung (siehe Kapitel 2.4) auf dem Tabellenblatt „AC_1005“.

Table 3.10: Number of animal places in the German emission inventory (in 1000, cattle including buffalo, horses including mules and asses)

	dairy cows	other cattle	pigs	sheep	goats	horses	poultry
1990	6.355	13.133	26.502	3.266	90	499	113.879
1991	5.632	11.502	22.183	3.250	86	519	108.770
1992	5.365	10.842	22.618	2.999	90	539	103.662
1993	5.301	10.596	22.238	3.001	92	573	106.805
1994	5.273	10.689	21.148	2.882	95	607	109.948
1995	5.229	10.661	20.387	2.991	100	634	111.228
1996	5.195	10.565	20.809	2.953	105	661	112.507
1997	5.026	10.201	21.248	2.885	115	602	114.439
1998	4.833	10.110	22.500	2.869	125	543	116.371
1999	4.765	10.131	22.138	2.724	135	484	118.303
2000	4.570	9.969	21.768	2.743	140	500	120.180
2001	4.549	10.055	21.792	2.771	160	515	122.056
2002	4.427	9.561	22.110	2.722	160	524	122.732
2003	4.372	9.273	22.365	2.697	160	533	123.408
2004	4.285	8.912	21.758	2.714	160	521	121.984
2005	4.236	8.800	22.743	2.643	170	508	120.560
2006	4.082	8.668	22.418	2.561	180	529	124.512
2007	4.071	8.617	22.985	2.538	180	550	128.463
2008	4.218	8.754	22.678	2.437	190	521	128.608
2009	4.205	8.742	23.022	2.350	220	491	128.754
2010	4.183	8.629	22.244	2.245	150	462	128.900
2011	4.190	8.340	22.788	1.980	143	462	145.044
2012	4.190	8.319	23.648	1.966	137	461	161.189
2013	4.268	8.418	23.391	1.877	130	461	177.333
2014	4.296	8.447	23.667	1.892	133	455	176.080
2015	4.285	8.351	22.979	1.867	136	448	174.827
2016	4.218	8.249	22.761	1.851	139	442	173.574
2017	4.199	8.082	22.921	1.863	142	436	174.163
2018	4.101	7.848	22.019	1.846	145	429	175.200

3.4.2.3 Comparison with livestock-population figures of the FAO / Vergleich mit Tierzahlen der FAO

The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) publishes worldwide animal numbers in its internet database FAOSTAT¹⁹. The German data in FAOSTAT basically come from the Federal Statistical Office in Germany, the data source that is also the basis for the German inventory. However, for cattle, pigs, sheep, goats, horses and poultry, the comparison of FAOSTAT data (looked up 19 June 2019: time series 1990 - 2017) and the data used in the 2020 submission shows numerous deviations: between 1990 and 2017 only about 14 % of the FAOSTAT data is consistent with the German data (even though animal numbers rounded to 100 animals are taken into account).

The main reasons for the sometimes big differences between FAOSTAT and the German data are mainly entries in FAOSTAT under false years and an seemingly unsystematic FAOSTAT approach to the closure of data gaps.

In the following the main findings of the data comparison are listed.

Cattle (including buffalo): The FAOSTAT animal numbers only agree with the official German data in the years 2014 - 2017. Before the year 2000, the FAOSTAT

Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) veröffentlicht weltweite Tierzahlen in ihrer Internetdatenbank FAOSTAT¹⁹. Die deutschen Daten in FAOSTAT stammen grundsätzlich vom Statistischen Bundesamt in Deutschland, der Datenquelle, die auch Grundlage für das deutsche Inventar ist. Dennoch ergibt für Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Pferde und Geflügel der Vergleich der Daten von FAOSTAT (Stand 19.06.2019: Zeitreihe 1990 - 2017) und der in Submission 2020 verwendeten Daten zahlreiche Abweichungen: Zwischen 1990 und 2017 stimmen nur rund 14 % der FAOSTAT-Angaben mit den deutschen Daten überein (wenn dabei auch auf ganze 100 Tiere gerundete Zahlen berücksichtigt werden).

Hauptgründe für die zum Teil großen Unterschiede zwischen FAOSTAT und den deutschen Daten sind vor allem Einträge in FAOSTAT unter falschen Jahren und eine unsystematisch erscheinende Vorgehensweise von FAOSTAT bei der Schließung von Datenlücken.

Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse des Datenvergleichs aufgelistet.

Rinder (incl. Büffel): Die FAOSTAT-Tierzahlen stimmen nur in den Jahren 2014 – 2017 mit den offiziellen deutschen Daten überein. Vor dem Jahr 2000 sind die

¹⁹ FAOSTAT <http://faostat3.fao.org>

figures are shifted by one year compared to the German figures. For example, the German cattle number of 1998 is found in FAOSTAT under 1999. In the years 2011 – 2013 FAOSTAT contains the data of the May census, while the inventory uses the data of the November census as required by EU regulations (see Chapter 3.4.2.1).

Pigs: The FAOSTAT numbers of pigs are generally not to be compared with the number of pigs in the inventory, because in the inventory, for methodological reasons, the number of suckling piglets (i. e. piglets weighing less than 8 kg) is subtracted, see Chapter 3.4.2.2. If one compares the FAOSTAT numbers with the pig numbers of the Federal Statistical Office before deduction of the suckling pigs, then, as with the cattle in the FAOSTAT numbers before 2000, there is a misalignment of one year. Except for the years 2011–2013, when the FAOSTAT numbers are the numbers of the May census (while the inventory uses data from the November census according to EU regulations, see Chapter 3.4.2.1), there is high agreement between the animal numbers; however, a match can be found only for the years 2001 – 2003 and 2007 – 2009 (taking into account the rounding to 100 animals).

Sheep: In the years 1991, 1993 – 2000 and 2005 – 2009 the FAOSTAT figures are very similar to the data of the German Federal Statistical Office; however, a match is only available for the years 2007 – 2009 (taking into account the rounding to 100 animals). In the years 1990 – 1992, 1993 and 2001 – 2004 there are, to some extent, larger deviations that can not be explained with available information. As of 2010, a comparison of the two time series is not possible, as the officially revised sheep numbers are corrected in the inventory (see Chapter 6.1.1.1).

Goats: The FAOSTAT goat numbers are offset by one year compared to the German figures for the years 1991 – 2002. For example, the FAOSTAT goat number of 1991 reflects the German goat number of 1990. For the years 1990, 2003, 2005, 2007, 2008, 2013 and 2016, the FAOSTAT figures are in line with the German figures. In the intervening years, when Germany did not collect or estimate any data, FAOSTAT states data which must be estimated, even though FAOSTAT says it is official data. These estimates are particularly implausible as of 2011, as they run counter to the trends estimated by linear interpolation between the years of known goat numbers.

Horses (including asses and mules): The FAOSTAT figures before 2010 are the pure horse numbers without asses and mules. The inventory numbers, on the other hand, also include asses and mules. Subtracting, for a comparison of FAOSTAT and inventory numbers, the asses and mules (see chapter 3.4.2.2) from the inventory numbers, one finds that the FAOSTAT numbers are

FAOSTAT-Zahlen um ein Jahr verschoben gegenüber den deutschen Zahlen. So steht z. B. in FAOSTAT unter 1999 die deutsche Rinderzahl von 1998. In den Jahren 2011 – 2013 enthält FAOSTAT die Daten der Mai-Zählung, während das Inventar aufgrund einer EU-Vorgabe (siehe Kapitel 3.4.2.1) die Daten der November-Zählung verwendet.

Schweine: Die FAOSTAT-Schweinezahlen sind generell nicht mit den Schweinezahlen im Inventar zu vergleichen, da im Inventar aus methodischen Gründen die Zahl der Ferkel mit einem Gewicht kleiner als 8 kg abgezogen wird (siehe Kapitel 3.4.2.2). Vergleicht man die FAOSTAT-Zahlen daher mit den Schweinezahlen des Statistischen Bundesamtes *vor Abzug* der Saugferkel, so findet sich wie bei den Rindern in den FAOSTAT-Zahlen vor 2000 eine fehlerhafte Verschiebung um ein Jahr. Mit Ausnahme der Jahre 2011 – 2013, in denen die FAOSTAT-Zahlen der Mai-Zählung entsprechen, während das Inventar aufgrund einer EU-Vorgabe (siehe Kapitel 3.4.2.1) mit den Daten der November-Zählung rechnet, besteht eine große Ähnlichkeit zwischen den Tierzahlzeitreihen; eine Übereinstimmung (unter Berücksichtigung der Rundung auf 100 Tierplätze) liegt aber nur für die Jahre 2001 – 2003 und 2007 – 2009 vor.

Schafe: In den Jahren 1991, 1993 – 2000 und 2005 – 2009 sind die FAOSTAT-Zahlen den Daten des deutschen Statistischen Bundesamtes sehr ähnlich; eine Übereinstimmung (unter Berücksichtigung der Rundung auf 100 Tierplätze) liegt aber nur für die Jahre 2007 – 2009 vor. In den Jahren 1990 – 1992, 1993 sowie 2001 – 2004 gibt es z. T. größere Abweichungen, die mit vorliegenden Informationen nicht erklärbar sind. Ab 2010 ist ein Vergleich der beiden Zeitreihen nicht möglich, da im Inventar die offiziell erhobenen Schafzahlen korrigiert werden (siehe Kapitel 6.1.1.1).

Ziegen: Die FAOSTAT-Ziegenzahlen sind für die Jahre 1991 – 2002 gegenüber den deutschen Zahlen um ein Jahr versetzt. So gibt z. B. die FAOSTAT-Ziegenzahl 1991 die deutsche Ziegenzahl von 1990 wieder. Für die Jahre 1990, 2003, 2005, 2007, 2008, 2013 und 2016 stimmen die FAOSTAT-Zahlen mit den deutschen Zahlen überein. In den Jahren dazwischen, in denen Deutschland keine Daten erhoben bzw. geschätzt hat, gibt FAOSTAT Daten an, die ihrerseits geschätzt sein müssen, obwohl es sich laut FAOSTAT um offizielle Daten handelt soll. Insbesondere ab 2011 sind diese Schätzungen unplausibel, da sie den durch lineare Interpolation zwischen den Stützjahren geschätzten Trends zuwider laufen.

Pferde (incl. Esel und Maultiere): Die FAOSTAT-Zahlen vor 2010 geben nur Pferdezahlen ohne Esel und Maultiere wieder. Die Inventarzahlen beinhalten dagegen auch Esel und Maultiere. Subtrahiert man daher für einen Vergleich von FAOSTAT und Inventarzahlen von letzteren die Zahlen von Eseln und Maultieren (siehe Kapitel 3.4.2.2), so ergibt sich, dass die FAOSTAT-Zahlen

shifted by one year compared to the German figures. In addition, as a rule, the level of the animal numbers differs. From 2005, there is a correspondence between FAOSTAT and the German data only for the years 2013 and 2016. In the years between 2005 and 2016, in which Germany did not collect data, the FAOSTAT estimates show, as with goats, an implausible time course.

Poultry: In almost all years with animal counts, poultry numbers are largely consistent between FAOSTAT and German data (1994, 1999, 2003, 2005, 2007, 2010, 2013 and 2016). The animal counts of 1990, 1996 and 2001 appear in FAOSTAT under 1991, 1997 and 2002, respectively. The closure of data gaps in FAOSTAT from 2010 onwards is as implausible as with goats and horses, yielding an erratic time course from 2010 onwards.

3.4.3 Frequency distributions (housing, storage, spreading) and grazing data / Häufigkeitsverteilungen (Stall, Lager, Ausbringung) und Weidedaten

In Germany, depending on the animal category, there are different forms of animal housing and different techniques and procedures for the storage and application and incorporation of animal manures manure and distates from anaerobic digestion of animal manures. Also the grazing times, where needed, are different. The different emission behavior of these systems and techniques as well as their different distribution in Germany are taken into account in the inventory calculations, as far as corresponding data are available.

These data were estimated, at district level, for the years 1990 to 1999 for cattle, pigs and laying hens using mainly the agricultural sector model RAUMIS and interviews with experts at district level. For horses, sheep, goats and poultry without laying hens nationwide uniform assumptions were made. For details see Chapter 3.4.3.1.

For the years 2010 and 2015, official statistical surveys were carried out, where, however, not all the data required in the inventory was covered. The results of these surveys, which were provided by the Federal Statistical Office, are described in Chapter 3.4.3.2 for 2010 and in Chapter 3.4.3.3 for 2015.

Chapter 3.4.3.4 describes the closure of the data gaps in the times series, i. e. for the years 2000 - 2009, 2011 - 2014 and 2016 and 2017.

The time series of data finally used in the up-to-date inventory are given, as average values for Germany, in the data collection provided with the report at hand (see Chapter 2.4) on the sheets AI_1005FHO, AI_1005FST and AI_1005FSP. See also the note at the end of Chapter 3.4.3.4.

den deutschen Zahlen bis zum Jahr 2004 um ein Jahr hinterherlaufen. Dabei unterscheidet sich i. d. R. auch die Höhe der Tierzahlen. Ab 2005 gibt es eine Übereinstimmung zwischen FAOSTAT und den deutschen Daten nur für die Jahre 2013 und 2016. In den Jahren zwischen 2005 und 2016, in den Deutschland keine Daten erhoben hat, zeigen die FAOSTAT-Schätzungen wie bei den Ziegen einen unplausiblen zeitlichen Verlauf.

Geflügel: In fast allen Jahren mit Tierzählungen stimmen die Geflügelzahlen weitgehend überein zwischen FAOSTAT und deutschen Daten (1994, 1999, 2003, 2005, 2007, 2010, 2013 und 2016). Die Ergebnisse der Zählungen der Jahre 1990, 1996 und 2001 erscheinen in FAOSTAT in den Jahren 1991, 1997 und 2002. Die Schließung der Datenlücken ab 2010 in FAOSTAT ist ähnlich unplausibel wie bei Ziegen und Pferden, woraus sich ein erratischer Zeitverlauf ab 2010 ergibt.

In Deutschland gibt es je nach Tierkategorie unterschiedliche Haltungsformen und verschiedene Techniken und Vorgehensweisen zur Lagerung und Ausbringung und Einarbeitung von Wirtschaftsdünger und Wirtschaftsdünger-Gärresten. Auch die Weidedauern, wo benötigt, unterscheiden sich. Das unterschiedliche Emissionsverhalten dieser Systeme und Techniken sowie ihre unterschiedliche Verbreitung in Deutschland werden in den Inventarberechnungen berücksichtigt, soweit entsprechende Daten verfügbar sind.

Diese Daten wurden für die Jahre 1990 bis 1999 für Rinder, Schweine und Legehennen im Wesentlichen mithilfe des Agrarsektormodells RAUMIS und von Expertenbefragungen auf Kreisebene geschätzt. Für Pferde, Schafe, Ziegen und Geflügel ohne Legehennen wurden bundesweit einheitliche Annahmen getroffen. Zu Details siehe Kapitel 3.4.3.1.

Für die Jahre 2010 und 2015 fanden offizielle statistische Erhebungen statt, wobei allerdings nicht alle im Inventar benötigten Daten erfasst wurden. Die Ergebnisse dieser Erhebungen, die durch das Statistische Bundesamt bereitgestellt wurden, werden in Kapitel 3.4.3.2 für 2010 und in Kapitel 3.4.3.3 für 2015 beschrieben.

Kapitel 3.4.3.4 geht auf die Schließung der zeitlichen Datenlücken (2000 – 2009, 2011 – 2014 sowie 2016 und 2017) ein.

Die Zeitreihen der im aktuellen Inventar schließlich verwendeten Daten finden sich als Mittelwerte für Deutschland in der Datensammlung (siehe Kapitel 2.4) auf den Tabellenblättern AI_1005FHO, AI_1005FST und AI_1005FSP. Siehe dazu auch die Anmerkung am Ende von Kapitel 3.4.3.4.

3.4.3.1 *The years 1990 - 1999 (RAUMIS) / Die Jahre 1990 - 1999 (RAUMIS)*

For the years until 1999, data regarding the frequency distributions for housing (including shares of grazing and housing, housing types), storage types and spreading techniques (including different incorporation times) were modelled using the agricultural sector model RAUMIS (Regionalisiertes Agrar- und UmweltInformationsSystem für Deutschland – regionalised information system for agriculture and environment in Germany / Institute of Rural Studies of the TI). There is no grazing for pigs; for laying hens only the spreading was modeled.

For an introduction to RAUMIS see Weingarten (1995), for a detailed description see Henrichsmeyer et al. (1996). The data base and details of the resulting modelling of input data for GAS-EM using RAUMIS are described in DÖHLER et al. (2002), Chapter 2.6.2. They are collated in the following short overview:

The frequency distributions were calculated for the years 1991, 1995, and 1999. For this purpose, Germany was divided into 11 model regions, each with the most uniform possible agricultural structure. In these model regions expert surveys were carried out in 13 representative districts.

These model district data formed the basis from which the data needed for the calculation of the emissions in all German districts was derived. In a first step this was done using a cluster analysis to assign all German districts to the 11 model regions regardless of boundaries of federal states. In a limited number of cases the cluster analysis had to be corrected by means of maps and statistics.

A second step was performed under the assumption that the stock size has a major impact on the type of the chosen housing system. Therefore a projection was carried out for an approximate estimate of the frequencies of housing systems in all regions. The projection was based on collected characteristics that was differentiated according to stock size classes. It was taken into account that the manure management depends on individual regulations of each federal state concerning informational, advisory and supporting programmes as well as sanctions.

The Federal Statistical Office (Statistisches Bundesamt) replenished the surveys in the modelled regions with a special evaluation of the amount of manure and slurry in agricultural farms ordered by administrative districts. For the assessment of the situation in the new federal states (former GDR) in 1990, data of the official 1987 GDR census on buildings and building structures were used.

For the emission calculations, the distributions modelled by RAUMIS are applied as follows: 1991 for 1990 to 1993; 1995 for 1994 to 1998; 1999 for the years from 1999 onwards.

In addition to the distributions modeled with RAUMIS, the following characteristics were used for the calculations of horses, sheep, goats and poultry for the

Für Rinder, Schweine und Legehennen wurden für die Jahre 1990 - 1999 die Daten zu den Häufigkeitsverteilungen für Haltungsformen (Anteile Weidehaltung / Stallhaltung; Anteile von Aufstallungsformen), Lagerungsformen sowie Ausbringungstechniken und Einarbeitungsdauern mithilfe des Agrarsektormodells RAUMIS (Regionalisiertes Agrar- und UmweltInformationsSystem für Deutschland / Institut für Betriebswirtschaft, Agrarstruktur und ländliche Räume des TI) modelliert. Für Schweine gibt es keine Weidehaltung; für Legehennen wurde nur die Ausbringung modelliert.

Für eine Einführung zu RAUMIS siehe Weingarten (1995). Eine detaillierte Modellbeschreibung findet sich bei Henrichsmeyer et al. (1996). Datengrundlagen und Details der darauf aufbauenden Modellierung der GAS-EM-Eingangsdaten mit RAUMIS sind in DÖHLER et al. (2002), Kapitel 2.6.2 beschrieben und werden nachfolgend in einer kurzen Übersicht zusammengefasst:

Die Häufigkeitsverteilungen wurden für die Jahre 1991, 1995 und 1999 erstellt. Dazu wurde Deutschland in 11 Modellregionen mit jeweils möglichst einheitlicher Agrarstruktur gegliedert, in denen in 13 repräsentativen Kreisen Expertenbefragungen durchgeführt wurden.

Für die Übertragung und Hochrechnung der Modellkreisdaten zur Erstellung einer Datengrundlage für eine flächendeckende Emissionsberechnung erfolgte in einem ersten Schritt eine Clusteranalyse, um alle deutschen Kreise den 11 Modellregionen zuordnen zu können. Dabei wurde auch eine bundeslandübergreifende Zuordnung zugelassen. Die Ergebnisse der Clusteranalyse wurde in einigen wenigen Fällen anhand von Karten und Statistiken korrigiert.

Unter der Annahme, dass die Bestandsgröße bei der Ausprägung der Stallhaltungsformen von entscheidender Bedeutung ist, erfolgte in einem zweiten Schritt zur Schätzung der Verfahrensumfänge in allen Regionen eine Hochrechnung auf Grundlage der nach Bestandsgrößenklassen differenziert erfassten Merkmale. Dabei wurde auch berücksichtigt, dass das Wirtschaftsdünger-Management von Informations-, Beratungs- und Förderprogrammen sowie von Auflagen abhängt, die auf Bundesländerebene ausgestaltet werden.

Eine Sonderauswertung des Mist- und Gülleanfalls in landwirtschaftlichen Betrieben nach Regierungsbezirken durch das Statistische Bundesamt ergänzte die Erhebungen in den Modellregionen. Zur Einschätzung der Situation in den neuen Ländern im Jahr 1990 wurden Daten der DDR-Bausubstanzanalyse 1987 herangezogen.

Die mit RAUMIS modellierten Verteilungen werden für die Emissionsberechnungen wie folgt als gültig angenommen: 1991 für 1990 bis 1993; 1995 für 1994 bis 1997; 1999 für 1998 und 1999.

Zusätzlich zu den mit RAUMIS modellierten Verteilungen wurden für Pferde, Schafe, Ziegen und Geflügel für die Jahre 1990 bis 1999 in Abstimmung mit KTBL

years 1990 to 1999 in coordination with KTBL (uniform for the whole of Germany):

- Housing/storage: For horses, sheep, goats and poultry without laying hens, only one housing and storage system is assumed (solid manure). This also applies to storage with laying hens. The frequencies of housing systems of laying hens are provided by the Federal Statistical Office at an annual rate, see Chapter 8.3.2.
- Application: broadcast without incorporation with horses, sheep and goats; broadcast with 24-hour incorporation with poultry without laying hens.
- Grazing times, horses: All horses are on pasture 180 days a year for 10 hours.
- Grazing times, sheep: All sheep are on pasture 24 hours a day, 300 days a year.
- Grazing times, goats: Half of the goats are on pasture 24 hours a day, 250 days a year. The other half has no pasturage.

For sake of simplicity, the data described above are, in the report at hand, collectively addressed by the label "RAUMIS".

In the current inventory these data were partially replaced based on findings from the 2010 Agricultural Census (LZ 2010, see Chapter 3.4.3.2) and from the 2016 Agricultural Structure Survey (ASE 2016, see Chapter 3.4.3.3). This concerns (see Chapter 3.4.3.2.7):

- grazing times for male cattle and male cattle > 2 years,
- grazing times for sheep.

The storage and application of digestates from anaerobic digestion did not yet play a role in the emissions inventory at the time of creating the RAUMIS data modeling, which is why no assumptions were made at the time. It is not possible to retrieve information for the years 1990 to 1999. Since this also applies to the years 2000 to 2009, the data on techniques and procedures collected in the LZ 2010 (see Chapter 3.4.3.2) were used for the entire period from 1990 to 2010.

3.4.3.2 *The year 2010 (LZ 2010) / Das Jahr 2010 (LZ 2010)*

The frequency distributions of housing and storage facilities as well as application procedures for 2010 were collected by means of the 2010 official agricultural census²⁰ („Landwirtschaftszählung 2010“) and of the simultaneous survey of agricultural production methods as well as the 2011 survey on manure application practices

folgende Merkmale für die Inventarberechnungen zugrunde gelegt (einheitlich für ganz Deutschland):

- Haltung/Lagerung: Für Pferde, Schafe, Ziegen und Geflügel ohne Legehennen wird jeweils nur ein Haltings- und Lagerungssystem angenommen (Festmist). Dies gilt auch für die Lagerung bei Legehennen. Die Häufigkeiten der Legehennen-Haltungsformen werden im jährlichen Rhythmus vom Statistischen Bundesamt bereitgestellt, siehe Kapitel 8.3.2.
- Ausbringung: Breitverteiler ohne Einarbeitung bei Pferden, Schafen und Ziegen; Breitverteiler mit Einarbeitung innerhalb von 24 Stunden bei Geflügel ohne Legehennen.
- Weidedauer, Pferde: Alle Pferde sind an 180 Tagen im Jahr für 10 Stunden auf der Weide.
- Weidedauer, Schafe: Alle Schafe sind an 300 Tagen im Jahr 24 Stunden auf der Weide.
- Weidedauer, Ziegen: Die Hälfte der Ziegen ist an 250 Tagen im Jahr 24 Stunden auf der Weide. Die andere Hälfte hat keinen Weidegang.

Die Gesamtheit der oben beschriebenen Daten wird im vorliegenden Berichtsband vereinfachend unter der Bezeichnung „RAUMIS“ angesprochen.

Im aktuellen Inventar wurden diese Daten aufgrund von Erkenntnissen aus der Landwirtschaftlichen Zählung 2010 (LZ 2010, siehe Kapitel 3.4.3.2) und aus der Agrarstrukturhebung 2016 (ASE 2016, siehe Kapitel 3.4.3.3) teilweise ersetzt. Dies betrifft (siehe Kapitel 3.4.3.2.7):

- Weidezeiten für männliche Mastrinder und männliche Rinder > 2 Jahre,
- Weidezeiten für Schafe.

Lagerung und Ausbringung von Gärresten spielten zur Zeit der Erstellung der RAUMIS-Daten-Modellierungen noch keine Rolle im Emissionsinventar, weshalb dafür seinerzeit auch keine Annahmen getroffen wurden. Es ist nicht möglich, nachträglich Informationen für die Jahre 1990 – 1999 zu erhalten. Da dies auch auf die Jahre 2000 – 2009 zutrifft, wurden die in der LZ 2010 (siehe Kapitel 3.4.3.2) erhobenen Daten zu Techniken und Vorgehensweisen für den gesamten Zeitraum 1990 bis 2010 angewendet.

Die Häufigkeitsverteilungen von Haltings-, Lager- und Ausbringungsverfahren wurden für 2010 im Rahmen der vom Statistischen Bundesamt durchgeführten „Landwirtschaftszählung 2010“²⁰ und der parallel dazu durchgeführten „Erhebung über landwirtschaftliche Produktionsmethoden“ sowie der „Erhebung über Wirtschaftsdüngerausbringung im Kalenderjahr 2010 für die

²⁰ <https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Wirtschaftsbereiche/LandForstwirtschaft/Landwirtschaftszaehlung2010/Ergebnisse.html>

(“Erhebung über Wirtschaftsdüngerausbringung”)²¹. Census and both surveys were carried out by the Federal Statistical Office. For sake of simplicity, the resulting data are, in the report at hand, collectively addressed by the label “LZ 2010” (for „Landwirtschaftszählung 2010“).

The procedures used for the evaluation of the results of the LZ 2010 is described in DIETERLE (2012). The resolution in space is federal states, i.e., all districts within a given state are described with the same data set. A higher resolution in space (districts) appeared not meaningful in view of the uncertainties involved.

For the same reason, separate evaluations were not performed for the single city states. Instead, Bremen was treated like Niedersachsen, Berlin like Brandenburg, and Hamburg like Schleswig-Holstein.

Further details on the use of LZ 2010 data for inventory calculations are described in the following subchapters and in Chapter 3.4.3.4.

3.4.3.2.1 *Housing systems, cattle / Haltungsverfahren, Rinder*

Statistisches Bundesamt provided frequency distributions of housing systems for dairy cows, heifers, suckler cows, mature males > 2 years and calves. These comprise

- tied systems, predominantly slurry based;
- tied systems, predominantly solid manure based;
- loose housing systems, predominantly slurry based;
- loose housing systems, predominantly solid manure based;
- other housing systems.

The category “other housing systems” is not defined with respect to its emission properties. Hence it cannot be used in emission reporting. The percentages of this category were redistributed to the other housing facility categories according to their proportions. On the national scale, about 3 % of all housing systems had been declared “other systems” for heifers and male beef cattle, 20 % of suckler cows, 13 % of mature males > 2 years. For dairy cows the share of “other systems” on the national scale was close to 0 %. However, differences were observed for a few federal states - 3 states declared 1 and 2 % “other systems”. As a result of the redistribution, the data used within inventory deviate from those supplied by Statistisches Bundesamt.

The frequency data of calves as provided by Statistisches Bundesamt cannot be used in the inventory as the surveys counted cattle up to an age of 6 or 8 months as calves (see Chapter 4.4.1.1) while the inventory defines calves as cattle up to an age of 4 months.

Furthermore, the inventory assumes that from 2003 onwards calves have been kept in deep bedding sys-

tem. Emissionsberichterstattung“²¹ erhoben. Diese Daten werden im vorliegenden Bericht der Einfachheit halber einheitlich unter der Bezeichnung „LZ 2010“ angesprochen.

Die Vorgehensweise zur Auswertung der Erhebungsergebnisse der LZ 2010 wird in DIETERLE (2012) beschrieben. Sie erfolgte auf Bundeslandebene, sodass allen Kreisen eines Bundeslandes identische Datensätze zugewiesen wurden. Eine Auswertung auf Kreisebene war wegen der damit verbundenen großen statistischen Unsicherheit nicht sinnvoll.

Aus diesem Grunde wurden auch die Ergebnisse der Stadtstaaten verworfen und durch die Ergebnisse der benachbarten Flächenbundesländer ersetzt: Bremen durch Niedersachsen, Berlin durch Brandenburg und Hamburg durch Schleswig-Holstein.

Weitere Details zur Verwendung der Daten der LZ 2010 für die Inventarberechnungen finden sich in den nachfolgenden Unterkapiteln und in Kapitel 3.4.3.4.

Vom Statistischen Bundesamt wurden für Milchkühe, Färsen, Mutterkühe, Männliche Mastrinder, männliche Rinder > 2 Jahre und Kälber die prozentualen Anteile folgender Stallhaltungsverfahren bereitgestellt:

- Anbindeställen, überwiegend mit Gülle;
- Anbindeställen, überwiegend mit Festmist;
- Laufställen, überwiegend mit Gülle;
- Laufställen, überwiegend mit Festmist;
- andere Haltungsverfahren.

Die Kategorie „andere Haltungsverfahren“ ist hinsichtlich der Emissionseigenschaften undefiniert und kann daher für die Emissionsberichterstattung nicht verwendet werden. Die Anteile dieser Kategorie wurden auf die übrigen vier Stallhaltungsverfahren entsprechend deren relativer Häufigkeit aufgeteilt. Dadurch stimmen die im Inventar verwendeten Zahlen bei den Färsen und männlichen Mastrindern (bundesweit je 3 % „andere Haltungsverfahren“), Mutterkühen (20 %), männliche Rinder > 2 Jahre (13 %) nicht mit den vom Statistischen Bundesamt gelieferten Prozentzahlen überein. Analog verfahren wurde bei den Milchkühen, bei denen zwar auf Bundesebene 0 % andere Haltungsverfahren erhoben wurden, bei denen allerdings auf Bundeslandebene auch 3 Bundesländer mit 1 und 2 % anderen Haltungsverfahren erfasst wurden.

Die vom Statistischen Bundesamt gelieferten Verteilungsdaten für Kälber wurden nicht verwendet, da sie für Kälber bis zu einem Alter von 6 bzw. 8 Monaten erhoben wurden (siehe Kapitel 4.4.1.1), im Inventar die Kategorie Kälber aber nur Rinder bis zu einem Alter von 4 Monaten umfasst.

²¹<https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Wirtschaftsbereiche/LandForstwirtschaftFischerei/Produktionsmethoden/Produktionsmethoden.html>

tems, whereas before 2003 they were kept in tied systems with bedding (50 %) and in deep bedding systems (50 %). (Expert judgement KTBL, as tied systems for calves were banned in Germany.)

The information provided by Statistisches Bundesamt with regard to suckler cows as "loose housing systems" is taken to be deep bedding systems (expert judgement KTBL). For male beef cattle, "loose housing systems" is interpreted as "sloped floor systems with bedding". This is the same definition as in RAUMIS. For all other animal categories "loose housing systems, predominantly solid manure based" is considered a loose house with periodical removal of manure. For heifers, this resulted in a revision of the category "deep bedding" used between 1990 and 1999 (expert judgement KTBL). For RAUMIS see Chapter 3.4.3.1.

Concerning the N₂O emission factor for "deep bedding", IPCC (2006) -10.63 differentiates between two variants: "No mixing" and "active mixing". For Germany, according to an expert judgment by KTBL (Brigitte Eurich-Menden et al., 22 September 2016), "no mixing" applies, since mixing is not wanted and it does not make economic sense. The excretions of the animals and daily adding of bedding material form a constantly growing manure mattress that is compacted by the animals' feet and removed by the farmer only after the animals have eventually been removed, i. e. after months.

3.4.3.2.2 *Housing systems, pigs / Haltungsverfahren, Schweine*

Statistisches Bundesamt provided frequency distributions of housing systems for the animal categories "sows" (for reproduction) and "other pigs" (including piglets):

- fully slatted floors,
- partly slatted floors,
- non-slatted floors with bedding and periodical removal of manure,
- other housing systems,
- free range.

The inventory differentiates between the subcategories sows (including suckling-pigs), weaners, fattening pigs and boars (for reproduction). So far, identical housing data were used for sows and boars. The same applied to weaners and fattening pigs. For reasons of consistency this treatment was maintained when the 2010 data sets provided by Statistisches Bundesamt were evaluated.

The category "other housing systems" cannot be used in the inventory as it is not defined there. It is interpreted as a closed insulated stable deep bedding system.

The category "free range" cannot be treated adequately in the inventory due to lack of emission factors. However, its frequency on the national level as reported by Statistisches Bundesamt is 0 %. Few federal states reported a frequency of 1 %. In the inventory, "free

Außerdem wird angenommen, dass Kälber seit 2003 zu 100 % auf Tiefstreu gehalten wurden und davor zu 50 % in Anbindehaltung mit Festmist und zu 50 % auf Tiefstreu (Expertenurteil KTBL aufgrund des Verbots der Anbindehaltung bei Kälbern in Deutschland).

Bei Mutterkühen wird „Laufstall, überwiegend mit Festmist“ im Inventar als Tiefstreu interpretiert (Expertenurteil KTBL). Bei den männlichen Mastrindern wird „Laufstall, überwiegend mit Festmist“ im Inventar als Tretmist angesehen (entsprechend der in RAUMIS verwendeten Kategorie). Bei allen anderen Tierkategorien wird „Laufstall, überwiegend mit Festmist“ als Stall mit regelmäßiger Entmistung interpretiert. Dies bedeutete bei den Färsen eine nachträgliche Revision der ursprünglichen in RAUMIS verwendeten Kategorie „Tiefstreu“, auch für die Jahre 1990 bis 1999 (Expertenurteil KTBL). Zu RAUMIS siehe Kapitel 3.4.3.1.

Bzgl. des N₂O-Emissionsfaktors für „Tiefstreu“ unterscheidet IPCC (2006)-10.63 zwei Varianten: „No mixing“ und „active mixing“. Für Deutschland trifft nach einem Expertenurteil von KTBL (Brigitte Eurich-Menden et al., 22.09.2016) „no mixing“ zu, da eine Durchmischung nicht gewollt und arbeitswirtschaftlich nicht sinnvoll ist. Die durch Kot und tägliche Zugabe von Einstreu ständige wachsende Mistmatratze wird durch die Tiere festgetreten und erst nach Ausstallung der Tiere, d. h. nach Monaten, durch den Landwirt entfernt.

Das Statistische Bundesamt stellte für die Tierkategorien Zuchtsauen und übrige Schweine inklusive Ferkel Daten über die prozentualen Anteile folgender Stallhaltungsverfahren bereit:

- Vollspaltenboden,
- Teilspaltenboden,
- planbefestigter Boden mit Einstreu und regelmäßiger Entmistung,
- andere Stallhaltungsverfahren,
- Freiland.

Das Inventar unterscheidet zwischen Zuchtsauen (inklusive Saugferkel), Aufzuchtferkeln, Mastschweinen und Zuchtebern. Dabei wurden bisher für Eber und Zuchtsauen die gleichen Daten zu Haltungsverfahren verwendet. Analog war das Vorgehen für Mastschweine und Aufzuchtferkel. Aus Konsistenzgründen wurde dies bei der Auswertung der vom Statistischen Bundesamt für 2010 gelieferten Erhebungsdaten beibehalten.

Die Kategorie „andere Stallhaltungsverfahren“ ist hinsichtlich der Emissionseigenschaften undefiniert und kann daher für die Emissionsberichterstattung nicht verwendet werden. Sie wird als Tiefstreu im wärmege-dämmten Stall interpretiert.

Die Kategorie „Freiland“ ist mangels Emissionsfaktor in GAS-EM nicht abbildbar. Auf Bundesebene liegt ihr Anteil nach den gelieferten Zahlen des Statistischen Bundesamtes bei 0 %; in den wenigen Bundesländern, für

range" is treated in the same way as a "free ventilated deep bedding system".

The other three provided housing systems are expected to be closed insulated stable systems.

As practiced in former inventories, the inventory differentiates for sows and boars between slurry based and farmyard manure systems. The frequencies of fully and partly slatted floor systems are combined in the inventory category "slurry based systems". The three remaining categories obtained from LZ 2010 are combined under the inventory category "solid manure systems".

For weaners and fattening pigs the four categories "fully slatted floor systems", "partly slatted floor systems", "non-slatted floors with bedding and periodical removal of manure", "sloped floor systems" and "deep bedding system" are taken into account.

Concerning the N₂O emission factor for "deep bedding", IPCC (2006) -10.63 differentiates between two variants: "No mixing" and "active mixing". For Germany, according to an expert judgment by KTBL (Brigitte Eurich-Menden et al., 22 September 2016), "no mixing" applies, since mixing is not wanted and it does not make economic sense. The excretions of the animals and daily adding of bedding material form a constantly growing manure mattress that is compacted by the animals' feet and is removed by the farmer only after the animals have eventually been removed, i. e. after months.

die Freilandhaltung mit 1 % ermittelt wurde, wird „Freiland“ im Inventar wie „Tiefstreu im Außenklimastall“ behandelt.

Für die anderen drei erhobenen Stallhaltungsverfahren wird angenommen, dass sie wärmegeklämt sind.

Für Zuchtsauen und Eber wird im Inventar wie bisher nur zwischen Flüssigmist- und Festmistverfahren unterschieden. Die Summe der offiziell erhobenen Häufigkeiten von „Vollspaltenboden“ und „Teilspaltenboden“ liefert die Häufigkeit der Inventarkategorie „Flüssigmist“, die Summe der Häufigkeiten der anderen drei in der LZ 2010 berücksichtigten Stallhaltungsverfahren die Häufigkeit der Inventarkategorie „Festmist“.

Bei den Mastschweinen und Aufzuchtferkeln werden die vier Kategorien „Vollspaltenboden“, „Teilspaltenboden“, „planbefestigter Boden mit Einstreu und regelmäßiger Entmistung“ und „Tiefstreu“ verwendet.

Bzgl. des N₂O-Emissionsfaktors für „Tiefstreu“ unterscheidet IPCC (2006)-10.63 zwei Varianten: „No mixing“ und „active mixing“. Für Deutschland trifft nach einem Expertenurteil von KTBL (Brigitte Eurich-Menden et al., 22.09.2016) „no mixing“ zu, da eine Durchmischung nicht gewollt und arbeitswirtschaftlich nicht sinnvoll ist. Die durch Kot und tägliche Zugabe von Einstreu ständige wachsende Mistmatratze wird durch die Tiere festgetreten und erst nach Ausstallung der Tiere, d. h. nach Monaten, durch den Landwirt entfernt.

3.4.3.2.3 *Housing systems, other animals / Haltungsverfahren, übrige Tiere*

For horses, sheep, goats and poultry without laying hens no data was collected in the LZ 2010 (nor in the ASE 2016, see chapter 3.4.3.3). The inventory is therefore based on the continuation of the assumptions made in Chapter 3.4.3.1. The laying hen husbandry forms are provided by the Federal Statistical Office at an annual rate, see Chapter 8.3.2.

Für Pferde, Schafe, Ziegen und Geflügel ohne Legehennen wurden in der LZ 2010 (und in der ASE 2016, siehe Kapitel 3.4.3.3) keine Daten erhoben. Das Inventar geht deshalb vom Fortbestand der in Kapitel 3.4.3.1 getroffenen Annahmen aus. Die Legehennen-Haltungsformen werden im jährlichen Rhythmus vom Statistischen Bundesamt bereitgestellt, siehe Kapitel 8.3.2.

3.4.3.2.4 *Slurry storage systems, cattle and pigs / Güllelagerverfahren, Rinder und Schweine*

The following separate frequency distributions were provided by Statistisches Bundesamt for slurry stores in cattle and pig husbandry:

- without cover,
- with natural crust,
- with artificial crust,
- with plastic film or solid cover.

The frequencies of these categories apply to the cattle and pig categories as a whole. No further differentiation is made for subcategories.

The official surveys did not cover the share of slurry stored underneath slatted floors. In Germany this fraction cannot be neglected. The 1999 frequency distributions (last data set provided by RAUMIS; for RAUMIS see Chapter 3.4.3.1), however, allowed for this differentiation. The data available for animal numbers of cattle and pigs were used to assess weighted means of the shares

Vom Statistischen Bundesamt wurden getrennt für Rinder und Schweine die prozentualen Anteile für folgende Güllelager-Varianten bereitgestellt:

- ohne Abdeckung,
- mit natürlicher Schwimmdecke,
- mit künstlicher Schwimmdecke,
- mit Folien- oder fester Abdeckung.

Diese Anteile gelten jeweils für alle Rinder und alle Schweine und werden nicht nach Unterkategorien differenziert.

Durch die offizielle Erhebung nicht abgefragt wurde der Anteil der Gülle, der unter Spaltenboden gelagert wird und der in Deutschland nicht unbedeutend ist. Mithilfe der Rinderzahlen bzw. Schweinezahlen und ihrer entsprechenden N-Ausscheidungen von 1999 wurde das gewichtete Mittel des Anteils der Güllelagerung unter Spaltenboden in den einzelnen Bundesländern aus

of slurry stored underneath slatted floors in 1999. The percentages obtained were then used for all cattle and pigs in the inventory for 2010. The differences between these percentages and 100 % were allocated to the four slurry storage categories surveyed by the Federal Statistical Office. The allocation was based on the relative shares of these four storage categories.

dem letzten verwendeten RAUMIS-Datensatz von 1999 gebildet (zu RAUMIS siehe Kapitel 3.4.3.1). Die dabei erhaltenen Prozentzahlen wurden für 2010 für alle Rinder bzw. Schweine angenommen. Die Differenz zwischen diesen Prozentzahlen und 100 % wurden zwischen dem vom Statistischen Bundesamt erhobenen vier Güllelagerkategorien gemäß ihren relativen Anteilen aufgeteilt.

3.4.3.2.5 *Other storage systems / Andere Lagerverfahren*

For cattle and pigs data for the storage of solid manure were collected in the LZ 2010. For the other categories of animals no data were collected, so it was assumed that the latest information from Chapter 3.4.3.1 persists.

Für Rinder und Schweine wurden in der LZ 2010 Daten zur Lagerung von Festmist erhoben. Für die anderen Tierkategorien wurden keine Daten erhoben, so dass angenommen wurde, dass die letztgültigen Angaben aus Kapitel 3.4.3.1 fortbestehen.

3.4.3.2.6 *Spreading of animal manures and digestate / Ausbringung von Wirtschaftsdünger und Gärresten*

The Federal Statistical Office (Statistisches Bundesamt) delivered frequency distributions for the application of untreated slurry from cattle and pigs, of leachate from cattle and pigs (combined) and of liquid digestate (digested manure from cattle, pigs and poultry as well as residues from anaerobic digestion of energy crops), covering the techniques involved, the time span between application and incorporation as well as the kind of land use:

Vom Statistischen Bundesamt wurden jeweils für Rinder- bzw. Schweinegülle (unbehandelt) sowie für Jauche (Rinder- und Schweinejauche gemeinsam) und flüssigen Gärrest (vergorene Rinder-, Schweine- und Geflügelexkremente sowie Gärreste von Energiepflanzen gemeinsam) die Werte der relativen Anteile bereitgestellt, die mit folgenden Techniken und Einarbeitungszeiten sowie auf folgende Flächennutzungsarten ausgebracht wurden:

- **broad cast:** Application to bare soil: with immediate incorporation, incorporation within 1 to 4 hours, 4 to 8 hours or more than 8 hours. Application to tilled arable land, grassland or permanent crops;
- **trailing hose:** Application to bare soil: with immediate incorporation, incorporation within 1 to 4 hours, 4 to 8 hours or more than 8 hours. Application to tilled arable land, grassland or permanent crops;
- **trailing shoe:** application to bare soil, to tilled arable land, to grassland or to permanent crops;
- **slot injection:** application to bare soil, to tilled arable land, to grassland or to permanent crops;
- **slurry cultivator or other injection techniques:** application to bare soil, to tilled arable land, to grassland or to permanent crops.

- **Breitverteiler:** Ausbringung auf unbestelltes Ackerland: Einarbeitung sofort, zwischen 1 und 4 h, zwischen 4 und 8 h oder nach mehr als 8 h. Ausbringung auf bestelltes Ackerland, auf Dauergrünland oder auf Dauerkulturen;
- **Schleppschlauch:** Ausbringung auf unbestelltes Ackerland: Einarbeitung sofort, zwischen 1 und 4 h, zwischen 4 und 8 h oder nach mehr als 8 h. Ausbringung auf bestelltes Ackerland, auf Dauergrünland oder auf Dauerkulturen;
- **Schleppschuh:** Ausbringung auf unbestelltes Ackerland, auf bestelltes Ackerland, auf Dauergrünland oder auf Dauerkulturen;
- **Schlitzverfahren:** Ausbringung auf unbestelltes Ackerland, auf bestelltes Ackerland, auf Dauergrünland oder auf Dauerkulturen;
- **Güllegrubber:** Ausbringung auf unbestelltes Ackerland, auf bestelltes Ackerland, auf Dauergrünland oder auf Dauerkulturen.

Any incorporation after 12 hours was treated as „incorporation between 8 and 12 hours“.

Die Einarbeitung nach mehr als 8 h wurde als Einarbeitung nach höchstens 12 h interpretiert.

The German inventory system has no emission factors for permanent cultures. These are treated in the same way as grassland. The share applied to permanent crops is thus added to the share spread on grassland.

Für die Ausbringung auf Dauerkulturen existieren in Deutschland keine Emissionsfaktoren, daher wird im Inventar der Anteil, der auf Dauerkulturen ausgebracht wurde, jeweils dem Anteil, der auf Dauergrünland ausgebracht wurde, hinzugezählt.

In Germany there do not exist any differentiated emission factors for slurry application with a trailing shoe referring to the kind of land use. Therefore all

Für die Ausbringung mit dem Schleppschuh existieren in Deutschland keine nach Flächennutzungsart differenzierten Emissionsfaktoren. Daher werden alle auf

shares of slurry applied on different kinds of land use with the trailing shoe technique are summarized.

There are only two emission factors available for the application techniques “injection” and “slurry cultivator”: One for slurry cultivator on bare soil, and one common to the rest of the application techniques in these two categories. Hence the frequencies of the latter are summed up.

The working group on emission reporting had made proposals to inquire frequency distributions for the application procedures of solid manures. These were not accepted for the questionnaires of LZ 2010. The little information that could be extracted from the remaining questions in the questionnaires does not allow for a detailed judgment. So it was initially assumed that the latest information from Chapter 3.4.3.1 persisted. This has been changed with the corresponding results of the ASE 2016 survey, see Chapters 3.4.3.3 and 3.4.3.4.

3.4.3.2.7 *Grazing times / Weidezeiten*

Statistisches Bundesamt made data available describing, in federal state resolution, the frequency of animals grazing (in %), the mean annual duration of the grazing period (in weeks) and the average daily grazing time (in hours per day) for dairy cows, heifers, male beef cattle, mature males > 2 years and calves.

Of these, the data for calves are not used in the inventory, as the category described by Statistisches Bundesamt (calves younger than 8 months) differs from that used in the inventory (calves younger than 4 months). For calves younger than 4 months, the inventory simplifyingly assumes no grazing.

All other data supplied by Statistisches Bundesamt are used as provided.

In previous submissions, no data were available for grazing times of male beef cattle and mature males > 2 years. Therefore “no grazing” had been assumed for these subcategories. In the present submission, the data provided for 2010 are used for the entire time series as of 1990.

For pigs, the inventory does not consider any times outdoors.

For sheep (including lambs) the Federal Statistical Office provided the share of animals grazed (in %), the mean annual duration of the grazing period (in weeks) and the mean daily grazing hours for each federal state.

For the city states data from the neighbouring federal states (Schleswig-Holstein for Hamburg, Niedersachsen for Bremen, Brandenburg for Berlin) were adopted. It is not possible to create a time series as of 1990. Therefore the 2010 data are used for all years of the time series.

unterschiedliche Flächennutzungen ausgebrachten Anteile, die mit dem Schleppschuh ausgebracht wurden, zusammengezählt.

Mit Ausnahme des Güllegrubbers auf unbewachsenen Flächen, für den ein eigener Emissionsfaktor existiert, werden in Ermangelung flächennutzungsbezogener Emissionsfaktoren alle Ausbringungsanteile der beiden Kategorien „Schlitzverfahren“ und „Güllegrubber und andere Injektionsverfahren“ zusammengefasst.

Die durch die Emissionsberichterstattungsgruppe vorgeschlagenen Fragen zur Festmist-Ausbringung wurden für den Fragenkatalog der LZ 2010 nicht akzeptiert. Die Informationen, die aus den wenigen im Fragebogen verbliebenen Fragen gewonnen werden konnten, erlauben keine differenzierte Einschätzung, so dass zunächst angenommen wurde, dass die letztgültigen Angaben aus Kapitel 3.4.3.1 fortbestehen. Dies wurde mit Vorliegen der entsprechenden Ergebnisse der ASE-2016-Befragung geändert, siehe Kapitel 3.4.3.3 und 3.4.3.4.

Der Anteil der Rinder mit Weidegang wurde vom Statistischen Bundesamt für jedes Bundesland getrennt nach Milchkühen, Färsen, Mutterkühen, männlichen Mastrindern, männlichen Rindern > 2 Jahre und Kälbern in Prozent bereitgestellt: durchschnittliche jährliche Weidedauer in Wochen und durchschnittliche Weidedauer in Stunden pro Tag.

Die Daten für die Kälber wurden nicht verwendet, da sie für Kälber bis zu einem Alter von 8 Monaten erhoben wurden, im Inventar die Kategorie Kälber aber nur Rinder bis zu einem Alter von 4 Monaten umfasst. Das Inventar geht vereinfachend davon aus, dass Kälber bis 4 Monate keinen Weidegang haben.

Die übrigen Daten des Statistischen Bundesamtes wurden unverändert übernommen.

Für frühere Inventare gab es für männliche Mastriender und männliche Rinder > 2 Jahre keine Informationen zum Weidegang, weshalb „kein Weidegang“ angenommen wurde. Die für 2010 für diese beiden Tierkategorien erhobenen Weidegangdaten wurden daher für den gesamten Berichtszeitraum ab 1990 übernommen.

Für Schweine sieht das Inventar keine Zeiten im Freiland vor.

Für Schafe (einschließlich Lämmer) wurde vom Statistischen Bundesamt für jedes Bundesland der Anteil der Tiere mit Weidegang (in %), die durchschnittliche jährliche Weidedauer in Wochen und die durchschnittliche Weidedauer in Stunden pro Tag bereitgestellt.

Für die Stadtstaaten wurden die Daten der benachbarten Bundesländer übernommen (Schleswig-Holstein für Hamburg, Niedersachsen für Bremen, Brandenburg für Berlin). Eine Zeitreihe ab 1990 lässt sich nicht erstellen. Daher werden die Daten von 2010 für alle Jahre ab 1990 eingesetzt.

Annual grazing times on a national level are summarized in the data collection provided with this report (see Chapter 2.4) on sheet AI_1005FHO. This data is derived from survey data provided by Statistisches Bundesamt.

3.4.3.3 *The year 2015 (ASE 2016) / Das Jahr 2015 (ASE 2016)*

With the Agricultural Structure Survey 2016 (ASE 2016), the Federal Statistical Office collected agricultural data for 2015, including data on the application of liquid and solid manure and digestates. Data on housing, storage and grazing were not collected.

For liquid manure and digestates, the following data on application techniques and induction times were collected:

- broadcast with incorporation within one hour or more than one hour on a bare soils, as well as without incorporation on cultivated areas and permanent grassland;
- trailing hose: same as for broadcast;
- trailing shoe: application on bare and cultivated soils as well as on permanent grassland;
- injection techniques: as for the trailing shoe;
- slurry cultivators and other injection techniques: as with trailing shoe.

The same procedure was followed with this data as with the corresponding data of the LZ 2010, see Chapter 3.4.3.2.4. As it has been necessary to incorporate liquid manure and digestates within 4 hours since 2012 (see chapter 3.4.3.2.4), the frequencies of incorporation within more than one hour has been interpreted as "incorporation within 4 hours". All data on trailing shoe techniques has been summarized as there is only one single trailing shoe emission factor for NH_3 . The application with slurry cultivator on bare soils was assigned to the application with manure cultivator. The application with slurry cultivators and other injection methods on cultivated soils and on permanent grassland was combined with the total application by means of injection techniques, since there is only one NH_3 emission factor (emission factor for injection techniques).

In contrast to the LZ 2010 (see Chapter 3.4.3.2.6), the ASE 2016 also collected data on the application of manure, differentiated between poultry manure (including poultry dry manure) and manure of all other animals. From this, for the emission inventory, the Federal Statistical Office made separate evaluations available for cattle manure and pig manure:

- application on bare soils without incorporation, with incorporation within 4 hours and with incorporation within more than 4 hours,
- application on cultivated areas, and
- application on permanent grassland.

Auf Tabellenblatt AI_1005FHO in der beiliegenden Datensammlung (siehe Kapitel 2.4) wird auf Bundesebene die aus den Erhebungsdaten folgende durchschnittliche jährliche Weidezeit in % des Jahres angegeben.

Mit der Agrarstrukturhebung 2016 (ASE 2016) erhob das Statistische Bundesamt landwirtschaftliche Daten für das Jahr 2015, darunter auch Daten zur Ausbringung von flüssigen und festen Wirtschaftsdüngern und Gärresten. Daten zu Haltungs- und Lagerverfahren sowie Weidegang wurden nicht erhoben.

Für flüssige Wirtschaftsdünger und Gärreste wurden folgende Daten zu Ausbringungstechniken und Einarbeitungszeiten erhoben:

- Breitverteiler mit Einarbeitung innerhalb einer Stunde oder mehr als einer Stunde auf unbestellter Fläche, sowie ohne Einarbeitung auf bestellten Flächen und Dauergrünland;
- Schleppschlauch: wie bei Breitverteiler;
- Schleppschuh: Ausbringung auf unbestellten und bestellten Flächen sowie auf Dauergrünland;
- Schlitzverfahren: wie bei Schleppschuh;
- Grubber und andere Injektionsverfahren: wie bei Schleppschuh.

Mit diesen Daten wurde genauso verfahren wie mit den entsprechenden Daten der LZ 2010, siehe Kapitel 3.4.3.2.4. Da seit 2012 eine Einarbeitung von flüssigen Wirtschaftsdüngern und Gärresten innerhalb von 4 Stunden vorgeschrieben ist (siehe Kapitel 3.4.3.2.4), wurden die Häufigkeiten für die Einarbeitung innerhalb von mehr als einer Stunde als „Einarbeitung innerhalb von 4 Stunden“ interpretiert. Alle Daten zu Schleppschuhverfahren wurden zusammengefasst, da es nur einen einzigen Schleppschuh-Emissionsfaktor für NH_3 gibt. Die Ausbringung mit Grubber auf unbestellten Flächen wurde der Ausbringung mit Güllegrubber zugeordnet. Die Ausbringung mit Grubber und anderen Injektionsverfahren auf bestellten Flächen und auf Dauergrünland wurde mit der gesamten Ausbringung mittels Schlitzverfahren zusammengefasst, da es nur einen einzigen NH_3 -Emissionsfaktor gibt (Emissionsfaktor für Schlitzverfahren).

Im Gegensatz zur LZ 2010 (siehe Kapitel 3.4.3.2.6) erhob die ASE 2016 auch Daten zur Ausbringung von Mist, getrennt nach Geflügelmist (incl. Trockenkot) und Mist aller anderen Tiere. Daraus abgeleitet stellte das Statistische Bundesamt für das Emissionsinventar Auswertungen getrennt für Rindermist und Schweinemist zur Verfügung:

- Ausbringung auf unbestellten Flächen ohne Einarbeitung, mit Einarbeitung innerhalb von 4 Stunden und mit Einarbeitung innerhalb von mehr als 4 Stunden,
- Ausbringung auf bestellten Flächen, und
- Ausbringung auf Dauergrünland.

The data for the application on cultivated areas and permanent grassland are summarized with the application without incorporation since there is only one NH_3 emission factor for the situation "not incorporated".

In the RAUMIS estimation (see chapter 3.4.3.1), there was information on incorporation within one hour. As 2015 was not expected to worsen the practices, these RAUMIS values were maintained for 2015 and the "within 4 hours" inventory category was based on data obtained as the difference from the ASE 2016 data for "within 4 hours" and the RAUMIS data for "within 1 hour". For the total manure and poultry droppings, the ASE 2016 data for incorporation within more than 4 hours was interpreted as incorporation within 12 hours.

For horses, sheep and goats, therefore, the inventory used the above-mentioned application frequencies collected for all animals together (except poultry). As there was no incorporation category "within 1 hour" for horses, sheep and goats in the RAUMIS data (see Chapter 3.4.3.1), the frequencies of the ASE 2016 for incorporation within 4 hours were fully included in the inventory for "incorporation within 4 hours". As for the other animal categories (see above), the ASE-2016 data for incorporation within more than 4 hours was interpreted as incorporation within 12 hours.

3.4.3.4 *Closure of the temporal data gaps / Schließung der zeitlichen Datenlücken*

This chapter describes the closure of temporary gaps between RAUMIS data (see Chapter 3.4.3.1), LZ-2010 data (see Chapter 3.4.3.2) and ASE-2016 data (see Chapter 3.4.3.3) as well as the estimation of the lacking values for 2016 and 2017. The closure rules are applied at federal state level because the input data is in federal state resolution. The impact on the averages at national level is addressed at the end of this chapter.

In the years 2000 to 2009, the frequencies of cattle and pig housing and storage systems were estimated by linear interpolation between the last RAUMIS year (1999) and the reference year of LZ 2010. Since no corresponding data were collected in ASE 2016, the data for the LZ 2010 were maintained for the years after 2010.

For the other categories of animals (horses, sheep, goats, poultry without laying hens), the information in Chapter 3.4.3.1 was maintained, as neither the LZ 2010 nor the ASE 2016 provided more recent data. This also applies to storage with laying hens. There are no temporal gaps in the laying hen husbandry forms as they are provided annually by the Federal Statistical Office (see chapter 8.3.2).

Die Daten für die Ausbringung auf bestellten Flächen und Dauergrünland werden mit der Ausbringung ohne Einarbeitung zusammengefasst, da es nur einen einzigen NH_3 -Emissionsfaktor für die Situation „nicht eingearbeitet“ gibt.

In der RAUMIS-Schätzung (s. Kap. 3.4.3.1) gab es Daten zur Einarbeitung innerhalb von einer Stunde. Da für 2015 nicht von einer Verschlechterung der Verfahrensweise auszugehen war, wurden diese RAUMIS-Werte für 2015 beibehalten und die Inventarkategorie „innerhalb von 4 Stunden“ mit Daten belegt, die sich als Differenz aus den ASE-2016-Daten für „innerhalb von 4 Stunden“ und den RAUMIS-Daten für „innerhalb von 1 Stunde“ ergaben. Für die gesamte Ausbringung von Mist und Geflügelkot wurden die ASE-2016-Daten für „Einarbeitung innerhalb von mehr als 4 Stunden“ als „Einarbeitung innerhalb von 12 Stunden“ interpretiert.

Für Pferde, Schafe und Ziegen wurden im Inventar daher die oben erwähnten Ausbringungshäufigkeiten verwendet, die für alle Tiere zusammen (außer Geflügel) erhoben wurden. Da es für Pferde, Schafe und Ziegen in den RAUMIS-Daten keine Einarbeitungskategorie „innerhalb von 1 Stunde“ gab (siehe Kapitel 3.4.3.1), wurden die Einarbeitungszeiten der ASE 2016 für „innerhalb von 4 Stunden“ im Inventar uneingeschränkt für „innerhalb von 4 Stunden“ eingesetzt. Wie bei den anderen Tierkategorien (s. o.) wurden die ASE-2016-Daten für „Einarbeitung innerhalb von mehr als 4 Stunden“ als „Einarbeitung innerhalb von 12 Stunden“ interpretiert.

Dieses Kapitel beschreibt die Schließung von zeitlichen Lücken zwischen RAUMIS-Daten (siehe Kapitel 3.4.3.1), LZ-2010-Daten (siehe Kapitel 3.4.3.2) und ASE-2016-Daten (siehe Kapitel 3.4.3.3) sowie die Schätzung der fehlenden Werte für die Jahre 2016 und 2017. Die Schließungsregeln werden auf Bundeslandebene angewendet, da die eingehenden Daten in Bundesland-Auflösung vorliegen. Zu den Auswirkungen auf die Mittelwerte auf nationaler Ebene siehe am Ende dieses Kapitels.

Die Häufigkeiten der Haltungs- und Lagersysteme von Rindern und Schweinen wurden in den Jahren 2000 – 2009 durch lineare Interpolation zwischen dem letzten RAUMIS-Jahr 1999 und dem Bezugsjahr der LZ 2010, geschätzt. Da in der ASE 2016 keine entsprechenden Daten erhoben wurden, wurden die Daten der LZ 2010 für die Jahre nach 2010 beibehalten.

Bei den übrigen Tierkategorien (Pferde, Schafe, Ziegen, Geflügel ohne Legehennen) wurden die Angaben aus Kapitel 3.4.3.1 beibehalten, da weder durch die LZ 2010 noch die ASE 2016 neuere Daten erhoben wurden. Dies gilt auch für die Lagerung bei Legehennen. Bei den Legehennen-Haltungsformen existieren keine zeitlichen Datenlücken, da sie jährlich vom Statistischen Bundesamt bereitgestellt werden (siehe Kapitel 8.3.2).

The frequencies of application techniques and incorporation times of liquid manure (undigested manure and leachate) for cattle and sheep in the years 2000 to 2009 were estimated by linear interpolation between the last RAUMIS year (1999) and the reference year of the LZ 2010.

The 2010 data were maintained for the years 2011 and 2012, except that in 2012 the incorporation of liquid manure was duly shortened to "within 4 hours", where this had not previously been the case. This shortening is based on the specification of the German Fertilizer Ordinance (DÜNGEVERORDNUNG, 2007) as approved of by the Agrarministerkonferenz (Conference of the farming ministers of the federal states) on 1 April 2011 in Jena: According to this specification, liquid manure has to be incorporated not later than 4 hours after application on bare arable land from 2011/2012 onwards.

For 2013 and 2014 frequencies were estimated by linear interpolation between 2012 and ASE 2016 data for 2015. For 2016 and 2017, the data from 2015 is maintained.

For the application of liquid digestates from anaerobic digestion of animal manures and energy crops, the data from the LZ 2010 were used for the years 1990 to 2012, whereby for 2012 the incorporation was limited to 4 hours, as for liquid manure (see above). For the years between 2012 and 2015, data were interpolated between the LZ 2010 and the ASE 2016. For 2016 and 2017, the data from 2015 is maintained.

Since there is no data for the application of solid manure and poultry manure from the LZ 2010, the gap between the last RAUMIS year 1999 and the reference year of the ASE 2016, i. e. 2015, was closed by linear interpolation. For 2016 and 2017, the data from 2015 is maintained.

For grazing, the following procedure has been established on the basis of the limited availability of grazing data (see chapters 3.4.3.1, 3.4.3.2.7 and 3.4.3.3):

- Linear interpolation for dairy cows, heifers and suckler cows for 2000 - 2009 between RAUMIS data and LZ 2010 data and retention of LZ 2010 data for all years after 2010;
- no grazing for calves (see Chapter 3.4.3.2.7);
- for male beef cattle, male cattle > 2 years and sheep adoption of the data from the LZ 2010 for all years of the time series;
- for horses and goats continuation of the assumptions for the RAUMIS data.

The time series of data finally used in the pcurrent inventory are given, as average values for Germany, in the data collection provided with the report at hand (see Chapter 2.4) on the sheets AI_1005FHO, AI_1005FST and AI_1005FSP. The time course of these averages may

Die Häufigkeiten der Ausbringungstechniken und Einarbeitungszeiten von flüssigen Wirtschaftsdüngern (unvergorene Gülle und Jauche) bei Rindern und Schweinen wurden in den Jahren 2000 – 2009 durch lineare Interpolation zwischen dem letzten RAUMIS-Jahr 1999 und dem Bezugsjahr der LZ 2010 geschätzt.

Die Daten von 2010 wurden für die Jahre 2011 und 2012 beibehalten, mit der Ausnahme, dass 2012 die Einarbeitung der flüssigen Wirtschaftsdünger vorschriftsgemäß auf „innerhalb von 4 Stunden“ verkürzt wurde, wo dies bislang nicht der Fall war. Grund hierfür ist eine Konkretisierung der Verwaltungsvorschriften zur Düngeverordnung (DÜNGEVERORDNUNG, 2007) in Deutschland auf Grundlage der Agrarministerkonferenz am 01.04.2011 in Jena, nach der ab 2011/2012 die Einarbeitung von flüssigem Wirtschaftsdünger innerhalb von 4 Stunden nach der Ausbringung auf unbewachsenen Ackerflächen stattgefunden haben muss.

Für die Jahre 2013 und 2014 wurden die Häufigkeiten durch lineare Interpolation zwischen 2012 und den ASE-2016-Daten für 2015 geschätzt. Für 2016 und 2017 wurden die Daten von 2015 beibehalten.

Für die Ausbringung von flüssigen Gäresten aus der Vergärung von Wirtschaftsdüngern und Energiepflanzen wurden für die Jahre 1990 bis 2012 die Daten der LZ 2010 verwendet, wobei für 2012 die Einarbeitung wie bei Gülle (s. o.) auf 4 Stunden begrenzt wurde. Für die Jahre zwischen 2012 und 2015 wurden zwischen den Daten der LZ 2010 und der ASE 2016 interpoliert. Für 2016 und 2017 wurden die Daten von 2015 beibehalten.

Da es zur Ausbringung von Festmist und Geflügelmist aus der LZ 2010 keine Daten gibt, wurde die Lücke zwischen dem letzten RAUMIS-Jahr 1999 und dem Bezugsjahr der ASE 2016, d. h. 2015, durch lineare Interpolation geschlossen. Für 2016 und 2017 wurden die Daten von 2015 beibehalten.

Für Weidegang wurde ausgehend von der eingeschränkten Verfügbarkeit von Weidedaten (siehe dazu die Kapitel 3.4.3.1, 3.4.3.2.7 und 3.4.3.3) folgendes Vorgehen festgelegt:

- bei Milchkühen, Färsen und Mutterkühen lineare Interpolation für 2000 – 2009 zwischen RAUMIS-Daten und Daten der LZ 2010 sowie Beibehaltung der Daten der LZ 2010 für alle Jahre nach 2010;
- bei Kälbern kein Weidegang (siehe Kapitel 3.4.3.2.7);
- bei männlichen Mastrindern, männlichen Rindern > 2 Jahre sowie Schafen Übernahme der Daten aus der LZ 2010 für alle Jahre der Zeitreihe;
- bei Pferden und Ziegen Fortbestand der Annahmen zu den RAUMIS-Daten.

Die Zeitreihen der im aktuellen Inventar schließlich verwendeten Daten finden sich als Mittelwerte für Deutschland in der Datensammlung (siehe Kapitel 2.4) auf den Tabellenblättern AI_1005FHO, AI_1005FST und AI_1005FSP. Der zeitliche Verlauf dieser Mittelwerte

differ from the above rules for closing the data gaps. The reason is that it is averaged using the numbers of animals in the federal states as averaging weights. Thus, the frequency values and grazing times, which as a rule vary from state to state, are weighted with animal numbers which differ from state to state and from year to year.

kann von den oben vorgegebenen Regeln zur Schließung der Datenlücken abweichen, da es sich um eine mit den Tierzahlen der Bundesländer gewichtete Mittelung handelt. So werden die in der Regel von Bundesland zu Bundesland verschiedenen Häufigkeitswerte und Weidedauern mit Tierzahlen gewichtet, die sich von Bundesland zu Bundesland und von Jahr zu Jahr unterscheiden.

3.4.4 Data on the digestion of animal manures and energy crops / Daten zur Vergärung von Wirtschaftsdünger und Energiepflanzen

3.4.4.1 Data bases used / Ausgangsdaten

The time series of the activity data have been provided by KTBL (2019a) using data especially of the DBFZ (German Biomass Research Center). For the respective references see KTBL (2019a):

Die Zeitreihen der Aktivitätsdaten wurden durch KTBL (2019a) unter Verwendung von Daten insbesondere des DBFZ bereitgestellt (zu Quellenangaben siehe KTBL, 2019a):

- Register of the biogas plants known in Germany by 31 December 2016, including not only the biogas plants that generate electric energy but also biogas plants upgrading biogas to biomethane that is fed into the national gas distribution system;
- database of substrate input for 1664 anaerobic digestion plants;
- time series of installed electric capacity of anaerobic digestion plants in Germany from 1990 to 2017 and differentiated for each federal state from 2004 to 2017;
- Time series of N excretion of cattle, pigs and poultry for each federal state from 1990 to 2017 (calculated with the inventory model GAS-EM).
- Register mit den zum 31. Dezember 2016 bekannten Biogasanlagenstandorten in Deutschland, wobei neben den Energie produzierenden Biogasanlagen auch die Anlagen berücksichtigt sind, die Biogas zu Methan aufbereiten und ins Gasnetz einspeisen;
- Substratinputdatenbank zu 1664 Biogasanlagen mit Angaben zur Substratzusammensetzung;
- Daten zur installierten elektrischen Leistung der Biogasanlagen für 1990 bis 2017 für Deutschland und von 2004 bis 2017 nach Bundesländern;
- Zeitreihendaten zu N-Ausscheidungen von Rindern, Schweinen und Geflügel differenziert nach Bundesländern für 1990 bis 2017 (berechnet mit dem Inventarmodell GAS-EM).

3.4.4.2 Digestion of animal manures / Vergärung von Wirtschaftsdünger

3.4.4.2.1 Shares of digested manure and frequencies of gas tight residue storage / Anteile vergorenen Wirtschaftsdüngers und Häufigkeiten gasdichter Gärrestelager

Cattle slurry, cattle farmyard manure, pig slurry and poultry manure were considered for anaerobic digestion. Data for pig farmyard manure were too unreliable due to its low occurrence.

Table 3.11 shows German mean values of the shares of the different manure categories that were digested. The averaged time series are derived from data on federal-state level provided by KTBL (2019a). For the data used by KTBL (2019a) see Chapter 3.4.4.1. The inventory model GAS-EM used the time series on federal-state level. The data are percentages of N entering storage (including N contributions by bedding material), but were used for VS excretions as well.

The emission calculations were done separately for each single sub-category of cattle, pigs and poultry. The amounts of N and VS used for these calculations are calculated routinely in the inventory (see Chapters 3.3.3.1, 4, 5 and 8).

The data in Table 3.11 represent ratios of amounts of animal manures. Both for nominator and denominator KTBL (2019a) estimates the uncertainty (half the 95 % confidence interval) with 10 %. This results in a

Bei der Vergärung von Wirtschaftsdünger wurden Rindergülle, Rindermist, Schweinegülle und Geflügelmist berücksichtigt. Für Schweinemist war wegen des geringen Aufkommens die Datenlage zu unsicher.

Table 3.11 zeigt als Mittelwerte auf Deutschlandebene die von KTBL (2019a) für die einzelnen Bundesländer abgeleiteten Anteile der verschiedenen Wirtschaftsdünger-kategorien, die der Vergärung zugeführt wurden. Zu den Ausgangsdaten siehe Kapitel 3.4.4.1. Das Inventarmodell GAS-EM verwendete die Daten auf Bundeslandebene. Die Daten stellen Prozente der ins Lager gehenden N-Mengen dar, wurden aber auch für die VS-Ausscheidungen angewendet.

Die Berechnung von Emissionen aus der Vergärung von Wirtschaftsdünger erfolgte getrennt für jede einzelne Rinder-, Schweine- und Geflügelkategorie. Die zugrunde liegenden N- und VS-Mengen werden im Inventar routinemäßig berechnet (siehe Kapitel 3.3.3.1, 4, 5 und 8).

Die Daten in Table 3.11 stellen Quotienten von Wirtschaftsdüngermengen dar. Sowohl für Nenner als auch Zähler schätzt KTBL (2019a) die Unsicherheit (halbes 95 %-Konfidenzintervall) mit 10 %. Daraus resultiert für

total uncertainty of $(0.01^2 + 0.01^2)^{1/2} \approx 0.14$, i. e. about 14 %, for the data given in Table 3.11.

Table 3.12 shows, by analogy to Table 3.11, German mean shares of the total amounts of manure that were stored in gastight storage (as percentages of the amounts of N entering storage). The averaged time series are derived from data on federal-state level provided by KTBL (2019a). The inventory model GAS-EM used the time series on federal-state level. Due to limited data it was differentiated between different substrate categories cattle slurry, cattle farmyard manure, pig slurry and poultry manure. (Only for energy crops a separate time series was derived, see Chapter 3.4.4.3.). The marked increase of the frequency of gastight storage from 2011 to 2012 is assumed to be due to the Renewable Energy Act 2012 (Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG), that prescribes a gastight cover for all storages of digestate that were put into operation as of 1 January 2012. The percentages of gastight storage have been updated for 2013 and subsequent years. The shares given in Table 3.12 were interpreted as shares of N and VS.

die Daten in Table 3.11 eine Gesamtunsicherheit von $(0,01^2 + 0,01^2)^{1/2} \approx 0,14$, entsprechend rund 14 %.

Table 3.12 zeigt in einer Darstellung analog zu Table 3.11 Mittelwerte auf Deutschlandebene für die von KTBL (2019a) für die einzelnen Bundesländer abgeleiteten Anteile der Wirtschaftsdünger-Gesamtmenge, die nach der Vergärung in gasdichten Gärrestlagern gelagert wurden (in Prozent der ins Lager gehenden N-Menge). Das Inventarmodell GAS-EM verwendete die Daten auf Bundeslandebene. Eine Differenzierung nach den Substratkategorien Rindergülle, Rindermist, Schweinegülle und Geflügelmist wurde wegen der begrenzten Datenbasis nicht vorgenommen. (Lediglich für Energiepflanzen wurde eine separate Zeitreihe erstellt, siehe Kapitel 3.4.4.3.) Der starke Anstieg in der Verbreitung der gasdichten Gärrestlagerung von 2011 zu 2012 wird auf das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2012 zurückgeführt, das für alle Gärrestlager eine gasdichte Abdeckung vorschreibt, die ab 1. Januar 2012 in Betrieb genommen wurden. Die Prozentwerte der gasdichten Abdeckung wurden für alle Jahre ab 2013 aktualisiert. Die Daten in Table 3.12 wurden auch für die ins Lager gehenden VS-Mengen übernommen.

Table 3.11: Digestion of manures, percentages of animal manures used as feedstock

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
total (weighted mean)	0.003	0.008	0.011	0.015	0.018	0.045	0.074	0.096	0.214	0.246
cattle slurry	0.005	0.012	0.017	0.022	0.024	0.060	0.099	0.129	0.291	0.336
cattle solid manure	0.001	0.002	0.003	0.004	0.005	0.013	0.022	0.028	0.066	0.075
pig slurry	0.003	0.009	0.012	0.016	0.019	0.048	0.078	0.097	0.202	0.234
poultry manure	0.004	0.010	0.015	0.019	0.023	0.056	0.091	0.114	0.251	0.288
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
total (weighted mean)	0.40	0.55	0.82	0.98	1.30	2.73	4.11	5.85	7.04	8.90
cattle slurry	0.55	0.77	1.16	1.40	1.89	3.75	5.96	8.68	10.51	13.42
cattle solid manure	0.12	0.16	0.24	0.29	0.38	0.83	1.22	1.61	1.86	2.32
pig slurry	0.38	0.53	0.76	0.88	1.18	2.67	3.65	5.29	6.44	8.01
poultry manure	0.43	0.59	0.85	1.00	1.26	3.22	4.36	5.37	6.21	7.86
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
total (weighted mean)	11.2	13.5	14.4	16.1	16.6	16.9	16.8	17.0	17.2	
cattle slurry	16.7	20.6	22.2	24.6	25.5	25.9	25.7	26.4	26.8	
cattle solid manure	2.9	3.6	4.0	4.3	4.4	4.5	4.5	4.7	4.8	
pig slurry	10.3	12.2	13.0	14.8	15.2	16.2	16.1	16.1	16.7	
poultry manure	9.8	10.9	11.3	12.8	13.0	13.5	13.4	13.1	12.9	

Table 3.12: Digestion of manures, percentages of gas tight storage of digestate from animal manures

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
gas tight	0.0	0.9	1.8	2.7	3.6	4.5	5.4	6.3	7.2	8.1
not gas tight	100.0	99.1	98.2	97.3	96.4	95.5	94.6	93.7	92.8	91.9
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
gas tight	9.1	10.0	10.9	12.3	13.8	15.2	20.3	25.3	30.4	35.5
not gas tight	90.9	90.0	89.1	87.7	86.2	84.8	79.7	74.7	69.6	64.5
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
gas tight	40.6	45.6	57.0	59.1	60.9	61.6	61.9	61.8	61.9	
not gas tight	59.4	54.4	43.0	40.9	39.1	38.4	38.1	38.2	38.1	

Emissions arising in connection with the application of digestates from the anaerobic digestion of animal manures (N-species only) are addressed in the following Chapters 3.4.4.2.3 and 3.4.4.2.4.

Zu Emissionen, die im Zusammenhang mit der Ausbringung von Gärresten aus der Vergärung von Wirtschaftsdüngern entstehen (nur N-Spezies), siehe die nachfolgenden Kapitel 3.4.4.2.3 und 3.4.4.2.4.

3.4.4.2.2 Data for CH₄ emission calculations / Daten für CH₄-Emissionsberechnung

The calculation of CH₄ emissions from digestion of manure (including storage of digested slurry, see Chapter 3.3.4.4.1) requires the amounts of VS excreted per animal place and year (for cattle, pigs and poultry), the maximum methane producing capacity B_o , and the CH₄ density ρ_{CH_4} . VS excretions are routinely calculated in the inventory (see Chapters 3.3.3.1, 4, 5, and 8). For the maximum methane producing capacity B_o see Chapter 4 and 5. According to IPCC (2006)-10.41, Eq. 10.23, a CH₄ density ρ_{CH_4} of 0.67 kg m⁻³ is used.

Besides the relative share of manure that is digested and the frequencies of gas-tight storages (see Chapter 3.4.4.2.1), the calculation of CH₄ emissions requires the following additional data which will subsequently be discussed in more detail:

- Methane conversion factor of pre-storage (MCF_{ps}),
- leakage rate of the digester (L_{dig}),
- relative potential of residual gas (μ_{rg}),
- leakage rate of the gas-tight storage ($L_{sto,gt}$),
- methane conversion factor of the non-gastight storage of the digestate (MCF_{ngts}).

No methane conversion factor (MCF) is available for pre-storage of slurry. The MCF has been derived as follows: Based on the data generated by the Biogas Measurements Programme II (BMPII, 2009), KTBL assumes that the size of pre-storage facilities corresponds to a seven-days production of slurry. As a rule, there is no natural crust. For farms with animal husbandry the German Fertilizer Ordinance (DÜNGEVERORDNUNG, 2017, § 12 Absatz 2) states that slurry tanks must be able to hold a six-months production of slurry. This approximately corresponds to a mean duration of storage of 3 months. It is assumed that this mean duration is represented by the respective MCF used in the inventory. It is then assumed that slurry pre-storages are completely and exclusively filled with slurry. This assumption is conservative as it ignores that pre-storages also contain leachate from silage and rain water. These considerations lead to an estimate of the pre-storage MCF (MCF_{ps}) that is about 7 days / 90 days = 8 % of the MCF for untreated slurry without natural crust in an open tank. As this is a very simple approximation, the percentage is rounded to 10 % yielding the following pre-storage MCF: $MCF_{ps} = 0.017 \text{ m}^3 \text{ m}^{-3}$ for cattle slurry and $MCF_{ps} = 0.025 \text{ m}^3 \text{ m}^{-3}$ for pig slurry.

The pre-storage of cattle farmyard manure is dealt with by analogy. Hence, the standard MCF for cattle farmyard manure used in the inventory (see Chapter 4.2.1) leads to the pre-storage MCF $MCF_{ps} = 0.002 \text{ m}^3 \text{ m}^{-3}$. (Digestion of pig farmyard manure is not considered, see Chapter 3.3.4.4.)

The procedure to estimate of MCF_{ps} for poultry manure is based on the procedure for slurry as well. IPCC (2006) provides an MCF for the storage of manure produced by laying hens, broilers, ducks and turkeys that is $0.015 \text{ m}^3 \text{ m}^{-3}$ for the climatic conditions in Germany. This

Zur Berechnung von CH₄-Emissionen aus der Vergärung von Wirtschaftsdünger einschließlich des Gärreste-Managements (siehe Kapitel 3.3.4.4.1) werden die pro Tierplatz und Jahr ausgeschiedene VS-Menge, die maximale CH₄-Bildungskapazität B_o sowie die CH₄-Dichte ρ_{CH_4} benötigt. Die hier benötigten VS-Ausscheidungen von Rindern, Schweinen und Geflügel werden routinemäßig berechnet (siehe Kapitel 3.3.3.1, 4, 5 und 8). Zu B_o siehe Kapitel 4 und 5. Die CH₄-Dichte ρ_{CH_4} wird nach IPCC (2006)-10.41, Gl. 10.23, mit $0,67 \text{ kg m}^{-3}$ angesetzt.

Neben dem Anteil des vergorenen Wirtschaftsdüngers und der Häufigkeit gasdichter Gärrestelager (siehe Kapitel 3.4.4.2.1), werden für Berechnung von CH₄-Emissionen zusätzlich folgende Eingangsgrößen benötigt, auf die im Anschluss näher eingegangen wird:

- Vorlager-Methanumwandlungsfaktor (MCF_{ps}),
- Leckagerate des Fermenters (L_{dig}),
- relatives Restgaspotential (μ_{rg}),
- Leckagerate des gasdichten Gärrestelagers ($L_{sto,gt}$),
- Methanumwandlungsfaktor des nicht gasdichten Gärrestelagers (MCF_{ngts}).

Für die Lagerung von Gülle in einer Vorgrube ist kein Methanumwandlungsfaktor (MCF) bekannt. Er wird wie folgt abgeleitet: Basierend auf Angaben aus dem Biogas-Messprogramm II (BMPII, 2009) geht KTBL davon aus, dass die Größe von Vorgruben etwa der Güllemenge von 7 Tagen entspricht. Es bildet sich i. d. R. keine Schwimmdecke. Für tierhaltende Betriebe schreibt die deutsche Düngeverordnung eine Mindestlagerkapazität für Gülle von 6 Monaten vor (DÜNGEVERORDNUNG, 2017, § 12 Absatz 2). Dies entspricht überschlägig einer mittleren Lagerdauer der Gülle von 3 Monaten, auf die sich der im Emissionsinventar angesetzte MCF bezieht. Es wird in konservativer Weise angenommen, dass Vorgruben auf Biogasanlagen immer vollständig und ausschließlich mit Gülle gefüllt sind (d. h. der Umstand, dass in der Vorgrube auch Silage-Sickerwässer und Regenwasser gespeichert werden, wird vernachlässigt). Daraus ergibt sich der Methanumwandlungsfaktor MCF_{ps} somit mit rund 7 Tage / 90 Tage = 8 % des MCF für die Lagerung unvergorener Gülle im offenen Tank. Wegen dieser einfachen Schätzmethodik wird der Prozentwert auf glatte 10 % gerundet, womit sich folgende Vorlager-MCF-Werte ergeben: $MCF_{ps} = 0,017 \text{ m}^3 \text{ m}^{-3}$ für Rindergülle und $MCF_{ps} = 0,025 \text{ m}^3 \text{ m}^{-3}$ für Schweinegülle.

Für die Vorlagerung von Rindermist wird analog vorgegangen. Damit resultiert aus dem im Inventar verwendeten MCF-Wert für Rindermisthaufen (siehe Kapitel 4.2.1) der Vorlager-MCF-Wert $MCF_{ps} = 0,002 \text{ m}^3 \text{ m}^{-3}$. (Die Vergärung von Schweinemist wird nicht berücksichtigt, siehe Kapitel 3.3.4.4.)

Die Schätzung von MCF_{ps} für Geflügelkot orientiert sich ebenfalls an der Vorgehensweise für Gülle. IPCC (2006) gibt für Legehennen, Masthähnchen, Enten und Puten für die Lagerung von Geflügelkot unter den klimatischen Bedingungen in Deutschland einen MCF von

results in an estimate of pre-storage MCF for poultry manure of $MCF_{ps} = 0.0015 \text{ m}^3 \text{ m}^{-3}$. This value is adopted for all poultry manure that is digested.

For the leakage rate of the digester (L_{dig}), KTBL (2019a) proposes a general value of 1 %. This value is generally agreed upon and used in most calculations of the greenhouse gas balance of biogas production. Studies that used $L_{dig} = 1 \%$ are e. g.: BACHMAIER and GRONAUER (2007), BÖRJESSON and BERGLUND (2007), GÄRTNER et al. (2008) and ROTH et al. (2011). In 2016 the Federal Environment Agency published a study that, too, is based on a leakage rate of 1 % (UBA, 2016a).

In practice, the potential of residual gas (i. e. the difference $B_o - v_{CH4, prod}$, see Chapter 3.3.4.4.1) is not given as a share of the maximum methane producing capacity B_o , but as a share of the amount of gas usable for energy production. Hence, a new quantity v_{rg} can be defined which is closely related to μ_{rg} (for μ_{rg} see Chapter 3.3.4.4.1, Equation (3.65)):

$$v_{rg} = \frac{B_o - v_{CH4, prod}}{v_{CH4, prod}} \quad (3.85)$$

with

$$\mu_{rg} = \frac{v_{rg}}{1 + v_{rg}} \quad (3.86)$$

v_{rg}	relative potential of residual gas, related to $v_{CH4, prod}$
B_o	maximum methane producing capacity per kg of VS (in $\text{m}^3 \text{ kg}^{-1}$)
$v_{CH4, prod}$	specific volume of methane produced in the digester (related to VS input) (in $\text{m}^3 \text{ kg}^{-1}$)
μ_{rg}	relative potential of residual gas, related to B_o (with $0 \leq \mu_{rg} \leq 1 \text{ m}^3 \text{ m}^{-3}$)

The potential of residual gas is, among other things, a function of temperature. In Germany mesophilic digestion²² is predominant, which comes with a temperature range of about 30 – 42 °C. KTBL (2019a) provides $v_{rg} = 4,8 \%$ for 37°C. This value is used for the inventory and relates, according to Equation (3.86), to $\mu_{rg} = 4,6 \%$.

No data is available on the leakage rate of the storage, $L_{sto, gt}$. Hence it is assumed that is equal to the leakage rate of the digester, L_{dig} .

For the MCF of the non-gastight storage (MCF_{ngts}) the German inventory uses the MCF of an open cattle slurry tank with natural crust ($0,1 \text{ m}^3 \text{ m}^{-3}$, see Chapter 4.2.1). This estimate takes into account that usual co-fermentation of slurry, farmyard manure and energy crops produces generally leads to liquid digestate the viscosity of which resembles, due to the high share of dry matter originating from the energy crops, more the viscosity of cattle slurry than that of pig slurry and that

$0,015 \text{ m}^3 \text{ m}^{-3}$ an. Daraus resultiert für das Vorlager $MCF_{ps} = 0,0015 \text{ m}^3 \text{ m}^{-3}$. Dieser Wert wird für den gesamten zu vergärenden Geflügelkot übernommen.

Für die Leckagerate des Fermenters (L_{dig}) wird nach Vorgabe durch KTBL (2019a) ein einheitlicher Wert von 1 % verwendet. Dies ist ein Konventionswert, der in den meisten Berechnungen zur Klimagasbilanz der Biogaserzeugung verwendet wird. Studien, die den 1%-Wert verwenden, sind z. B. BACHMAIER und GRONAUER (2007), BÖRJESSON und BERGLUND (2007), GÄRTNER et al. (2008) und ROTH et al. (2011). Das Umweltbundesamt geht in einer Studie von 2016 ebenfalls von einer Leckagerate von 1 % aus (UBA, 2016a).

Das Restgaspotential, d. h. die Differenz $B_o - v_{CH4, prod}$ (siehe Kapitel 3.3.4.4.1), wird in der Praxis i. d. R. nicht als Anteil der maximal möglichen Methanausbeute B_o , sondern als Anteil der produzierten nutzbaren Gasmenge angegeben. Dementsprechend lässt sich eine zu μ_{rg} (siehe Kapitel 3.3.4.4.1, Gleichung (3.65)) verwandte Größe v_{rg} definieren:

Das Restgaspotential ist u. a. eine Funktion der Temperatur. Die in Deutschland vorherrschende mesophile Vergärung²² erfolgt in einem Bereich von ca. 30 – 42 °C. KTBL (2019a) gibt v_{rg} für 37°C mit 4,8 % an. Dieser Wert wird für das Inventar verwendet. Nach Gleichung (3.86) folgt daraus $\mu_{rg} = 4,6 \%$.

Für die Lager-Leckagerate $L_{sto, gt}$ sind keine Daten verfügbar. Daher wird angenommen, dass sie gleich der Leckagerate des Fermenters (L_{dig}) ist.

Für den MCF der nicht gasdichten Lagerung (MCF_{ngts}) verwendet das Inventar den Wert für offene Rindergülle-Lagerung mit Schwimmdecke ($0,1 \text{ m}^3 \text{ m}^{-3}$, siehe Kapitel 4.2.1). Damit wird berücksichtigt, dass die bei der praxisüblichen gemeinsamen Vergärung von Gülle, Mist und Energiepflanzen anfallenden Gärreste flüssig sind, und dass wegen der von den Energiepflanzen stammenden Trockensubstanz die Viskosität der flüssigen Gärreste eher der von Rindergülle als der von Schweinegülle

²² Siehe <http://www.renewable-energy-concepts.com/german/bioenergie/biogas-basiswissen/mesophil-thermophil.html> und <http://biogas.fnr.de/biogas-gewinnung/gaerbiologie/prozessgroessen/>

forms a natural crust. (As there are no data available, the inventory does not consider the option to obtain solid digestate by separation of digestate.)

Despite the assumed leakage rate of the gas-carrying system of a biogas plant and the CH₄ emission from the partially non-gastight digestate storage, the total MCF calculated with equation (3.74) from chapter 3.3.4.4.1 for the combination "pre-storage / digester / digestate storage" is considerably smaller than the average MCF of conventional farmyard storage. Hence, under the given conditions, anaerobic digestion of animal manures generally leads to a reduction in CH₄ emissions from manure management. The CH₄ not emitted in this way is instead collected in the gas-carrying system of the biogas plants and used for energetic purposes. (This use and the resulting emissions are not pursued here as they are not the subject of agricultural emissions reporting.)

ähnelt und dass sich eine Schwimmdecke ausbilden kann. (Mangels Daten wird eine Separierung zum Erhalt von festen Gärresten im Inventar nicht berücksichtigt.)

Trotz der unterstellten Leckagerate des gasführenden Systems einer Biogasanlage und der CH₄-Emission aus der teilweise nicht gasdichten Gärrestlagerung ist der mit Gleichung (3.73) aus Kapitel 3.3.4.4.1 berechnete Gesamt-MCF der Kombination „Vorlager/Fermenter/Gärrestelager“ beträchtlich kleiner als der mittlere MCF der herkömmlichen Wirtschaftsdüngerlagerung. Unter den gegebenen Bedingungen führt Vergärung von Wirtschaftsdünger also generell zu einer Minderung der CH₄-Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management. Das nicht emittierte CH₄ wird stattdessen im gasführenden System der Biogasanlagen für eine energetische Nutzung gesammelt. (Diese Nutzung und die dabei entstehenden Emissionen werden hier nicht weiter verfolgt, da sie nicht Gegenstand der landwirtschaftlichen Emissionsberichterstattung sind.)

3.4.4.2.3 *Data for the calculation of N₂O, NO and N₂ / Daten für die Berechnung von N₂O, NO and N₂*

For the pre-storage of slurry it is assumed that emissions of N₂O, NO and N₂ can be neglected, see Chapter 3.3.4.4.2. For the pre-storage of farmyard manure and poultry manure it is assumed that, by analogy to CH₄ (see Chapter 3.4.4.2.2), the emission factor for N₂O-N is about 1/10 of the default emission factor.

The maximum emission factor for N₂O-N emissions from cattle and pig manure management is 0.01 kg kg⁻¹ (according to IPCC (2006)-10.62), from which a N₂O-N emission factor of 0.001 kg kg⁻¹ is derived for pre-storage of farmyard manure.

For poultry manure, IPCC (2006)-10.63 provides a default N₂O-N emission factor of 0.001 kg kg⁻¹, leading to a N₂O-N emission factor of 0.0001 kg kg⁻¹ for pre-storage.

No methodology is available for the calculation of emissions of NO and N₂ from the digestion of manure. Hence, these emissions are calculated proportionally to the N₂O emissions as it is described in Chapter 3.3.4.3.5 (Tier 3 methodology) for manure management.

The emission factor of gastight storage of digestate is zero (see Chapter 3.3.4.4.2).

The emission factor of open storage of digestate with natural crust shall be derived by a KTBL working group. As the result is not yet available, the emission factor for untreated cattle slurry with natural crust is used (0.005 kg kg⁻¹, see Chapters 4.2.2.2 and 5.2.2.2).

Table 3.13 shows the time series of the resulting overall N₂O-N emission factor for digestion of manure (slurry plus farmyard manure plus poultry manure) compared to the mean N₂O-N emission factors of the three other categories of manure management „slurry based (without digestion)“, „straw based (without deep

Bei der Gülle-Vorlagerung wird davon ausgegangen, dass N₂O-, NO- und N₂-Emissionen vernachlässigbar sind, siehe Kapitel 3.3.4.4.2. Bei der Vorlagerung von Mist und Geflügelkot wird wie bei CH₄ (siehe Kapitel 3.4.4.2.2) auch für N₂O-N ein auf 1/10 des Standard-Emissionsfaktors verringerter Emissionsfaktor angesetzt.

Der höchste Emissionsfaktor für N₂O-N aus dem Wirtschaftsdünger-Management bei Rindern und Schweinen ist nach IPCC (2006)-10.62 0,01 kg kg⁻¹, woraus dann für das Mist-Vorlager ein N₂O-N-Emissionsfaktor von 0,001 kg kg⁻¹ resultiert.

Für Geflügelkot gibt IPCC (2006)-10.63 einen Standard-Emissionsfaktor für N₂O-N von 0,001 kg kg⁻¹ an, woraus sich für das Vorlager die Annahme von 0,0001 kg kg⁻¹ ergibt.

Für die Berechnung der NO- und N₂-Emissionen im Zusammenhang mit der Vergärung von Wirtschaftsdünger ist keine Methodik bekannt. Daher werden diese Emissionen wie im Bereich Wirtschaftsdünger-Management üblich (siehe Kapitel 3.3.4.3.5, Tier-3-Verfahren) proportional zu N₂O berechnet.

Für die gasdichte Gärrestelagerung wird der Emissionsfaktor für N₂O null gesetzt, siehe Kapitel 3.3.4.4.2.

Der Emissionsfaktor für die offene Lagerung mit Schwimmdecke wird durch eine KTBL-Arbeitsgruppe abgeleitet. Bis das Ergebnis vorliegt, wird der Emissionsfaktor für die Lagerung von unvergorener Rindergülle mit Schwimmdecke verwendet (0,005 kg kg⁻¹, siehe Kapitel 4.2.2.2 und 5.2.2.2).

Table 3.13 zeigt die Zeitreihe des resultierenden effektiven N₂O-N-Emissionsfaktors für Vergärung von Wirtschaftsdünger (Gülle, Mist und Geflügelkot insgesamt) im Vergleich mit den mittleren N₂O-N-Emissionsfaktoren für die drei anderen Wirtschaftsdünger-Managementkategorien „güllebasiert (ohne Vergä-

bedding and without digestion)“, „deep bedding (without digestion)“. For each of the four manure management categories these emission factors are defined as the ratio of the total N₂O-N emissions of all animals in the respective management category to the total of N excretions in the respective management category. Note that for straw based systems the N₂O-N emissions **comprise emissions originating from straw N inputs**. This is the reason that in Table 3.13 the emission factor for deep bedding is higher than the value of 0.01 kg kg⁻¹ provided in Chapters 4.2.2.2 and 5.2.2.2. The same holds in principle for „straw based systems (without deep bedding and without digestion)“, even if it is not discernible as the values in Table 3.13 comprise the low poultry emission factor of 0.001 kg kg⁻¹ (see Chapter 8.2.1).

The emission factors are not constant with time as they are influenced by variable conditions. These are – except for the category of deep bedding – the varying shares of the different management subsystems and, for digestion, the frequencies of gastight storage that increased across the years. The latter is the reason that, as of 2008/2009, the emission factor for digestion of manure is lower than the otherwise lowest emission factor (slurry based systems). In 2008/2009 gastight storage of digestate had a share of about one third (see Chapter 3.4.4.2.1). Until 2012/2013 this share increased up to significantly more than 50 %, reducing the emission factor by about one third in comparison to 2008/2009. It becomes evident that gastight storage of digestate is an essential prerequisite for the mitigation of N₂O emissions from manure management by means of digestion of manure.

Note that for poultry manure digestion generally leads to increased N₂O emissions due to the comparably low IPCC default emission factor of 0.001 kg kg⁻¹, see Chapter 8.2.1).

rung)“, „strohbasierend (ohne Tiefstreu und ohne Vergärung)“, „Tiefstreu (ohne Vergärung)“. Diese Emissionsfaktoren sind für alle vier Managementkategorien definiert als das Verhältnis der gesamten N₂O-N-Emissionen aller Tiere aus der jeweiligen Kategorie zur Summe aller tierischen N-Ausscheidungen in dieser Kategorie. Dabei umfassen die Gesamt-N₂O-Emissionen bei Systemen mit Einstreu **auch Anteile, die auf Einstreu-N zurückgehen**. Aus diesem Grund ist in Table 3.13 der Emissionsfaktor für Tiefstreu höher als der in Kapitel 4.2.2.2 und 5.2.2.2 angegebene Wert von 0,01 kg kg⁻¹. Gleiches gilt prinzipiell auch für „strohbasierende Systeme (ohne Tiefstreu und Vergärung)“, wobei dies aber nicht direkt auffällt, weil auch der niedrige Geflügel-Emissionsfaktor von 0,001 kg kg⁻¹ (siehe Kapitel 8.2.1) eingeht.)

Die Emissionsfaktoren sind zeitlich nicht konstant, da sie von variablen Bedingungen beeinflusst werden. Dies sind – mit Ausnahme der Tiefstreu-Kategorie – die unterschiedlichen relativen Anteile der verschiedenen Untersysteme sowie bei der Vergärung die mit den Jahren zunehmende Verbreitung gasdichter Gärrestelagerung. Letztere bewirkt, dass der Emissionsfaktor für Wirtschaftsdünger-Vergärung ab 2008/2009 niedriger ausfällt als der ansonsten niedrigste Emissionsfaktor (gülle-basierte Systeme). Zu diesem Zeitpunkt erreichte die gasdichte Gärrestelagerung einen Anteil von rund einem Drittel (siehe Kapitel 3.4.4.2.1). Bis 2012/2013 stieg der Anteil der gasdichten Lagerung auf deutlich mehr als 50 % an, was den Emissionsfaktor gegenüber 2008/2009 um rund ein Drittel reduzierte. Die gasdichte Gärrestelagerung ist damit eine wesentliche Voraussetzung zur Minderung von N₂O aus dem Wirtschaftsdünger-Management durch Vergärung.

Anzumerken ist, dass bei Geflügelkot wegen des geringen IPCC-Defaultwertes für den N₂O-N-Emissionsfaktor (0,001 kg kg⁻¹, siehe Kapitel 8.2.1) die Vergärung durchgängig zu erhöhten N₂O-Emissionen führt.

Table 3.13: Digestion of manure, comparison of mean N₂O-N emission factors for the four different manure management categories in the German inventory (related to N available)

(in kg kg ⁻¹)	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
slurry based ^a	0.00312	0.00314	0.00311	0.00311	0.00346	0.00346	0.00346	0.00344	0.00342	0.00342
straw based ^b	0.00489	0.00487	0.00490	0.00491	0.00462	0.00462	0.00461	0.00459	0.00452	0.00451
deep bedding ^a	0.01116	0.01115	0.01114	0.01113	0.01124	0.01126	0.01125	0.01123	0.01122	0.01122
digestion of manure	0.00545	0.00540	0.00535	0.00530	0.00514	0.00510	0.00505	0.00500	0.00494	0.00489
(in kg kg ⁻¹)	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
slurry based ^a	0.00343	0.00344	0.00343	0.00344	0.00345	0.00345	0.00346	0.00347	0.00348	0.00349
straw based ^b	0.00448	0.00447	0.00446	0.00447	0.00443	0.00447	0.00444	0.00440	0.00437	0.00434
deep bedding ^a	0.01123	0.01122	0.01121	0.01120	0.01119	0.01118	0.01117	0.01117	0.01118	0.01117
digestion of manure	0.00485	0.00481	0.00476	0.00468	0.00461	0.00454	0.00428	0.00402	0.00376	0.00350
(in kg kg ⁻¹)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
slurry based ^a	0.00351	0.00351	0.00351	0.00351	0.00351	0.00351	0.00351	0.00351	0.00351	
straw based ^b	0.00430	0.00417	0.00410	0.00403	0.00403	0.00400	0.00399	0.00395	0.00391	
deep bedding ^a	0.01116	0.01116	0.01116	0.01116	0.01115	0.01115	0.01114	0.01114	0.01113	
digestion of manure	0.00324	0.00297	0.00237	0.00225	0.00215	0.00211	0.00210	0.00211	0.00211	

^a without digestion

^b without deep bedding and digestion

As for the pre-storage the emission factors of NO and N₂ are assumed to be proportional to the N₂O emission factor (see above).

N₂O emissions from agricultural soils due to the spreading of digested slurry are dealt with in the context of the calculation of N₂O emissions from agricultural soils due to the spreading of untreated slurry, see Chapter 11.2.

Wie beim Vorlager werden die Emissionsfaktoren für NO und N₂ proportional zum Emissionsfaktor von N₂O angesetzt (siehe oben).

Bodenbürtige N₂O-Emissionen als Folge der Ausbringung von Gärresten werden im Zusammenhang mit der Berechnung von N₂O aus landwirtschaftlichen Böden nach der Ausbringung von Wirtschaftsdünger behandelt, siehe Kapitel 11.2.

3.4.4.2.4 *Data for the calculation of NH₃ / Daten für die Berechnung von NH₃*

For the pre-storage of slurry it is assumed that emissions of NH₃ can be neglected, see Chapter 3.3.4.4.3. For the pre-storage of cattle farmyard manure and poultry manure it is assumed that, by analogy to CH₄ (see Chapter 3.4.4.2.2), the emission factor is about 1/10 of the emission factor for the normal storage. According to EMEP (2016)-3B-29, the emission factors for the normal storage (related to TAN) are 0.27 kg kg⁻¹ for cattle farmyard manure and a range between 0.14 kg kg⁻¹ and 0.24 kg kg⁻¹ for poultry manure. According to RÖSEMANN et al. (2015) the weighted overall mean for poultry is 0.17 kg kg⁻¹.

Table 3.14 shows the resulting pre-storage NH₃-N emission factors for solid manure of cattle and poultry manure. (Solid manure of pigs is not considered, see Chapter 3.4.4.2.1.)

Bei der Vorlagerung von Gülle wird davon ausgegangen, dass NH₃-Emissionen vernachlässigbar sind, siehe Kapitel 3.3.4.4.3. Bei der Vorlagerung von Rindermist und Geflügelkot wird in Analogie zur CH₄-Emission (see Chapter 3.4.4.2.2) ein Emissionsfaktor angesetzt, der 1/10 des Wertes für das normale Lager beträgt. Für Letzteres werden nach EMEP (2016)-3B-29 die folgenden Emissionsfaktoren für NH₃-N (bezogen auf TAN bzw. UAN) verwendet: 0,27 kg kg⁻¹ für Rindermist sowie ein Bereich von 0,14 kg kg⁻¹ bis 0,24 kg kg⁻¹ für Geflügelkot. Nach RÖSEMANN et al. (2015) beträgt der gewichtete Mittelwert für Geflügel 0,17 kg kg⁻¹.

Table 3.14 zeigt die daraus für Rindermist und Geflügelkot resultierenden NH₃-N-Emissionsfaktoren der Vorgrube. (Schweinemist wird nicht berücksichtigt, siehe Kapitel 3.4.4.2.1.)

Table 3.14: Digestion of manure, NH₃-N emission factors for pre-storage

	EF _{NH₃-N} (in kg kg ⁻¹)	related to
cattle, solid manure	0.027	TAN
poultry manure	0.017	UAN

In the digester the amount of TAN increases due to mineralization of organic nitrogen. Due to lack of adequate data it is not possible to model this increase context-specifically. Hence, the TAN correction factor g_{TAN} (see Chapter Kapitel 3.3.4.4.3) had to be estimated in another way. The bulletin "Eigenschaften von Biogasgülle" („Properties of biogas slurry“)(THÜRINGER LANDESANSTALT FÜR LANDWIRTSCHAFT, 2012), describes the monitoring results of 125 biogas plants in Thuringia. This bulletin (pg. 6) reports relative TAN contents of 40 to 50 % of total N at the beginning of the digestion and 55 to 70 % at the end, total N being unchanged during the process. This increase is, on average, equivalent to an increase of relative TAN content from 45 % to 62.5 % or by about 39 %. At the same time the share of organic nitrogen decrease from 55 % to 37.5 %. This means that about 32 % of the original organic nitrogen is converted to TAN, i. e. $g_{\text{TAN}} = 0.32 \text{ kg kg}^{-1}$.

The NH₃ emission factor for gastight storage of digestate is zero. The emission factor of open storage and spreading of digestate shall be derived by a KTBL working group. As the results are not yet available, the emission factors for untreated cattle slurry are used (because of a relatively high content of dry matter due to co-fermentation with energy crops). This means an NH₃-N

Im Fermenter steigt der TAN-Gehalt durch Mineralisierung organischen Stickstoffs an. Eine situationsabhängige Modellierung dieses Anstiegs ist aufgrund der wenigen verfügbaren Daten nicht möglich. Daher muss der TAN-Korrekturfaktor g_{TAN} (siehe Kapitel 3.3.4.4.3) geschätzt werden. Nach dem Merkblatt "Eigenschaften von Biogasgülle" (THÜRINGER LANDESANSTALT FÜR LANDWIRTSCHAFT, 2012, Seite 6), steigt – basierend auf einem Monitoring in 125 Thüringer Biogasanlagen - der relative TAN-Gehalt bei gleichbleibender Gesamt-N-Menge von 40 bis 50 % während der Vergärung auf 55 bis 70 % der Gesamt-N-Menge. Das entspricht einer Erhöhung des relativen TAN-Gehaltes von im Mittel 45 % auf 62,5 % oder um rund 39 %. Der Gehalt an organischem Stickstoff sinkt damit von 55 % auf 37,5 %. Das bedeutet, dass rund 32 % des ursprünglich vorhandenen organischen Stickstoffs zu TAN mineralisiert werden, d. h. $g_{\text{TAN}} = 0,32 \text{ kg kg}^{-1}$.

Für das gasdichte Gärrestelager ist der NH₃-Emissionsfaktor null. Die NH₃-Emissionsfaktoren für nicht gasdichte Lagerung und Ausbringung von Gärresten werden derzeit von einer KTBL-Arbeitsgruppe erarbeitet. Bis die Ergebnisse vorliegen, werden wegen des relativ hohen Trockensubstanzgehaltes der Gärreste (aufgrund der Mitvergärung von Energiepflanzen) die Emissions-

emission factor of 0.045 kg kg^{-1} (cattle slurry with natural crust, see Chapter 4.2.2.3). This emission factor is related to TAN.

In the case of spreading, the emission factors depend on spreading techniques and incorporation times. Preliminary emission factors for the spreading of untreated cattle manure (see Chapter 4.2.2.3) are used. The spreading of digestates from anaerobic digestion is calculated in the inventory separately from the spreading of untreated manure, in order to be able to take into account different frequencies of the application techniques and incorporation times. The frequencies for the different variants of spreading of digestates were collected by the Federal Statistical Office for the first time as part of the survey on manure application 2010 (see Chapter 3.4.3.2.6), and for the next time in the 2016 Agricultural Structure Survey for 2015 (ASE 2016, see Chapter 3.4.3.3). In the absence of data for the years prior to 2010, the frequencies from the survey on farm fertilizer application 2010 for the years 1990 - 2009 were adopted. The 2010 data were maintained for the years 2011 and 2012 because 2012 was the last year before requiring the incorporation of liquid manure and digestates within 4 hours. For 2013 and 2014 frequencies were estimated by linear interpolation between 2012 and ASE 2016 data for 2015. For 2016, data from 2015 has been retained.

With the specifications described above, anaerobic digestion of animal manures has different impact on NH_3 emissions for the various animal categories. For cattle, gastight storage of digested manure leads to a decrease of total NH_3 emissions in comparison to manure management without anaerobic digestion. However, this effect is partly compensated by increased emissions during spreading due to the higher TAN content.

For pigs, digestion of manure generally leads to higher NH_3 emissions than are calculated for the situation without digestion. This is due to the fact that, because of co-fermentation with energy crops, the digestate of pig slurry are more similar to untreated cattle slurry than to untreated pig slurry. Hence the emission factors for spreading of digested pig slurry are significantly higher than those for spreading of untreated pig slurry. This effect is intensified by the increased TAN content of the digestate.

For poultry, digestion of manure generally leads to a reduction of NH_3 emissions in comparison to manure management without digestion. In parts this is due to gastight storage of digestate, but it is also a consequence of the fact that digestate are spread differently from undigested manure: spreading techniques and incorporation times are less NH_3 emitting for spreading of digestate than for untreated poultry manure.

For the time series of the overall effect of manure digestion on NH_3 emissions see Chapter 2.2.

faktoren für unvergorene Rindergülle verwendet. Für die Lagerung der Gärreste folgt daraus ein auf TAN bezogener $\text{NH}_3\text{-N}$ -Emissionsfaktor von $0,045 \text{ kg kg}^{-1}$ (Rindergülle mit Schwimmdecke, siehe Kapitel 4.2.2.3).

Bei der Ausbringung hängen die Emissionsfaktoren von Ausbringungstechnik und Einarbeitungsdauer ab. Es werden vorläufig die Emissionsfaktoren für die Ausbringung unbehandelter Rindergülle (siehe Kapitel 4.2.2.3) verwendet. Die Gärreste-Ausbringung wird im Inventar getrennt von der Ausbringung unbehandelten Wirtschaftsdüngers berechnet, um unterschiedliche Häufigkeiten der Ausbringungstechniken und Einarbeitungszeiten berücksichtigen zu können. Die Häufigkeiten für die verschiedenen Varianten der Gärrestausrückführung wurden vom Statistischen Bundesamt erstmalig im Rahmen der Erhebung zur Wirtschaftsdüngerausbringung 2010 (siehe Kapitel 3.4.3.2.6) erhoben, danach in der Agrarstrukturserhebung 2016 für das Jahr 2015 (ASE 2016, siehe Kapitel 3.4.3.3). Mangels Daten für die Jahre vor 2010 wurden die Häufigkeiten aus der Erhebung zur Wirtschaftsdüngerausbringung 2010 für die Jahre 1990 – 2009 übernommen. Die Daten von 2010 wurden für 2011 und 2012 beibehalten, weil 2012 das letzte Jahr war, bevor die Einarbeitung von flüssigen Wirtschaftsdüngern und Gärresten innerhalb von 4 Stunden vorgeschrieben wurde. Für die Jahre 2013 und 2014 wurden die Häufigkeiten durch lineare Interpolation zwischen 2012 und den ASE-2016-Daten für 2015 geschätzt. Für 2016 wurden die Daten von 2015 beibehalten.

Mit den vorstehend beschriebenen Vorgaben hat die Vergärung von Wirtschaftsdünger bei den verschiedenen Tierkategorien unterschiedliche Auswirkungen auf die NH_3 -Emissionen. So führt die gasdichte Gärrestelagerung bei den Rindern zu einer Minderung der gesamten NH_3 -Emissionen gegenüber dem herkömmlichen Wirtschaftsdünger-Management, die aber wegen des höheren TAN-Gehaltes durch gesteigerte Emissionen bei der Gärrestausrückführung teilweise kompensiert werden.

Bei den Schweinen ergibt sich bei Vergärung generell eine Zunahme der NH_3 -Emissionen im Vergleich zur Situation ohne Vergärung. Dies liegt daran, dass durch die angenommene Mitvergärung von Energiepflanzen die Gärreste eher einer unbehandelten Rindergülle entsprechen als einer unbehandelten Schweinegülle. Dementsprechend hoch sind die NH_3 -Emissionsfaktoren für die Ausbringung im Vergleich zu unvergorener Schweinegülle. Verstärkt wird dieser NH_3 -Anstieg noch durch den erhöhten TAN-Gehalt in den Gärresten.

Bei Geflügel führt die Vergärung des Wirtschaftsdüngers generell zu einer Verringerung der NH_3 -Emissionen. Dies liegt an der gasdichten Lagerung und daran, dass nach den für die Emissionsberechnungen verwendeten Daten zu Ausbringungstechniken und Einarbeitszeiten die Ausbringung der Gärreste emissionsärmer erfolgt als die Ausbringung des unvergorenen Geflügelmists.

Für die Zeitreihe der Gesamtauswirkung der Vergärung auf die NH_3 -Emissionen siehe Kapitel 2.2.

3.4.4.3 *Digestion of energy crops / Vergärung von Energiepflanzen*

In terms of emission reporting, anaerobic digestion of energy crops (including the spreading of the digestate) represents a separate source of emissions. Hence, in spite of the usual co-fermentation of energy crops and animal manures, separate input data sets were derived for energy crops (KTBL, 2019a). Methodology, data and emission factors are described in Chapter 10.

Die Energiepflanzenvergärung (incl. Gärrestausbringung) gilt in der Emissionsberichterstattung als eigenständige Emissionsquelle. Daher wurden trotz der in der Praxis vorherrschenden Ko-Fermentierung von Energiepflanzen und Wirtschaftsdünger separate Eingangsdaten abgeleitet (KTBL, 2019a). Methodik, Daten und Emissionsfaktoren werden in Kapitel 10 beschrieben.

3.4.5 *Other activity data in animal husbandry / Andere Aktivitätsdaten in der Tierhaltung*

In the following activity data of animal husbandry are described which are of concern for more than one single animal category. For category-specific activity data, e. g. milk yield or the number of eggs produced, see the respective animal chapters.

Im Folgenden werden Aktivitätsdaten für die Tierhaltung beschrieben, die für mehr als eine Tierkategorie von Bedeutung sind. Für tierkategorie-spezifische Aktivitätsdaten wie z. B. die Milchleistung oder die Anzahl produzierter Eier wird auf die entsprechenden Tierkapitel verwiesen.

3.4.5.1 *Use of protein in pig feeding / Proteineinsatz in der Schweinefütterung*

In combination with the inquiry on pig animal numbers on 3 November 2011, the Federal Statistical Office made an survey on the use of protein in pig fattening between November 2011 and October 2012 (about 11000 farms)²³. The aim of this protein-use inquiry was to improve the data base for the emission inventory.

Im Zusammenhang mit der Erhebung über die Schweinebestände am 3. November 2011 führte das Statistische Bundesamt eine Befragung über den Einsatz von Protein in der Schweinemast im Zeitraum November 2010 bis Oktober 2011 durch (ca. 11000 Betriebe)²³. Diese Erhebung hatte das Ziel, die Datengrundlage für das Emissionsinventar zu verbessern.

The questionnaire queried feed protein contents of for the first and the last phase in phase feeding of fattening pigs; for possible phases in between no protein data were collected. The questionnaire also queried on the national level and on the level of the federal states the percentages of the various feeding concepts (single-phase, dual-phase, multi-phase feeding).

Für Mastschweine wurden die Futterproteingehalte für die erste und die letzte Fütterungsphase abgefragt; für etwaige dazwischenliegende Phasen wurden keine Daten erhoben. Außerdem wurden auf Bundesländer- und nationaler Ebene die Prozentanteile der verschiedenen Fütterungsvarianten (einphasig, zweiphasig, drei- und mehrphasig) erhoben.

Based on these data an improved model concept has been developed to account for the reduction of feed N input in fattener feeding. For this model concept and the underlying data of the survey see Chapter 5.5.3. The improved model replaces the concept used before, which was based on the distribution of the BImSchG (Federal Immission Control Act) farms and their animal numbers (RÖSEMANN et al., 2013).

Mithilfe dieser Daten wurde für das Inventar ein verbessertes Modellkonzept („N-angepasste Fütterung“) für die Mastschweinefütterung entwickelt. Zu diesem Modellkonzept und den zugrunde liegenden Erhebungsergebnissen siehe Kapitel 5.5.3. Dieses Konzept löst das frühere Konzept einer N-reduzierten Fütterung ab, die auf der Verteilung der BImSchG-Betriebe und der zugehörigen Tierzahl beruhte (RÖSEMANN et al., 2013).

The modelling of N-reduced feeding with sows which has been applied in the inventory until Submission 2013 (incl.) is not used any longer. The feeding of weaners and boars, however, is the same as for Submission 2013.

Die bis Submission 2013 einschließlich auch bei Sauen angewendete N-reduzierte Fütterung entfällt. Die Fütterung von Aufzuchtferkeln und Ebern bleibt gegenüber der Submission 2013 unverändert.

3.4.5.2 *Air scrubber systems / Abluftreinigungsanlagen*

The inventory takes into account the mitigation of emissions of NH₃ and particulate matter from housing by air scrubbing, see Chapters 3.3.4.3.3 und 3.3.4.3.5. The number of air scrubbing systems was surveyed by KTBL using manufacturer queries, including an update for the present report. From this data, the trend of the increasing use of such systems was derived.

Das Inventar berücksichtigt die Filterwirkung von Abluftreinigungsanlagen bzgl. NH₃ und Partikel, siehe Kapitel 3.3.4.3.3 und 3.3.4.3.5. Die Anzahl der Abluftreinigungsanlagen wurde durch KTBL mithilfe von Herstellerabfragen erhoben und für den vorliegenden Bericht aktualisiert. Daraus wurde der zeitliche Verlauf der Verbreitung von Abluftreinigungsanlagen abgeleitet.

²³ Table/Tabelle 1.24 in https://www.destatis.de/GPStatistik/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00009162/2030400117004.pdf

In the case of air scrubbing in pig houses, a distinction between certified and non-certified air scrubbing systems has been introduced in accordance with the improved data availability for Submission 2020 and subsequent submissions: For certified systems, removal of NH_3 and particulate matter is taken into account, for non-certified systems only removal of particulate matter.

For Submission 2020, data on air scrubbing in laying hen houses (NH_3 and particulate matter) are available for the first time (as of 2015).

In total, 6.6 % of all pig places were equipped with air scrubbers in 2018. In the case of poultry, the corresponding figure was well below 1%.

For the removal efficiency φ_{as} (see Chapter 3.3.4.3.3) typical values are used: for NH_3 in pig housings 0.8 kg kg^{-1} (i. e. 80 %) and for poultry housings 0.7 kg kg^{-1} (or 70 %); for TSP and PM_{10} , 0.9 kg kg^{-1} (or 90 %) are uniformly adopted, for $\text{PM}_{2.5}$, 0.7 kg kg^{-1} (or 70 %).

Bei der Abluftreinigung in Schweineställen wurde entsprechend der verbesserten Datenverfügbarkeit ab Submission 2020 eine Unterscheidung zwischen zertifizierten und nichtzertifizierten Abluftreinigungsanlagen eingeführt: Für die zertifizierten Anlagen wird eine Abscheidung von NH_3 und Staub berücksichtigt, während bei den nicht-zertifizierten Anlagen nur eine Staub-Abscheidung berechnet wird.

Für die Submission 2020 waren erstmals Daten zur Abluftreinigung (NH_3 und Staub) in Legehennenställen verfügbar (ab Zeitreihenjahr 2015).

Im Jahr 2018 waren 6,6 % aller Schweineplätze mit NH_3 -Abluftreinigung ausgestattet, beim Geflügel lag die entsprechende Zahl deutlich unter 1 %.

Für die Reinigungseffizienz φ_{as} (s. Kapitel 3.3.4.3.3) werden typische Werte angesetzt: für NH_3 bei Schweinen $0,8 \text{ kg kg}^{-1}$ (d. h. 80 %) und bei Geflügel $0,7 \text{ kg kg}^{-1}$ (bzw. 70 %); für TSP und PM_{10} werden einheitlich $0,9 \text{ kg kg}^{-1}$ (bzw. 90 %) angenommen, für $\text{PM}_{2.5}$ $0,7$ (bzw. 70 %).

3.4.6 Data gaps and uncertainties / Datenlücken und Unsicherheiten

Procedures for data gap closure are described in specific subchapters from Chapter 4 onwards.

The description of the uncertainties of the emission calculations in the respective sub-chapters as of Chapter 4 is based on the following guidance documents: IPCC (2006), Chapter 3; EMEP (2016), Part A, Chapter 5; „Anleitung zur Durchführung eines Expert Judgement (Expertenschätzung) zur Unsicherheitsbestimmung“ („Guidance for expert judgements“) by Umweltbundesamt (Qualitätssicherungs-System Emissionen, unpublished typescript).

For total uncertainties of the German agricultural GHG and NH_3 emission inventories see Chapter 14.

Die Behandlung von Datenlücken wird ab Kapitel 4 in den entsprechenden Unterkapiteln beschrieben.

Die Beschreibung der Unsicherheiten der Emissionsberechnungen in den entsprechenden Unterkapiteln ab Kapitel 4 orientiert sich an IPCC (2006), Kapitel 3, und EMEP (2016), Part A, Kapitel 5, sowie an der „Anleitung zur Durchführung eines Expert Judgement (Expertenschätzung) zur Unsicherheitsbestimmung“ (Umweltbundesamt, Qualitätssicherungs-System Emissionen, unveröffentlichtes Typeskript).

Auf die Gesamtunsicherheiten (Emissionshöhe und Trend) des THG-Inventars und des Ammoniak-Inventars der deutschen Landwirtschaft geht Kapitel 14 ein.

3.5 Quality management / Qualitätsmanagement

In the following the various modules of the quality management for the inventory preparation are described.

Im Folgenden werden die verschiedenen „Bausteine“ des Qualitätsmanagements für die Erstellung des Emissionsinventars beschrieben.

3.5.1 Quality management of emission inventory preparation at the Thünen Institute / Qualitätsmanagement der Emissionsinventarerstellung am Thünen-Institut

For the inventory preparation the UNFCCC Reporting Guidelines require the implementation of a system of quality control and assurance (QC/QA). The National Coordination Agency (NaKo) within the Federal Environment Agency (UBA) has established the Quality System for Emissions Inventories (QSE) to comply with the requirements of UNFCCC and IPCC with respect to quality management. The guidebook of the quality system (Version 5.0 (UBA, 2016)) specifies the international requirements for the National System of Emissions Inventories (NaSE) in Germany. It describes a concept complying with the standards of inventory preparation.

The Thünen Institute as participant of the NaSE (even though external to the NaKo) has, according to the re-

Die UNFCCC Reporting Guidelines fordern bei Emissionsinventar-Erstellung die Implementierung einer Qualitätskontrolle und -sicherung (QK/QS). Die Nationale Koordinierungsstelle (NaKo) des Umweltbundesamtes (UBA) hat das Qualitäts-System Emissionsinventare (QSE) zur Umsetzung der Anforderungen der UNFCCC und des IPCC an das Qualitätsmanagement eingerichtet. Das Handbuch des Qualitäts-Systems (Version 5.0 (UBA, 2016b)) spezifiziert die internationalen Anforderungen für das Nationale System Emissionsinventare (NaSE) in Deutschland. Es beschreibt das Konzept für eine regelkonforme Emissionsinventar-Erstellung.

Das Thünen-Institut als Teilnehmer des NaSE außerhalb der NaKo hat ein den QSE-Vorgaben entsprechendes eige-

quirements of the QSE, established its own quality management for the inventory preparation, see BMVEL (2012) and the updated version BMEL (2016). The supplemental document „Ausführungsbestimmung zur Erstellung von Emissions- und Kohlenstoffinventaren und deren Qualitätsmanagement für den Bereich der Quellgruppen Landwirtschaft und LULUCF (vTI, 2012; updated version: TI, 2016) describes in detail the implementation of the standards of the QSE and its endorsement by additional rules.

Processes and quality control/assurance of the emission inventory preparation at Thünen Institute are schematically displayed in


Figure 3.7. For more details see Chapters 3.5.1.1 to 3.5.1.4.

nes Qualitätsmanagement für die Emissionsinventarerstellung etabliert, siehe BMVEL (2012) und in der aktualisierten Fassung BMEL (2016). Das ergänzende Dokument „Ausführungsbestimmung zur Erstellung von Emissions- und Kohlenstoffinventaren und deren Qualitätsmanagement für den Bereich der Quellgruppen Landwirtschaft und LULUCF“ (vTI, 2012; aktualisierte Fassung: TI, 2016) beschreibt im Detail, wie die Anforderungen des QSE umgesetzt und durch weiter gehende Regelungen ergänzt werden.

Der Ablauf einer Emissionsinventarerstellung und deren Qualitätskontrolle/-sicherung ist in

Figure 3.7 schematisch dargestellt. Nähere Informationen sind in Kapitel 3.5.1.1 bis 3.5.1.4 zu finden.

Figure 3.7: Processes and quality control/assurance of the emission inventory preparation at Thünen Institute



3.5.1.1 Quality checks at the Thünen Institute / Qualitätskontrolle am Thünen-Institut

The quality control of the inventory preparation is based on several work steps subdivided in distinct tasks described in the document „Ausführungsbestimmung...“ (TI, 2016), see

Figure 3.7 in the previous chapter. Particularly relevant are tasks like comparisons and checks by specific calculations. The results of these tasks have to satisfy specific criteria of the achievement of objectives.

In this process the emission results calculated with the inventory model GAS-EM cannot be compared to other German emission results as such data sets are not available. Instead, for the relevant emission sources, international intercomparisons are made as far as possi-

Als Grundlage für die Qualitätskontrolle der Emissionsinventarerstellung dienen die im Dokument „Ausführungsbestimmung...“ (TI, 2016) beschriebenen Aufgaben innerhalb der einzelnen Arbeitsschritte, siehe

Figure 3.7 im vorhergehenden Kapitel. Dabei sind vor allem Aufgaben wie Vergleiche und Kontrollrechnungen relevant, deren Ergebnisse bestimmte Kriterien der Zielerreichung erfüllen müssen.

In diesem Prozess können die mit dem Inventarmodell GAS-EM berechneten nationalen Emissionsergebnisse nicht mit anderen nationalen Daten verglichen werden, da solche Daten nicht vorliegen. Stattdessen wird, soweit möglich, für die relevanten Quellgruppen ein

ble for input data and emission results, taking into account default values provided in the guidance documents. These comparisons are presented in the report at hand in specific sub-chapters from Chapter 4 on.

For the various tasks relevant for the quality control the specific criteria of the achievement of objectives are defined in the document „Ausführungsbestimmung...“ (TI, 2016). The execution of all tasks as well as the compliance with the criteria of achievement of objectives during the process of inventory implementation are surveyed by the responsible personnel with the help of the specific Thünen Institute checklists: Compliance with the criteria is either conformed or the non-compliance has to be justified.

3.5.1.2 *Documentation and Archiving / Dokumentation und Archivierung*

The central place for the documentation of the QSE is the so called Inventory Description. The latter has a obligatory structure in which to store all the documents and information relevant for inventory preparation, inventory reconstruction and quality management. The Inventory Description of the inventories established at Thünen Institute is held in the institute's internet platform („Greenhouse Gas Wiki“). This internet platform represents the central interface between Thünen Institute and NaKo in the Federal Environmental Agency, as NaKo has full access to the internet platform. Thünen Institute and NaKo take care of periodical storing and archiving of the data.

Vergleich von Eingangsgrößen und Emissionsergebnissen mit Defaultwerten aus den Richtlinien und entsprechenden Daten benachbarter Staaten durchgeführt. Diese Vergleiche werden im vorliegenden Bericht in entsprechenden Unterkapiteln ab Kapitel 4 beschrieben.

Für die verschiedenen qualitätskontrollrelevanten Aufgaben sind spezifische Kriterien der Zielerreichung in der „Ausführungsbestimmung...“ (TI, 2016) festgelegt. Die Erledigung aller Aufgaben sowie die Erfüllung der Kriterien der Zielerreichung wird mit den Checklisten des Thünen-Instituts während der Emissionsinventarerstellung von den zuständigen Mitarbeitern des Thünen-Instituts überprüft. Die Einhaltung dieser Kriterien wird bestätigt oder deren Nichteinhaltung begründet.

Der zentrale Dokumentationsort des QSE ist die so genannte Inventarbeschreibung. Diese umfasst in einer vorgegebenen Struktur alle für die Erstellung und Rekonstruktion des Emissionsinventars sowie für das Qualitätsmanagement relevanten Informationen und Dokumente. Die Inventarbeschreibung wird am Thünen-Institut in Form einer institutseigenen Internet-Plattform („Treibhausgas-Wiki“) geführt und stellt eine zentrale Schnittstelle zwischen Thünen-Institut und der NaKo im Umweltbundesamt dar, da die vollen Zugriff auf die Internet-Plattform besitzt. Durch das Thünen-Institut und die NaKo erfolgt eine regelmäßige Sicherung und Archivierung der Daten.

3.5.1.3 *Quality assurance by the NaKo / Qualitätssicherung durch die NaKo*

The quality of data and methods used to prepare the inventory is checked by NaKo with the help of checklists, the so-called QSE checklists (QSE Guidebook, (UBA, 2016), Chapter 4.2.5). The QSE checklists have to be used in parallel to the inventory preparation. These checklists, which entail criteria of the achievement of objectives, serve for survey and documentation of the successful implementation of the quality controls by the participants of the NaKo. Compliance with the criteria is either conformed or the non-compliance has to be justified. Any violation of these criteria leads to the definition of measures of improvement to be implemented during the inventory preparation by the participants of NaSE. The measures of improvement are administrated within the Inventory Plan (QSE Guidebook, (UBA, 2016), Chapter 4.2.6) that represents an additional tool for the quality assurance of the emission inventories. The contents of the Inventory Plan are based on the results of the QSE checklists, the improvements planned as addressed in the NIR, as well as the results of the various review procedures by UNFCCC and the EU commission. The Inventory Plan is updated in a permanent process and discussed in consultations with the NaSE participants.

Die Qualität der dem Inventar zugrunde liegenden Daten und Methoden wird von der NaKo mithilfe von Checklisten, den QSE-Checklisten, kontrolliert (QSE-Handbuch (UBA, 2016), Kapitel 4.2.5). Die QSE-Checklisten sind parallel zur Inventarerstellung auszufüllen. Sie dienen der Überprüfung und Dokumentation der erfolgreichen Durchführung der Qualitätskontrollen der Teilnehmer des NaSE und enthalten diverse Kriterien der Zielerreichung. Die Einhaltung dieser Kriterien wird bestätigt oder ihre Nichteinhaltung begründet. Nicht eingehaltene Kriterien führen zur Formulierung von Verbesserungsmaßnahmen. Die von den Teilnehmern des NaSE während der Emissionsinventarerstellung umzusetzenden Verbesserungsmaßnahmen werden im Inventarplan (QSE-Handbuch (UBA, 2016), Kapitel 4.2.6) verwaltet, der damit ein weiteres Instrument zur Qualitätssicherung der Emissionsinventare darstellt. In die Erstellung des Inventarplans fließen die Ergebnisse der QSE-Checklisten, die im NIR benannten geplanten Verbesserungsaktivitäten sowie die Ergebnisse der verschiedenen Reviewprozeduren der UNFCCC und der EU-Kommission ein. Der Inventarplan wird in einem fortlaufenden Prozess regelmäßig aktualisiert und mit den Teilnehmern des NaSE abgestimmt.

3.5.1.4 *Quality assurance by external checks / Qualitätssicherung durch externe Überprüfungen*

After termination of inventory preparation, the complete German emission inventory is subject to additional checks carried out by NaKo: initial quality check, in-house consultations within the Federal Environment Agency, inter-ministerial co-ordination. After release of the emission inventory by NaKo the emission inventory is checked within a routine review process carried out by UNFCCC (Initial Check, S&A, Individual Review). In addition to the UNFCCC review the quality of the emission inventory is assured by a review process carried out by UNECE (Initial Check, S&A, In-depth Reviews).

If necessary, external experts (e.g. from KTBL) or the Ministry of Agriculture are consulted to evaluate the inventory.

Nach seiner Fertigstellung durchläuft das gesamte deutsche Emissionsinventar weitere Überprüfungen durch die NaKo (initiale Qualitätskontrolle, Hausabstimmung im Umweltbundesamt, Ressortabstimmung). Nach der Freigabe des Emissionsinventars durch die NaKo tritt das Emissionsinventar in den routinemäßigen Reviewprozess unter UNFCCC (Initial Check, S&A, Individual Review) ein. Zusätzlich zu den UNFCCC-Reviews wird das Emissionsinventar durch den Reviewprozess unter UNECE (Initial Check, S&A, In-depth Reviews) qualitätsgesichert.

Je nach Bedarf werden vom Thünen-Institut externe Experten wie beispielsweise KTBL oder das BMEL zu Beurteilungen des Emissionsinventars hinzugezogen.

3.5.2 *Changes with respect to the previous submission / Änderungen gegenüber der vorherigen Berichterstattung*

This chapter provides short descriptions of changes of methods and data that were made to improve the emission reporting for the German Agriculture in comparison to the previous submission (Submission 2019). The modifications are shortly described in the following according to the chapter numbers used in the report at hand. These chapter-wise annotations are preceded by short descriptions of modifications that concern more than one chapter.

A quantitative summary of the changes in emissions due to the aforementioned modifications is provided in Chapter 2.3.

Dieses Kapitel beinhaltet Kurzbeschreibungen zu Änderungen von Methoden und Daten, die zur Verbesserung der deutschen landwirtschaftlichen Emissionsberichterstattung gegenüber der letzten Submission (Submission 2019) vorgenommen wurden. Die Änderungen werden im Folgenden übersichtsartig unter der im vorliegenden Bericht geltenden Kapitelnummer beschrieben. Dem gehen Kurzbeschreibungen zu wichtigen Änderungen voraus, die mehrere Kapitel betreffen.

Eine quantitative Darstellung der mit den vorgenannten Modifikationen verbundene Änderungen in der Höhe der Emissionen findet sich in Kapitel 2.3.

Structure of this report

Following Chapter 11.7, a new Chapter 11.8 was inserted compared to the report on Submission 2019 (i. e. Rösemann et al., 2019) (mineralization of organic soil). For the previous Chapter 11.8 and the following chapters, the chapter numbering has been adjusted accordingly.

Gliederung des vorliegenden Reports

Im Anschluss an Kapitel 11.7 wurde gegenüber dem Bericht der Submission 2019 (d. h. Rösemann et al., 2019) ein neues Kapitel 11.8 eingeschoben (Mineralisierung organischer Bodensubstanz). Beim bisherigen Kapitel 11.8 und den nachfolgenden Kapiteln wurde die Kapitelnummerierung entsprechend angepasst.

Direct N₂O according to husbandry systems

The CRF tables require the presentation of N₂O emissions according to the manure management systems "deep litter", "solid manure", "slurry" and "digestion". An error in the consideration of straw N input was corrected in the calculations of these emissions. This correction did not affect the total emissions as the splitting up of these emissions is performed after all emission calculations are finished.

Direktes N₂O getrennt nach Haltungssystemen

In der für die CRF-Tabellen erforderlichen Aufteilung der N₂O-Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management auf die vier Kategorien „Tiefstreu“, „Festmist“, „Gülle“ und „Vergärung“ wurde ein Fehler in der Berücksichtigung der Einstreu-N-Menge korrigiert. Da diese Aufteilung erst nach Abschluss aller Emissionsberechnungen erfolgt, bleiben Emissionsergebnisse uneinflusst.

Chapters 4.3 to 4.8 All cattle

Except for calves and heifers, the sums of the relative proportions of housing systems as well as application methods as obtained from the RAUMIS model (see Chapter 3.4.3.1) showed rounding errors in numerous districts in each cattle category. In these cases (all of them occurring during the years 1990 – 1999), the resulting sums were just below or above 100%. These rounding errors have been corrected. The correction also affects the years 2000 to 2009 through the interpo-

Kapitel 4.3 bis 4.8 Alle Rinder

Außer bei Kälbern und Färsen wiesen in jeder Rinderkategorie in zahlreichen Kreisen die Summen der relativen Anteile der Haltungs- und Ausbringungsverfahren aus dem RAUMIS-Modell (siehe Kapitel 3.4.3.1) Rundungsfehler auf. In diesen Fällen, die die Zeitreihenjahre 1990 – 1999 betreffen, ergaben sich Summen, die knapp unter oder über 100 % lagen. Diese Rundungsfehler wurden korrigiert. Die Korrektur wirkt sich durch die Interpolation zwischen dem letzten Jahr mit RAUMIS-

lation between the last year with RAUMIS data (1999) and the first year with data from the Federal Statistical Office (2010), see Chapters 3.4.3.2 and 3.4.3.4. There were no rounding errors in the RAUMIS data for the heifers. With the interpolation between 1999 and 2010, however, as with the other cattle categories, rounding to 6 decimals is no longer used. All in all, the aforementioned data modifications slightly change all emissions in the years mentioned.

Concerning the anaerobic digestion of cattle manure, the percentages of cattle manures that go into anaerobic digestion were updated (as of 1990). As a result, the percentages of cattle manures used for anaerobic digestion were slightly higher for 1990 - 2017.

The data on gastight storage of digestion residues were updated from 2013 onwards. This results in a slightly higher proportion in gas-tight storage in 2013 - 2016 and a slightly lower proportion in 2017 than in last year's submission.

Overall, the data updates described above lead to a (slightly) greater digestion-related reduction in CH₄ emissions from cattle manure management for all years from 1990 onwards compared to last year's submission. In addition, from 2013 onwards, this effect is somewhat enhanced by the slightly increased use of the gastight storage of the digestates, which also leads to a certain reduction in N₂O and NO emissions from cattle manure management. On the other hand, the national total NH₃ emissions from spreading of cattle manure (including the digestates) increase because more N (or TAN) is available for spreading.

In addition to updating the input data for the anaerobic digestion of manure, an error in the N flow methodology in the area of the prestorage of digestion substrates has been corrected. This results in a further slight reduction in N₂O and NO.

Starting with the present Submission 2020, the NH₃ emission factors for spreading of liquid manure and anaerobically digested manure with trailing shoe on bare soil were updated, see below (section in Chapter 11.2).

The NMVOC calculation for cattle was changed from Tier 1 to Tier 2 methodology. This results in significantly higher NMVOC emissions.

Chapter 4.3 Dairy cows

In addition to the changes described under "All cattle", the subsequent changes also had an impact on the emissions.

In all federal states except Schleswig-Holstein, the slaughter weights for 2017 were updated by the Federal Statistical Office. Overall, this leads to a slight reduction in the average cow weight in 2017 at the national level.

Milk output in 2017 has been updated at federal state level in several federal states. In the German

Daten (1999) und dem ersten Jahr mit Daten des Statistischen Bundesamtes (2010), siehe Kapitel 3.4.3.2 und 3.4.3.4, auch auf die Jahre 2000 bis 2009 aus. Bei den Färsen gab es zwar keine Rundungsfehler in den RAUMIS-Daten; bei der Interpolation zwischen 1999 und 2010 wird ab sofort aber wie bei den anderen Rinderkategorien auf eine Rundung auf 6 Dezimalstellen verzichtet. Insgesamt verändern die vorgenannten Datenmodifikationen in den genannten Jahren geringfügig alle Emissionen.

Bei der Wirtschaftsdüngervergärung wurden ab 1990 die prozentualen Anteile des Rinder-Wirtschaftsdüngers aktualisiert, die in die Vergärung gehen. Als Folge ergaben sich für 1990 – 2017 geringfügig höhere prozentuale Anteile des Rinder-Wirtschaftsdüngers, die in die Vergärung gehen.

Die Daten zur gasdichten Gärrestlagerung wurden ab 2013 einschließlich aktualisiert. Daraus folgt in den Jahren 2013 – 2016 ein geringfügig höherer Anteil und im Jahr 2017 ein geringfügig niedrigerer Anteil an gasdichter Lagerung als in der letztjährigen Submission.

Insgesamt führten die vorstehend beschriebenen Daten-Aktualisierungen gegenüber der letztjährigen Submission zu einer (geringfügig) stärkeren vergärungsbedingten Minderung der CH₄-Emissionen aus dem Rinder-Wirtschaftsdüngermanagement für alle Jahre ab 1990. Etwas verstärkt wird dieser Effekt ab 2013 noch durch die geringfügig größere Verbreitung der gasdichten Gärrestlagerabdeckung, die auch zu einer gewissen Minderung der N₂O- und NO-Emissionen aus dem Rinder-Wirtschaftsdüngermanagement führt. Die nationalen Gesamt-NH₃-Emissionen aus der Ausbringung von Rinder-Wirtschaftsdünger (einschließlich der Gärreste) nehmen dagegen zu, da mehr N (bzw. TAN) zur Ausbringung zur Verfügung steht.

Zusätzlich zur Aktualisierung der Eingangsdaten für die Vergärung von Wirtschaftsdünger wurde ein Fehler in der N-Flow-Methodik im Vorlagerbereich korrigiert. Daraus ergibt sich eine weitere geringfügige Absenkung von N₂O und NO.

Für Submission 2020 und alle nachfolgenden Submissionen wurden die NH₃-Emissionsfaktoren für die Ausbringung mit Schleppschuh auf unbewachsenem Boden aktualisiert, siehe weiter unten (Abschnitt zu Kap. 11.2).

Die NMVOC-Berechnung für Rinder wurde von Tier-1- auf Tier-2-Methodik umgestellt. Dadurch ergeben sich deutliche höhere NMVOC-Emissionen.

Kapitel 4.3 Milchkühe

Zusätzlich zu den unter "Alle Rinder" beschriebenen Änderungen wirkten sich auch die nachfolgenden Änderungen auf die Emissionen aus.

In allen Bundesländern außer Schleswig-Holstein wurden durch das Statistische Bundesamt die Schlachtgewichte für 2017 aktualisiert. Dies führt insgesamt auf nationaler Ebene zu einer leichten Verringerung des mittleren Kuhgewichts 2017.

In mehreren Bundesländern wurde durch BLE (2019) Milchleistung 2017 aktualisiert. Im deutschen Mittel liegt

mean, the milk yield is about 0.2% below the corresponding value of last year's submission. The reduced performance reduces all emissions (except NMVOC).

For the years from 2014, the milk production at the district level for Rhineland-Palatinate was updated without changing the annual total milk production in Rhineland-Palatinate. These changes result in slight changes in feed intake at the federal level and associated changes in emissions.

In the years 1990 - 2009, the change in the data on the frequency of the various housing systems also had very little effect, see above under "All cattle".

Chapter 4.5 Heifers

In addition to the changes described under "All cattle", the subsequent changes also had an impact on the emissions.

For 2017, the final weights have been updated. Since the new values are lower than the old ones, this also implies a reduction in emissions.

For 2016, an input data error from last year's submission has been corrected. This correction leads to a slight reduction in emissions.

Chapter 4.6 Male beef cattle

In addition to the changes described under "All cattle", the subsequent change also had an impact on the emissions.

For the years from 1999, the final weights were updated. The impact on emissions from fattening male cattle is low.

Chapter 4.7 Suckler cows

In addition to the changes described under "All cattle", the subsequent change also had an impact on the emissions.

The N excretion was updated by increasing it from 82 to 90.7 kg per animal place and year, see Chapter 4.7.6.1. This leads to higher N emissions from suckler cows.

Chapter 5.3 to 5.6 All pigs

As with most cattle categories (see above), the totals of the frequencies of the housing methods as obtained from the RAUMIS model (see Chapter 3.4.3.1) showed rounding errors in numerous districts in each pig category. These rounding errors were corrected in the same way as for cattle and therefore, like cattle, affect the time series years 1990 to 2009. These changes have only a minor impact on all emissions.

In the anaerobic digestion of pig manure, the percentages of pig manure that go into anaerobic digestion were updated for all federal states in 2017. Those updates at national level for the various years of the time series result in partly higher, partly lower percentages of

die Milchleistung damit rund 0,2 % unter dem entsprechenden Wert der letztjährigen Submission. Die verringerte Leistung wirkt sich verringernd auf alle Emissionen (außer NMVOC) aus.

Für die Jahre ab 2014 wurde für Rheinland-Pfalz die Milchleistung auf Kreisebene aktualisiert, ohne die jährliche Gesamt-Milchleistung von Rheinland-Pfalz zu verändern. Durch diese Änderungen ergeben sich auf Bundesebene leichte Änderungen in der Futteraufnahme und damit verbunden auch Änderungen in den Emissionen.

Ebenfalls sehr geringe Auswirkung hat 1990 – 2009 die Änderung der Daten zur Häufigkeit der verschiedenen Haltungssysteme, siehe oben („Alle Rinder“).

Kapitel 4.5 Färsen

Zusätzlich zu den unter "Alle Rinder" beschriebenen Änderungen wirkten sich auch die nachfolgenden Änderungen auf die Emissionen aus.

Für das Jahr 2017 wurden die Endgewichte aktualisiert. Da die neuen Werte niedriger als die alten Werte sind, ist damit auch eine Absenkung der Emissionen verbunden.

Für das Jahr 2016 wurde ein Übertragungsfehler in den Eingabedaten der letztjährigen Submission korrigiert. Daraus folgt eine geringfügige Verringerung der Emissionen.

Kapitel 4.6 Männliche Mastrinder

Zusätzlich zu den unter "Alle Rinder" beschriebenen Änderungen wirkte sich auch die nachfolgende Änderung auf die Emissionen aus.

Für die Jahre ab 1999 wurden die Endgewichte aktualisiert. Die Auswirkung auf die Emissionen aus der Mast männlicher Rinder ist gering.

Kapitel 4.7 Mutterkühe

Zusätzlich zu den unter "Alle Rinder" beschriebenen Änderungen wirkte sich auch die nachfolgende Änderung auf die Emissionen aus.

Die N-Ausscheidung wurde aktualisiert, indem sie von 82 auf 90,7 kg pro Tierplatz und Jahr angehoben wurde, siehe Kapitel 4.7.6.1. Dies führt zu höheren N-Emissionen aus der Mutterkuhhaltung.

Kapitel 5.3 bis 5.6 Alle Schweine

Wie bei den meisten Rinderkategorien (siehe weiter oben) wiesen in jeder Schweinekategorie die Summen der relativen Anteile der Haltungssysteme aus dem RAUMIS-Modell (siehe Kapitel 3.4.3.1) in zahlreichen Kreisen Rundungsfehler auf. Die Korrektur dieser Rundungsfehler erfolgte wie bei den Rindern und betrifft daher wie bei den Rindern die Zeitreihenjahre 1990 bis 2009. Diese Änderungen haben nur geringen Einfluss auf alle Emissionen.

Bei der Vergärung von Schweine-Wirtschaftsdünger wurden für 2017 für alle Bundesländer die prozentualen Anteile des Schweine-Wirtschaftsdüngers aktualisiert, die in die Vergärung gehen. Aus dieser Aktualisierung ergeben sich auf nationaler Ebene für die verschiedenen

the pig manure that goes into anaerobic digestion. At the same time, the data on gas-tight storage of digestates in 2017 was updated in all federal states.

Two errors were corrected in the methodology (see above in the section "All cattle" regarding N_2O and TAN in digestates).

The effects of all changes in calculating emissions from anaerobic digestion are very low.

In the case of air scrubbing in pig houses, a distinction between certified and non-certified air scrubbing systems has been introduced in accordance with the improved data availability for Submission 2020: For certified systems, removal of NH_3 and particulate matter is taken into account, for non-certified systems only removal of particulate matter.

Starting with the present Submission 2020, the NH_3 emission factors for spreading of liquid manure and anaerobically digested manure with trailing shoe on bare soil were updated, see below (section in Chapter 11.2).

Chapter 5.3 Sows

In addition to the changes described under "All pigs", the subsequent changes also had an impact on the emissions.

The number of piglets for the federal state of Bavaria has been updated for 2016. The same was done in 2017 for the federal state of Saxony. These changes have only a minor impact on emissions from sows.

Chapter 5.4 Weaners

In addition to the changes described under "All pigs", the subsequent change also had an impact on the emissions.

For the federal state of Bavaria, the number of weaners was updated in 2017 (slightly reduced). This is a result of updated animal weights and the weight-dependent calculation of the boundary between the categories of weaners and fattening pigs. The changes also have an impact at the national level and lead to somewhat lower emissions from weaner husbandry than in last year's Submission.

Chapter 5.5 Fattening pigs

In addition to the changes described under "All pigs", the subsequent changes also had an impact on the emissions.

The initial and final weights of the fattening pigs for the federal state of Bavaria were updated in 2017 (slightly increased). This is a result of updated animal weights and the weight-based calculation of the boundary between the categories of weaners and fattening pigs. This also has an impact at the national level and leads to somewhat higher emissions from fattening pigs than in last year's Submissions.

Zeitreihenjahre teils höhere, teil niedrigere prozentuale Anteile des Schweine-Wirtschaftsdüngers, der in die Vergärung geht. Parallel wurden in allen Bundesländern die Daten zur gasdichten Gärrestlagerung des Jahres 2017 aktualisiert.

In der Methodik wurden zwei Fehler korrigiert (siehe weiter oben im Abschnitt „Alle Rinder“ bzgl. N_2O und Gärreste-TAN).

Die Auswirkungen aller vergärungsrelevanten Änderungen auf die Emissionen sind sehr gering.

Bei der Abluftreinigung in Schweineställen wurde entsprechend der verbesserten Datenverfügbarkeit für Submission 2020 eine Unterscheidung zwischen zertifizierten und nichtzertifizierten Abluftreinigungsanlagen eingeführt: Für die zertifizierten Anlagen wird eine Abscheidung von NH_3 und Staub berücksichtigt, während bei den nicht-zertifizierten Anlagen nur eine Staub-Abscheidung berechnet wird.

Für Submission 2020 und alle nachfolgenden Submissionen wurden die NH_3 -Emissionsfaktoren für die Ausbringung mit Schleppschuh auf unbewachsenem Boden aktualisiert, siehe weiter unten (Abschnitt zu Kap. 11.2).

Kapitel 5.3 Sauen

Zusätzlich zu den unter "Alle Schweine" beschriebenen Änderungen wirkten sich auch die nachfolgenden Änderungen auf die Emissionen aus.

Für 2016 wurde die Ferkelzahl für das Bundesland Bayern aktualisiert. Das Gleiche erfolgte 2017 für das Bundesland Sachsen. Diese Änderungen haben nur geringen Einfluss auf die Emissionen aus der Sauenhaltung.

Kapitel 5.4 Aufzuchtferkel

Zusätzlich zu den unter "Alle Schweine" beschriebenen Änderungen wirkte sich auch die nachfolgende Änderung auf die Emissionen aus.

Für das Bundesland Bayern wurde die Zahl der Aufzuchtferkel im Jahr 2017 aktualisiert (geringfügig verringert). Dies ist eine Folge aktualisierter Tiergewichte und der gewichtsabhängigen Berechnung der Grenze zwischen den Kategorien der Aufzuchtferkel und Mastschweine. Die Änderungen wirken sich auch auf nationaler Ebene aus und führt zu etwas niedrigeren Emissionen aus der Aufzuchtferkelhaltung als in der letztjährigen Submission.

Kapitel 5.5 Mastschweine

Zusätzlich zu den unter "Alle Schweine" beschriebenen Änderungen wirkten sich auch die nachfolgenden Änderungen auf die Emissionen aus.

Für das Bundesland Bayern wurden Anfangs- und Endgewicht der Mastschweine im Jahr 2017 aktualisiert (geringfügig vergrößert). Dies ist eine Folge aktualisierter Tiergewichte und der gewichtsabhängigen Berechnung der Grenze zwischen den Kategorien der Aufzuchtferkel und Mastschweine. Dies wirkt sich auch auf nationaler Ebene aus und führt zu etwas höheren Emissionen aus der Mastschweinehaltung als in der letztjährigen Submission.

Chapter 8 All poultry

For this Submission 2020, data on air scrubbing systems in some of the poultry houses are available for the first time, see below under "Laying hens" and "Broilers". Those air scrubbing systems remove both NH_3 and particulate matter from the house exhaust air.

For anaerobic digestion of poultry manure, the percentages of poultry manure that are used as substrates in biogas plants were updated for all years and federal states. This resulted in slightly higher percentages of poultry manure going into anaerobic digestion at national level for all years of the time series.

At the same time, the data on gas-tight storage of digestates in 2017 was updated in all federal states (slightly lower level of gas-tight coverage than in the previous year's Submission).

An error in the N-Flow scheme was corrected in the methodology.

The effects of all changes in calculating emissions from anaerobic digestion are very low.

Starting with the present Submission 2020, the NH_3 emission factors for spreading of liquid manure and anaerobically digested manure with trailing shoe on bare soil were updated, see below (section in Chapter 11.2).

Chapter 8.3 Laying hens

In addition to the changes described under "All poultry", the subsequent changes also had an impact on the emissions.

The number of laying hens 2017 has been updated compared to Submission 2019. The new animal numbers are somewhat higher, which results in higher emissions from laying hens in 2017.

For the present submission 2020, data on air scrubbing in laying hen houses are available for the first time (as of 2015). This leads to a reduction of emissions of NH_3 and particulate matter dust from housing compared to Submission 2019.

Chapter 8.4 Broilers

In addition to the changes described under "All poultry", the subsequent changes also had an impact on the emissions.

The model quantity "gross broiler meat production" was updated for 2017 (slight increase) as final input data were provided in the meantime by the Federal Statistical Office. This led to slightly increased excretion values and, as a consequence, also to increased emissions in 2017.

For the present submission 2020, data on air scrubbing in broiler houses are available for the first time (as of 2015). This leads to a reduction of emissions of NH_3 and dust from housing compared to Submission 2019.

Chapter 8.5 Pullets

In addition to the changes described under "All poultry", the subsequent change also had an impact on the emissions.

Kapitel 8 Geflügel insgesamt

Für die vorliegende Submission 2020 sind erstmals Daten zur Abluftreinigung in einem Teil der Geflügelställe verfügbar, siehe dazu unten bei „Legehennen“ und „Masthähnchen“. Es handelt sich um Anlagen, die sowohl NH_3 als auch Staub aus der Stallabluft filtern.

Bei der Vergärung von Geflügelkot wurden für alle Jahre und Bundesländer die prozentualen Anteile des Geflügelkots aktualisiert, die in die Vergärung gehen. Daraus ergaben sich für alle Zeitreihenjahre auf nationaler Ebene geringfügig höhere prozentuale Anteile des Geflügelkots, der in die Vergärung geht.

Parallel wurden in allen Bundesländern die Daten zur gasdichten Gärrestlagerung des Jahres 2017 aktualisiert (geringfügig niedrigerer Grad an gasdichter Abdeckung als in der Vorjahressubmission).

In der Methodik wurden ein Fehler im N-Flow-Schema korrigiert.

Die Auswirkungen aller vergärungsrelevanten Änderungen auf die Emissionen sind sehr gering.

Für Submission 2020 und alle nachfolgenden Submissionen wurden die NH_3 -Emissionsfaktoren für die Ausbringung mit Schleppschuh auf unbewachsenem Boden aktualisiert, siehe weiter unten (Abschnitt zu Kap. 11.2).

Kapitel 8.3 Legehennen

Zusätzlich zu den unter "Geflügel insgesamt" beschriebenen Änderungen wirkten sich auch die nachfolgenden Änderungen auf die Emissionen aus.

Die Legehennenzahlen 2017 wurden gegenüber Submission 2019 aktualisiert. Die neuen Tierzahlen sind etwas höher, woraus höhere Emissionen aus der Legehennenhaltung 2017 resultieren.

Für die vorliegende Submission 2020 sind erstmals Daten zur Abluftreinigung in Legehennenställen verfügbar (ab Zeitreihenjahr 2015). Damit reduzierten sich ab 2015 die Emissionen von NH_3 und Staub aus dem Stall im Vergleich zur Submission 2019.

Kapitel 8.4 Masthähnchen

Zusätzlich zu den unter "Geflügel insgesamt" beschriebenen Änderungen wirkten sich auch die nachfolgenden Änderungen auf die Emissionen aus.

Die Eingangsgröße „Brutto-Hähnchenfleischproduktion“ wurde für 2017 aktualisiert (geringfügige Erhöhung), da inzwischen endgültige Daten des Statistischen Bundesamtes zur Berechnung vorliegen. Dies führte zu leicht erhöhten Ausscheidungswerten und damit auch höheren Emissionen für 2017.

Für die vorliegende Submission 2020 sind erstmals Daten zur Abluftreinigung in Masthähnchenställen verfügbar (ab Zeitreihenjahr 2015). Damit reduzierten sich ab 2015 die Emissionen von NH_3 und Staub aus dem Stall im Vergleich zur vorjährigen Submission.

Kapitel 8.5 Junghennen

Zusätzlich zu den unter "Geflügel insgesamt" beschriebenen Änderungen wirkte sich auch die nachfolgende Änderung auf die Emissionen aus.

In calculating the N intake, up to and including last year's submission, the feed fresh mass had been wrongly used instead of the dry mass. This markedly overestimated N intake and N excretions. The correction of the error leads to lower N excretions and thus to lower N emissions than in last year's submission.

Chapter 10 Anaerobic digestion of energy crops

The input data were updated back to 1990. This resulted, compared to Submission 2019, in an increase in the total mass of anaerobically digested energy crops and thus the emission potential for 1990 – 2016, while there are now lower emissions in 2017. The data on the gas-tight coverage of the digestate storage were updated from 2013 onwards (increase 2013 - 2016, decrease 2017).

As a result, emissions have changed slightly compared to Submission 2019: NH_3 , CH_4 and N_2O from the "Fermenter & digestate storage" area show an increase in 1990 - 2016 and a decrease in 2017. This also applies to direct N_2O and N_2O originating from leaching due to the spreading of the digestates. In contrast, spreading-related NH_3 and the deposition-related N_2O (that is dependent on spreading-related NH_3) show an increase for 1990 - 2012 and a decrease for 2013 - 2017.

For the application of digestates of energy crops, as with liquid manure, the application with trailing shoe on arable land is taken into account as of the present Submission 2020. See section 11.2 below for details.

Chapter 11.1 Application of mineral fertilizers

The quantification of the uncertainties has been updated for activity data and effective emission factor. This reduces the uncertainty of the mineral fertilizer application and thus also the uncertainty of the total GHG and NH_3 inventories in Chapter 14.

Chapter 11.2 Spreading of animal manures

Starting with the present Submission 2020, the NH_3 emission factors for spreading of liquid manure and anaerobically digested manure with trailing shoe on bare soil were updated; they are now assumed to be identical to the emission factors for spreading with trailing hose on bare soil. This was judged to be more realistic than the previous assumption of them being identical to those for trailing shoe on grassland. This modification leads to lower NH_3 emissions and thus to lower indirect N_2O emissions from the deposition of reactive nitrogen.

The quantification of the uncertainties has been updated for activity data and effective emission factor. This reduces the uncertainty of the application of animal manures and thus also the uncertainty of the total GHG and NH_3 inventories in Chapter 14.

In der Berechnung der N-Aufnahme wurde bisher fälschlich die Futterfrischmasse anstatt der Trockenmasse verwendet. Dadurch wurde die N-Aufnahme und die N-Ausscheidung merklich überschätzt. Die Korrektur des Fehlers führt zu einer entsprechend geringeren N-Ausscheidung und damit auch zu niedrigeren N-Emissionen als in der letztjährigen Submission.

Kapitel 10 Energiepflanzen-Vergärung

Die Eingangsdaten wurden bis zurück zu 1990 aktualisiert. Dabei ergab sich gegenüber Submission 2019 eine Anhebung der Gesamtmasse der vergorenen Energiepflanzen und damit des Emissionspotentials für 1990 – 2016 sowie eine Absenkung für 2017. Die Daten zur gasdichten Abdeckung der Gärrestlager wurden ab 2013 einschließlich aktualisiert (Anhebung 2013 – 2016, Absenkung 2017).

Dadurch haben sich die Emissionen gegenüber Submission 2019 geringfügig verändert: NH_3 , CH_4 und N_2O aus dem Bereich „Fermenter & Gärrestlager“ zeigen einen Anstieg 1990 - 2016 und eine Abnahme im Jahr 2017. Dies gilt auch für direktes und auswaschungsbedingtes N_2O infolge der Ausbringung der Gärreste. Dagegen weisen ausbringungsbedingtes NH_3 und das davon abhängige depositionsbedingte N_2O einen Anstieg für 1990 - 2012 und eine Abnahme für 2013 - 2017 auf.

Für die Ausbringung von Energiepflanzen-Gärresten wird ab der vorliegenden Submission 2020 wie bei flüssigem Wirtschaftsdünger die Ausbringung mit Schleppschuh auf Acker berücksichtigt. Für Details siehe weiter unten im Abschnitt zu Kapitel 11.2.

Kapitel 11.1 Mineraldüngerausbringung

Für Aktivitätswert und effektivem Emissionsfaktor wurde die Quantifizierung der Unsicherheiten aktualisiert. Dadurch verringert sich die Unsicherheit der Mineraldüngerausbringung und damit auch die von THG- und NH_3 - Gesamtinventar in Kapitel 14.

Kapitel 11.2 Ausbringung von Wirtschaftsdünger

Für Submission 2020 und alle nachfolgenden Submissionen wurden die NH_3 -Emissionsfaktoren für die Ausbringung von flüssigen Wirtschaftsdüngern und Wirtschaftsdünger-Gärresten mit Schleppschuh auf Acker aktualisiert. Sie werden jetzt mit den Emissionsfaktoren für die Ausbringung mit Schleppschlauch gleich gesetzt. Dies wird als realistischer eingeschätzt als die bisherige Annahme, dass sie dem Schleppschuh-Emissionsfaktor für Grünland entsprächen. Diese Änderung führt zu geringeren NH_3 -Emissionen und damit auch zu niedrigeren indirekten N_2O Emissionen aus der Deposition von reaktivem Stickstoff.

Für Aktivitätswert und effektivem Emissionsfaktor wurde die Quantifizierung der Unsicherheiten aktualisiert. Dadurch verringert sich die Unsicherheit der Wirtschaftsdüngerausbringung und damit auch die von THG- und NH_3 - Gesamtinventar in Kapitel 14.

Chapter 11.4 Sewage sludge

The amounts of sewage sludge applied were updated (i. e. slightly decreased) for 2017. Accordingly, emissions for 2017 decreased compared to Submission 2019.

Chapter 11.6 Drained organic soils

The area values reported separately for arable land and grassland (drained) differ from the corresponding data in Submission 2019 because the calculation in the LULUCF sector has been updated.

Chapter 11.7 Crop residues

For the first time, the cultures “cereals for whole-crop harvesting” and “strawberries” are taken into account. The N contents of the crop residues were corrected for spinach and rhubarb. For oats and rye the crop yields were corrected. These changes result in an average increase in N₂O emissions of 0.2% over the previous year's submission.

Chapter 11.8 Mineralization (agricultural soils)

In Submission 2020, direct and indirect N₂O emissions from N from the mineralization of soil organic matter are reported for the first time, since in the LULUCF sector mineral soils with remaining use as arable land are now differentiated between annual and perennial crops.

Chapter 11.12 NMVOC (agricultural soils)

Corrected yields of rye and oats as well as the first-time consideration of cereals for whole-crop harvesting as of 2010 lead to changed emission values compared to Submission 2019 (slight decrease from 1990 to 2009 in the order of 0.01 to 0.04%; increase from 2010 between 0.4% and 0.7%).

Chapter 11.13 HCB emissions

Activity data for 2017 has been updated. This results in an increase in total German HCB emissions in 2017 from 11.7 kg to 14.4 kg.

Chapter 11.14 TSP and PM (agricultural soils)

The emissions of TSP and PM from agricultural soils differ slightly from the corresponding emissions in Submission 2019. These changes are due to the fact that for the first time the acreage of strawberries and cereals for whole-crop harvesting was taken into account. The differences to the submission 2019 are between 0.05% (1990) and 1.1% (2015).

Chapter 14.6.4 Uncertainty of the GHG inventory

In the GHG inventory, emissions from the application mineral fertilizers are treated as a single source of emissions, although several subcategories contribute to this. Until Submission 2019, the total mineral fertilizer application was simply assigned the uncertainties of the activity value and the emission factor that actually apply

Kapitel 11.4 Klärschlamm

Für das Jahr 2017 wurde die ausgebrachte Klärschlammmenge aktualisiert (d. h. geringfügig abgesenkt). Dementsprechend verringern sich die Emissionen für 2017 gegenüber Submission 2019.

Kapitel 11.6 Drainierte organische Böden

Die für Ackerland und Grünland (drainiert) getrennt ausgewiesenen Flächenwerte unterscheiden sich von den entsprechenden Daten in Submission 2019, weil die Berechnung im LULUCF-Sektor aktualisiert wurde.

Kapitel 11.7 Ernterückstände

Erstmals werden die Kulturen „Getreide zur Ganzpflanzenernte“ und „Erdbeeren“ berücksichtigt. Bei Spinat und Rhabarber wurden die N-Gehalte der Ernterückstände korrigiert. Bei Hafer und Roggen wurden die Ernteerträge korrigiert. Durch diese Änderungen ergibt sich im Mittel über die Zeitreihe eine Erhöhung der N₂O-Emission um 0,2 % gegenüber der Vorjahressubmission.

Kapitel 11.8 Mineralisierung (landw. Böden)

In Submission 2020 werden erstmals direkte und indirekte N₂O-Emissionen aus N aus der Mineralisierung organischer Bodensubstanz berichtet, da im LULUCF-Sektor bei Mineralböden unter verbleibender Nutzung als Ackerland nun zwischen annuellen und perennuellen Kulturen differenziert wird.

Kapitel 11.12 NMVOC (landwirtsch. Böden)

Die Korrektur der Erträge bei Roggen und Hafer sowie die erstmalige Berücksichtigung von Getreide zur Ganzpflanzenernte ab 2010 führt gegenüber Submission 2019 zu veränderten Emissionswerten (geringfügige Abnahme 1990 – 2009 in der Größenordnung von 0,01 bis 0,04 %; Zunahme ab 2010 zwischen 0,4 % und 0,7 %).

Kapitel 11.13 HCB-Emissionen

Die Aktivitätsdaten für 2017 wurden aktualisiert. Daraus ergibt sich eine Anhebung der deutschen Gesamt-HCB-Emissionen des Jahres 2017 von 11,7 kg auf 14,4 kg.

Kapitel 11.14 TSP und PM (landw. Böden)

Die Emissionen von TSP und PM aus landwirtschaftlich genutzten Böden unterscheiden sich geringfügig von den entsprechenden Emissionen in Submission 2019. Diese Änderungen gehen darauf zurück, dass erstmalig die Anbauflächen von Erdbeeren sowie Getreide zur Ganzpflanzenernte berücksichtigt wurden. Die Unterschiede zur Submission 2019 liegen zwischen 0,05 % (1990) und 1,1 % (2015).

Kapitel 14.6.4 Unsicherheit des THG-Inventars

Im THG-Inventar werden die Emissionen aus der Mineraldüngeranwendung als eine einzige Emissionsquelle behandelt, obwohl mehrere Unterkategorien dazu beitragen. Bis zur Submission 2019 wurden der gesamten Mineraldüngerausbringung vereinfachend die Unsicherheiten von Aktivitätswert und Emissionsfaktor zugeord-

to each individual subcategory. However, this approach meant an overestimation of the uncertainty of the total mineral fertiliser application in both activity data and emission inputs. For the present Submission 2020, the uncertainties of the activity data and the emission factors of the various subcategories were aggregated by means of error propagation calculations. Only the aggregated uncertainties were then used for the calculation of the overall uncertainty calculation of the GHG inventory.

An analogous problem existed with the use of manure. For the present Submission 2020, therefore, for the first time the uncertainties of the activity data and the emission factors from the corresponding uncertainties of the application contributions by the individual animal categories were aggregated and only the aggregated uncertainties were used in the calculation of the overall uncertainty calculation of the GHG inventory and the NH_3 inventory.

As a result of these corrections, there is a lower overall uncertainty of the GHG inventory at emission level and trend.

Chapters 14. 7 Uncertainty of the NH_3 inventory

As of the present submission 2020, the previously simplified estimation of the uncertainties of mineral fertilizer and manure application is based on the Gaussian error propagation calculation. This is done by analogy to the uncertainty of the GHG inventory (see above: section on Chapter 14.6) and results in lower overall uncertainties of emission levels and trends in the NH_3 inventory.

net, wie sie eigentlich für jede einzelne Unterkategorie gelten. Dieses Vorgehen bedeutete aber eine Überschätzung der Unsicherheiten der gesamten Mineraldüngerausbringung sowohl bei den Aktivitätsdaten als auch bei den Emissionsfaktoren. Für die vorliegende Submission 2020 wurden erstmals die Unsicherheiten jeweils der Aktivitätsdaten und der Emissionsfaktoren der verschiedenen Unterkategorien mittels Fehlerfortpflanzungsrechnung aggregiert. Nur die aggregierten Unsicherheiten wurden in der Berechnung der Gesamt-Unsicherheit des THG-Inventars zugrunde gelegt.

Eine analoge Problematik bestand bei der Ausbringung von Wirtschaftsdünger. Für die vorliegende Submission 2020 wurden daher erstmals die Unsicherheiten jeweils der Aktivitätsdaten und der Emissionsfaktoren aus den entsprechenden Unsicherheiten der Ausbringungsbeiträge der einzelnen Tierkategorien aggregiert und nur die aggregierten Unsicherheiten der der Berechnung der Gesamt-Unsicherheitsberechnung von THG- und NH_3 -Inventars zugrunde gelegt.

Als Folge dieser Korrekturen ergibt sich eine niedrigere Gesamt-Unsicherheit des THG-Inventars bei Emissionshöhe und Trend.

Kapitel 14.7 Unsicherheit des NH_3 -Inventars

Analog zur Unsicherheit des THG-Inventars (siehe oben, Abschnitt zu Kap. 14.6) wurden ab der vorliegenden Submission 2020 die bislang vereinfacht geschätzten Unsicherheiten von Mineraldünger- und Wirtschaftsdüngerausbringung nach der Gaußschen Fehlerfortpflanzung berechnet. Daraus ergibt sich im NH_3 -Inventar eine niedrigere Gesamt-Unsicherheit bei Emissionshöhe und Trend.

Cattle numbers at district level are used to calculate emissions. For the years with agricultural structure surveys (see chapter 3.4.2.1), the numbers of animals at district level are available for all of the cattle categories listed in Table 4.1. The data are provided by the Federal Statistical Office specifically for emissions reporting. Missing district data are replaced in such a way that, for each federal state, the resulting total of the district animal numbers equal the statistically surveyed animal number at federal-state level. In the years without agricultural structure surveys, the district animal numbers are interpolated. It is ensured for each year and each federal state that the total of the district animal numbers corresponds to the numbers at federal-state level published annually by the Federal Statistical Office (StatBA F3 R4, StatBA F3 R4.1).

The animal numbers used and their derivation are discussed in the respective subchapters of the subsequent animal category chapters.

Note: There is no separate animal category "buffalo" in the German inventory. The reason for this is that, as of 2013, the cattle numbers provided by the Federal Statistical Office include the buffaloes in an inseparable manner. For more details and the way of taking into account the buffaloes in the years 1990 to 2012 see subsequent Chapter 4.1.1.2.

4.1.1.2 Buffalo / Büffel

As of 2013 the cattle numbers provided by the Federal Statistical Office comprise the German buffaloes and there is no way to deduce the numbers of the buffaloes from those of the cattle. Hence, the calculation of emissions for buffaloes is, as of 2013, inevitably included in that for cattle.

The assignment of the buffaloes to the cattle is zoologically justified, since both animal categories belong to the same subfamily of the Bovidae (hornbearing animals)²⁴, and management systems and nutrition are basically comparable (Spindler, 2008).

Today's German buffalo population is estimated at 3000 to 4000 animals (<https://www.golden-buffalo.de/wasserbuumlfel-in-deutschland.html>) while the total population of cattle (including buffaloes) reported by the Federal Statistical Office in 2018 was 11.9 million. Thus, the buffaloes' share of cattle numbers is on the order of only 0.03 %. This illustrates the very low importance of buffalo husbandry in Germany. The error associated with the buffaloes' assignment to the cattle from 2013 onwards is therefore considered negligible.

For reasons of consistency in the emission inventory, also for the time series years 1990 to 2012 the buffaloes had to be assigned to the cattle. Since the Federal Statistical Office did not survey buffalo numbers for these

Zur Berechnung der Emissionen werden Rinderzahlen auf Kreisebene verwendet. Für die Jahre mit Agrarstrukturhebungen (siehe Kapitel 3.4.2.1) liegen für alle der in Table 4.1 genannten Rinderkategorien die Tierzahlen auf Kreisebene vor. Die Daten werden vom Statistischen Bundesamt speziell für die Emissionsberichterstattung bereitgestellt. Dabei fehlende Kreistierzahlen werden so ersetzt, dass die Summe der Kreistierzahlen eines Landes der statistisch erhobenen Rinderzahl auf Bundeslandebene entspricht. In den Jahren ohne Agrarstrukturhebungen werden die Kreistierzahlen interpoliert. Es wird dabei für jedes Jahr und jedes Bundesland sicher gestellt, dass die Summe der Kreistierzahlen den vom Statistischen Bundesamt jährlich veröffentlichten Landestierzahlen entspricht (StatBA F3 R4, StatBA F3 R4.1).

Die verwendeten Tierzahlen bzw. ihre Berechnung wird in den entsprechenden Unterkapiteln der einzelnen Tierkategorien erläutert.

Anmerkung: Es gibt im deutschen Inventar keine separate Tierkategorie „Büffel“. Der Grund hierfür ist, dass ab 2013 die vom Statistischen Bundesamt bereitgestellten Rinderzahlen in untrennbarer Weise auch die Büffel umfassen. Hierzu und zur Berücksichtigung der Büffel in den Jahren 1990 bis 2012 siehe das nachfolgende Kapitel 4.1.1.2.

Ab 2013 umfassen die vom Statistischen Bundesamt bereitgestellten Rinderzahlen auch die Büffel, ohne dass die Büffelnzahlen aus diesen Rinderzahlen herauszurechnen wären. Die Emissionsberechnung für die Büffel erfolgt daher ab 2013 zwangsläufig zusammen mit der der Rinder.

Die Zuordnung der Büffel zu den Rindern ist zoologisch berechtigt, da beide Tierkategorien der gleichen Unterfamilie der Bovidae (Hornträger) angehören²⁴, und Halteverfahren und Ernährung grundsätzlich vergleichbar sind (Spindler, 2008).

Der heutige deutsche Büffelbestand wird auf 3000 bis 4000 Tiere geschätzt (<https://www.golden-buffalo.de/wasserbuumlfel-in-deutschland.html>), während die vom Statistischen Bundesamt berichteten Rinder Gesamtzahl (incl. Büffel) im Jahr 2018 bei 11,9 Millionen lag. Damit liegt der Anteil der Büffel an den Rinderzahlen in der Größenordnung von lediglich 0,03 %. Dies verdeutlicht die sehr geringe Bedeutung der Büffelhaltung in Deutschland. Der mit der Zuordnung der Büffel zu den Rindern ab 2013 verbundene Fehler ist daher als vernachlässigbar anzusehen.

Aus Konsistenzgründen mussten die Büffel im Emissionsinventar für die Zeitreihenjahre 1990 bis 2012 ebenfalls den Rindern zugeordnet werden. Da das Statistische Bundesamt für diese Jahre keine Büffelnzahlen

²⁴ <https://en.wikipedia.org/wiki/Bovidae>

years, the buffalo numbers of the German Buffalo Association (M. THIELE, 2010 - 2013, personal communication) were used. These numbers are available in federal state resolution. Table 4.2 shows the total German buffalo number of these years. For these years, the total number of cattle in Germany was between 14.5 million (year 2000) and 12.5 million (year 2012). Thus, based on the buffalo numbers provided in Table 4.1, the ratio of buffalo to cattle numbers was between 0.004% (2000) and 0.023% (2012), demonstrating the minimal importance of buffalo husbandry also for the years 2000 to 2012.

erhoben hat, wurden die Büffelfzahlen des Deutschen Büffelfverbandes (M. THIELE, 2010 - 2013, pers. Mitteilung) verwendet. Diese Zahlen liegen in Bundesland-Auflösung vor. Table 4.2 zeigt die deutsche Büffelf-Gesamtzahl dieser Jahre. Für diese Jahre lag die Gesamtzahl der Rinder in Deutschland zwischen 14,5 Millionen (Jahr 2000) und 12,5 Millionen (Jahr 2012). Daraus ergibt sich zusammen mit den Büffelfzahlen aus Table 4.1 ein Verhältnis von Büffel- zu Rinderzahlen zwischen 0,004 % (2000) und 0,023 % (2012), was die sehr geringe Bedeutung der Büffelfhaltung auch für die Jahre 2000 bis 2012 belegt.

Table 4.2: Buffalo, animal numbers between 2000 and 2012 at national level

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
642	625	755	894	1021	1187	1324	1541	1793	2111	2362	2680	2829

Source: German Buffalo Association (THIELE M, 2010 - 2013, personal communication)

On the recommendation of the final report of the „Initial Review under the Kyoto Protocol and Annual 2006 Review under the Convention“ and in agreement with German Statistics, department VII A, the buffalo numbers before 2000 were estimated by linear back extrapolation. The extrapolation produced negative animal numbers for the years before 1996 which were replaced by zero.

A problem with the allocation of the buffaloes to the cattle in the time series years 1990 to 2012 was, among others, the lack of information on the structure of the buffalo population: A division into dams, calves and adult male animals was not possible. Therefore, the buffaloes had to be assigned to a single cattle category. The category of suckler cows was chosen because the categories of dairy cows, calves, heifers, fattening bulls and male cattle over 2 years did not seem suitable. For example, grazing is widely used for young buffaloes and buffalo suckler cows (Spindler, 2008), which is not the case for any of the German cattle categories except suckler cows.

Following a recommendation of the UNFCCC-Review 2018²⁵, the assignment of the buffaloes to the suckler cows is quantitatively checked in the following by comparing performance data and emissions of buffaloes and the cattle categories of the German inventory.

Since there is no statistical survey on buffalo performance data in Germany, no detailed emission calculation is possible. Hence the buffalo data published by Italy in the GHG emissions reporting are used. In contrast to Germany, Italy has a noteworthy buffalo population: according to the Italian submission in 2019²⁶, there were just under 349,000 animals in 2012, i.e. around

Für die Zeit vor 2000 wurden die Büffelfzahlen der Empfehlung im Abschlussbericht zum „Initial Review under the Kyoto Protocol and Annual 2006 Review under the Convention“ folgend in Absprache mit dem Statistischen Bundesamt, Referat VII A, linear rückwärts extrapoliert. Vor 1996 ergaben sich dabei rechnerisch negative Tierzahlen, die durch Nullen ersetzt wurden.

Ein Problem bei der Zuordnung der Büffel zu den Rindern in den Zeitreihenjahre 1990 bis 2012 waren u. a. fehlende Informationen über die Struktur der Büffelpopulation: Eine Aufteilung in Muttertiere, Kälber und ausgewachsene männliche Tiere war nicht möglich. Daher mussten die Büffel einer einzigen Rinderkategorie zugeordnet werden. Es wurde dafür die Kategorie der Mutterkühe gewählt, da die Kategorien der Milchkühe, Kälber, Färsen, Mastbullen und männlichen Rinder über 2 Jahre nicht geeignet erschienen. So ist z. B. für Büffel-Jungtiere und Büffel-Mutterkühe die Weidehaltung weit verbreitet (Spindler, 2008), was in diesem Maße für keine der deutschen Rinderkategorien außer den Mutterkühen zutrifft.

Einer Empfehlung des UNFCCC-Reviews 2018²⁵ folgend werden zur quantitativen Hinterlegung der Zuordnung der Büffel zu den Mutterkühen im Folgenden Leistungsdaten und Emissionen von Büffeln und den Rinderkategorien des deutschen Inventars verglichen.

Da es in Deutschland keine statistische Erhebung zu Büffel-Leistungsdaten gibt und demzufolge auch keine detaillierte Emissionsberechnung möglich ist, werden die von Italien in der THG-Emissionsberichterstattung veröffentlichten Büffelfdaten verwendet. Italien besitzt im Gegensatz zu Deutschland eine nennenswerte Büffelpopulation: Laut italienischer Submission 2019²⁶ waren es 2012 knapp 349.000 Tiere und damit rund 91 %

²⁵ Report on the individual review of the annual submission of Germany submitted in 2018, Table 6 (A.9). https://unfccc.int/sites/default/files/resource/arr2018_DEU.pdf

²⁶ See UNFCCC (2019): <https://unfccc.int/documents/194577>. The Italian Submission 2019 was the most up-to-date available at the time of making the comparison of Italian buffalo and German cattle categories.

91% of the buffalo population reported by the EU²⁷. Accordingly, the Italian emission calculations consider the buffaloes in detail. Table 4.3 shows the data comparison for 2012, the last year of the period in which the German inventory assigns the buffaloes to the suckler cow category.

The large difference in animal weight between the Italian buffaloes and German suckler cows is of no significance for the comparison since the suckler cow weight does not enter into the German emission calculations.

Conspicuous in the Italian data are the high VS excretion and the low B_0 value. From the Italian NIR 2019²⁸ it is obvious that these two parameters are not used for the calculation of CH_4 emissions from the buffalo manure management, but are derived after completion of the emission calculations from manure management data and the calculated CH_4 emissions. The low B_0 value is a direct computational consequence of the high VS excretion. However, the product of VS excretion and B_0 value is comparable to the corresponding value of the German suckler cow.

The comparison of the total direct GHG emissions in Table 4.2 shows that only the two cattle categories of suckler cows and male cattle over 2 years approximate the corresponding result of the Italian buffaloes. Here, the suckler cows are preferable because they correspond to the buffaloes in more detail data. Not relevant in the final assessment is that the Italian N_2O emissions from buffalo manure spreading were not available directly from the Italian CRF tables, but had to be estimated from related CRF data. In the end, the N_2O from spreading of buffalo manure was estimated by using for buffalo the ratio of N excreted in the housing / N available for spreading as obtained for the total of all Italian animals.

der von der EU berichteten Büffelpopulation²⁷. Dementsprechend detailliert werden die Büffel in den italienischen Emissionsberechnungen berücksichtigt. Table 4.3 zeigt den Datenvergleich für 2012, das letzte Jahr des Zeitraums, in dem das deutsche Inventar die Büffel der Mutterkuhkategorie zuordnet.

Die große Differenz im Tiergewicht zwischen den italienischen Büffeln und deutschen Mutterkühen ist ohne Bedeutung für den Vergleich, da das Mutterkuhgewicht in die deutschen Emissionsberechnungen nicht eingeht.

Auffällig sind bei den italienischen Daten die hohe VS-Ausscheidung und der niedrige B_0 -Wert. Aus dem italienischen NIR 2019²⁸ geht hervor, dass diese beiden Größen nicht in die Berechnung der CH_4 -Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management der Büffel eingehen, sondern nach Abschluss der Emissionsberechnungen aus Wirtschaftsdüngermengen und berechneten CH_4 -Emissionen abgeleitet werden. Der niedrige B_0 -Wert ist dabei eine unmittelbare rechnerische Folge der hohen VS-Ausscheidung. Das Produkt aus VS-Ausscheidung und B_0 -Wert ist dagegen vergleichbar mit dem entsprechenden Wert der deutschen Mutterkuh.

Der Vergleich der gesamten direkten THG-Emissionen in Table 4.3 zeigt, dass lediglich die beiden Rinderkategorien der Mutterkühe und der männlichen Rinder über zwei Jahre dem entsprechenden Ergebnis der italienischen Büffel nahekomen. Dabei sind die Mutterkühe vorzuziehen, weil sie in mehr Detaildaten den Büffeln entsprechen. Nicht entscheidend in der abschließenden Bewertung ist, dass die italienischen N_2O -Emissionen aus der Wirtschaftsdünger-Ausbringung anhand der vorliegenden italienischen Daten nur geschätzt werden konnten, indem das Verhältnis von ausgebrachter N-Menge zur N-Ausscheidung im Stall der Gesamtheit aller Tiere des italienischen Inventars für die Büffelhaltung übernommen wurde.

²⁷ See UNFCCC (2019): <https://unfccc.int/documents/194946>

²⁸ See UNFCCC (2019): <https://unfccc.int/documents/194933>

Table 4.3: Buffalo, comparison of Italian buffalo data (Submission 2019) for 2012 with respective data from all cattle categories of the German inventory (Submission 2020)

	Italy	Germany					
	buffalo ^a	suckler cow	dairy cow	heifer ^b	calf ^b	male beef cattle ^b	mature male < 2 years
mean weight (kg an ⁻¹)	508.1	650.0	646.1	379.7	83.0	402.2	1000.0
MCF enteric fermentation (%)	6.5	6.5	6.4	6.5	4.1	6.5	6.5
CH ₄ from enteric fermentation (kg pl ⁻¹ a ⁻¹)	77.6	76.1	134.7	51.3	9.9	59.3	85.3
VS (kg pl ⁻¹ a ⁻¹) ^c	1847.4	880.4	1462.3	578.9	151.0	607.7	1456.0
Bo (m ³ kg ⁻¹) ^c	0.13	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
VS · Bo (m ³ pl ⁻¹ a ⁻¹)	238.6	202.5	336.3	133.2	34.7	139.8	334.9
overall MCF of manure management including grazing (%) ^d	7.37	7.39	9.45	6.75	16.40	12.95	4.67
CH ₄ from manure management including grazing (kg pl ⁻¹ a ⁻¹)	11.8	10.0	21.3	6.0	3.8	12.1	10.5
N excretion (kg pl ⁻¹ a ⁻¹)	91.4	90.7	117.6	52.6	20.3	45.4	84.0
direct N ₂ O emissions from manure management, without grazing and spreading (kg pl ⁻¹ a ⁻¹)	0.66	0.62	0.60	0.28	0.38	0.36	0.38
direct N ₂ O from grazing and spreading (kg pl ⁻¹ a ⁻¹) ^e	0.97	1.30	1.65	0.73	0.26	0.60	0.80
GHG in CO ₂ eq (kg pl ⁻¹ a ⁻¹) ^f	2718.2	2722.7	4567.5	1734.1	532.5	2071.8	2744.3
GHG in % of buffalo GHG	100.0	100.2	168.0	63.8	19.6	76.2	101.0

^a weighted means of the two buffalo categories used in the Italian inventory; all data taken from the Italian CRF tables of the year 2012 in Submission 2019, except for VS · Bo and the overall MCF of manure management including grazing which were calculated from other Italian data provided in the table above.

^b mean weight during growth

^c The Italian methodology to estimate VS and B₀ is completely different from IPCC (2006) and the German inventory. For further explanations see text.

^d Overall MCF of manure management is derived from the given values of CH₄ emission, VS excretion and B₀, using the IPCC (2006) Tier 2 equation 10.23 and the IPCC (2006) density of CH₄ (0.67 kg m⁻³).

^e Other than for grazing of buffalo no data for spreading of buffalo manure is directly available from the Italian CRF tables. Hence N₂O related to spreading was approximated by using related CRF data, i.e. the ratio of N spreaded / N excreted in housing for the total of all Italian animal categories.

^f Sum of CH₄ from enteric fermentation and from manure management as well as direct N₂O from manure management including spreading and grazing (with the GWP of CH₄ and N₂O being 25 and 298, respectively)

4.1.2 Uncertainties / Unsicherheiten

As of 2008, the cattle numbers reported by the Federal Statistical Office are taken from the HIT database (Herkunftssicherungs- und Informationssystem für Tiere - Data base for the origin of animals and other animal-related data) where all cattle animals are registered, including buffaloes. However, the HIT data base does not contain information on the animal type. Hence the number of the cattle subcategories cannot be extracted directly from the HIT data base. A model estimate has to be performed to generate these numbers from the HIT data of the total cattle herd. The uncertainty of the results is unknown.

It is assumed that the standard error of cattle numbers is comparable to that of the important pig subcategories (sows, weaners, fatteners), i.e. 2 %. 50 % of the

Ab 2008 werden die durch das Statistische Bundesamt berichteten Rinderzahlen der HIT-Datenbank (Herkunftssicherungs- und Informationssystem für Tiere) entnommen, in der alle Rinder erfasst werden, einschließlich der Büffel. Allerdings enthält HIT keine Informationen über die Nutzungsrichtung. Aus HIT können also die zur Erstellung des Emissionsinventars erforderlichen Tierzahlen der verschiedenen Rinderkategorien nicht direkt entnommen werden. Sie werden mithilfe eines Schätzmodells aus der HIT-Rindergesamtzahl ermittelt. Die Unsicherheit des Ergebnisses ist nicht bekannt.

Daher wird für das Emissionsinventar angenommen, dass der Standardfehler der Rinderzahlen mit dem bei den wichtigen Schweinekategorien (Sauen, Aufzuchtfer-

95 % confidence intervall amount to 4 % uncertainty. A normal distribution is assumed.

kel, Mastschweine) vergleichbar ist, d. h. 2 %. Das halbe 95 %-Konfidenzintervall beträgt demnach 4 %. Es wird Normalverteilung angenommen.

4.2 Parameters common to all cattle and buffalo / Gemeinsame Parameter aller Rinder und Büffel

4.2.1 Methane from manure management / Methan aus dem Wirtschaftsdüngermanagement

In the emission inventory, the formation of methane from manure storage is characterized by two parameters (see Chapter 3.3.4.1): the animal-specific maximum methane formation capacity B_0 and the storage-specific methane conversion factor MCF . MCF gives the fraction of B_0 that is typically produced in the various storage systems.

For cattle, a national value for B_0 is used (DÄMMGEN et al., 2012a), siehe Table 4.4.

Table 4.4 also shows the MCF values derived for the storage systems most frequent for cattle in Germany. The MCF values assumed according to DÄMMGEN et al. (2012a) are given in bold figures. "Slurry with floating cover" (chaff or plastic film) is treated by a conservative approach i. e. by adopting the MCF of "slurry without natural crust". The MCF values for deep bedding and pasture are provided by IPCC (2006)-10.44 ff. For "sloped floor" no IPCC default MCF is available. Hence the value for "deep litter" is adopted.

Table 4.4 does not provide MCF values for anaerobic digestion of manure including storage of digestate. These MCF have to be calculated and are not constant (see Chapter 3.3.4.4.1).

Uncertainty estimates are provided in the subsequent animal chapters, see subchapters on calculation CH_4 emissions from manure management.

Die Entstehung von Methan aus der Wirtschaftsdüngerlagerung wird im Emissionsinventar durch zwei Parameter charakterisiert (siehe Kapitel 3.3.4.1): die tier-spezifische maximale Methan-Bildungsrate B_0 und den lagerspezifischen Methanumwandlungsfaktor MCF , der angibt, welcher Anteil von B_0 in den verschiedenen Lagerungssystemen tatsächlich produziert wird.

Für Rinder wird ein nationaler B_0 -Wert verwendet (DÄMMGEN et al., 2012a), siehe Table 4.4.

Table 4.4 zeigt überdies für die in Deutschland bei Rindern häufigsten Lagerungsverfahren die MCF -Werte, wobei die nach DÄMMGEN et al. (2012a) angenommenen Werte fettgedruckt sind. Für „Gülle mit fester Abdeckung“ und „Gülle mit schwimmender Abdeckung“ (Strohhäcksel oder Folie) wurde konservativ der MCF von „Gülle ohne natürliche Schwimmdecke“ übernommen. Die Werte für Tiefstreu und Weide stammen aus IPCC (2006)-10.44ff. Für „Tretmist“ wurde mangels MCF -Angaben in IPCC der Wert für Tiefstreu angewendet.

Die MCF -Werte für die Wirtschaftsdünger-Vergärung incl. Gärrestelagerung sind in Table 4.4 nicht angegeben, da sie berechnet werden (siehe Kapitel 3.3.4.4.1) und nicht konstant sind.

Zur Bestimmung der Unsicherheiten wird auf die Unterabschnitte der nachfolgenden Tier-Kapitel verwiesen, in denen die Berechnung der CH_4 -Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management beschrieben wird.

Table 4.4: Cattle, maximum methane producing capacity (B_0) and methane conversion factors (MCF)

Maximum methane producing capacity B_0	Maximale Methanbildungs-Kapazität B_0	0.23	$m^3 CH_4 (kg VS)^{-1}$
Methane conversion factor MCF	Methanumwandlungsfaktor MCF		
slurry (untreated)	Gülle (unbehandelt)		
slurry tank	Güllelager		
open tank (without natural crust)	offen (ohne natürliche Schwimmdecke)	0.17	$m^3 m^{-3}$
solid cover (incl. tent structures)	feste Abdeckung (inkl. Zelt)	0.17	$m^3 m^{-3}$
natural crust	natürliche Schwimmdecke	0.10	$m^3 m^{-3}$
floating cover (chaff)	schwimmende Abdeckung (Strohhäcksel)	0.17	$m^3 m^{-3}$
floating cover (plastic film)	schwimmende Abdeckung (Folie)	0.17	$m^3 m^{-3}$
underneath slatted floor > 1 month	Lager unter Spaltenboden > 1 Monat	0.17	$m^3 m^{-3}$
solid manure/heap (tied systems, loose housing ^a)	Festmist/Misthaufen (Anbindehaltung, Laufstall ^a)	0.02	$m^3 m^{-3}$
solid manure/heap (deep bedding, sloped floor)	Festmist/Misthaufen (Tiefstreu, Tretmist)	0.17	$m^3 m^{-3}$
pasture	Weide	0.01	$m^3 m^{-3}$

^a loose housing other than deep bedding and sloped floor

Sources: see text

4.2.2 Emission factors for nitrogen emissions / Emissionsfaktoren für Stickstoffemissionen

4.2.2.1 NH_3 emission factors for housing and grazing / NH_3 -Emissionsfaktoren für Stall und Weide

Partial NH_3 emission factors were fixed for all relevant housing systems, cf. Table 4.5. They are based on national animal-place related emission factors provided by DÖHLER et al. (2002) and converted into TAN related data by DÄMMGEN et al. (2010a). For the uncertainties of the emission factors see Chapter 4.2.2.4.

Die für die relevanten Stallssysteme angesetzten partiellen NH_3 -Emissionsfaktoren beruhen auf nationalen tierplatzbezogenen Emissionsfaktoren von DÖHLER et al. (2002), die von DÄMMGEN et al. (2010a) auf TAN-Bezug umgerechnet wurden, siehe Table 4.5. Zur Unsicherheit der Emissionsfaktoren siehe Kapitel 4.2.2.4.

Table 4.5: Cattle, partial emission factors for NH_3 -N from housing (related to TAN)

Housing type		Haltungssystem		Emission factor (kg kg ⁻¹)
tied systems	slurry based	Anbindehaltung	güllebasiert	0.066 ^a
	straw based		strohbasierend	0.066 ^a
loose housing	slurry based	Laufstall	güllebasiert	0.197 ^a
	straw based		strohbasierend	0.197 ^a
	deep bedding	Tiefstreu	strohbasierend	0.197 ^a
	sloped floor	Tretmist	strohbasierend	0.213 ^a

^a estimated according to DÖHLER et al. (2002), pg. 49, and DÄMMGEN et al. (2010a), pg. 97

^b estimated according to DÖHLER et al. (2002), pg. 49, and DÄMMGEN et al. (2010a), pg. 97, UNECE (1999), Table 3

The NH_3 emission factors for grazing can be found in the respective chapters describing the various cattle subcategories.

Die NH_3 -Emissionsfaktoren für Weidegang finden sich in den entsprechenden Unterkapiteln der verschiedenen Rinder-Unterkategorien.

4.2.2.2 NH_3 , N_2O and NO emission factors for storage / NH_3 -, N_2O - und NO -Emissionsfaktoren der Lagerung

Except for the anaerobic digestion of manure, the partial NH_3 -N emission factors for the storage systems used in Germany are based on data of DÖHLER et al. (2002, pg. 62 ff). They are valid for all subcategories of cattle and were converted to TAN-related emission factors, see DÄMMGEN et al. (2010a) and able 4.4.

According to IPCC (2006), the anaerobic digestion of manure represents a separate type of manure storage. This storage type, however, in the German methodology, consists of three compartments: pre-storage, digester, storage of digestate. The effective emission factor of this combination is not a constant and must be calculated (see Chapter 3.3.4.4).

Mit Ausnahme der Vergärung von Wirtschaftsdünger beruhen die partiellen NH_3 -N-Emissionsfaktoren für die in Deutschland üblichen Lagerverfahren auf Daten von DÖHLER et al. (2002, S. 62 f). Sie gelten für alle Rinder und wurden von DÄMMGEN et al. (2010a) in TAN bezogene Emissionsfaktoren umgerechnet, siehe Table 4.6.

Die Vergärung von Wirtschaftsdünger wird nach IPCC (2006) als eigenständiger Lagertyp aufgefasst. Dieser umfasst im deutschen Inventar prinzipiell die drei Komponenten Vorlager, Fermenter und Gärrestlager. Der effektive Emissionsfaktor für diese Kombination ist nicht konstant und muss berechnet werden (siehe Kapitel 3.3.4.4).

Table 4.6: Cattle, partial emission factors for NH_3 -N from storage (related to TAN)

Storage type	Lagerungsart	Emission factor (kg kg ⁻¹)
slurry (untreated)	Gülle (unbehandelt)	
slurry tank	Güllelager	
open tank (without natural crust)	offen (ohne natürliche Schwimmdecke)	0.150 ^a
solid cover (incl. tent structures)	feste Abdeckung (inkl. Zelt)	0.015 ^b
natural crust	natürliche Schwimmdecke	0.045 ^b
floating cover (chaff)	schwimmende Abdeckung (Strohhäcksel)	0.030 ^b
floating cover (plastic film)	schwimmende Abdeckung (Folie)	0.023 ^b
underneath slatted floor > 1 month	Lager unter Spaltenboden > 1 Monat	0.045 ^a
leachate, storage with solid cover	Jauche, Lagerung mit fester Abdeckung	0.013 ^a
solid manure/heap (deep bedding, sloped floor)	Festmist/Misthaufen (Tiefstreu, Tretmist)	0.600 ^a
solid manure/heap (tied systems, loose housing ^c)	Festmist/Misthaufen (Anbindehaltung, Laufstall)	0.600 ^a

^a estimated according to DÄMMGEN et al. (2010a)

^b calculated according to DÖHLER et al. (2002), Table 3.14

^c loose housing other than deep bedding and sloped floor

According to IPCC (2006) there are two different categories of N₂O emissions from animal husbandry: Direct emissions from the compartments housing and storage, and indirect emissions. The German inventory considers only the indirect emissions due to deposition of reactive nitrogen that is a consequence of emissions of NH₃ and NO from the compartments housing and storage, see Chapter 3.3.4.3.6.

The emission factors for direct N₂O from housing/storage were, as far as available, taken from IPCC (2006). For floating cover consisting of chaff the emission factor of natural crust (0.005 N₂O-N (kg N)⁻¹) is used as a worst-case assumption. Because of the low prevalence of floating covers consisting of chaff, the impact of this assumption on total N₂O emissions is very low.

Germany differentiates solid-manure systems according to whether they include solid-manure storage or use deep bedding. For solid manure systems the default emission factor provided in IPCC (2006)-10.62 is used: 0.005 kg N₂O-N (kg N)⁻¹. As in Germany deep bedding systems are used without active mixing (see Chapter 3.4.3.2.1), the lower default emission factor of IPCC (2006) is adopted: 0.01 kg N₂O-N (kg N)⁻¹.

Like for NH₃, the effective N₂O emission factor of an aerobic digestion of manure has to be calculated, see Chapter 3.3.4.4. It is not a constant.

Table 4.7 shows the emission factors used in the inventory for direct N₂O. They are related to the sum of N excreted and N input with bedding material.

Nach IPCC (2006) werden der Tierhaltung neben direkten N₂O-Emissionen aus dem Bereich Stall/Lager auch indirekte N₂O-Emissionen zugeordnet. Im deutschen Inventar werden dabei lediglich die indirekten Emissionen aufgrund der Deposition von reaktivem Stickstoff berücksichtigt, die auf die Emissionen von NH₃ und NO aus dem Bereich Stall/Lager zurückgeht. Siehe dazu auch Kapitel 3.3.4.3.6.

Die Emissionsfaktoren für direktes N₂O aus Stall/Lager wurden, soweit verfügbar, aus IPCC (2006) entnommen. Für eine schwimmende Abdeckung aus Häckseln wird der N₂O-Emissionsfaktor im Sinne einer worst-case-Annahme mit dem Emissionsfaktor für die natürliche Schwimmdecke gleichgesetzt (0,005 N₂O-N (kg N)⁻¹). Wegen geringer Verbreitung der Abdeckung aus Häckseln ist die Auswirkung auf die Gesamt-N₂O-Emissionen sehr gering.

Bei Festmistsystemen differenziert Deutschland nach Festmistlagerung und Tiefstreu. Für Festmistsysteme wird der Default-Emissionsfaktor von IPCC (2006)-10.62 verwendet: 0,005 kg N₂O-N (kg N)⁻¹. Da Tiefstreusysteme in Deutschland ohne Durchmischung betrieben werden (siehe Kapitel 3.4.3.2.1), verwendet das Inventar den niedrigeren Default-Emissionsfaktor von IPCC (2006): 0,01 kg N₂O-N (kg N)⁻¹.

Für die Vergärung von Wirtschaftsdünger wird wie bei NH₃ auch für N₂O der effektive Emissionsfaktor berechnet, siehe Kapitel 3.3.4.4. Er ist nicht konstant.

Table 4.7 gibt einen Überblick über die im Inventar verwendeten Emissionsfaktoren für direktes N₂O. Sie beziehen sich auf die Summe aus ausgeschiedenem und durch Einstreu eingebrachtem N.

Table 4.7: Cattle, partial emission factors for direct N₂O-N from housing and storage (applied to N_{excr} + N_{straw})

Storage type	Lagerungsart	Emission factor (kg kg ⁻¹)
slurry (untreated)	Gülle (unbehandelt)	
slurry tank	Güllelager	
open tank (without natural crust)	offen (ohne natürliche Schwimmdecke)	0.000 ^a
solid cover (incl. tent structures)	feste Abdeckung (inkl. Zelt)	0.005 ^b
natural crust	natürliche Schwimmdecke	0.005 ^a
floating cover (chaff)	schwimmende Abdeckung (Strohhäcksel)	0.005 ^c
floating cover (plastic film)	schwimmende Abdeckung (Folie)	0.000 ^d
underneath slatted floor > 1 month	Lager unter Spaltenboden > 1 Monat	0.002 ^a
leachate, storage with solid cover	Jauche, Lagerung mit fester Abdeckung	0.005 ^e
solid manure/heap (deep bedding, sloped floor)	Festmist/Misthaufen (Tiefstreu, Tretmist)	0.010 ^a
solid manure/heap (tied systems, loose housing ^f)	Festmist/Misthaufen (Anbindehaltung, Laufstall)	0.005 ^a

^a Source: IPCC(2006)-10.62 ff; for details see text

^b A natural crust can develop; enough oxygen is available for N₂O formation. Hence the EF of natural crust is adopted.

^c Assumption (worst case) due to missing data: Floating covers produced by chaff act like natural crusts.

^d Even though a natural crust may develop there is not enough oxygen for N₂O formation.

^e Assumption: comparable to solid-covered storage of slurry

^f loose housing other than deep bedding and sloped floor

According to IPCC (2006) the emission factor for indirect N₂O-N emissions due to deposition of reactive N from housing/storage is 0.01 kg kg⁻¹. It is to be applied to the amount of reactive N deposited.

In accordance with Chapter 3.3.4.3.5, the emission factor for NO-N from housing/storage is assumed to be one tenth of the N₂O-N emissions factor, the emission factor for N₂ from housing/storage is estimated thrice

Der Emissionsfaktor für indirekte N₂O-N-Emissionen aufgrund der Deposition von reaktivem N aus Stall/Lager ist nach IPCC (2006) 0,01 kg kg⁻¹ (anzuwenden auf die Menge an reaktivem N).

Entsprechend Kapitel 3.3.4.3.5 wird der Emissionsfaktor für NO-N aus Stall/Lager mit einem Zehntel, der Emissionsfaktor für N₂ aus Stall/Lager mit dem Dreifachen des N₂O-N-Emissionsfaktors angesetzt. Die Emissi-

the factor for N_2O . Again, the emission factors for NO and N_2 are related to the sum of nitrogen excreted and N input with bedding material.

For the uncertainties of the emission factors see Chapter 4.2.2.4.

onsfaktoren für NO und N_2 beziehen sich auf die Summe aus ausgeschiedenem und durch Einstreu eingebrachtem N .

Zur Unsicherheit der Emissionsfaktoren siehe Kapitel 4.2.2.4.

4.2.2.3 NH_3 , N_2O and NO emission factors for spreading / NH_3 -, N_2O - und NO -Emissionsfaktoren der Ausbringung

Table 4.8 to Table 4.10 provide the partial NH_3 - N emission factors used in the inventory for the spreading of cattle manure. These emission factors are generally based on data from DÖHLER et al. (2002), but were converted from the units “per animal place” to the units “per kg TAN”. Some emission factors had to be corrected, and missing emission factors were added.

Table 4.8 bis Table 4.10 zeigen die im Inventar für Rinder eingesetzten partiellen NH_3 - N -Emissionsfaktoren für die Wirtschaftsdünger-Ausbringung. Sie beruhen grundsätzlich auf Daten von DÖHLER et al. (2002), wurden aber von Tierplatz-Bezug auf TAN-Bezug umgerechnet. In einigen Fällen war es erforderlich die Emissionsfaktor zu korrigieren oder fehlende Werte zu ergänzen.

Table 4.8: Cattle, NH_3 - N emission factors for application of slurry and digested manure (related to TAN)

Application type	Ausbringungstechnik	Emission factor ($kg\ kg^{-1}$) ^a
broadcast, without incorporation	Breitverteiler, ohne Einarbeitung	0.50
broadcast, incorporation ≤ 1 h	Breitverteiler, Einarbeitung ≤ 1 h	0.10
broadcast, incorporation ≤ 4 h	Breitverteiler, Einarbeitung ≤ 4 h	0.26
broadcast, incorporation ≤ 6 h	Breitverteiler, Einarbeitung ≤ 6 h	0.35
broadcast, incorporation ≤ 8 h	Breitverteiler, Einarbeitung ≤ 8 h	0.40 ^b
broadcast, incorporation ≤ 12 h	Breitverteiler, Einarbeitung ≤ 12 h	0.43
broadcast, incorporation ≤ 24 h	Breitverteiler, Einarbeitung ≤ 24 h	0.46
broadcast, incorporation ≤ 48 h	Breitverteiler, Einarbeitung ≤ 48 h	0.50
broadcast, vegetation	Breitverteiler, Vegetation	0.50 ^c
broadcast, grassland	Breitverteiler, Grünland	0.60
trailing hose, without incorporation	Schleppschlauch, ohne Einarbeitung	0.46
trailing hose, incorporation ≤ 1 h	Schleppschlauch, Einarbeitung ≤ 1 h	0.04
trailing hose, incorporation ≤ 4 h	Schleppschlauch, Einarbeitung ≤ 4 h	0.15
trailing hose, incorporation ≤ 6 h	Schleppschlauch, Einarbeitung ≤ 6 h	0.20
trailing hose, incorporation ≤ 8 h	Schleppschlauch, Einarbeitung ≤ 8 h	0.24 ^b
trailing hose, incorporation ≤ 12 h	Schleppschlauch, Einarbeitung ≤ 12 h	0.30
trailing hose, incorporation ≤ 24 h	Schleppschlauch, Einarbeitung ≤ 24 h	0.39
trailing hose, incorporation ≤ 48 h	Schleppschlauch, Einarbeitung ≤ 48 h	0.46
trailing hose, short vegetation	Schleppschlauch, kurze Vegetation	0.46 ^d
trailing hose, beneath vegetation	Schleppschlauch, unterhalb der Vegetation	0.35
trailing hose, grassland	Schleppschlauch, Grünland	0.54
trailing shoe, incorporation ≤ 1 h	Schleppschuh, Einarbeitung ≤ 1 h	0.04 ^e
trailing shoe, incorporation ≤ 4 h	Schleppschuh, Einarbeitung ≤ 4 h	0.15 ^e
trailing shoe, incorporation ≤ 8 h	Schleppschuh, Einarbeitung ≤ 8 h	0.24 ^e
trailing shoe, incorporation ≤ 12 h	Schleppschuh, Einarbeitung ≤ 12 h	0.30 ^e
trailing shoe, grassland	Schleppschuh, Grünland	0.36
injection techniques	Injektionsverfahren/Schlitzverfahren	0.24
slurry cultivator	Güllegrubber	0.04 ^f

^a Source: The emission factors are calculated from Table 3.19 and pg. 69 in DÖHLER et al. (2002), except for the EFs denoted by ^{b, c, d, e}.

^b broadcast or trailing hose, incorporation within 8 h: no data available in DÖHLER et al. (2002), hence emission factor estimated in agreement with KTBL.

^c broadcast, vegetation: worst case assumption of “no reduction” as no emission factor available.

^d Expert judgment (S. Wulf, KTBL, 2018): EF of “trailing hose, short vegetation” is assumed to be equal to the EF of “trailing hose, without incorporation”.

^e As there is no data available on these trailing shoe emission factors, the respective emission factors of trailing hose were adopted.

^f Expert judgment (S. Wulf, KTBL, 2016): The EF of the slurry cultivator is assumed to be equal to the EF of trailing hose with incorporation within 1 hour.

No NH_3 - N emission factors are available for the application of cattle manures after anaerobic digestion. Hence, according to Chapter 3.3.4.4.3, the emission factors of untreated cattle slurry were used (see Table 4.8).

Für die Ausbringung von Gärresten aus der Vergärung von Rindergülle und –mist sind keine NH_3 - N -Emissionsfaktoren verfügbar. Nach Kapitel 3.3.4.4.3 wurden daher die Emissionsfaktoren für die Ausbringung von unbehandelter Rindergülle übernommen, siehe Table 4.8.

Table 4.9: Cattle, NH₃-N emission factors for application of leachate (“Jauche”) (related to TAN)

Application type	Ausbringungstechnik	Emission factor (kg kg ⁻¹)
broadcast, without incorporation	Breitverteiler, ohne Einarbeitung	0.20 ^a
broadcast, incorporation ≤ 1 h	Breitverteiler, Einarbeitung ≤ 1 h	0.02 ^a
broadcast, incorporation ≤ 4 h	Breitverteiler, Einarbeitung ≤ 4 h	0.07 ^a
broadcast, incorporation ≤ 8 h	Breitverteiler, Einarbeitung ≤ 8 h	0.116 ^b
broadcast, incorporation ≤ 12 h	Breitverteiler, Einarbeitung ≤ 12 h	0.144 ^b
broadcast, vegetation	Breitverteiler, Vegetation	0.20 ^a
broadcast, grassland	Breitverteiler, Grünland	0.20 ^a
trailing hose, without incorporation	Schleppschlauch, ohne Einarbeitung	0.18 ^b
trailing hose, incorporation ≤ 1 h	Schleppschlauch, Einarbeitung ≤ 1 h	0.01 ^b
trailing hose, incorporation ≤ 4 h	Schleppschlauch, Einarbeitung ≤ 4 h	0.05 ^b
trailing hose, incorporation ≤ 8 h	Schleppschlauch, Einarbeitung ≤ 8 h	0.09 ^b
trailing hose, incorporation ≤ 12 h	Schleppschlauch, Einarbeitung ≤ 12 h	0.12 ^b
trailing hose, vegetation	Schleppschlauch, Vegetation	0.10 ^b
trailing hose, grassland	Schleppschlauch, Grünland	0.14 ^c
trailing shoe, incorporation ≤ 1 h	Schleppschuh, Einarbeitung ≤ 1 h	0.01 ^d
trailing shoe, incorporation ≤ 4 h	Schleppschuh, Einarbeitung ≤ 4 h	0.05 ^d
trailing shoe, incorporation ≤ 8 h	Schleppschuh, Einarbeitung ≤ 8 h	0.09 ^d
trailing shoe, incorporation ≤ 12 h	Schleppschuh, Einarbeitung ≤ 12 h	0.12 ^d
trailing shoe, grassland	Schleppschuh, Grünland	0.08 ^c
injection techniques	Injektionsverfahren/Schlitzverfahren	0.04 ^c
slurry cultivator	Güllegrubber	0.01 ^e

^a DÖHLER et al. (2002), Table 3.20^b emission factors estimated in agreement with KTBL, based on a emission decay curve as function of the duration of incorporation similar to that of pig slurry (see DÖHLER et al., 2002, Table 3.19)^c estimated with the respective emission reduction factor for pig slurry (DÖHLER et al., 2002, Table 3.19)^d As there is no data available on these trailing shoe emission factors, the respective emission factors of trailing hose were adopted.^e Expert judgment (S. Wulf, KTBL, 2016): EF of the slurry cultivator is assumed to be equal to the EF of trailing hose with incorporation within 1 hour.**Table 4.10: Cattle, NH₃-N emission factors for application of solid manure (FYM) (related to TAN)**

Application type	Ausbringungstechnik	Emission factor (kg kg ⁻¹)
broadcast, without incorporation	Breitverteiler, ohne Einarbeitung	0.90 ^a
broadcast, incorporation ≤ 1 h	Breitverteiler, Einarbeitung ≤ 1 h	0.09 ^a
broadcast, incorporation ≤ 4 h	Breitverteiler, Einarbeitung ≤ 4 h	0.45 ^a
broadcast, incorporation ≤ 8 h	Breitverteiler, Einarbeitung ≤ 8 h	0.72 ^b
broadcast, incorporation ≤ 12 h	Breitverteiler, Einarbeitung ≤ 12 h	0.81 ^b
broadcast, incorporation ≤ 24 h	Breitverteiler, Einarbeitung ≤ 24 h	0.90 ^a
broadcast, incorporation ≤ 48 h	Breitverteiler, Einarbeitung ≤ 48 h	0.90 ^a

^a calculated according to DÖHLER et al. (2002), Table 3.24^b estimated from data in DÖHLER et al. (2002), Table 3.24, in agreement with KTBL

For the uncertainties of the NH₃-N emission factors see Chapter 4.2.2.4.

Emission factors for N₂O and NO emissions due to spreading of manure or digestate of manure are provided in Chapters 11.2 and 12.

Zur Unsicherheit der NH₃-N-Emissionsfaktoren siehe Kapitel 4.2.2.4.

Zu Emissionsfaktoren für die Berechnung von N₂O- und NO-Emissionen als Folge der Ausbringung von Wirtschaftsdünger und Wirtschaftsdünger-Gärresten siehe Kapitel 11.2 und 12.

4.2.2.4 *Uncertainties of the nitrogen emission factors / Unsicherheiten der Stickstoff-Emissionsfaktoren*

The subsequent specifications apply to all animals for which emissions are calculated.

The NH₃ emissions from animal husbandry are reported in three different source categories:

- Emissions from housing and storage as emissions from manure management (separately for each animal category),

Die nachfolgenden Angaben gelten für alle Tiere, für die Emissionen berechnet werden.

Die NH₃-Emissionen aus der Tierhaltung werden in drei getrennten Quellkategorien berichtet:

- Emissionen aus Stall und Lager unter „Wirtschaftsdünger-Management“ getrennt nach Tierkategorien,

- emissions from manure spreading (as a total for all animals), and
- emissions from grazing (as a total for all animals which are grazed).

The uncertainties (half the 95 % confidence interval) of the NH_3 emission factors are needed separately for each of these three source categories in order to enable the calculation of the total uncertainty of the NH_3 emission inventory. As no national data are available for these uncertainties, they need to be estimated as described in the following.

The uncertainty of the emission factor for “manure management” (housing plus storage) is assumed to be 36 % (half the 95 % confidence interval, normal distribution), see Chapter 14.5.

EMEP (2016)-3B-35 quotes an investigation made in the UK that estimates the uncertainty of the emission factor for spreading of slurry to be ± 14 %. EMEP (2007)-B1090-19 gave an uncertainty of 30 % for Tier 1 emission factors. In a conservative way it is assumed in the inventory that the uncertainty provided by EMEP is adopted i. e. 30 % for half the 95 % confidence interval of the NH_3 emission factor for spreading. A normal distribution is assumed. This uncertainty applies to the application of each individual animal category. Effective emission factor uncertainty is calculated for the spreading-related total emission of all animal categories, as is ultimately to be reported, using Gaussian error propagation, see Chapter 11.2.

For the uncertainty of NH_3 emissions originating from grazing, the British study mentioned above obtained an uncertainty of ± 136 % for “beef cattle grazing” (see EMEP (2016)-3B-35). based on this the German inventory assumes an uncertainty of factor 2.5 for the NH_3 emission factors for all grazing animals. This is equivalent to -60 % and +150 % as limits of the 95 % confidence interval. The unreasonable information “-136 %” is ignored. A lognormal distribution is assumed. In accordance with the guidance for greenhouse gases in IPCC (2006)-3.29, the total uncertainty of the NH_3 emissions in the German inventory is quantified in Chapter 14.7 using the larger of the two intervals [2,5 % percentile; mean] und [mean; 97,5 % percentile], i. e. 150 %.

For the uncertainties of the N_2O emission factor for the combination of animal house and storage see Chapter 14.4.1. (The direct N_2O emissions from agricultural soils resulting from the application of manure are described in Chapter 11.2 See also there for the uncertainty of the corresponding emission factor. For indirect N_2O emissions, including related uncertainties, see Chapter 12.)

Due to the lack of information on the uncertainties of the NO and N_2 emission factors, the uncertainty of the N_2O emission factor is adopted (see Chapter 14.4.2).

The uncertainties of the implied emission factors (IEF) for NH_3 , N_2O , NO , and N_2 from manure management are described in Chapters 14.4 to 14.5.

- Emissionen aus der Ausbringung für alle Tiere zusammengefasst, und
- Emissionen aus dem Weidegang für alle weidenden Tiere zusammengefasst.

Die Unsicherheit (halbes 95 %-Konfidenzintervall) der NH_3 -Emissionsfaktoren wird getrennt für jede dieser drei Quellkategorien benötigt, um die Gesamtunsicherheit des NH_3 -Inventars in Kapitel 14.7 ermitteln zu können. Da nationale Daten für diese Unsicherheiten nicht verfügbar sind, müssen sie geschätzt werden, wie im Folgenden beschrieben wird.

Die Unsicherheit des Emissionsfaktors für „Wirtschaftsdünger-Management“ (Stall und Lager zusammen) wird mit 36 % angesetzt (halbes 95 %-Konfidenzintervall, Normalverteilung), siehe Kapitel 14.5.

EMEP (2016)-3B-35 zitiert eine britische Untersuchung, in der die Unsicherheit des Emissionsfaktors für die Ausbringung von Gülle bei ± 14 % liegt. EMEP (2007)-B1090-19 gab für Tier-1-Emissionsfaktoren eine Unsicherheit von 30 % an. In konservativer Weise wird im Inventar für den NH_3 -Emissionsfaktor der Ausbringung die EMEP-Unsicherheit von 30 % angenommen (halbes 95 %-Konfidenzintervall, Normalverteilung). Diese Unsicherheit gilt für die Ausbringung jeder einzelnen Tierkategorie. Für die ausbringungsbedingte Gesamtemission aller Tierkategorien, wie sie letztlich zu berichten ist, wird mittels Gaußscher Fehlerfortpflanzung eine effektive Emissionsfaktor-Unsicherheit berechnet, siehe Kapitel 11.2.

Zur Unsicherheit des NH_3 -Emissionsfaktors für Weidegang gibt die oben erwähnte britische Studie laut EMEP (2016)-3B-35 eine Unsicherheit von ± 136 % für „beef cattle grazing“ an. Davon ausgehend nimmt das deutsche Inventar für alle weidenden Tiere einen NH_3 -EF-Unsicherheitsfaktor von 2,5 an, d.h. -60 % und +150 % als Grenzen für das 95 %-Konfidenzintervall. Dabei wird die unsinnige Angabe „-136 %“ ignoriert. Es wird eine lognormale Verteilung angenommen. Entsprechend der Vorgabe für Treibhausgase in IPCC (2006)-3.29, wird für die Gesamtunsicherheitsberechnung des deutschen landwirtschaftlichen NH_3 -Inventars in Kapitel 14.7 von den beiden Intervallen [2,5 %-Perzentil; Mittelwert] und [Mittelwert; 97,5 %-Perzentil] das größere, d. h. 150 % verwendet.

Für die Unsicherheit des N_2O -Emissionsfaktors für die Kombination „Stall/Lager“ wird auf Kapitel 14.4.1 verwiesen. (Die als Folge der Ausbringung von Wirtschaftsdünger entstehenden direkten N_2O -Emissionen aus landwirtschaftlichen Böden werden in Kapitel 11.2 beschrieben. Siehe dort auch wegen der Unsicherheit des entsprechenden Emissionsfaktors. Zu den indirekten N_2O -Emissionen einschließlich der entsprechenden Unsicherheiten siehe Kapitel 12.)

Mangels Daten zu den Unsicherheiten der NO - und N_2 -Emissionsfaktoren wird die Unsicherheit des N_2O -Emissionsfaktors übernommen, siehe Kapitel 14.4.2.

Zu den Unsicherheiten der aggregierten Emissionsfaktoren (IEF) für NH_3 , N_2O , NO und N_2 aus dem Wirtschaftsdünger-Management siehe Kapitel 14.4 bis 14.5.

4.3 Dairy cows / Milchkühe

The emissions are calculated according to the methods compiled in Table 4.11.

For the definition of the methods see Chapter 3.2.3.

Die Berechnung der Emissionen erfolgt nach den in Table 4.11. zusammengestellten Methoden.

Zur Methodendefinition siehe Kapitel 3.2.3.

Table 4.11: Dairy cows, calculation methods applied

Species	Origin	Tier	Method applied
CH ₄	enteric fermentation	3	IPCC / national
CH ₄	manure management	2	IPCC / national
NM VOC	manure management	2	EMEP
NH ₃	manure management	3	EMEP / national
N ₂ O, NO, N ₂	manure management	2	IPCC / national
TSP, PM ₁₀ , PM _{2.5}	manure management	2	EMEP

4.3.1 Activity and performance data /Aktivitäts- und Leistungsdaten

4.3.1.1 Animal numbers / Tierzahlen

The category "dairy cow" used in the inventory corresponds to the category J in Table 4.1.

Cattle numbers are collected annually by the Statistical Offices of the federal states (STATLA C III 1 – vj 4) and published by the Federal Statistical Office in federal-state resolution and for Germany (STATBA FS3 R4, STATBA FS3 R4.1). The cattle numbers used to calculate the emissions in district resolution are provided by the Federal Statistical Office specifically for emissions reporting, see Chapter 4.1.1. For the uncertainties of the animal numbers see Chapter 4.1.

Die im Inventar verwendete Kategorie „Milchkuh“ entspricht der Kategorie J in Table 4.1.

Rinderzahlen werden jährlich von den Statistischen Landesämtern erhoben (STATLA C III 1 – vj 4) und durch das Statistische Bundesamt in Bundeslandauflösung und für Deutschland veröffentlicht (STATBA FS3 R4, STATBA FS3 R4.1). Die zur Emissionsberechnung verwendeten Rinderzahlen in Kreisauflösung werden durch das Statistische Bundesamt speziell für die Emissionsberichterstattung bereitgestellt, siehe dazu Kapitel 4.1.1. Zu den Unsicherheiten der Tierzahlen siehe Kapitel 4.1.

4.3.1.2 Milk yield and milk composition / Milchleistung und Milchinhaltsstoffe

For dairy cows, the most important performance criterion is milk yield.

As of Submission 2019, milk yields at district level are used in all years from 1990 onwards. This leads, compared to earlier submissions, to slight changes of milk yields at state and federal level in the years up to 2009.

As of the year 2007, BLE is providing district-specific data on milk production and use (BLE, 2019). However, the district-related data for the last year of the time series is usually not available in time. It is estimated based on the previous year.

Missing district data were interpolated in the respective federal states with the aid of milk production (in tons per federal state) in such a way that the average milk yield for each federal state is reproduced. Milk production is known for all federal states in the years as of 2007 (BLE, 2019).

For the years with agricultural structure surveys (1990, 1992, 1994, 1996, 2001 and 2003), district-based milk yield data are also available (STATLA C III 3). In the submissions before Submission 2018 the mean annual milk yield of the federal state was used in the absence of district data. As a result, the resulting annual mean milk yield of the federal state would have changed. However, this error was avoided by a new interpolation based on the number of crops and milk production. Milk produc-

Wesentliches Milchkuh-Leistungskriterium ist die Milchleistung.

Ab Submission 2019 wird in allen Jahren ab 1990 mit Milchleistungen auf Kreisebene gerechnet. Gegenüber früheren Submissionen ändern sich dadurch die Milchleistungen auf Landes- und Bundesebene in den Jahren bis 2009 geringfügig.

Ab dem Jahr 2007 liefert die BLE kreisbezogene Daten zu Milcherzeugung und –verwendung (BLE, 2019). Die kreisbezogenen Daten für das jeweils letzte Zeitreihenjahr liegen allerdings in der Regel nicht rechtzeitig vor. Sie werden mit Hilfe des Vorjahres geschätzt.

Fehlende Kreisdaten wurden mit Hilfe der Milcherzeugung (in Tonnen pro Bundesland) in den jeweiligen Ländern so interpoliert, dass sich für jedes Bundesland die mittlere Milchleistung ergibt. Die Milcherzeugung ist für alle Bundesländer in den Jahren ab 2007 bekannt (BLE, 2019).

Für die Jahre mit Agrarstrukturerhebungen (1990, 1992, 1994, 1996, 2001 und 2003) liegen kreisbezogene Milchleistungsdatenebenenfalls vor (STATLA C III 3). Bis zur Submission 2018 wurden bei fehlenden Kreisdaten die mittlere jährliche Milchleistung des Bundeslandes eingesetzt. Dies hätte an sich dazu geführt, dass sich die danach ergebende mittlere jährliche Milchleistung des Bundeslandes verändert. Dies wurde durch eine neue Interpolation auf Grundlage der Kreistierzahlen und der

tion was calculated for these years as a product of milk yield per federal state (STATBA FS3 R4.2.2) and number of animals.

In the years 1991, 1993, 1995, 1997, 1998, 2000, 2002 and 2004 - 2006 milk production was interpolated with the help of the animal numbers of the respective year and the milk production of the neighbouring years.

Mean milk yields for the federal states and Germany are compiled in Table 4.12. As the table size does not allow to present the complete time series, every other year is omitted before 2010.

Milcherzeugung vermieden. Die Milcherzeugung wurde für diese Jahre berechnet als Produkt aus Milchleistung pro Bundesland (STATBA FS3 R4.2.2) und Tierzahl.

In den Jahren 1991, 1993, 1995, 1997, 1998, 2000, 2002 und 2004 - 2006 wurde die Milcherzeugung mit Hilfe der Tierzahlen des jeweiligen Jahres und der Milcherzeugung der benachbarten Jahre interpoliert.

Die mittleren Milchleistungen der Bundesländer und von Deutschland sind in Table 4.12 zusammengestellt. Aus Platzgründen wurde in den nachfolgenden Tabellen bis 2010 jedes zweite Jahr weggelassen.

Table 4.12: Dairy cows, milk yield (in kg pl⁻¹ a⁻¹) (averaged district level data)

	1990	1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
BW	4207	4388	4732	4926	5197	5243	5539	5799	5893	6021	6246	6581	6768	6749	6750	7030	6944	6989	7244
BY	4415	4572	4791	4928	5210	5322	5438	5814	6100	5967	6205	6420	6513	6500	6714	6726	6890	6965	7302
BB	4204	4654	5073	5576	6356	6823	7318	7579	7960	8315	8353	8657	8487	8517	8731	8901	9111	8950	9088
HE	5181	5528	5459	5712	6121	6199	6286	6447	6650	6439	6672	6943	6938	6930	7026	7126	7344	7174	7570
MV	4176	4803	5033	5722	6587	6849	7215	7591	8026	8193	8251	8337	8419	8523	8801	8956	8998	8717	8928
NI	5897	6056	6228	6291	6559	6627	6811	6958	7170	6931	7494	7576	7673	7696	7908	7924	8060	8149	8455
NW	5200	5466	5745	6030	6538	6533	6890	7055	7387	7096	7445	7614	7591	7638	7879	7879	7962	8041	8356
RP	4470	4875	5122	5573	5938	5862	5977	6294	6460	6420	6831	7105	6963	6977	7245	7345	7546	7460	7867
SL	4808	5159	5188	5447	5981	5699	6306	6437	6568	6148	6388	6624	6304	6332	6692	6700	6846	6703	7153
SN	4380	5000	5274	5593	6295	6874	7321	7656	8050	8393	8533	8585	8967	8977	8980	9189	9394	9365	9620
ST	4006	5286	5425	5921	7047	7048	7235	7532	7912	8234	8277	8489	8636	8700	8848	9158	9453	9083	9393
SH	4881	5116	5393	5709	5947	6202	6627	6888	7134	6965	7237	7026	6993	7017	7345	7441	7532	7612	7854
TH	4267	4972	5112	5613	6224	6737	7134	7463	7864	8202	8460	8616	8952	8980	8999	9307	9604	9346	9615
StSt	5364	5280	6132	5760	5410	6406	6947	7281	6993	6948	7407	8057	7479	7460	7601	7609	7311	7332	7620
Ger- many	4700	5034	5269	5514	5917	6058	6296	6591	6858	6794	7083	7240	7323	7343	7541	7628	7746	7763	8063

Source: See text

Table 4.13: Dairy cows, fat content of milk (in % of mass)

	1990	1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
BW	4.04	4.10	4.15	4.17	4.17	4.14	4.17	4.22	4.17	4.17	4.17	4.14	4.16	4.15	4.14	4.15	4.17	4.12	4.10
BY	4.06	4.11	4.14	4.19	4.22	4.20	4.24	4.25	4.19	4.19	4.18	4.15	4.18	4.18	4.18	4.19	4.23	4.20	4.19
BB		4.35	4.43	4.32	4.24	4.17	4.08	4.14	3.93	3.99	4.04	3.97	3.97	3.97	3.91	3.90	3.96	3.93	3.82
HE	4.07	4.17	4.21	4.28	4.27	4.24	4.23	4.24	4.19	4.15	4.17	4.14	4.14	4.11	4.08	4.09	4.12	4.09	4.06
MV		4.38	4.43	4.41	4.33	4.26	4.13	4.16	4.10	4.06	4.12	4.09	4.11	4.10	3.96	3.97	4.00	3.98	3.91
NI	4.17	4.22	4.28	4.33	4.27	4.27	4.22	4.25	4.20	4.17	4.19	4.15	4.16	4.12	4.06	4.09	4.10	4.07	4.03
NW	4.11	4.14	4.15	4.20	4.21	4.19	4.17	4.19	4.14	4.13	4.13	4.11	4.07	4.10	4.05	4.07	4.10	4.07	4.04
RP	4.12	4.15	4.20	4.22	4.27	4.21	4.21	4.22	4.18	4.16	4.17	4.14	4.14	4.11	4.08	4.09	4.12	4.09	4.06
SL																			
SN		4.41	4.49	4.45	4.36	4.29	4.17	4.19	4.07	4.05	4.05	4.02	4.01	4.02	3.99	3.96	4.03	3.96	3.90
ST		4.37	4.41	4.36	4.25	4.18	4.07	4.10	4.00	3.99	4.04	3.98	3.95	3.98	3.92	3.89	3.93	3.93	3.85
SH	4.16	4.27	4.27	4.33	4.28	4.30	4.37	4.22	4.25	4.23	4.27	4.26	4.24	4.22	4.15	4.20	4.21	4.16	4.13
TH		4.35	4.38	4.33	4.32	4.19	4.09	4.10	4.00	4.00	4.03	3.97	3.96	4.02	3.95	3.93	3.99	3.97	3.90
Ger- many	4.09	4.20	4.24	4.27	4.25	4.22	4.20	4.22	4.16	4.14	4.16	4.13	4.13	4.12	4.08	4.09	4.12	4.09	4.06

Source: ZMP, various years; MLUR-BB (2007); ZMB (2009); AMI, Markt Bilanz Milch (2011 - 2019)

Milk fat contents are available for single German Federal States. The data available at the time being are listed in Table 4.13 Milk protein contents are shown in Table 4.14. As of 2014, it is the contents of milk fat and milk protein of conventionally produced cow's milk. For the years 1990 – 2013 the values in Table 4.12 do not distinguish between conventionally and organically produced milk. The use of data from conventional milk production as of 2014 is a conservative approach in terms of emission calculations.

Die aktuell bekannten mittleren MilCHFett-Gehalte sind für die einzelnen Bundesländer in Table 4.13 zusammengestellt, die mittleren Milcheiweiß-Gehalte in Table 4.14. Ab 2014 sind es MilCHFett- und Milchprotein-Gehalte von konventionell erzeugter Kuhmilch. Die Werte in Table 4.14 bis 2013 einschließlich unterscheiden nicht zwischen konventionell und ökologisch erzeugter Milch. Die Verwendung von Daten aus konventioneller Milcherzeugung ab 2014 ist in Hinblick auf die Emissionsberechnung ein konservativer Ansatz.

The missing data for the new federal states (former GDR) and the year 1990 were replaced with the respective data for 1991.

Data for Saarland were taken from the respective data set for Rheinland-Pfalz. For the City States, data for Hamburg were taken from Schleswig-Holstein, for Bremen from Niedersachsen, and for Berlin from Brandenburg.

Die fehlenden Daten für die Neuen Bundesländer im Jahr 1990 wurden durch Daten aus 1991 ersetzt.

Die Daten für das Saarland wurden insgesamt durch Daten aus Rheinland-Pfalz ersetzt. Für die Stadtstaaten werden bei Hamburg die Daten von Schleswig-Holstein eingesetzt, bei Bremen die von Niedersachsen und bei Berlin die von Brandenburg.

Table 4.14: Dairy cows, protein content of milk (in % of mass)

	1990	1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
BW	3.33	3.37	3.43	3.46	3.39	3.39	3.40	3.44	3.40	3.40	3.41	3.40	3.41	3.39	3.41	3.41	3.43	3.44	3.46
BY	3.35	3.38	3.36	3.39	3.45	3.46	3.47	3.49	3.46	3.46	3.47	3.47	3.47	3.47	3.50	3.49	3.52	3.52	3.52
BB		3.42	3.46	3.49	3.48	3.47	3.46	3.46	3.41	3.38	3.40	3.37	3.37	3.37	3.37	3.38	3.41	3.42	3.39
HE	3.30	3.32	3.31	3.35	3.36	3.35	3.37	3.39	3.37	3.37	3.39	3.38	3.38	3.37	3.37	3.38	3.41	3.42	3.43
MV		3.42	3.50	3.50	3.47	3.46	3.44	3.43	3.39	3.39	3.41	3.39	3.39	3.38	3.39	3.39	3.41	3.43	3.42
NI	3.29	3.29	3.30	3.37	3.35	3.37	3.38	3.39	3.38	3.40	3.41	3.38	3.40	3.38	3.38	3.39	3.40	3.41	3.42
NW	3.34	3.32	3.32	3.35	3.33	3.35	3.36	3.38	3.37	3.39	3.42	3.39	3.37	3.38	3.39	3.40	3.42	3.44	3.44
RP	3.28	3.33	3.34	3.36	3.34	3.32	3.35	3.37	3.37	3.38	3.39	3.38	3.38	3.37	3.37	3.38	3.41	3.42	3.43
SL																			
SN		3.38	3.46	3.48	3.47	3.47	3.45	3.44	3.40	3.41	3.40	3.38	3.39	3.39	3.38	3.38	3.41	3.41	3.40
ST		3.42	3.46	3.50	3.47	3.45	3.43	3.42	3.38	3.40	3.42	3.40	3.38	3.39	3.38	3.38	3.40	3.42	3.39
SH	3.32	3.36	3.43	3.40	3.39	3.41	3.42	3.39	3.39	3.40	3.41	3.39	3.40	3.39	3.40	3.41	3.40	3.41	3.42
TH		3.38	3.43	3.45	3.46	3.42	3.41	3.42	3.39	3.39	3.39	3.39	3.41	3.42	3.40	3.40	3.44	3.43	3.41
Germany	3.32	3.35	3.39	3.42	3.41	3.41	3.42	3.43	3.40	3.41	3.42	3.41	3.41	3.41	3.41	3.42	3.43	3.45	3.45

Source: ZMP Milch, various years; MLUR-BB (2007); ZMB (2009); AMI, Markt Bilanz Milch (2011 - 2019)

4.3.1.3 Animal weights / Tiergewichte

Start and final animal weight are the necessary data to estimate the emissions from dairy cows. The start weight of dairy cows is equivalent to the final live weight of heifers, see Chapter 4.5.1.2.1.

Carcass weight is used as proxy data (for the definition of the term "carcass weight" see Chapter 3.1.2.4) to calculate final live weight of dairy cows according to DÄMMGEN et al. (2010a):

$$w_{\text{fin,dc}} = a + b \cdot w_{\text{dc,cw}} \quad (4.1)$$

$w_{\text{fin,dc}}$	final live weight of dairy cows (in kg an ⁻¹)
a	constant ($a = 221 \text{ kg an}^{-1}$)
b	coefficient ($b = 1.46 \text{ kg kg}^{-1}$)
$w_{\text{dc,cw}}$	carcass weight of dairy cows (in kg an ⁻¹)

The carcass weights of dairy cows are compiled in Table 4.15. Due to limited space in the table, every other year is omitted before 2010.

The mean animal live weight w of a dairy cow is assumed as the arithmetic mean of her start weight and her final live weight.

The missing data for the new federal states (former GDR) and the year 1990 were replaced with the respective data for 1991. For the City States, data for Hamburg were taken from Schleswig-Holstein, for Bremen from Niedersachsen, and for Berlin those from Brandenburg.

Für die Emissionsberechnung der Milchkühe sind das Anfangsgewicht und das Lebendendgewicht von Bedeutung. Das Anfangsgewicht der Milchkühe entspricht dem Lebendendgewicht der Färsen, siehe Kapitel 4.5.1.2.1.

Das Lebendendgewicht der Milchkühe berechnet sich mittels einer von DÄMMGEN et al. (2010a) angegebenen Gleichung aus dem Schlachtgewicht (zur Schlachtgewicht-Definition siehe Kapitel 3.1.2.4):

Die Schlachtgewichte von Milchkühen sind in Table 4.15 zusammengestellt. Aus Platzgründen wurde in dieser Tabelle bis 2010 jedes zweite Jahr weggelassen.

Das mittlere Gewicht w einer Milchkuh wird als arithmetische Mittel aus Anfangs- und Lebendendgewicht angenommen.

Für die fehlenden Daten im Jahr 1990 bei den Neuen Bundesländern werden die Daten von 1991 eingesetzt. Für die Stadtstaaten werden bei Hamburg die Daten von Schleswig-Holstein verwendet, bei Bremen die von Niedersachsen und bei Berlin die von Brandenburg.

Table 4.15: Dairy cows, carcass weights (in kg an⁻¹)

	1990	1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
BW	283	284	290	291	296	298	306	305	309	309	311	310	308	307	306	307	304	309	316
BY	299	299	310	308	310	315	319	318	320	321	325	322	321	321	321	323	322	325	326
BB		250	260	265	271	278	282	284	278	270	272	277	274	272	274	275	271	272	276
HE	278	282	280	275	274	285	285	284	290	278	281	305	304	302	302	299	302	299	302
MV		250	254	255	256	262	274	272	267	270	272	277	274	272	274	275	271	272	276
NI	280	285	293	290	290	297	300	296	299	296	298	297	293	290	287	291	288	291	290
NW	279	280	284	284	285	287	289	289	292	290	295	298	296	293	293	295	291	293	292
RP	272	279	292	288	281	282	283	280	282	281	285	287	285	278	276	279	274	273	279
SL	293	290	307	307	305	304	305	301	302	302	308	305	304	303	300	300	302	299	302
SN		245	254	257	260	266	278	273	272	275	278	278	276	275	277	279	277	279	280
ST		241	262	259	266	278	290	263	262	276	276	276	275	275	276	279	275	279	282
SH	283	287	294	290	293	301	305	298	303	302	307	303	299	296	294	298	293	297	294
TH		249	270	268	270	275	274	269	272	275	277	277	275	275	276	277	276	279	282

Source: Calculated from data in STATBA FS3 R 4.2.1 (Schlachtungen und Fleischerzeugung); STATISTISCHES BUNDESAMT, GENESIS-Online-Datenbank.

4.3.1.4 Animal weight gains / Tiergewichtszunahmen

The relevant weight gain is calculated using the final live weight of cows and the final live weight of heifers (see Chapter 4.5.1.2.2). The weight gain rate is derived from the weight gain by dividing it by the timespan between the age of slaughtering and the age of first calving.

Als relevante Gewichtszunahme wird die Differenz zwischen dem Lebendendgewicht der Färsen (siehe Kapitel 4.5.1.2.2) und dem Lebendendgewicht der Milchkühe angesehen. Die Zunahmerate wird aus dieser Gewichts Differenz und der Zeit zwischen Kalbealter und Schlachalter berechnet.

$$\frac{\Delta w_{dc}}{\Delta t} = \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{w_{fin, dc} - w_{fin, bf}}{\tau_{fin, dc} - \tau_{calf}} \quad (4.2)$$

$\Delta w_{dc}/\Delta t$	weight gain rate of dairy cows, averaged over lifetime (in kg an ⁻¹ d ⁻¹)
α	time units conversion factor ($\alpha = 365$ d a ⁻¹)
$w_{fin, dc}$	final live weight of dairy cows (in kg an ⁻¹)
$w_{fin, bf}$	final live weight of heifers (in kg an ⁻¹)
$\tau_{fin, dc}$	slaughter age of dairy cows (in a)
τ_{calf}	age at first calving (in a)

The ages of first calving (τ_{calf}) and of slaughtering (τ_{fin}) are published by ADR and taken from their annual reports (ADR, 1993 ff). These data originate from sample surveys. There is no differentiation between Federal States or animal races. The data used in the inventory is compiled in Table 4.16. Data gaps occurring in the early 1990s were not closed by interpolation, thus avoiding implausible trends. Instead they were closed by backward continuation. Data gaps at the end of the time series were treated accordingly. As the table size does not allow to present the complete time series, every other year is omitted before 2010.

Erstkalbealter (τ_{calf}) und Schlachalter (τ_{fin}) werden ADR-Mitteilungen entnommen (ADR, 1993 ff). Die Zahlen entstammen Stichproben. Eine Differenzierung nach Bundesländern oder Rassen ist nicht verfügbar. Die im Inventar verwendeten Daten sind in Table 4.16 zusammengestellt. Datenlücken zu Beginn der 1990er Jahre wurden zur Vermeidung von unplausiblen Tendenzen nicht durch Extrapolation, sondern durch rückwärts gerichtete Fortschreibung gefüllt. Analog wurde mit den Datenlücken am Ende der Zeitreihen verfahren. Aus Platzgründen wurde in dieser Tabelle bis 2010 jedes zweite Jahr weggelassen.

Table 4.16: Dairy cows, slaughter ages, ages at first calving and resulting life spans (in a)

	1990	1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
τ_{fin}	5.70	5.70	5.60	5.70	5.50	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.30	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40
τ_{calf}	2.55	2.55	2.55	2.50	2.51	2.50	2.48	2.46	2.43	2.39	2.38	2.38	2.36	2.35	2.33	2.33	2.33	2.31	2.31
Δt	3.15	3.15	3.05	3.20	2.99	2.90	2.93	2.94	2.98	3.01	3.03	3.03	2.94	3.05	3.07	3.07	3.08	3.09	3.09

τ_{calf} : age of first calving; τ_{fin} : age of slaughtering; Δt : resulting life span.

Data based on gap closure are printed in italics.

Sources: ADR (annual reports, 1993 – 2017), e.g. ADR (2017), Tables 4.9 and 4.15; BRS (annual reports, 2018 – 2019), e.g. BRS (2019), Tables 4.9 and 4.15

4.3.1.5 *Pregnancy / Trächtigkeit*

The share of pregnant dairy cows is published in ADR (1993 - 2017) and BRS (2018 ff). A complete timeseries covering all Federal States can be obtained. This data was provided for emission reporting on an informative basis. However, it was not used for reporting.

Der Anteil trächtiger Milchkühe wird ADR (1993 - 2017) und BRS (2018 ff) entnommen. Es ergibt sich eine vollständige Zeitreihe für alle Bundesländer. Diese Daten werden informationshalber zur Berichterstattung bereitgestellt, aber nicht für die Emissionsberechnung benötigt.

4.3.1.6 *Duration of calving interval, lactation period, and dry period / Dauer von Zwischenkalbezeit, Laktationsperiode und Trockenstehzeit*

The calculation of the energy requirements and the respective feed intake of a dairy cow is based on the cycle defined by the duration of the interval between calvings and its performance-based partitioning. In general, the duration of the interval between calvings does not equal one year. Hence, the year-based inventory calculations require a normalization of energy requirements and respective feed intake with respect to one year.

The interval between calvings is given by:

$$t_{ibc}^* = t_{lact}^* + t_{dry}^* \quad (4.3)$$

t_{ibc}^*	duration of interval between calvings (calving interval) (in d)
t_{lact}^*	duration of lactation period (in d)
t_{dry}^*	duration of dry period (in d)

The duration of the calving interval can be related to the milk yield (DÄMMGEN et al., 2009b, Figure 2 and Equation (53)):

$$t_{ibc}^* = a + b \cdot Y_M \quad (4.4)$$

t_{ibc}^*	duration of interval between calvings (calving interval) (in d)
a	constant ($a = 346.4$ d)
b	coefficient ($b = 0.00769$ d (kg cow ⁻¹ a ⁻¹) ⁻¹)
Y_M	annual milk yield (in kg cow ⁻¹ a ⁻¹), see Chapter 4.3.1.2

The duration of the dry period t_{dry}^* is assumed to 6 weeks or 42 days (reflecting the data in Table 1.4.2 in GfE, 2001, pg. 23).

Hence, the duration of the lactation period t_{lact}^* follows from the difference of the calving interval t_{ibc}^* and the duration of the dry period t_{dry}^* .

Die Dauer der Zwischenkalbezeit kann als Funktion der Milchleistung ausgedrückt werden (DÄMMGEN et al., 2009b, Abbildung 2 und Gleichung (53)):

Die Dauer der Trockenstehzeit t_{dry}^* wird nach Tabelle 1.4.2 in GfE (2001), S. 23, mit 6 Wochen bzw. 42 Tagen angenommen.

Somit ergibt sich die Laktationsdauer t_{lact}^* aus der Differenz von Zwischenkalbezeit t_{ibc}^* und Trockenstehzeit t_{dry}^* .

4.3.2 *Energy requirements / Energiebedarf*

The subsequent chapters describe the derivation of the total energy requirements of a dairy cow based on the various details of animal performance. The NEL system is used (Net Energy Lactation), which is standard in Germany, see GfE (2001), Chapter 1.3.

In preparation of the calculation of feed intake in Chapter 4.3.3, Chapter 4.3.2.8 gives a description of the partitioning of the total energy requirements into the shares required for the lactation period and the dry period (for lactation period and dry period see Chapter 4.3.1.6).

In den nachfolgenden Kapiteln wird der Gesamtenergiebedarf der Milchkuh aus den verschiedenen tierischen Leistungsmerkmalen abgeleitet. Es wird das in Deutschland übliche NEL-System (Netto-Energie-Laktation) verwendet, siehe GfE (2001), Kapitel 1.3.

In Kapitel 4.3.2.8 erfolgt zur Vorbereitung der Futteraufnahmeberechnung in Kapitel 4.3.3 eine Aufteilung des Gesamtenergiebedarfs in die Anteile für Laktationsperiode und Trockenstehzeit (zu Laktationsperiode und Trockenstehzeit siehe Kapitel 4.3.1.6).

4.3.2.1 Overall annual NEL requirements / Jährlicher Gesamt-NEL-Bedarf

The overall annual NEL requirements are given by:

Für den gesamten jährlichen NEL-Bedarf ergibt sich:

$$NEL_{\text{tot}} = \alpha \cdot (nel_m + nel_f + nel_{lc} + nel_d + nel_p + nel_g) \quad (4.5)$$

NEL_{tot}	annual NEL required (in MJ cow ⁻¹ a ⁻¹)
α	time units conversion factor ($\alpha = 365 \text{ d a}^{-1}$)
nel_m	mean daily NEL required for maintenance (in MJ cow ⁻¹ d ⁻¹)
nel_f	mean daily NEL needed to obtain food (in MJ cow ⁻¹ d ⁻¹)
nel_{lc}	mean daily NEL requirements for lactation (in MJ cow ⁻¹ d ⁻¹)
nel_d	mean daily NEL required for draft power (in MJ cow ⁻¹ d ⁻¹)
nel_p	mean daily NEL required for pregnancy (in MJ cow ⁻¹ d ⁻¹)
nel_g	mean daily NEL required for growth (in MJ cow ⁻¹ d ⁻¹)

4.3.2.2 NEL requirement for maintenance / NEL-Bedarf für Erhaltung

The mean daily NEL requirements for maintenance are obtained as follows (GfE, 2001, pg. 20):

Der mittlere tägliche NEL-Bedarf für Erhaltung wird wie folgt (GfE, 2001, S. 20) berechnet:

$$nel_m = \eta_{nel,m} \cdot w_{\text{unit}} \cdot \left(\frac{w}{w_{\text{unit}}} \right)^{0.75} \quad (4.6)$$

nel_m	mean daily NEL required for maintenance (in MJ cow ⁻¹ d ⁻¹)
$\eta_{nel,m}$	constant ($\eta_{nel,m} = 0.364 \text{ MJ kg}^{-1} \text{ d}^{-1}$) (see discussion in DÄMMGEN et al., 2009b, Chapter 3.2.1)
w_{unit}	unit value of animal weight ($w_{\text{unit}} = 1 \text{ kg cow}^{-1}$)
w	animal weight averaged over lifetime (in kg cow ⁻¹), see Chapter 4.3.1.3

4.3.2.3 NEL requirement to obtain feed / NEL-Bedarf für die Nahrungsaufnahme

According to IPCC (2006)-10.16, the mean daily NEL requirements to obtain feed are assumed to be proportional to the NEL requirements for maintenance. The calculation considers the duration of grazing time:

In Anlehnung an IPCC (2006)-10.16 wird der mittlere tägliche NEL-Bedarf für Nahrungsaufnahme proportional zum NEL-Bedarf für Erhaltung berechnet. Die Berechnung erfolgt unter Berücksichtigung der Weidezeiten:

$$nel_f = nel_m \cdot [c_{\text{house}} \cdot (1 - f_{\text{graz}}) + c_{\text{pasture}} \cdot f_{\text{graz}}] \quad (4.7)$$

nel_f	mean daily NEL needed to obtain food (in analogy to IPCC) (in MJ cow ⁻¹ d ⁻¹)
nel_m	mean daily NEL required for maintenance (in MJ cow ⁻¹ d ⁻¹), see Chapter 4.3.2.2
c_{house}	coefficient for housing ($c_{\text{house}} = 0.00$; IPCC(2006)-10.17, Table 10.5)
f_{graz}	weighting factor ($0 \leq f_{\text{graz}} \leq 1$), see Chapter 4.3.8.5.1
α	time units conversion factor ($\alpha = 365 \text{ d a}^{-1}$)
c_{pasture}	coefficient for pasture ($c_{\text{pasture}} = 0.17$; IPCC(2006)-10.17, Table 10.5)

4.3.2.4 NEL requirements for lactation / NEL-Bedarf für Laktation

In contrast to IPCC (2006), the approach proposed includes the energy requirements for the synthesis of milk protein, see GfE (2001, pg. 21 ff), Equation 1.4.3.

DÄMMGEN et al. (2009b) Chapter 3.2.3, introduced an additional correction factor $a = 1.04$ to reflect that the inventory uses temporal means of milk yield, milk fat and milk protein contents. However, a revision of the derivation of the coefficients in Equation 1.4.2 in GfE (2001) suggests that the effects of using means of milk yield, milk fat and milk protein have implicitly been taken into account. Hence, from the 2011 submission onwards a factor $a = 1.00$ is used in agreement with GfE (2001), pg. 21 ff

Anders als IPCC (2006) berücksichtigt die Berechnung des NEL-Bedarfs für Laktation den Aufwand für die Milcheiweiß-Synthese (GfE, 2001, S. 21 f, Gl. 1.4.3).

DÄMMGEN et al. (2009b), Kapitel 3.2.3, führten einen zusätzlichen Korrekturfaktor $a = 1,04$ ein zum Ausgleich dafür, dass mit zeitlich gemittelten Werten von Milchleistung, Fett- und Eiweißgehalt gerechnet wird. Eine Neueinschätzung der Ableitung der Koeffizienten in Gleichung 1.4.3 in GfE (2001) legt aber den Schluss nahe, dass die Mittelungseffekte bereits implizit in den Regressionskoeffizienten enthalten sind. Daher wird seit Submission 2011 mit $a = 1,00$ und damit konform zu GfE (2001), S. 21 f, gerechnet.

$$nel_{lc} = \frac{Y_M}{\alpha} \cdot \left[(c_{lc,1} + c_{lc,2} \cdot x_{fat, milk} + c_{lc,3} \cdot x_{XP, milk}) + d \right] \cdot a \quad (4.8)$$

nel_{lc}	mean daily NEL requirements for lactation (in MJ cow ⁻¹ d ⁻¹)
Y_M	annual milk yield (in kg cow ⁻¹ a ⁻¹)
α	time units conversion factor ($\alpha = 365$ d a ⁻¹)
$c_{lc,1}$	constant ($c_{lc,1} = 0.95$ MJ kg ⁻¹ ; GfE, 2001, pg. 21)
$c_{lc,2}$	coefficient ($c_{lc,2} = 38$ MJ kg ⁻¹ ; GfE, 2001, pg. 21)
$x_{fat, milk}$	mass fraction of milk fat (in kg kg ⁻¹)
$c_{lc,3}$	coefficient ($c_{lc,3} = 21$ MJ kg ⁻¹ ; GfE, 2001, pg. 21)
$x_{XP, milk}$	mass fraction of milk protein (in kg kg ⁻¹)
d	constant ($d = 0.1$ MJ kg ⁻¹ ; GfE, 2001, pg. 22)
a	correction factor (in MJ MJ ⁻¹), see text

4.3.2.5 NEL requirements for draft power / NEL-Bedarf für Zugleistungen

In the reporting period, dairy cows have not been used as draught animals.

Im Berichtszeitraum wurden von Milchkühen keine Zugleistungen erbracht.

4.3.2.6 NEL requirements for pregnancy / NEL-Bedarf für die Trächtigkeit

The mean daily energy amount required for the development of the conception product and the udder, nel_p , is calculated as follows:

Der mittlere tägliche Energiebedarf für die Entwicklung von Konzeptionsprodukt und Euter, nel_p , berechnet sich wie folgt:

$$nel_p = \frac{NEL_p^*}{t_{ibc}^*} \quad (4.9)$$

nel_p	mean daily NEL energy required for pregnancy (in MJ cow ⁻¹ d ⁻¹)
NEL_p^*	NEL required for pregnancy (in MJ calf ⁻¹)
t_{ibc}^*	duration of the interval between calvings (calving interval) (in d), see Chapter 4.3.1.6

The total energy requirements NEL_p^* for pregnancy are derived from the energies needed for the development of the conception products and the udder (GfE, 2001, S. 23).

Der Gesamtenergiebedarf NEL_p^* für die Trächtigkeit errechnet sich aus dem Bedarf für die Entwicklung von Konzeptionsprodukt und Euter (GfE, 2001, S. 23).

$$NEL_p^* = NEL_{cp}^* + NEL_u^* \quad (4.10)$$

NEL_p^*	NEL required for pregnancy (in MJ calf ⁻¹)
NEL_{cp}^*	NEL required for the development of the uterus including the conception product (in MJ calf ⁻¹)
NEL_u^*	NEL required for the development of the udder (in MJ calf ⁻¹)

According to DÄMMGEN et al. (2009b) NEL_p^* is set to 917 MJ per calf.

Nach DÄMMGEN et al. (2009b) wird NEL_p^* mit 917 MJ Kalb⁻¹ angesetzt.

4.3.2.7 NEL requirements for growth / NEL-Bedarf für Wachstum

According to GfE (2001), pg. 22, the mean daily NEL requirements for growth are calculated as follows:

Der mittlere tägliche NEL-Bedarf für Wachstum wird nach GfE (2001), S. 22, wie folgt berechnet:

$$nel_g = \eta_{nel,g} \cdot \frac{\Delta w}{\alpha} \quad (4.11)$$

nel_g	mean daily NEL required for growth (in MJ cow ⁻¹ d ⁻¹)
$\eta_{nel,g}$	constant ($\eta_{nel,g} = 25.5$ MJ kg ⁻¹ according to GfE, 2001, pg. 22)
Δw	weight gain (in kg cow ⁻¹ a ⁻¹)
α	time units conversion factor ($\alpha = 365$ d a ⁻¹)

4.3.2.8 *Energy partitioning between lactation period and dry period / Energieaufteilung zwischen Laktationsperiode und Trockenstezeit*

As a base for the feed intake calculations in Chapter 4.3.3, the total energy requirements NEL_{tot} as calculated according to Chapter 4.3.2.1 have to be split up into the requirements during lactation (NEL_{lact}) and dry period (NEL_{dry}).

Zur Vorbereitung der Futteraufnahmeberechnung in Kapitel 4.3.3 ist eine Aufteilung des nach Kapitel 4.3.2.1 berechneten Gesamtenergiebedarfs NEL_{tot} auf Laktationsperiode (NEL_{lact}) und Trockenstezeit (NEL_{dry}) erforderlich.

$$NEL_{tot} = NEL_{lact} + NEL_{dry} \quad (4.12)$$

NEL_{tot}	total annual NEL requirements (in MJ cow ⁻¹ a ⁻¹), see Chapter 4.3.2.1
NEL_{lact}	annual NEL requirements related to the lactation period (MJ cow ⁻¹ a ⁻¹)
NEL_{dry}	annual NEL requirements related to the dry period (in MJ cow ⁻¹ a ⁻¹)

The much smaller contribution, NEL_{dry} , is estimated as described subsequently. NEL_{lact} is then calculated as the difference between NEL_{tot} und NEL_{dry} .

Der weitaus geringere Anteil, NEL_{dry} , wird wie nachfolgend beschrieben geschätzt. NEL_{lact} berechnet sich dann als Differenz von NEL_{tot} und NEL_{dry} .

Table 4.17 provides the data given by GfE (2001, pg. 24, Table 1.4.3) for dry matter intake during the dry period (i. e. the last 6 weeks before calving) as a function of the dry matter NEL content. This data set applies to a cow with a weight of 650 kg. Differing cow weights can not be taken into account as there is no information given in GfE (2001).

Table 4.17 zeigt die für die Trockenzeit (d. h. die letzten 6 Wochen vor dem Kalben) von GfE (2001, S. 24, Tabelle 1.4.3) angegebenen Werte für Trockenmasseaufnahme als Funktion des NEL-Gehaltes dieser Trockenmasse. Diese Daten gelten für ein Kuhgewicht von 650 kg. Eine Differenzierung nach Tiergewicht erfolgt mangels Daten in GfE (2001) nicht.

In additional lines, Table 4.17 lists the steps used to calculate the total NEL intake during the dry period.

In zusätzlichen Zeilen listet Table 4.17 die Schritte zur Berechnung der Gesamt-NEL-Aufnahme während der Trockenstezeit.

Table 4.17: Dairy cows, NEL intake during the dry period for a cow of 650 kg

NEL content per kg of dry matter (4 different types of dry matter) ^a	5.2	5.6	6.0	6.4
daily dry matter intake during phase 1 (6 to 4 weeks before calving) (in kg cow ⁻¹ d ⁻¹) ^a	9.8	9.0	8.4	7.9
daily dry matter intake during: phase 2 (3 rd week until calving) (in kg cow ⁻¹ d ⁻¹) ^a	10.7	9.9	9.3	8.7
daily dry matter intake averaged over the entire dry period (6 weeks) (in kg cow ⁻¹ d ⁻¹)	20.5/2	18.9/2	17.7/2	16.6/2
mean daily NEL intake (in MJ cow ⁻¹ d ⁻¹)	20.5/2 · 5.2	18.9/2 · 5.6	17.7/2 · 6.0	16.6/2 · 6.4
mean daily NEL intake averaged over the different dry matter types (in MJ cow ⁻¹ d ⁻¹)	53.1			
NEL [*] _{dry} , i. e. total daily NEL intake for 6 weeks of dry period (in MJ cow ⁻¹)	2230.6			

^a Source: GfE (2001), pg. 24, Table 1.4.3

The result equals that obtained with equation (22) in DÄMMGEN et al (2009b). As the emission inventory is based on the assumption that animal feeding exactly satisfies energy requirements, the total NEL intake calculated according to Table 4.17 can be interpreted as the total NEL requirements during the dry period (NEL_{dry}^*). NEL_{dry} can then be calculated from:

Das Ergebnis entspricht dem mit Gleichung (22) in DÄMMGEN et al. (2009b) zu erhaltenden Ergebnis. Da die Inventarberechnung auf der Voraussetzung beruht, dass die Tierfütterung genau den Energiebedarf decken soll, kann die nach Table 4.17 berechnete Gesamt-NEL-Aufnahme mit dem Gesamt-NEL-Bedarf NEL_{dry}^* gleich gesetzt werden. Für NEL_{dry} folgt damit:

$$NEL_{dry} = NEL_{dry}^* \cdot \frac{\alpha}{t_{ibc}^*} \quad (4.13)$$

NEL_{dry}	annual NEL requirements related to the dry period (in MJ cow ⁻¹ a ⁻¹)
NEL_{dry}^*	total NEL requirements during the dry period ($NEL_{dry}^* = 2230.6$ MJ cow ⁻¹ , see Table 4.17)
α	time units conversion factor ($\alpha = 365$ d a ⁻¹)
t_{ibc}^*	duration of the interval between calvings (calving interval) (in d), see Chapter 4.3.1.6

The NEL requirements during the lactation period are then given by:

Damit lässt sich der aus der Laktationsphase jährlich resultierende NEL-Bedarf NEL_{lact} berechnen:

$$NEL_{lact} = NEL_{tot} - NEL_{dry} \quad (4.14)$$

NEL_{lact}	annual NEL requirements related to the lactation period (MJ cow ⁻¹ a ⁻¹)
NEL_{tot}	total annual NEL requirements (in MJ cow ⁻¹ a ⁻¹), see Chapter 4.3.2.1
NEL_{dry}	annual NEL requirements related to the dry period (in MJ cow ⁻¹ a ⁻¹)

The NEL requirements during the lactation period are then given by:

Für den während der Laktationsphase entstehenden NEL-Bedarf folgt daraus:

$$NEL_{lact}^* = NEL_{lact} \cdot \frac{t_{ibc}^*}{\alpha} \quad (4.15)$$

NEL_{lact}^*	total NEL requirements during the lactation period (in MJ cow ⁻¹)
NEL_{lact}	annual NEL requirements related to the lactation period (in MJ cow ⁻¹ a ⁻¹)
t_{ibc}^*	duration of the interval between calvings (calving interval) (in d), see Chapter 4.3.1.6
α	time units conversion factor ($\alpha = 365 \text{ d a}^{-1}$)

4.3.3 Feed and energy intake / Futter- und Energieaufnahme

Feed is supplied in concentrates and roughage inside the animal house and during grazing. The respective shares are also governed by the DM intake of the animals, as DM intake is limited. Once the DM intake and the feed properties are known, the intakes of GE, DE, ME, NEL and N can be deduced.

Futter wird als Raufutter und als Kraftfutter im Stall und auf der Weide bereitgestellt. Die jeweiligen Anteile sind auch von der Trockenmasse-Aufnahme abhängig, die begrenzt ist. Wenn die Trockenmasse und die Futtereigenschaften bekannt sind, lassen sich die Aufnahme von GE, DE, ME, NEL und N ableiten.

Energy and N contents of pasture grass and roughage provided in the housing are different. This is taken into account in the inventory calculation by weighted averaging, see Chapter 4.3.4.

Die unterschiedlichen Energie- und N-Gehalte von Weidegras und im Stall verabreichten Raufutter werden in der Inventarberechnung durch gewichtete Mittelung berücksichtigt, siehe Kapitel 4.3.4.

The calculations described subsequently are done for all districts separately which is not explicitly emphasized in the respective paragraphs.

Die nachfolgend beschriebenen Berechnungen erfolgen für jeden Kreis separat, ohne dass dies gesondert hervorgehoben wird.

4.3.3.1 Linking feed intake with energy requirements / Die Kombination von Futter-Aufnahme und Energiebedarf

IPCC (2006, pg. 10.23) requires inventory calculations to be based on the principle of feeding animals exactly according to their energy requirements. Hence, the energy taken in with feed (NEL_{feed}) equals the total energy requirements (NEL_{tot}). The latter can be split up into the energy shares for the lactation period (NEL_{lact}) and the dry period (NEL_{dry}).

Die IPCC-Forderung (2006, S. 10.23), für die Inventarberechnung von energiebedarfsgerecht gefütterten Tieren auszugehen, resultiert in der Gleichsetzung der mit dem Futter aufgenommenen Energie NEL_{feed} mit dem Gesamtenergiebedarf NEL_{tot} , der sich wiederum nach Kapitel 4.3.2.8 in die Energiebedarfsanteile für die Laktationsperiode (NEL_{lact}) und die Trockenstehzeit (NEL_{dry}) aufspaltet.

$$NEL_{feed} = NEL_{tot} = NEL_{lact} + NEL_{dry} \quad (4.16)$$

NEL_{feed}	annual intake of NEL with feed (in MJ cow ⁻¹ a ⁻¹)
NEL_{tot}	annual NEL required (in MJ cow ⁻¹ a ⁻¹)
NEL_{lact}	annual NEL requirements related to the lactation period (MJ cow ⁻¹ a ⁻¹)
NEL_{dry}	annual NEL requirements related to the dry period (in MJ cow ⁻¹ a ⁻¹)

4.3.3.2 Total dry matter intake / Gesamttrockenmasse-Aufnahme

The calculation of the inventory-relevant *annual* dry matter intake is based on the total dry matter intake during the interval between calvings (DM^*). DM^* is calcu-

Ausgangspunkt zur Ermittlung der für das Inventar relevanten *jährlichen* Trockenmasse-Aufnahme ist die Trockenmasse-Aufnahme DM^* während der Zwischen-

lated from the amounts of dry matter taken in during the lactation period and the dry period. (For the period definitions see Chapter 4.3.1.6.)

kalbezeit, die aus Beiträgen aus Laktations- und Trockenphase gebildet wird. (Zum Zusammenhang der verschiedenen Phasen siehe Kapitel 4.3.1.6.).

$$DM^* = DM_{lact}^* + DM_{dry}^* \quad (4.17)$$

DM^*	total intake of dry matter (in kg cow ⁻¹)
DM_{lact}^*	intake of dry matter during the lactation period (in kg cow ⁻¹)
DM_{dry}^*	intake of dry matter during the dry period (in kg cow ⁻¹)

The *annual* dry matter intake is given by:

Für die *jährliche* Trockenmasse-Aufnahme gilt:

$$DM = DM_{lact} + DM_{dry} = (DM_{lact}^* + DM_{dry}^*) \cdot \frac{\alpha}{t_{ibc}^*} \quad (4.18)$$

DM	annual intake of dry matter (in kg cow ⁻¹ a ⁻¹)
DM_{lact}	annual intake of dry matter related to the lactation period (in kg cow ⁻¹ a ⁻¹)
DM_{dry}	annual intake of dry matter related to the dry period (in kg cow ⁻¹ a ⁻¹)
DM_{lact}^*	intake of dry matter during the lactation period (in kg cow ⁻¹)
DM_{dry}^*	intake of dry matter during dry period (in kg cow ⁻¹)
α	time units conversion factor ($\alpha = 365$ d a ⁻¹)
t_{ibc}^*	duration of the interval between calvings (calving interval) (in d), see Chapter 4.3.1.6

Different properties of roughage and concentrates are accounted for during the calculation of the dry matter intake by considering the different shares of roughage and concentrates:

Zur Berücksichtigung unterschiedlicher Eigenschaften von Raufutter- und Kraftfutter wird bei der Trockenmasse-Aufnahme zusätzlich noch nach Raufutter- und Kraftfutteranteilen unterschieden:

$$DM_{lact}^* = DM_{conc,lact}^* + DM_{rough,lact}^* = (dm_{conc,lact} + dm_{rough,lact}) \cdot t_{lact}^* \quad (4.19)$$

$$DM_{dry}^* = DM_{conc,dry}^* + DM_{rough,dry}^* = (dm_{conc,dry} + dm_{rough,dry}) \cdot t_{dry}^* \quad (4.20)$$

DM_{lact}^*	intake of dry matter during the lactation period (in kg cow ⁻¹)
$DM_{conc,lact}^*$	intake of dry matter of concentrates during the lactation period (in kg cow ⁻¹)
$DM_{rough,lact}^*$	intake of dry matter of roughage during the lactation period (in kg cow ⁻¹)
$dm_{conc,lact}$	daily intake of dry matter of concentrates during the lactation period (in kg cow ⁻¹ d ⁻¹)
$dm_{rough,lact}$	daily intake of dry matter of roughage during the lactation period (in kg cow ⁻¹ d ⁻¹)
t_{lact}^*	duration of the lactation period (in d), see Chapter 4.3.1.6
DM_{dry}^*	intake of dry matter during the dry period (in kg cow ⁻¹)
$DM_{conc,dry}^*$	intake of dry matter of concentrates during the dry period (in kg cow ⁻¹)
$DM_{rough,dry}^*$	intake of dry matter of roughage during the dry period (in kg cow ⁻¹)
$dm_{conc,dry}$	daily intake of dry matter of concentrates during the dry period (in kg cow ⁻¹ d ⁻¹)
$dm_{rough,dry}$	daily intake of dry matter of roughage during the dry period (in kg cow ⁻¹ d ⁻¹)
t_{dry}^*	duration of the dry period (in d), see Chapter 4.3.1.6

The calculation of the daily amounts of dry matter intake as introduced above is described in the subsequent chapters.

Die oben eingeführten Tageswerte der Trockenmasse-Aufnahme werden in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben.

4.3.3.3 *Dry matter intake during lactation / Trockenmasse-Aufnahme während der Laktation*

The calculation of the daily dry matter intake with roughage during the lactation period is principally based on the formula provided in DLG (1986), Chapter 6. However, it is extended to take into account the impact of high milk yields according to KRUUF et al. (2006). This formula describes, associated with increasing milk yield,

Die Berechnung der täglichen Trockenmasse-Aufnahme von Raufutter während der Laktationszeit beruht im Wesentlichen auf der Formel in DLG (1986), Kap. 6, ergänzt um die Berücksichtigung des Einflusses hoher Milchleistungen (KRUUF et al., 2006). Diese Formel beschreibt eine mit ansteigender Milchleistung verbundene

an increase in the relative proportion of more easily digestible concentrates at the expense of roughage.

DÄMMGEN et al. (2009b) combine this approach with an equation describing how energy requirements are met by feeding. This results in a set of two equations for the daily dry matter intake with roughage and concentrates. This set of equations was adopted from DÄMMGEN et al. (2009b) with slight formal modifications, e. g. the exclusion of negative intakes of concentrates that otherwise would be formally possible in case of rather low milk yields.

$$dm_{\text{rough,lact}} = \frac{nel_{\text{lact}} - dm_{\text{conc,lact}} \cdot \eta_{\text{NEL,conc}}}{\eta_{\text{NEL,rough}}} \quad (4.21)$$

with

$$nel_{\text{lact}} = \frac{NEL_{\text{lact}}^*}{t_{\text{lact}}^*} \quad (4.22)$$

and

$$dm_{\text{conc,lact}} = \max \left\{ 0; \frac{B}{2} - \sqrt{\left(\frac{B}{2}\right)^2 - C} \right\} \quad (4.23)$$

with

$$B = \frac{\eta_{\text{NEL,conc}}}{\eta_{\text{NEL,rough}}} \cdot \frac{1}{d} \quad (4.24)$$

$$C = \left(\frac{NEL_{\text{lact}}^*}{t_{\text{lact}}^* \cdot \eta_{\text{NEL,rough}}} - a \cdot w - b \cdot \left(\frac{\eta_{\text{NEL,rough}}}{\eta_{\text{NEL,unit}}} \right)^c - f \cdot \max(y_{\text{ECM}} - e; 0) \right) \cdot \frac{1}{d} \quad (4.25)$$

$dm_{\text{rough,lact}}$	daily intake of dry matter of roughage during the lactation period (in kg cow ⁻¹ d ⁻¹)
nel_{lact}	daily NEL requirements during the lactation period (in MJ cow ⁻¹ d ⁻¹)
$dm_{\text{conc,lact}}$	daily intake of dry matter of concentrates during the lactation period (in kg cow ⁻¹ d ⁻¹)
B, C	auxiliary quantities
$\eta_{\text{NEL conc}}$	NEL content of concentrates (in MJ kg ⁻¹), see Chapter 4.3.4.2
$\eta_{\text{NEL rough}}$	NEL content of roughage (in MJ kg ⁻¹), see Chapter 4.3.4.2
NEL_{lact}^*	total NEL requirements during the lactation period (in MJ cow ⁻¹), see Chapter 4.3.2.8
t_{lact}^*	duration of lactation period (in d a ⁻¹), see Chapter 4.3.1.6
d	constant ($d = 0.026 \text{ kg}^{-1} \text{ cow d}$)
a	constant ($a = 0.006 \text{ d}^{-1}$)
w	animal weight (in kg cow ⁻¹)
b	constant ($b = 0.19 \text{ kg cow}^{-1} \text{ d}^{-1}$)
$\eta_{\text{NEL, unit}}$	unit NEL content of feed ($X_{\text{NEL, unit}} = 1 \text{ MJ kg}^{-1}$)
c	exponent ($c = 2.16$)
f	constant ($f = 0.1$)
y_{ECM}	energy-corrected daily milk yield during lactation period (in kg cow ⁻¹ d ⁻¹), see below
e	constant ($e = 25 \text{ kg cow}^{-1} \text{ d}^{-1}$)

The energy-corrected daily milk yield y_{ECM} is defined as follows:

ne Zunahme des relativen Anteils von leichter verdaulichem Kraftfutter auf Kosten des Grundfutteranteils.

DÄMMGEN et al. (2009b) kombinieren diesen Ansatz mit einer Gleichung zur Befriedigung des Energiebedarfs durch das Futter. Daraus resultiert der nachfolgende Gleichungssatz für die tägliche Trockenmasse-Aufnahme von Rau- und Kraftfutter. Dieser Gleichungssatz wurde gegenüber DÄMMGEN et al. (2009b) formal leicht modifiziert (u. a. durch den Ausschluss einer negativen Kraftfutteraufnahme, die sich rein rechnerisch in Einzelfällen bei sehr niedrigen Milchleistungen ergeben könnte).

Die energiekorrigierte mittlere tägliche Milchleistung y_{ECM} ist wie folgt definiert:

$$y_{\text{ECM}} = y_{\text{M}} \cdot \frac{LE}{LE_s} \quad (4.26)$$

y_{ECM}	energy-corrected daily milk yield during lactation period (in kg cow ⁻¹ d ⁻¹)
y_M	daily milk yield during lactation period (in kg cow ⁻¹ d ⁻¹)
LE	energy content of milk (in MJ kg ⁻¹), see below
LE_s	energy content of standard milk (in MJ kg ⁻¹), see below

Taking into account a specific additional amount of energy $d = 0.1 \text{ MJ kg}^{-1}$ (see GfE, 2001, pg. 22), LE is given by (see also GfE, 2001, pg. 21, eq. (1.4.3)):

Nach GfE (2001), S. 21, Gl. (1.4.3), gilt unter Berücksichtigung des in GfE (2001), S. 22, angegebenen Energiezuschlages von $d = 0,1 \text{ MJ kg}^{-1}$:

$$LE = (c_{lc,1} + c_{lc,2} \cdot x_{fat,milk} + c_{lc,3} \cdot x_{XP,milk}) + d \quad (4.27)$$

LE	energy content of milk (in MJ kg ⁻¹)
LE_s	energy content of standard milk (4 % fat content, 12.8 % dry matter content) (in MJ kg ⁻¹)
$c_{lc,1}$	constant ($c_{lc,1} = 0.95 \text{ MJ kg}^{-1}$; GfE, 2001, pg. 21)
$c_{lc,2}$	coefficient ($c_{lc,2} = 38 \text{ MJ kg}^{-1}$; GfE, 2001, pg. 21)
$x_{fat,milk}$	mass fraction of milk fat (in kg kg ⁻¹)
$c_{lc,3}$	coefficient ($c_{lc,3} = 21 \text{ MJ kg}^{-1}$; GfE, 2001, pg. 21)
$x_{XP,milk}$	mass fraction of milk protein (in kg kg ⁻¹)
d	constant ($d = 0.1 \text{ MJ cow}^{-1} \text{ d}^{-1} \text{ NEL}$; GfE, 2001, pg. 22)

The quantity LE_s is obtained by using standard milk properties in the equation given above: fat content of 4 % or 0.04 kg kg^{-1} , protein content of 3.4 % or 0.034 kg kg^{-1} (DLG, 2005, pg. 28; WEIB, 2010). This leads to $LE_s = 3.28 \text{ MJ kg}^{-1}$.

Finally y_{ECM} can be written as follows:

Die Größe LE_s erhält man, indem Standardmilch-Kennwerte in die obige LE-Gleichung eingesetzt werden: Fettgehalt 4 % bzw. $0,04 \text{ kg kg}^{-1}$, Proteingehalt 3,4 % bzw. $0,034 \text{ kg kg}^{-1}$ (DLG, 2005, S. 28; WEIB, 2010). Dies führt zu $LE_s = 3,28 \text{ MJ kg}^{-1}$.

Zusammenfassend ergibt sich für y_{ECM} :

$$y_{ECM} = y_M \cdot \frac{p + q \cdot x_{fat,milk} + r \cdot x_{XP,milk}}{s} \quad (4.28)$$

y_{ECM}	energy-corrected daily milk yield during lactation period (in kg cow ⁻¹ d ⁻¹), see below
y_M	daily milk yield during lactation period (in kg cow ⁻¹ d ⁻¹)
p	constant ($p = 1.05 \text{ MJ kg}^{-1}$)
q	constant ($q = 38 \text{ MJ kg}^{-1}$)
$x_{fat,milk}$	mass fraction of milk fat (in kg kg ⁻¹)
r	constant ($r = 21 \text{ MJ kg}^{-1}$)
$x_{XP,milk}$	mass fraction of milk protein (in kg kg ⁻¹)
s	constant ($s = LE_s = 3.28 \text{ MJ kg}^{-1}$)

This equation corresponds to the formula given in DLG (2001, pg. 14 ff, context of Tables 5, 6, and 7).

The daily milk yield y_M that is obtained during the lactation period is derived from:

Diese Gleichung entspricht der Formel in DLG (2001, S. 14 ff, Kontext zu Tabellen 5, 6, und 7).

Die während der Laktationsperiode anfallende tägliche Milchmenge y_M berechnet sich aus:

$$y_M = \frac{Y_M^*}{t_{lact}^*} = \frac{Y_M}{t_{lact}^*} \cdot \frac{t_{ibc}^*}{\alpha}$$

y_M	daily milk yield during lactation period (in kg cow ⁻¹ d ⁻¹), see below
Y_M^*	total milk yield during the interval between calvings (in kg cow ⁻¹)
t_{lact}^*	duration of lactation period (in d), see Chapter 4.3.1.6
Y_M	annual milk yield (in kg cow ⁻¹ a ⁻¹)
t_{ibc}^*	duration of the interval between calvings (calving interval) (in d), see Chapter 4.3.1.6
α	time units conversion factor ($\alpha = 365 \text{ d a}^{-1}$)

4.3.3.4 Dry matter intake during the dry period / Trockenmasse-Aufnahme während der Trockenstehzeit

Combining the dairy cow's energy requirements with the energy contents of the feed, DÄMMGEN et al. (2009b) derived the following equation to calculate the dry matter intake with roughage during the dry period.

Aus der Kombination von Energiebedarf und Futterenergiegehalt leiteten DÄMMGEN et al. (2009b) für die Trockenstehzeit die folgende Gleichung zur Berechnung der Trockenmasse-Aufnahme mit dem Raufutter ab:

$$dm_{\text{rough,dry}} = \frac{nel_{\text{dry}} - dm_{\text{conc,dry}} \cdot \eta_{\text{NEL,conc}}}{\eta_{\text{NEL,rough}}} \quad (4.30)$$

$dm_{\text{rough,dry}}$	daily intake of dry matter of roughage during the dry period (in kg cow ⁻¹ d ⁻¹)
nel_{dry}	daily NEL intake with feed during the dry period (in MJ cow ⁻¹ d)
$dm_{\text{conc,dry}}$	daily intake of dry matter of concentrates during the dry period (in kg cow ⁻¹ d ⁻¹)
$\eta_{\text{NEL,conc}}$	NEL content of concentrates (in MJ kg ⁻¹), see Chapter 4.3.4.2
$\eta_{\text{NEL,rough}}$	NEL content of roughage (in MJ kg ⁻¹), see Chapter 4.3.4.2

and

$$nel_{\text{dry}} = \frac{NEL_{\text{dry}}^*}{t_{\text{dry}}^*} \quad (4.31)$$

nel_{dry}	daily NEL intake with feed during the dry period (in MJ cow ⁻¹ d)
NEL_{dry}^*	total NEL requirements during the dry period (in MJ cow ⁻¹)
t_{dry}^*	duration of the dry period (in d), see Chapter 4.3.1.6

During the dry period of 42 days (Chapter 4.3.1.6) dairy cows get no concentrates over 28 days and 3 kg cow⁻¹ d⁻¹ of concentrates over 14 days (according to SPIEKERS, 2002, Table 7 and 8). The mean daily intake of concentrates, $dm_{\text{conc,dry}}$ is therefore 1 kg cow⁻¹ d⁻¹ fresh matter or 0.88 kg cow⁻¹ d⁻¹ dry matter.

Nach SPIEKERS (2002, Tabelle 7 und 8) erhalten Milchkühe innerhalb der 42 Tage Trockenstehzeit (Kapitel 4.3.1.6) 28 Tage kein Kraftfutter und 14 Tage 3 kg cow⁻¹ d⁻¹. Daraus ergibt sich eine durchschnittliche tägliche Kraftfutteraufnahme $dm_{\text{conc,dry}}$ von 1 kg cow⁻¹ d⁻¹ Frischmasse bzw. 0,88 kg cow⁻¹ d⁻¹ Trockenmasse.

4.3.3.5 *Partitioning of roughage intake between house and pasture / Aufteilung der Raufutteraufnahme zwischen Stall und Weide*

The properties of pasture grass and roughage provided in the housing differ, e. g. for the nitrogen content. To account for this difference when calculating N intake and N excretion, the annual total intake of roughage dry matter is split up into the shares for housing and pasture:

Weidegras unterscheidet sich von dem im Stall verabreichten Raufutter u. a. im Stickstoffgehalt. Um dies in der Berechnung von N-Aufnahme und N-Ausscheidung berücksichtigen zu können, wird die jährlich aufgenommene Gesamtmenge an Raufutter-Trockenmasse zwischen Stall und Weide aufgeteilt:

$$DM_{\text{rough}} = DM_{\text{rough,house}} + DM_{\text{rough,graz}} \quad (4.32)$$

DM_{rough}	total annual intake of dry matter of roughage (in kg cow ⁻¹ a ⁻¹)
$DM_{\text{rough,house}}$	annual intake of dry matter of roughage in the house (in kg cow ⁻¹ a ⁻¹)
$DM_{\text{rough,graz}}$	annual intake of dry matter of roughage during grazing (in kg cow ⁻¹ a ⁻¹)

The dry matter proportioning is performed using the factor f_{graz} , which quantifies the relative annual duration of grazing:

Die Aufteilung wird mithilfe eines Faktors f_{graz} vorgenommen, der dem auf die Dauer eines Jahres bezogenen relativen Anteil der Weidezeiten entspricht.

$$DM_{\text{rough,graz}} = f_{\text{graz}} \cdot DM_{\text{rough}} \quad (4.33)$$

$$DM_{\text{rough,house}} = (1 - f_{\text{graz}}) \cdot DM_{\text{rough}} \quad (4.34)$$

$DM_{\text{rough,graz}}$	annual intake of dry matter of roughage during grazing (in kg cow ⁻¹ a ⁻¹)
f_{graz}	weighting factor ($0 \leq f_{\text{graz}} \leq 1$), see Chapter 4.3.8.5.1
DM_{rough}	total annual intake of dry matter of roughage (in kg cow ⁻¹ a ⁻¹)
$DM_{\text{rough,house}}$	annual intake of dry matter of roughage in the house (in kg cow ⁻¹ a ⁻¹)

Grazing has also an impact on the mean properties of the roughage taken in, see Chapter 4.3.4.5.

Der Weidegang beeinflusst in analoger Weise auch die mittleren Eigenschaften des Raufutters, siehe Kapitel 4.3.4.5.

4.3.3.6 *Assessment of gross energy intake / Bestimmung der Gesamtenergie-Aufnahme*

For the calculation of methane emissions from enteric fermentation (Chapter 3.3.2) as well as VS excretions (Chapter 3.3.3.1), the amount of annual gross energy intake (GE) is needed. The calculation of GE is described in Chapter 4.3.4.6.

Für die Berechnung der Methanemission aus der Verdauung (Kapitel 3.3.2) sowie der VS-Ausscheidung (Kapitel 3.3.3.1) wird der Betrag der jährlichen Gesamtenergie-Aufnahme pro Platz (GE) benötigt. Die Berechnung dieser Größe wird in Kapitel 4.3.4.6 beschrieben.

4.3.4 *Feed composition / Futterzusammensetzung*

4.3.4.1 *Modelling concept / Modellkonzept*

The German inventory differentiates between two standard diet categories:

- “Mixed diet” fed in regions with considerable areas of arable land (maize silage, grass silage, standard concentrate MLF 18/3, rapeseed expeller and straw),
- “grass based” diet in regions without considerable areas of arable land (grass silage, standard concentrate MLF 18/3, wheat)

The Federal Statistical Office calculates for the emission reporting the respective shares of these standard diet categories on federal-state level. Table 4.18 shows this data aggregated on national level. Due to limited space, every other year is omitted in the years before 2010.

Das deutsche Inventar unterscheidet zwei Standardkategorien von Futterrationen:

- “Gemischte Ration” in Ackerbaugebieten (Maissilage, Grassilage, Kraftfutter MLF 18/3, Rapskuchen und Stroh),
- „Grassilage-Ration“ in Grünlandgebieten (Grassilage, Kraftfutter MLF 18/3, Weizen)

Das Statistische Bundesamt berechnet für die Emissionsberichterstattung auf Bundeslandebene, zu welchen Anteilen diese Standardfutterkategorien an der Fütterung der jeweiligen Milchkuh-Population beteiligt sind. Table 4.18 zeigt die auf nationaler Ebene aggregierten Daten. Aus Platzgründen wurde in dieser Tabelle bis 2010 jedes zweite Jahr weggelassen.

Table 4.18: Dairy cows, national distribution (fractions) of “mixed diet” (M) and “grass based diet” (G)

	1990	1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
M	0.54	0.54	0.56	0.57	0.57	0.58	0.60	0.61	0.61	0.64	0.70	0.71	0.73	0.75	0.74	0.73	0.71	0.71	0.71
G	0.46	0.46	0.44	0.43	0.43	0.42	0.40	0.39	0.39	0.36	0.30	0.29	0.27	0.25	0.26	0.27	0.29	0.29	0.29

Source: see text.

The specific composition of each of the two standard diet categories depends on milk yield, see Chapters 4.3.4.2 and 4.3.4.4.

The modification of the mean properties of the roughage due to grazing is described in Chapter 4.3.3.5.

Chapter 4.3.4.6 deals with the calculation of the national mean of the digestibility, a quantity which is needed for the emission reporting under UNFCCC.

Die spezielle Zusammensetzung jeder der beiden Standardfutterkategorien ist eine Funktion der Milchleistung, siehe Kapitel 4.3.4.2 und 4.3.4.4.

Auf die Abhängigkeit des Raufutters vom Weidehaltung geht Kapitel 4.3.3.5 ein.

Kapitel 4.3.4.6 beschreibt schließlich die Berechnung der für die Klimaberichterstattung unter UNFCCC erforderlichen mittleren Verdaulichkeit auf nationaler Ebene.

4.3.4.2 *Feed properties / Futtereigenschaften*

In principle, the feed components used in the inventory can be subdivided in roughage and concentrates.

For the properties of the feed constituents see Table 4.19. The data were derived from Beyer et al. (2004) in a way that the overall diet properties used in DLG (2005) could be met as best as possible. The DLG data sets are considered as nationwide accepted data²⁹, and hence serve as standard. The DLG data sets could not be used on their own as - in contrast to Beyer et al. (2004) - the list of feed properties does not contain certain necessary parameters used for the compilation of the inventory.

The selection and combination of parameters ex-

Die Futterkomponenten lassen sich in die zwei Gruppen Raufutter und Kraftfutter einteilen.

Die Eigenschaften der Futterbestandteile zeigt Table 4.19. Die Daten wurden aus Beyer et al. (2004) in der Weise abgeleitet, dass durch DLG (2005), S. 13, vorgegebene Eigenschaften möglichst gut angenähert wurden. Die DLG-Datensätze wurden als Maßstab gewählt, da sie als national akzeptiert gelten können²⁹. Eine direkte Übernahme der DLG-Datensätze war nicht möglich, da sie im Gegensatz zu den Datensätzen in Beyer et al. (2004) nicht alle für die Inventarberechnungen erforderlichen Angaben enthalten.

²⁹ DLG (2005) is considered to be the official expert judgement for Germany and national consent (Spiekers, head of the group of authors, pers. communication).

tracted from Beyer et al. (2004) takes into account that the ratio of crude protein to NEL contents has to approximate the respective ratio of the DLG data set. This requirement was derived from the dairy cow modelling concept.

Die Auswahl und Kombination von Datensätzen aus Beyer et al. (2004) beruht auf der aus dem Milchkuh-Modellkonzept ableitbaren Forderung, dass das sich ergebende Verhältnis von Rohproteingehalt zu NEL-Gehalt möglichst gut den entsprechenden Wert des DLG-Datensatzes approximieren muss.

Table 4.19: Dairy cows, diet constituent properties used in the inventory

(X_{DM} : dry matter content; η_{ME} : content of metabolizable energy, related to dry matter; η_{NEL} : NEL content, related to dry matter; η_{DE} : content of digestible energy, related to dry matter; η_{GE} : content of gross energy, related to dry matter; x_{XP} : crude protein content of feed, related to dry matter; x_{ash} : ash content of feed, related to dry matter; X_{DOM} : digestibility of organic matter)

roughage	$X_{DM, rough}$ kg kg ⁻¹	$\eta_{ME, rough}$ MJ kg ⁻¹	$\eta_{NEL, rough}$ MJ kg ⁻¹	$\eta_{DE, rough}$ MJ kg ⁻¹	$\eta_{GE, rough}$ MJ kg ⁻¹	$x_{XP, rough}$ kg kg ⁻¹	$x_{ash, rough}$ kg kg ⁻¹	$X_{DOM, rough}$ kg kg ⁻¹
grass (pasture) ^a	0.18	10.0	6.3	12.3	17.9	0.180	0.125	0.72
grass silage ^b	0.35	10.0	6.3	12.4	18.5	0.162	0.099	0.72
maize silage ^c	0.25	10.2	6.6	12.4	17.9	0.080	0.082	0.73
straw ^d	0.85	6.4	3.8	8.0	18.1	0.038	0.070	0.47
concentrates	$X_{DM, conc}$ kg kg ⁻¹	$\eta_{ME, conc}$ MJ kg ⁻¹	$\eta_{NEL, conc}$ MJ kg ⁻¹	$\eta_{DE, conc}$ MJ kg ⁻¹	$\eta_{GE, conc}$ MJ kg ⁻¹	$x_{XP, conc}$ kg kg ⁻¹	$x_{ash, conc}$ kg kg ⁻¹	$X_{DOM, conc}$ kg kg ⁻¹
concentrates MLF 18/3 ^e	0.88	12.3	7.6	14.4	18.5	0.205	0.065	0.83
rapeseed expeller ^f	0.91	14.2	8.7	17.7	23.6	0.340	0.080	0.77
wheat ^g	0.87	13.2	9.0	15.8	18.5	0.145	0.020	0.88

^a Source: BEYER et al. (2004), No 1613

^b Source: BEYER et al. (2004), No 3431

^c Source: BEYER et al. (2004), combination of 33.3 % of No 2891 and 66.7 % of No 2895

^d Source: BEYER et al. (2004), No 5811

^e Source: $X_{DM, conc}$, $\eta_{NEL, conc}$, $x_{XP, conc}$ according to DLG (2005), pg. 13; η_{GE} , η_{ME} , η_{DE} estimated from a detailed composition of MLF 18/3 and properties of feed components according to Beyer et al. (2004); $x_{ash, conc}$ and $X_{DOM, conc}$ according to LWK, <http://www.riswick.de/versuche/tierhaltung/futterwertpruefung/milchleistungsfutter-540.htm>

^f Source: LFL (2011), No 6427, completed on base of digestibility and metabolizability taken from BEYER et al. (2004), No 7231

^g Source: BEYER et al. (2004), combination of 50 % of No 6113 and 50 % of No 6114

The data for crude protein contents are converted into data on N contents by multiplying the crude protein contents by 1/6.25 (IPCC(2006)-10.58).

Table 4.20 shows additional diet data as needed for the calculation of CH₄ emissions from enteric fermentation (see Chapter 4.3.5).

Die Angaben zum Rohproteingehalt werden mit dem Faktor 1/6,25 in N-Gehalte umgerechnet (IPCC(2006)-10.58).

Table 4.20 zeigt die Eigenschaften der Futterbestandteile, die für die Berechnung der Emissionen aus der Verdauung benötigt werden (siehe Kapitel 4.3.5).

Table 4.20: Dairy cows, additional diet data needed for the calculation of CH₄ from enteric fermentation

(x_{Fi} : content of crude fibre, related to dry matter; x_{NFE} : content of digestible N free residues, related to dry matter; x_{XF} : content of crude fat, related to dry matter)

roughage	x_{Fi} kg kg ⁻¹	x_{NFE} kg kg ⁻¹	x_{XF} kg kg ⁻¹
grass (pasture) ^a	0.225	0.430	0.040
grass silage ^b	0.245	0.452	0.042
maize silage ^c	0.228	0.582	0.028
straw ^d	0.450	0.425	0.017
concentrates	x_{Fi} kg kg ⁻¹	x_{NFE} kg kg ⁻¹	x_{XF} kg kg ⁻¹
concentrates MLF 18/3 ^e	0.134	0.554	0.042
rapeseed expeller ^f	0.160	0.350	0.070
wheat ^g	0.030	0.785	0.020

^{a, b, c, d, f, g} Source: BEYER et al. (2004), cf. Table 4.17

^e Source: Data based on LWK-NW (2004 – 2011)

The content of crude fibre x_{Fi} in Table 4.20 is determined from other known feed properties:

Der Rohfasergehalt x_{Fi} in Table 4.20 wurde dabei aus anderen bekannten Kennwerten berechnet:

$$x_{Fi} = 1 - x_{ash} - x_{XP} - x_{NFE} - x_{XF} \quad (4.35)$$

X_{Fi}	content of crude fibre, related to dry matter (in kg kg ⁻¹)
X_{ash}	ash content, related to dry matter (in kg kg ⁻¹)
X_{XP}	crude protein content, related to dry matter (in kg kg ⁻¹)
X_{NFE}	content of digestible N free residues, related to dry matter (in kg kg ⁻¹)
X_{XF}	content of crude fat, related to dry matter (in kg kg ⁻¹)

Mean feed properties (e. g. contents of DM, NEL, ME, DE, GE and XP) are calculated as follows

Mittlere Futtereigenschaften (z. B. Gehalte an DM, NEL, ME, DE, GE und XP) werden wie folgt berechnet:

$$A_{\text{mean}} = \sum_i^n g_{i, \text{house}} \cdot A_i \quad (4.36)$$

A_{mean}	mean value of a feed property A
i	index of feed constituent
$g_{i, \text{house}}$	mass fraction of feed constituent i
A_i	value of feed property A of feed constituent i (see Table 4.17 or Table 4.18)

4.3.4.3 Composition of the mixed diet / Zusammensetzung der gemischten Ration

According to Dämmgen et al. (2010a), the standard roughage composition of the mixed diet consists of grass and maize silages in a constant mass ratio $g_{i, \text{house}}$ of grass to maize to straw of 0.44 to 0.54 to 0.02 kg kg⁻¹ (related to dry matter).

The properties of the feed constituents are given in Chapter 4.3.4.2. The mean properties of roughage (contents of DM, NEL, ME, DE, GE and XP) are calculated with eq. (4.36). If grazing occurs, the mean roughage properties need to be adjusted in order to account for differing properties of pasture grass, see Chapter 4.3.4.5.

Standard concentrate MLF 18/3 is used throughout. The diet is supplemented by rapeseed expeller (varying between 0.5 and 1.5 kg cow⁻¹ d⁻¹).

From expert data (see Dämmgen et al., 2010a), a steady function for the share of rapeseed expeller in concentrates as a function of milk yield was derived, see Figure 4.1.


Nach DÄMMGEN et al. (2010a) besteht die Standard-Raufutterzusammensetzung in der gemischten Ration aus Grassilage, Maissilage und Stroh mit konstanten Massenanteilen $g_{i, \text{house}}$ von 0,44 zu 0,54 zu 0,02 kg kg⁻¹ (bezogen auf Trockenmasse).

Zu den Futtereigenschaften siehe Kapitel 4.3.4.2. Mit Gleichung (4.36) werden die mittleren Eigenschaften (Gehalte an DM, NEL, ME, DE, GE und XP) des Raufutters berechnet. Im Falle von Weidegang müssen die mittleren Raufuttereigenschaften noch angepasst werden, um die abweichenden Eigenschaften von Weidegras zu berücksichtigen, siehe dazu Kapitel 4.3.4.5.

An Kraftfutter wird generell Milchleistungsfutter MLF 18/3 gefüttert. Die Mischung wird mit Rapskuchen supplementiert (Mengen zwischen 0,5 und 1,5 kg cow⁻¹ d⁻¹).

Aus Expertenschätzungen (siehe DÄMMGEN et al., 2010a) wurde eine stetige Funktion für die Rapskuchen-Anteile in Abhängigkeit von der Milchleistung abgeleitet, siehe Figure 4.1.

Figure 4.1: Standard mixed feeds, share of rapeseed expeller in concentrates (related to DM) as function of milk yield



data points derived from expert judgement, see DÄMMGEN et al., 2010a

The adjusted steady function reads

Es ergibt sich die folgende stetige Funktion:

$$X_{\text{rape, mixed}} = a_{\text{rape, mixed}} + b_{\text{rape, mixed}} \cdot Y_M + c_{\text{rape, mixed}} \cdot Y_M^2 + d_{\text{rape, mixed}} \cdot Y_M^3 \quad (4.37)$$

$X_{\text{rape, mixed}}$	ratio of rapeseed expeller in concentrates (related to dry matter), mixed diet (in kg kg ⁻¹)
$a_{\text{rape, mixed}}$	constant ($a_{\text{rape, mixed}} = 0.4879 \text{ kg kg}^{-1}$)
$b_{\text{rape, mixed}}$	coefficient ($b_{\text{rape, mixed}} = 0.1038 \cdot 10^{-3} \text{ kg}^{-1} \text{ cow a}$)
Y_M	annual milk yield (in kg cow ⁻¹ a ⁻¹), see Chapter 4.3.1.2
$c_{\text{rape, mixed}}$	coefficient ($c_{\text{rape, mixed}} = -3.043 \cdot 10^{-8} \text{ kg}^{-2} \text{ cow}^2 \text{ a}^2$)
$d_{\text{rape, mixed}}$	coefficient ($d_{\text{rape, mixed}} = 1.71 \cdot 10^{-12} \text{ kg}^{-3} \text{ cow}^3 \text{ a}^3$)

The share of standard concentrate MLF 18/3 is

Der Anteil von MLF 18/3 im Kraftfutter ist

$$X_{\text{MLF, mixed}} = 1 - X_{\text{rape, mixed}} \quad (4.38)$$

$X_{\text{MLF, mixed}}$	share of standard concentrate MLF 18/3 (related to dry matter), mixed diet (in kg kg ⁻¹)
$X_{\text{rape, mixed}}$	ratio of rapeseed expeller in concentrates (related to dry matter), mixed diet (in kg kg ⁻¹)

The mean properties of concentrates (contents of DM, NEL, ME, DE, GE and XP) are calculated by analogy to the procedure used for roughage (see above). They depend on the milk yield which varies in space and time.

Die mittleren Eigenschaften (Gehalte an DM, NEL, ME, DE, GE und XP) des Kraftfutters werden analog zur Vorgehensweise beim Raufutter (s. o. berechnet. Sie sind von der räumlich und zeitlich variierenden Milchleistung abhängig.

4.3.4.4 Composition of the grass based diet / Zusammensetzung der Ration auf Grassilage-Basis

For roughage, only grass silage is used the properties of which are listed in Table 4.17 (see Chapter 4.3.4.2).

Als Raufutter wird ausschließlich Grassilage verwendet, deren Eigenschaften in Table 4.17 (siehe Kapitel 4.3.4.2) aufgeführt sind.

If grazing occurs, the mean roughage properties need to be adjusted in order to account for differing properties of pasture grass, see Chapter 4.3.4.5.

Im Falle von Weidegang müssen die Raufuttereigenschaften noch angepasst werden, um die abweichenden Eigenschaften von Weidegras zu berücksichtigen, siehe dazu Kapitel 4.3.4.5.

Standard concentrate MLF 18/3 is supplemented with wheat in varying shares.

Kraftfutter MLF 18/3 wird mit variierenden Mengen Weizen supplementiert.


The properties of the concentrates constituents are given in Table 4.17.

Die Eigenschaften der Kraftfutterbestandteile zeigt Table 4.17.

The share of wheat in concentrates is depending on milk yield as displayed in Figure 4.2:

Der Anteil von Weizen im Kraftfutttergemisch ist milchleistungsabhängig wie in Figure 4.2 gezeigt:

Figure 4.2: Standard grass based feeds, share of wheat in concentrates (related to DM) as function of milk yield



data points derived from expert judgement, see DÄMMGEN et al., 2010a

The resulting steady function reads

Daraus resultiert folgende stetige Funktion:

$$X_{\text{wheat, grass}} = a_{\text{wheat, grass}} + b_{\text{wheat, grass}} \cdot Y_M + c_{\text{wheat, grass}} \cdot Y_M^2 + d_{\text{wheat, grass}} \cdot Y_M^3 \quad (4.39)$$

$X_{\text{wheat, grass}}$	share of wheat in total concentrates (related to dry matter), grass based diet (in kg kg ⁻¹)
$a_{\text{wheat, grass}}$	constant ($a_{\text{wheat, grass}} = 0.47054 \text{ kg kg}^{-1}$)
$b_{\text{wheat, grass}}$	coefficient ($b_{\text{wheat, grass}} = 1.238 \cdot 10^{-4} \text{ kg}^{-1} \text{ cow a}$)
Y_M	annual milk yield (in kg cow ⁻¹ a ⁻¹), see Chapter 4.3.1.2
$c_{\text{wheat, grass}}$	coefficient ($c_{\text{wheat, grass}} = -3.1446 \cdot 10^{-8} \text{ kg}^{-2} \text{ cow}^2 \text{ a}^2$)
$d_{\text{wheat, grass}}$	coefficient ($d_{\text{wheat, grass}} = 1.688 \cdot 10^{-12} \text{ kg}^{-3} \text{ cow}^3 \text{ a}^3$)

The share of standard concentrate MLF 18/3 is

Der Anteil von MLF 18/3 im Kraftfutter ist

$$X_{\text{MLF, grass}} = 1 - X_{\text{wheat, grass}} \quad (4.40)$$

$X_{\text{MLF, grass}}$	ratio of MLF 18/3 in total concentrates, grass based diet (in kg kg ⁻¹)
$X_{\text{wheat, grass}}$	ratio of wheat in total concentrates, grass based diet (in kg kg ⁻¹)

The mean properties of concentrates (contents of DM, NEL, ME, DE, GE and XP) are calculated according to analogy to the procedure given in Chapter 4.3.4.2. They depend on the milk yield which varies in space and time.

Die mittleren Kraftfuttereigenschaften (Gehalte an DM, NEL, ME, DE, GE und XP) werden wie in Kapitel 4.3.4.2) beschrieben berechnet. Sie sind von der räumlich und zeitlich variierenden Milchleistung abhängig.

4.3.4.5 *Impact of grazing on mean roughage properties / Einfluss von Weidegang auf mittlere Raufutter-Eigenschaften*

The properties of pasture grass and roughage provided in the housing differ for energy and nitrogen content, see Table 4.17. Hence, grazing has to be accounted for when calculating the mean contents of NEL, GE and N in the roughage taken in. This leads to effective contents of the dry matter intake which are to be used in Chapters 4.3.3.3 and 4.3.3.4.

The effective value of a feed property A is calculated using a weighted mean:

Weidegras unterscheidet sich in Energie- und Stickstoffgehalt von dem im Stall verabreichten Raufutter, siehe Table 4.17. Daher ist Weidegang in die Berechnung der NEL-, GE- und N-Gehalte des insgesamt aufgenommenen Raufutters einzubeziehen. Dies ergibt effektive Gehalte der aufgenommenen Trockenmasse, die in den Kapiteln 4.3.3.3 und 4.3.3.4 zugrunde zu legen sind.

Der effektive Wert einer Futtereigenschaft A wird im Inventar durch gewichtete Mittelung berechnet:

$$A_{\text{eff}} = (1 - f_{\text{graz}}) \cdot A_{\text{standard}} + f_{\text{graz}} \cdot A_{\text{graz}} \quad (4.41)$$

A_{eff}	effective value of roughage property A
f_{graz}	weighting factor ($0 \leq f_{\text{graz}} \leq 1$), see Chapter 4.3.8.5.1
A_{standard}	value of roughage feed property A in the standard diet composition, see Chapters 4.3.4.2 and 4.3.4.4
A_{graz}	value of property A in pasture grass

4.3.4.6 *Calculation of digestibility and metabolizability / Berechnung von Verdaulichkeit und Umsetzbarkeit*

The mean digestibilities of the two standard rations (cf. Chapters 4.3.3.3 and 4.3.4.4) are calculated separately for each district:

Die mittlere Verdaulichkeiten der beiden Standard-Rationen (siehe Kapitel 4.3.3.3 und 4.3.4.4) werden für jeden Kreis jeweils wie folgt berechnet:

$$X_{\text{DE, f, i}} = \frac{DE_{\text{f, i}}}{GE_{\text{f, i}}} \quad (4.42)$$

with

$$DE_{\text{f, i}} = \frac{\alpha}{t_{\text{ibc}}^*} \cdot DE_{\text{f, i}}^* = \frac{\alpha}{t_{\text{ibc}}^*} \cdot \left(DM_{\text{f, conc, i}}^* \cdot \eta_{\text{DE, f, conc, i}} + DM_{\text{f, rough, i}}^* \cdot \eta_{\text{DE, f, rough, i}} \right) \quad (4.43)$$

$$GE_{\text{f, i}} = \frac{\alpha}{t_{\text{ibc}}^*} \cdot GE_{\text{f, i}}^* = \frac{\alpha}{t_{\text{ibc}}^*} \cdot \left(DM_{\text{f, conc, i}}^* \cdot \eta_{\text{GE, f, conc, i}} + DM_{\text{f, rough, i}}^* \cdot \eta_{\text{GE, f, rough, i}} \right) \quad (4.44)$$

$X_{\text{DE, f, i}}$	digestibility of standard feed type f in district i (in MJ MJ ⁻¹)
f	standard feed type (f = mix, gra)
i	index of districts
α	time units conversion factor ($\alpha = 365 \text{ d a}^{-1}$)

t_{ibc}^*	duration of the interval between calvings (calving interval) (in d), see Chapter 4.3.1.6
$DE_{f,i}$	total annual intake of digestible energy with diet f in district i (in MJ cow ⁻¹)
$DE_{f,i}^*$	total intake of digestible energy with diet f in district i during the interval between calvings (in MJ cow ⁻¹)
$GE_{f,i}$	total annual intake of gross energy with diet f in district i (in MJ cow ⁻¹)
$GE_{f,i}^*$	total intake of gross energy with diet f in district i during the interval between calvings (in MJ cow ⁻¹)
$DM_{f,conc,i}^*$	total intake of concentrates dry matter with diet f in district i during the interval between calvings (in kg cow ⁻¹ d ⁻¹)
$DM_{f,rough,i}^*$	total intake of roughage dry matter with diet f in district i during the interval between calvings (in kg cow ⁻¹ d ⁻¹)
$\eta_{DE,f,conc,i}$	effective content of digestible energy in the concentrates fed with diet f in district i (in MJ kg ⁻¹)
$\eta_{DE,f,rough,i}$	effective content of digestible energy in roughage fed with diet f in district i (in MJ kg ⁻¹)
$\eta_{GE,f,conc,i}$	effective content of gross energy in concentrates fed with diet f in district i (in MJ kg ⁻¹)
$\eta_{GE,f,rough,i}$	effective content of gross energy in roughage fed with diet f in district i (in MJ kg ⁻¹)

For the calculation of the effective contents of DE and GE see Chapters 4.3.4.2, 4.3.4.4 und 4.3.4.5.

The total intake of dry matter with concentrates in standard ration f in district i is given by (indices f and i dropped for sake of simplicity of notation):

Zur Ermittlung der effektiven Gehalte an DE und GE siehe Kapitel 4.3.4.2, 4.3.4.4 und 4.3.4.5.

Für die Gesamtaufnahme an Kraftfutter-Trockenmasse mit der Standard-Ration f im Kreis i gilt (Indizes f und i zur Vereinfachung der Schreibweise weggelassen):

$$DM_{conc}^* = DM_{conc,lact}^* + DM_{conc,dry}^* \quad (4.45)$$

DM_{conc}^*	total intake of dry matter of concentrates during the interval between calvings (in kg cow ⁻¹ d ⁻¹)
$DM_{conc,lact}^*$	intake of dry matter of concentrates during the lactation period (in kg cow ⁻¹)
$DM_{conc,dry}^*$	intake of dry matter of concentrates during the dry period (in kg cow ⁻¹)

The total intake of dry matter with roughage in standard ration f in district i is calculated accordingly.

Die Gesamtaufnahme an Raufutter-Trockenmasse mit Standard-Ration f im Kreis i wird analog berechnet.

The total annual energy intake per animal place is a weighted average of the ration-related GE intake values:

Die jährliche Gesamtenergie-Aufnahme pro Platz ergibt sich als gewichtetes Mittel aus den rationsbezogenen GE-Aufnahme-Werten:

$$GE_i = x_{mix,i} \cdot GE_{mix,i} + x_{gra,i} \cdot GE_{gra,i} \quad (4.46)$$

GE_i	gross energy intake in district i (in MJ pl ⁻¹ a ⁻¹)
$GE_{mix,i}$	intake of gross energy with mixed diet in district i (in MJ pl ⁻¹ a ⁻¹)
$x_{mix,i}$	fraction of dairy cow population in district i fed with the mixed feed composition (in cow cow ⁻¹)
$GE_{gra,i}$	intake of gross energy with grass based diet in district i (in MJ pl ⁻¹ a ⁻¹)
$x_{gra,i}$	fraction of dairy cow population in district i fed with the grass based feed composition (in cow cow ⁻¹)

The emission reporting under UNFCCC requires to report a national mean of digestibility (CRF Table 4.A, Cell I 14). This is calculated as follows:

Die Emissionsberichterstattung unter UNFCCC erfordert die Angabe eines nationalen Mittelwertes der Verdaulichkeit (CRF Tabelle 4.A, Zelle I 14):

$$X_{DE,Germany} = \frac{\sum_{i=1}^k n_{dc,i} \cdot (x_{mix,i} \cdot X_{DE,mix,i} + x_{gra,i} \cdot X_{DE,gra,i})}{\sum_{i=1}^k n_{dc,i}} \quad (4.47)$$

$X_{DE,Germany}$	national mean digestibility in Germany (in MJ MJ ⁻¹)
i	index of districts
k	number of districts
$n_{dc,i}$	number of dairy cows in district i
$x_{mix,i}$	fraction of dairy cow population in district i fed with the mixed feed composition (in cow cow ⁻¹)
$X_{DE,mix,i}$	digestibility of mixed feed in district i (in MJ MJ ⁻¹)
$x_{gra,i}$	fraction of dairy cow population in district i fed with the grass based feed (in cow cow ⁻¹)
$X_{DE,gra,i}$	digestibility of grass based feed in district i (in MJ MJ ⁻¹)

The calculation of metabolizability on district and national level follows the procedure described for mean digestibilities.

Die Berechnung der Umsetzbarkeit auf Kreis- und nationaler Ebene entspricht dem oben für die Verdaulichkeit beschriebenen Vorgehen.

4.3.5 Methane from enteric fermentation / Methan aus der Verdauung

The CH₄ emissions from enteric fermentation of dairy cows are calculated using a national (Tier 3) approach (DÄMMGEN et al., 2012b), where the emission factor is derived from KIRCHGESSNER et al. (1984) as a function of the intake of crude fibre, N free extracts, crude protein and fat:

$$EF_{CH_4,ent} = a \cdot M_{XFi} + b \cdot M_{NFE} + c \cdot M_{XP} + d \cdot M_{XF} + e \quad (4.48)$$

$EF_{CH_4,ent}$	emission factor for CH ₄ from enteric fermentation (in kg CH ₄ (pl · a) ⁻¹)
a	coefficient ($a = 0.079 \text{ kg kg}^{-1}$)
M_{XFi}	crude fibre intake rate (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
b	coefficient ($b = 0.010 \text{ kg kg}^{-1}$)
M_{NFE}	input rate of N free extracts (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
c	coefficient ($c = 0.026 \text{ kg kg}^{-1}$)
M_{XP}	crude protein intake rate (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
d	coefficient ($d = -0.212 \text{ kg kg}^{-1}$)
M_{XF}	fat intake rate (in kg place ⁻¹ a ⁻¹)
e	constant ($e = 365 \cdot 0.063 \text{ kg pl}^{-1} \text{ a}^{-1}$)

The intake rates of crude fibre, N free extracts, crude protein and fat are obtained from the properties of the feed constituents and the amount of feed taken in (see Chapter 4.3.4.2).

No national data is available on the uncertainty of the emission factor for CH₄ from enteric fermentation do not exist. IPCC(2006)-10.33 estimates the uncertainty of Tier 2 approaches to be 20 %. This value is, according to the definition of uncertainty used in Chapter 3 in IPCC (2006a), interpreted as half the 95 % confidence interval. A normal distribution is assumed.

The methane conversion factor required in the CRF tables is then calculated as follows:

$$X_{CH_4,GE} = \frac{\eta_{CH_4} \cdot EF_{CH_4,ent}}{GE} \quad (4.49)$$

$X_{CH_4,GE}$	methane conversion factor for dairy cows (in MJ MJ ⁻¹)
η_{CH_4}	energy content of methane ($\eta_{CH_4} = 55.65 \text{ MJ (kg CH}_4\text{)}^{-1}$)
$EF_{CH_4,ent}$	emission factor for CH ₄ from enteric fermentation (in kg CH ₄ (pl · a) ⁻¹)
GE	gross energy intake rate (in MJ pl ⁻¹ a ⁻¹), see Chapter 4.3.4.6

Neither the emission factor nor the methane conversion factor are constants. In the early 1990s, the conversion factor is about 0.07 MJ MJ⁻¹, and decreases by about 10 % during two decades. This change was mainly due to increased milk yields since 1990 and the necessary changes in the composition of the diets.

Die Aufnahme von Rohfaser, N-freien Extraktstoffen, Rohprotein und Fett ergibt sich aus den Kennwerten der Futterzusammensetzung und der Menge des aufgenommenen Futters (siehe Kapitel 4.3.4.2).

Zur Unsicherheit des Emissionsfaktors für CH₄ aus der Verdauung sind keine nationalen Daten verfügbar. IPCC(2006)-10.33 schätzt die Unsicherheit bei Anwendung von Tier-2-Verfahren auf 20 %. Dieser Wert wird im Sinne von IPCC (2006a), Kapitel 3, als halbes 95 %-Konfidenzintervall interpretiert. Es wird Normalverteilung angenommen.

Der in den CRF-Tabellen anzugebende Methanumwandlungsfaktor wird dann wie folgt berechnet:

Weder Emissionsfaktor noch Methanumwandlungsfaktor sind Konstanten. Der Umwandlungsfaktor liegt Anfang der 1990er Jahre bei ca. 0,07 MJ MJ⁻¹, und fällt im Verlaufe von 20 Jahren um rund 10 %. Diese Veränderung wird im Wesentlichen durch den Anstieg der Milchleistung seit 1990 und die damit verbundenen Änderungen in der Futterzusammensetzung verursacht.

4.3.6 Methane from manure management / Methan aus Wirtschaftsdünger-Management

CH₄ emissions from manure management are quantified using a Tier 2 procedure, cf. Chapter 3.3.4.1.

CH₄ aus dem Wirtschaftsdünger-Management wird mit einem Tier-2-Verfahren berechnet (Kapitel 3.3.4.1).

Volatile solids (VS) excretion rates are calculated using the modified IPCC approach described in DÄMMGEN et al. (2011a), see Chapter 3.3.3.1.

The necessary information on the digestibility of organic matter and the ash contents of the diet are obtained as weighted means from the properties of feed constituents as listed in Table 4.17.

Maximum methane producing capacity B_0 and conversion factors (MCF) for the respective manure storage system are provided in Table 4.4 (see Chapter 4.2.1).

The frequency distribution of storage types is supplied by RAUMIS or derived from official census data (see Chapter 3.4.3).

German data on the uncertainty of CH_4 emissions from manure management do not exist. IPCC(2006)-10.48 estimates the uncertainty of Tier 2 approaches to be 20 %. This value is, according to the definition of uncertainty used in Chapter 3 in IPCC (2006a), interpreted as half the 95 % confidence interval. A normal distribution is assumed.

Die VS-Ausscheidungen („volatile solids“) werden nach dem gegenüber IPCC modifizierten Verfahren von DÄMMGEN et al. (2011a) berechnet, siehe Kapitel 3.3.3.1.

Die dazu notwendigen Daten zur Verdaulichkeit von organischer Substanz und dem Aschegehalt im Futter ergeben sich im gewichteten Mittel aus den Angaben zu den Rationskomponenten in Table 4.17.

Zu maximaler Methan-Freisetzungskapazität B_0 und Methanumwandlungsfaktor (MCF) für die einzelnen Lagerungssysteme siehe Table 4.4 in Kapitel 4.2.1.

Die Häufigkeitsverteilung der Lagerverfahren wird durch RAUMIS bereitgestellt bzw. aus offiziellen Erhebungen abgeleitet, siehe Kapitel 3.4.3.

Deutsche Zahlen zur Unsicherheit der CH_4 -Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management liegen nicht vor. IPCC(2006)-10.48 schätzt die Unsicherheit bei Anwendung von Tier-2-Verfahren auf 20 %. Dieser Wert wird im Sinne von IPCC (2006a), Kapitel 3, als halbes 95 %-Konfidenzintervall interpretiert. Es wird Normalverteilung angenommen.

4.3.7 NMVOC emissions / NMVOC-Emissionen

The calculation of the NMVOC emissions of cattle are calculated with a Tier 2 methodology, see Chapters 3.3.4.2.2 and 3.3.4.2.3.

Agricultural NMVOC emissions are reported, but are neglected regarding the NEC emission threshold, see Chapter 3.3.4.2.

Die NMVOC-Emissionen von Rindern werden mit einer Tier-2-Methode berechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.2 und 3.3.4.2.3.

Landwirtschaftliche NMVOC-Emissionen werden zwar berichtet, aber bzgl. der NEC-Emissionsobergrenze nicht angerechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.

4.3.8 N balance and N emissions / N-Bilanz und N-Emissionen

4.3.8.1 N intake / N-Aufnahme

The N intake is calculated as follows:

Die N-Aufnahme wird wie folgt berechnet:

$$m_{\text{feed}} = x_{N,XP} \cdot \sum_{i=1}^i DM_i \cdot x_{XP, \text{feed}, i} \quad (4.50)$$

m_{feed}	amount of nitrogen in feed (in kg $pl^{-1} a^{-1}$)
$x_{N,XP}$	nitrogen content of crude protein ($x_{N,XP} = 1/6.25 \text{ kg kg}^{-1}$)
DM_i	amount of dry matter intake with feed constituent i (in kg $pl^{-1} a^{-1}$), see below
$x_{XP, \text{feed}, i}$	crude protein content of feed constituent i (in kg kg^{-1}), see below

The dry matter intake rate is calculated in the model (see Chapter 4.3.3). For the protein contents of the diet constituents see Chapter 4.3.4.

The N intake during grazing is assessed using the following relation and data:

Die Trockenmasse-Aufnahme wird modelliert, siehe 4.3.3. Für die Protein-Gehalte der Futterbestandteile wird auf Kapitel 4.3.4 verwiesen.

Die N-Aufnahme beim Weidegang wird mit der folgenden Beziehung beschrieben:

$$m_{\text{graz}} = DM_{\text{rough, graz}} \cdot x_{XP, \text{rough, graz}} \cdot x_{N, XP} \quad (4.51)$$

m_{graz}	mean nitrogen intake during grazing (in kg $pl^{-1} a^{-1}$)
$DM_{\text{rough, graz}}$	dry matter intake during grazing (in kg $pl^{-1} a^{-1}$)
$x_{XP, \text{rough, graz}}$	mean nitrogen content of crude protein XP in feed (in kg kg^{-1})
$x_{N,XP}$	nitrogen content of crude protein ($x_{N,XP} = 1/6.25 \text{ kg kg}^{-1}$)

4.3.8.2 Overall nitrogen excretion / Gesamtausscheidung von Stickstoff

In the dairy cow model, the overall amount of nitrogen imported into manure management and the pasture includes the organic N shed with hair and dandruff (GrE, 2001). The total amount of N excreted (m_{excr}) is calculated as follows:

$$m_{\text{excr}} = m_{\text{faeces}} + m_{\text{urine}} + m_s = m_{\text{feed}} - (m_g + m_l + m_p) \quad (4.52)$$

m_{excr}	amount of N excreted with faeces and urine, including N from losses of hair and skin (in kg cow ⁻¹ a ⁻¹)
m_{faeces}	amount of N excreted with faeces (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
m_{urine}	amount of N excreted with urine (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
m_{feed}	amount of N taken in with feed (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
m_g	amount of N retained in weight gained (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
m_l	amount of N exported with milk (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
m_p	amount of N excreted in conception products (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
m_s	amount of N lost by skin particles and hair (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)

The calculation of the N balance components is described in DÄMMGEN et al. (2009b). Deviating from this publication the birthweight of a calf is assumed to be 41 kg (arithmetic mean of 40 and 42 kg in KTBL, 2010, pg. 554) and the specific N content of cows and calves is assumed to be 0.0272 kg kg⁻¹ (LfL, 2006a).

Milk protein (crude protein) contents needed for the calculation of m_l are listed in Table 4.14. The determination of milk crude protein contents follows the German enactment on milk quality (Milchgüte-Verordnung, BMELF, 1981) where the Kjeldahl method is listed as official reference method in BVL (2012) according to the German Food and Feed Law (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch – LFGB, BMELV, 2011). The Kjeldahl method determines N; measured N contents are multiplied by 6.38 kg kg⁻¹ to obtain crude protein contents.

Die in das Wirtschaftsdünger-Managementsystem bzw. die Weideflächen eingebrachte N-Menge umfasst beim Milchkuhmodell auch die organische N-Menge aus abgefallenen Hautschuppen und Haaren (GrE, 2001). Die Gesamt-N-Ausscheidung berechnet sich wie folgt:

Zur Berechnung der einzelnen Glieder der N-Bilanz wird auf DÄMMGEN et al. (2009b) verwiesen. Abweichend davon werden das Geburtsgewicht eines Kalbes mit 41 kg (Mittelwert aus 40 und 42 kg in KTBL, 2010, S. 554) und der spezifische N-Gehalt von Kuh und Kalb mit 0,0272 kg kg⁻¹ (LfL, 2006a) angesetzt.

Die für m_l benötigten Milcheiweiß-Gehalte (Roheiweiß-Gehalte) sind Table 4.14 zu entnehmen. Die Bestimmung des Roheiweiß-Gehaltes erfolgt gemäß der Milch-Güteverordnung (BMELF, 1981) mithilfe eines in der amtlichen Sammlung von Untersuchungsmethoden (BVL, 2012) zum Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) (BMELV, 2011) vorgeschriebenen Referenzverfahrens zur Bestimmung des Stickstoff-Gehaltes (Kjeldahl-Verfahren). Multiplikation des N-Gehalts mit 6,38 kg kg⁻¹ ergibt den Roheiweiß-Gehalt.

4.3.8.3 Renal and faecal nitrogen excretion and TAN content of excreta / Stickstoff-Ausscheidung mit Harn und Kot und TAN-Gehalte der Ausscheidungen

It would be advantageous to model renal N excretion (m_{urine}) directly to use it as TAN excretion in the inventory (see Chapter 3.3.3.2). However, no simple modelling procedure is available. Renal N excretion cannot satisfactorily be related to the N intake with feed (e.g. KEBREAB et al., 2001, 2002; GEHMAN et al., 2008), because the actual XP digestibility of the feed decreases as the amount of feed increases. In addition, it is not possible to apply the approach developed by Spek et al. (2013) to use data on the milk urea content that is surveyed routinely in milk yield recordings. The reason is that there is no direct link between this differentiated data on milk urea content found in practice and the calculations of feed rations and feed intake with the GAS-EM dairy cow model. Complex models such as Molly (see e.g. JOHNSON and BALDWIN, 2008) require input information that is not available for emission inventory calculations on a routine basis.

Hence, in order to obtain renal N excretion that is identified with TAN, the inventory model GAS-EM first calculates faecal N excretion. This is subtracted from

Vorteilhaft wäre eine direkte Modellierung des renal ausgeschiedenen N (m_{urine}), das im Inventar mit der TAN-Ausscheidung gleichgesetzt wird (siehe Kapitel 3.3.3.2). Ein einfaches Modell hierfür ist jedoch nicht verfügbar. Renales N kann nicht befriedigend auf die mit dem Futter aufgenommene N-Menge bezogen werden (vgl. KEBREAB et al., 2001, 2002, GEHMAN et al., 2008), weil die tatsächliche XP-Verdaulichkeit des Futters mit zunehmender Futtermenge abnimmt. Die Nutzung der in routinemäßigen Milchleistungsprüfungen erhobenen Daten zum Milchwurststoffgehalt (z. B. mit dem Ansatz von Spek et al., 2013) scheidet aus, da zwischen diesen differenzierten Praxisdaten und den Futterberechnungen des GAS-EM-Milchkuhmodells keine direkte Verbindung hergestellt werden kann. Komplexe Modelle wie Molly (siehe z. B. JOHNSON und BALDWIN, 2008) benötigen spezielle Inputdaten, die für die routinemäßige Emissionsinventarberechnung nicht verfügbar sind.

Daher wird im Inventarmodell GAS-EM zunächst die fäkale N-Ausscheidung berechnet. Diese wird von der Gesamt-N-Ausscheidung abgezogen, um die renale

total N excretion to obtain renal N excretion. In this context also the N amounts lost by hair and skin (dandruff) are to be subtracted as they previously are added to the total N excretions, see Chapter 4.3.8.2.

N-Ausscheidung und damit TAN zu erhalten; dabei ist auch die organische N-Menge aus Hautschuppen und Haaren abzuziehen, die zuvor den N-Ausscheidungen zugerechnet worden war, siehe Kapitel 4.3.8.2.

$$m_{\text{urine}} = m_{\text{excr}} - m_{\text{faeces}} - m_s \quad (4.53)$$

m_{urine}	amount of N excreted in urine (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
m_{excr}	amount of N excreted with faeces and urine, including N from losses of hair and skin (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
m_{faeces}	amount of N excreted with faeces (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
m_s	amount of N lost by hair and skin (dandruff) (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)

Faecal N excretion is dominated by microbial XP synthesis in the rumen. The calculation procedure used in the inventory takes into account that a rising feed level leads to a decrease of the effective digestibility of crude protein. The procedure is based on Danish experimental results and is in "good harmony" with similar equations reported in the literature ((KRISTENSEN et al., 1998, pg. 117):

Die fäkale N-Ausscheidung wird von der mikrobiellen XP-Synthese im Pansen bestimmt. Das im Inventar verwendete Berechnungsverfahren berücksichtigt, dass die effektive Rohprotein-Verdaulichkeit mit zunehmender Futtermenge abnimmt. Das Verfahren beruht auf dänischen experimentellen Daten und steht in gutem Einklang mit ähnlichen Verfahren, die in der Literatur berichtet wurden (KRISTENSEN et al., 1998, S. 117):

$$m_{\text{faeces}} = \alpha \cdot \beta \cdot \left\{ a \cdot \frac{m_{\text{feed}}}{\alpha} + x_N \cdot \left[b \cdot \frac{DM}{\alpha} + c \cdot \left(\frac{DM}{\alpha} \right)^2 \right] \right\} \quad (4.54)$$

m_{faeces}	N excreted with faeces (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
α	time units conversion factor ($\alpha = 365 \text{ d a}^{-1}$)
β	mass units conversion factor ($\beta = 0.001 \text{ kg g}^{-1}$)
a	constant ($a = 40 \text{ g kg}^{-1}$)
m_{feed}	N intake with feed (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
x_N	nitrogen content of crude protein ($x_N = 1/6.25 \text{ kg kg}^{-1}$)
b	constant ($b = 20 \text{ g kg}^{-1}$)
DM	DM intake (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
c	constant ($c = 1.8 \text{ g d pl kg}^{-2}$)

The amounts of organic N ($m_{\text{excr, org}}$) and TAN ($m_{\text{excr, TAN}}$) are (cf. Chapter 3.3.3.2):

Dabei betragen, vgl. Kapitel 3.3.3.2, die Mengen an organischem N, ($m_{\text{excr, org}}$) und TAN ($m_{\text{excr, TAN}}$):

$$m_{\text{excr, org}} = m_{\text{faeces}} + m_s \quad (4.55)$$

$$m_{\text{excr, TAN}} = m_{\text{urine}} \quad (4.56)$$

$m_{\text{excr, org}}$	total amount of organic N treated as organic N excretions (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
m_{faeces}	amount of N excreted with faeces (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
m_s	amount of N lost by skin particles and hair (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
$m_{\text{excr, TAN}}$	amount of TAN excreted (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
m_{urine}	amount of N excreted with urine (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)

The share of TAN of the nitrogen imported into the manure management system from dairy cows amounts to

Der relative TAN-Gehalt der durch die Milchkühe dem Wirtschaftsdünger-Management zugeführten Stickstoffmenge ergibt sich wie folgt:

$$x_{\text{TAN}} = \frac{m_{\text{excr, TAN}}}{m_{\text{excr, TAN}} + m_{\text{excr, org}}} = \frac{m_{\text{urine}}}{m_{\text{urine}} + m_{\text{faeces}} + m_s} \quad (4.57)$$

x_{TAN}	relative content of TAN excreted (in kg kg ⁻¹)
$m_{\text{excr, TAN}}$	amount of TAN excreted (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
$m_{\text{excr, org}}$	total amount of organic N treated as organic N excretions (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)

m_{urine}	amount of N excreted with urine (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
m_{faeces}	amount of N excreted with faeces (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
m_s	amount of N lost by skin particles and hair (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)

4.3.8.4 N inputs with straw / N-Einträge mit Stroh

For straw based systems N inputs with straw are taken into account. The amounts of N are given in Table 4.21. For the properties of straw and the mineralization of organic N to TAN see Chapter 3.3.4.3.2.

Für Systeme mit Einstreu wird der N-Eintrag mit dem Stroh berücksichtigt. Die eingetragenen N-Mengen sind in Table 4.21 angegeben. Zu den Eigenschaften von Stroh und der Mineralisierung von organisch gebundenem N zu TAN wird auf Kapitel 3.3.4.3.2 verwiesen.

As no bedding is taken into account during the grazing period, the annual amount of bedding actually used depends on the duration of the grazing period.

Da für Weidezeiten keine Einstreu berücksichtigt wird, hängt die im Inventar für das gesamte Jahr verwendete Einstreumenge von der Weidedauer ab.

Table 4.21: Dairy cows, N inputs with straw in solid-manure systems

Housing type	Haltungssystem	Straw input kg pl ⁻¹ d ⁻¹	Dry matter (DM) ^d kg pl ⁻¹ d ⁻¹	N input (in DM) ^d kg pl ⁻¹ d ⁻¹	TAN ^d kg pl ⁻¹ d ⁻¹
tied systems	Anbindehaltung	5.0 ^a	4.3	24.9·10 ⁻³	12.5·10 ⁻³
loose housing	Laufstall	5.0 ^b	4.3	24.9·10 ⁻³	12.5·10 ⁻³
deep bedding	Tiefstreu	8.0 ^c	6.88	39.9·10 ⁻³	20.0·10 ⁻³

^a Source: KTBL (2006a), pg. 221

^b Assumption: same value as for "loose housing, sloped floor" (KTBL (2006a), pg. 269); KTBL expert judgement, Brigitte Eurich-Menden

^c Source: KTBL (2006a), pg.261

^d Calculation of DM, N input und TAN according to Chapter 3.3.4.3.2

4.3.8.5 Emissions during housing and grazing / Emissionen aus dem Stall und auf der Weide

4.3.8.5.1 N excreted in the house, the milking area and during grazing / N-Ausscheidungen im Stall, im Melkbereich und auf der Weide

Housing, milking area and pasture have different NH₃ emission factors (see Chapter 4.3.8.5.3). Hence, N excretions have to be split into fractions dropped in the respective areas (see also the N low scheme in Chapter 3.3.4.3.1.). The splitting procedure is based on the relative N excretion shares for the house (f_{house}), the milking area (f_{milk}) and grazing (f_{graz}) as derived in the following:

Stall, Melkbereich und Weide weisen unterschiedliche NH₃-Emissionsfaktoren auf (siehe Kapitel 4.3.8.5.3). Daher ist eine Aufteilung der N-Ausscheidungen auf diese drei Bereiche erforderlich (siehe auch das N-Fluss-Schema, Kapitel 3.3.4.3.1). Diese Aufteilung erfolgt mithilfe der nachstehenden relativen Ausscheidungsanteile für Stall (f_{house}), Melkbereich (f_{milk}) und Weide (f_{graz}):

$$f_{\text{graz}} = \frac{\tau_{\text{graz, year}} \cdot [x_{\text{graz, d}} \cdot (\delta - \tau_{\text{milk}}) + x_{\text{graz, h}} \cdot \tau_{\text{graz, h}}]}{\alpha \cdot \delta} \quad (4.58)$$

$$f_{\text{milk}} = \frac{\tau_{\text{milk}}}{\delta} \quad (4.59)$$

$$f_{\text{house}} = 1 - f_{\text{graz}} - f_{\text{milk}} \quad (4.60)$$

f_{graz}	fraction of N excreted on pasture (in kg kg ⁻¹)
$\tau_{\text{graz, year}}$	annual duration of the grazing period (in d a ⁻¹)
$x_{\text{graz, d}}$	fraction of the dairy cow population kept outdoors all day (an an ⁻¹)
δ	time units conversion factor ($\delta = 24 \text{ h d}^{-1}$)
τ_{milk}	daily duration of milking (in h d ⁻¹)
$x_{\text{graz, h}}$	fraction of the dairy cow population kept outdoors part of day (an an ⁻¹)
$\tau_{\text{graz, h}}$	daily duration of grazing (in h d ⁻¹)
α	time units conversion factor ($\alpha = 365 \text{ d a}^{-1}$)
f_{milk}	fraction of N excreted during milking (in kg kg ⁻¹)
f_{house}	fraction of N excreted in the house (in kg kg ⁻¹)

The daily duration of milking is assumed to be $\tau_{\text{milk}} = 3.5 \text{ h d}^{-1}$. For the parameters describing grazing see Chapter 3.4.3.2.7.

No specific emission factors are available for N_2O , NO and N_2 from manure management in the dairy parlour. Therefore the calculation of these emissions is treated in the same way as for NH_3 emissions, where N excretion rates in both the dairy parlour and animal house are combined.

The emissions of N_2O from agricultural soils resulting from N inputs of grazing animals are calculated separately in Chapter 11.5.

Für die Melkdauer wird $\tau_{\text{milk}} = 3,5 \text{ h d}^{-1}$ angenommen. Bzgl. der Daten zur Weidehaltung siehe Kapitel 3.4.3.2.7.

Für Emissionen von N_2O , NO und N_2 aus dem Wirtschaftsdünger-Management gibt es keinen spezifischen Melkbereich-Emissionsfaktor. Daher wird für die Berechnung dieser Emissionen wie bei den NH_3 -Emissionen die N -Ausscheidung in Stall und Melkbereich zusammengefasst.

Die Emissionen von N_2O aus landwirtschaftlichen Böden infolge von tierischen N -Ausscheidungen auf der Weide erfolgt separat in Kapitel 11.5.

4.3.8.5.2 *Housing types and duration of grazing / Stalltypen und Dauer des Weidegangs*

Information on the frequency distribution of the various housing systems and the duration of grazing is obtained from RAUMIS and the respective data supplied by the official statistics (see Chapter 3.4.3).

Die Angaben zur Verteilung der verschiedenen Stallformen und zur Dauer der Weidehaltung werden durch RAUMIS bereitgestellt bzw. aus der Agrarstatistik entnommen (siehe Kapitel 3.4.3).

4.3.8.5.3 *Partial emission factors "housing and grazing" / Partielle Emissionsfaktoren „Stall und Weide“*

Partial $\text{NH}_3\text{-N}$ emission factors were fixed for all relevant housing systems, cf. Table 4.5. They are based on absolute data provided by DÖHLER et al. (2002) and converted into TAN related data by DÄMMGEN et al. (2010a).

Die für die relevanten Stallsysteme angesetzten partiellen $\text{NH}_3\text{-N}$ -Emissionsfaktoren beruhen auf absoluten Daten von DÖHLER et al. (2002), die von DÄMMGEN et al. (2010a) auf TAN-Bezug umgerechnet wurden, siehe Table 4.5.

The $\text{NH}_3\text{-N}$ emission factor for dairy parlour is assumed to equal that of loose housing ($EF_{\text{milk}} = 0.197 \text{ kg kg}^{-1}$, related to TAN).

Der $\text{NH}_3\text{-N}$ -Emissionsfaktor für den Melkbereich wird dem für Laufställe gleichgesetzt ($EF_{\text{milk}} = 0,197 \text{ kg kg}^{-1}$, bezogen auf TAN).

The $\text{NH}_3\text{-N}$ emission factor for grazing is $0.10 \text{ kg kg}^{-1} \text{ N}$, related to TAN excreted (EMEP(2013)-3B-27, Table 3.7).

Für Weidegang beträgt der auf die ausgeschiedene TAN-Menge bezogene $\text{NH}_3\text{-N}$ -Emissionsfaktor $0,10 \text{ kg kg}^{-1} \text{ N}$ (EMEP(2013)-3B-27, Table 3.7).

N_2O and NO emissions resulting from animal excreta dropped during grazing are calculated according to Chapter 11.5. For further details see Chapters 3.3.4.3.5 and 4.3.8.5.1.

Die aus dem Weidegang resultierenden Emissionen von N_2O und NO werden nach Kapitel 11.5 berechnet. Zu weiteren Einzelheiten siehe Kapitel 3.3.4.3.5 und 4.3.8.5.1.

4.3.8.6 *Emissions during storage / Emissionen aus dem Lager*

Storage of slurry distinguishes storage underneath the slatted floor from storage in a separate slurry tank within the house as well as from several different outdoor storage systems. Emissions from separate slurry tanks within houses are dealt with in the same way as outdoor tanks with solid covers.

Bei der Gülle-Lagerung wird zwischen Lagerung im Stall unter dem Spaltenboden, der Lagerung im separaten Güllekeller unter dem Stall und zwischen mehreren Formen des Außenlagers unterschieden. Separate Güllekeller werden wie Außenlager mit fester Abdeckung behandelt.

The frequency distribution of storage types is supplied by RAUMIS or derived from official census data (see Chapter 3.4.3).

Die Häufigkeitsverteilung der Lagerverfahren wird durch RAUMIS bereitgestellt bzw. aus offiziellen Erhebungen abgeleitet, siehe Kapitel 3.4.3.

The emission factors for NH_3 , N_2O , NO and N_2 from storage are given in Chapter 4.2.2.1 (Table 4.6 and Table 4.7).

Für die Emissionsfaktoren für NH_3 , N_2O , NO und N_2 aus dem Lager wird auf Kapitel 4.2.2.1 (Table 4.6 und Table 4.7) verwiesen.

NO emissions from manure management are reported (as NO_x), but are neglected regarding the NEC emission threshold, see Chapter 3.3.4.2.

NO aus dem Wirtschaftsdünger-Management wird berichtet (als NO_x), bzgl. der NEC-Emissionsobergrenze aber nicht angerechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.

4.3.8.7 *Indirect N₂O from manure management / Indirektes N₂O aus dem Wirtschaftsdünger-Management*

Indirect N₂O emissions from manure management (housing/storage without spreading) are calculated according to Chapter 3.3.4.3.6. See Chapter 3.3.4.3.6 also for the uncertainties of activity data and emission factor.

(Indirect N₂O emissions from agricultural soils after spreading of manures or digested manures are reported in Sector 3.D. For the calculation of these emissions see Chapter 12.)

Indirekte N₂O-Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management (Stall/Lager ohne Ausbringung) werden nach Kapitel 3.3.4.3.6 berechnet. Siehe dort auch wegen der Unsicherheiten von Aktivitätswert und Emissionsfaktor.

(Indirekte N₂O-Emissionen als Folge der Ausbringung von Wirtschaftsdüngern und Wirtschaftsdünger-Gärresten werden im Sektor 3.D berichtet. Zur Berechnung siehe Kapitel 12.)

4.3.8.8 *Emissions during spreading / Emissionen bei der Ausbringung*

The emission factors of NH₃ for the different spreading techniques and times before incorporation are given in Chapter Kapitel 4.2.2.3.

The frequency distribution of spreading techniques and times before incorporation is supplied by RAUMIS or derived from official census data (see Chapter 3.4.3).

Für die Emissionsfaktoren von NH₃ für die verschiedenen Ausbringungstechniken und Einarbeitungszeiten wird auf Kapitel 4.2.2.3 verwiesen.

Die Häufigkeitsverteilungen der Ausbringungstechniken und Einarbeitungszeiten wird durch RAUMIS bereitgestellt bzw. aus offiziellen Erhebungen abgeleitet, siehe Kapitel 3.4.3.

4.3.8.9 *Uncertainties of emission factors and activity data / Unsicherheiten von Emissionsfaktoren und Aktivitätsdaten*

For the uncertainties of the emission factors see Chapter 4.2.2.4 and 11.2.2.

The uncertainty of N excretion is discussed in Chapter 14.4.1. For the uncertainty of the amount of N spreaded see Chapter 11.2.1.

Zu den Unsicherheiten der Emissionsfaktoren siehe Kapitel 4.2.2.4 und 11.2.2.

Die Unsicherheit der N-Ausscheidung wird in Kapitel 14.4.1 diskutiert. Zur Unsicherheit der zur Ausbringung kommenden N-Menge siehe Kapitel 11.2.1.

4.3.9 *Emissions of particulate matter / Partikelemissionen*

The method to calculate particle emissions is described in Chapter 3.3.4.5. The emission factors are listed in Table 4.22. For the uncertainty of the emission factors see Chapter 3.3.4.5.

Zur Berechnungsmethode für Partikelemissionen wird auf Kapitel 3.3.4.5 verwiesen. Die Emissionsfaktoren sind in Table 4.22 angegeben. Zur Unsicherheit der Emissionsfaktoren siehe Kapitel 3.3.4.5.

Table 4.22: Dairy cows, emission factors for particle emissions from housing

Housing type	Haltungssystem	Emission factor for TSP kg pl ⁻¹ a ⁻¹	Emission factor for PM ₁₀ kg pl ⁻¹ a ⁻¹	Emission factor for PM _{2.5} kg pl ⁻¹ a ⁻¹
straw based	strohbasierend	0.94	0.43	0.28
slurry based	güllebasierend	1.81	0.83	0.54

Source: EMEP(2016)-3B-53, Table A1.6 (with TSP = ID [inhalable dust])

Information on the frequency distribution of the various housing systems and the duration of grazing is obtained from RAUMIS and the respective data supplied by the official statistics (see Chapter 3.4.3).

Die Angaben zur Verteilung der verschiedenen Stallformen und zur Dauer der Weidehaltung werden durch RAUMIS bereitgestellt bzw. aus der Agrarstatistik entnommen (siehe Kapitel 3.4.3).

4.3.10 *International comparison / Internationaler Vergleich*

As an element of quality assurance it would be necessary to validate the German emission inventory with the help of independent data (measurements, calculations). Due to the lack of such independent data a comparison is made between German input data and emission results on the one hand and, on the other hand, default values (IPCC, 2006; EMEP, 2016) and respective data of neighbouring countries and the United Kingdom.

Als Element der Qualitätssicherung wäre es sinnvoll, das deutsche Emissionsinventar mit Daten zu validieren, die unabhängig von den Eingangsdaten und Ergebnissen des Inventars erhoben wurden. Mangels solcher unabhängigen Daten erfolgt eine Gegenüberstellung von deutschen Eingangsgrößen und Emissionsergebnissen mit IPCC (2006)- und EMEP (2016)-Standardwerten (Defaults) sowie entsprechenden Daten von Nachbar-

From the latter, the median is determined and also shown in the comparison tables.

At the time the German emissions reporting 2020 was being prepared, the results of the other countries' emission reporting 2020 were not yet available. Consequently, the other countries' data have been taken from their 2019 submissions, and the international comparison is performed for 2017.

staaten und des Vereinigten Königreichs. Aus letzteren wird der Median ermittelt und ebenfalls in den Vergleichstabellen angegeben.

Bei Erstellung der deutschen Emissionsberichterstattung 2020 waren die Ergebnisse der Emissionsberichterstattung 2020 der anderen Länder noch nicht bekannt. Daher wurde für diese Länder auf Daten der Berichterstattung 2019 zurückgegriffen. Der internationale Vergleich wird daher für 2017 durchgeführt.

4.3.10.1 Methane from enteric fermentation / Methan aus der Verdauung

Table 4.23 allows for a comparison of emissions from enteric fermentation and important governing parameters, supported by the medians of the respective distributions. Mean daily milk yield of German dairy cows is calculated by dividing the annual milk yield by 365.

Of the ten countries, Denmark has the highest and France (roughly on par with the UK) has the lowest IEF. Germany is in the middle range. This also applies to milk production. The German GE intake is slightly below the median and thus in the area between Switzerland and Austria.

With regard to the methane conversion factors, it can be seen that three countries (Austria, Czech Republic, Poland) exactly used the IPCC default value of 6.5%, UK only approximately. The Swiss value is significantly higher than the IPCC default value. For Belgium, Denmark, France, Germany and the Netherlands, the methane conversion factor is below the IPCC default value, with the German value closest to the IPCC default value.

Table 4.23 zeigt die Vergleichsdaten für die Emissionen aus der Verdauung mit wichtigen Einflussgrößen, einschließlich des Medians der jeweiligen Verteilungen. Die durchschnittliche deutsche Tagesmilchleistung entspricht der Jahresleistung dividiert durch 365.

Von den zehn Ländern hat Dänemark den höchsten und Frankreich (ungefähr gleichauf mit UK) den niedrigsten IEF. Deutschland liegt im mittleren Bereich. Dies gilt auch für die Milchleistung. Die deutsche GE-Aufnahme liegt etwas unter dem Median und damit im Bereich zwischen Schweiz und Österreich.

Im Hinblick auf die Methanumwandlungsfaktoren ist zu erkennen, dass drei Länder (Österreich, Tschechien, Polen) exakt den IPCC-Defaultwert von 6,5 % verwendet haben, UK aber nur angenähert. Der Schweizer Wert ist deutlich höher als der IPCC-Defaultwert. Bei Belgien, Dänemark, Frankreich, Deutschland und den Niederlanden liegt der Methanumwandlungsfaktor unter dem IPCC-Defaultwert, wobei der deutsche Wert dem IPCC-Defaultwert noch am nächsten kommt.

Table 4.23: Dairy cows, 2017, international comparison of emission explaining variables and implied emission factors of CH₄ from enteric fermentation

	IEF _{CH₄} enteric ferment.	GE intake	milk yield	animal weight	digestibility of energy	methane con- version rate
	kg pl ⁻¹ a ⁻¹	MJ pl ⁻¹ d ⁻¹	kg pl ⁻¹ d ⁻¹	kg an ⁻¹	%	MJ MJ ⁻¹
Austria	133.27	312.61	18.81	700	71.04	0.0650
Belgium	147.20	367.93	22.61	600	75.15	0.0610
Czech Republic	148.05	347.28	22.53	620	67.00	0.0650
Denmark ^a	159.17	404.47	27.57	580	71.00	0.0600
France	122.10	303.46	19.08	677	NE	0.0613
Germany	136.49	330.41	21.27	651	70.60	0.0631
Netherlands	134.59	295.75	NA	NE	NA	0.0582
Poland	126.09	295.75	16.05	500	63.30	0.0650
Switzerland	136.64	301.93	22.74	650	72.17	0.0690
United Kingdom	122.70	288.92	21.61	538	72.24	0.0648
Median	135.54	308.04	21.61	620	71.02	0.0639
IPCC(2006)-10.15 to 10.21, 10.29, 10.72	117	Equations 10.3-10.16	16.44 ^b	600	70	0.065

Source: Germany: Submission 2020; all other countries: UNFCCC (2019), CRF Tables

NE, NA: No data available for different reasons

^a Denmark without Greenland and Faroe Island

^b IPCC milk yield: calculated from 6000 kg pl⁻¹ a⁻¹

4.3.10.2 Methane from manure management / Methan aus Wirtschaftsdünger-Management

Table 4.24 allows for a comparison of CH₄ emissions from manure management and important governing parameters, supported by the medians of the respective distributions. According to the CRF Tables the percentages of liquid systems and the pertinent MCF values relate only to liquid systems that do not encompass the option for anaerobic digestion of slurry.

Germany's VS excretion is at 80 % of the median and thus at the bottom of the distribution. This is, among other things, attributed to the German VS calculation methodology which is improved in comparison to IPCC (2006), see Chapter 3.3.3.1. This results in an IEF that is at 89 % of the median but still within the IPCC default value span. The latter is, however, below the median. The distribution of manure systems in Germany is only slightly lower than the median, while the MCF is 10 % below the median.

Table 4.24 zeigt die Vergleichsdaten für CH₄-Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management sowie wichtige Einflussgrößen, einschließlich des Medians der jeweiligen Verteilungen. Entsprechend der CRF-Vorgabe beziehen sich die prozentualen Anteile von Flüssigmistsystemen und die entsprechenden MCF-Werte nur auf Flüssigmistsysteme, deren Gülle nicht in einer Biogasanlage vergoren wird.

Deutschland liegt mit der VS-Ausscheidung bei 80 % des Medians und damit am unteren Rand der Verteilung. Dies wird u. a. auf die gegenüber IPCC (2006) verbesserte deutsche VS-Berechnungsmethodik zurückgeführt, siehe Kapitel 3.3.3.1. Daraus resultiert ein IEF, der bei 89 % des Medians liegt, aber immer noch innerhalb der IPCC-Defaultwertspanne. Letztere liegt allerdings unterhalb des Medians. Die Verbreitung von von Güllesystemen in Deutschland liegt knapp unter dem Median, während der MCF 10 % unter dem Median liegt.

Table 4.24: Dairy cows, 2017, international comparison of emission explaining variables and implied emission factors of CH₄ from manure management

	IEF _{CH4} manure management	VS excreted	Liquid systems (without anaerobic digestion)	
			frequency	MCF
	kg pl ⁻¹ d ⁻¹	kg pl ⁻¹ d ⁻¹	%	%
Austria	17.09	4.97	54.60	8.81
Belgium	30.61	5.27	48.52	19.00
Czech Republic	22.55	6.41	27.00	17.00
Denmark ^a	24.76	6.97	69.89	4.59
France	10.32	4.15	17.85	16.89
Germany	21.03	4.07	53.36	15.32
Netherlands	37.85	4.73	82.11	17.00
Poland	12.03	6.00	10.53	17.00
Switzerland	27.68	4.79	69.42	13.50
United Kingdom	37.24	5.51	61.03	17.00
Median	23.65	5.12	53.98	16.95
IPCC(2006)-10.38, 10.77, Western Europe, cool region, 10°C/11°C	21 to 23	5.1	35.7	17 to 19

Source: Germany: Submission 2020; all other countries: UNFCCC (2019), CRF Tables

^a Denmark without Greenland and Faroe Island

4.3.10.3 Emissions of nitrogen species / Emissionen von Stickstoff-Spezies

The German N excretion as provided in Table 4.25 (i.e total N excretion including N excreted on pasture, in the milking parlour etc.) is 8% above the median. The IPCC default value of N excretion and thus the corresponding EMEP default value are too low compared to most countries in Central Europe.

Since the NH₃ IEF is not reported directly, it had to be calculated for all countries except Germany from reported NH₃ emissions and animal numbers. The German NH₃-IEF is 5% above the median.

The German IEF for direct N₂O from manure management is 3% below the median.

Die in Table 4.25 angegebene deutsche N-Ausscheidung (ohne Abzug für Weidegang, Melkstell o. ä.) liegt 8% über dem Median. Der IPCC-Standardwert für N-Ausscheidung und damit auch der entsprechende EMEP-Standardwert sind im Vergleich zu den meisten mitteleuropäischen Ländern zu niedrig.

Da der NH₃-IEF nicht berichtet wird, musste er für alle Länder außer Deutschland aus den NH₃-Emissionen und Tierzahlen berechnet werden. Der deutsche NH₃-IEF liegt 5% über dem Median. Der deutsche IEF für direktes N₂O aus dem Wirtschaftsdünger-Management liegt 3% unter dem Median.

Table 4.25: Dairy cows, 2017, international comparison of total N excretions and implied emission factors of NH₃ from manure management (housing and storage, without spreading)

	N excreted (incl. grazing)	number of animals 1000 pl	NH ₃ emission (manure management without spreading)	IEF _{NH₃}	IEF _{N₂O, direct}
	kg pl ⁻¹ a ⁻¹		Gg a ⁻¹	kg pl ⁻¹ a ⁻¹	kg pl ⁻¹ a ⁻¹
Austria	104.29	543.4	8.18	15.06	0.653
Belgium	119.69	613.3	6.27	10.22	0.716
Czech Republic	136.78	585.9	8.01	13.67	1.290
Denmark ^a	151.44	570.0	7.98	14.00	1.002
France	114.36	3587.8	58.79	16.39	0.413
Germany	121.78	4199.0	64.96	15.47	0.595
Netherlands	81.50	1671.7	22.76	13.62	0.412
Poland	90.00	2374.4	34.44	14.51	0.634
Switzerland	111.65	569.2	11.16	19.60	0.337
United Kingdom ^b	109.88	2070.7	35.90	17.34	0.505
Median	113.00			14.78	0.615
IPCC(2006)-10.59 ^c	105.1				
EMEP(2016)-3B-29 & 16	105			16.9 to 19.2	

Sources: Germany: Submission 2020; all other countries: UNFCCC (2019), CRF Tables; CEIP (2019) NFR Table

^a Denmark without Greenland and Faroe Island

^b United Kingdom: N excretion for dairy cows, all other data for dairy cattle, which is dairy cows plus all dairy replacements (including calves going on to be dairy cows)

^c IPCC N excretion: calculated using the IPCC default animal weight (600 kg)

4.3.10.4 Emissions of particulate matter and NMVOC / Partikel- und NMVOC-Emissionen

The table below shows IEF values of TSP, PM₁₀ and PM_{2.5} of the different countries scattering over a power of ten and more. It is not clear whether these large differences can be justified solely by the fact that there are different proportions of straw- and manure-based systems from country to country. Differences in grazing times contribute as well, because no TSP and PM emissions are calculated for grazing times.

Die nachstehende Tabelle zeigt IEF-Werte von TSP, PM₁₀ und PM_{2.5} der verschiedenen Länder, die über eine Zehnerpotenz und mehr streuen. Ob diese großen Unterschiede allein dadurch zu begründen sind, dass von Land zu Land unterschiedliche Anteile stroh- und gülle-basierter Systeme vorliegen, kann nicht geklärt werden. Auch Unterschiede in der Weidegangdauer wirken sich aus, da für Weidegang keine TSP- und PM-Emissionen berechnet werden.

Table 4.26: Dairy cows, 2017, international comparison of implied emission factors of TSP, PM and NMVOC

	IEF _{TSP}	IEF _{PM₁₀}	IEF _{PM_{2.5}}	IEF _{NMVOC}
	kg pl ⁻¹ a ⁻¹	kg pl ⁻¹ a ⁻¹	kg pl ⁻¹ a ⁻¹	kg pl ⁻¹ a ⁻¹
Austria	0.24	0.02	0.11	19.15
Belgium	0.78	0.35	0.23	7.98
Czech Republic	0.68	0.31	0.20	NE
Denmark ^a	1.64	0.75	0.49	17.45
France	0.73	0.33	0.22	IE
Germany	1.48	0.68	0.44	40.70
Netherlands	0.13	0.13	0.03	27.02
Poland	1.38	0.63	0.41	13.73
Switzerland	0.61	0.18	0.04	13.59
United Kingdom ^b	0.98	0.45	0.29	15.60
Median	0.75	0.34	0.22	16.52
EMEP(2016)-3B-19, 18 (Tier 1)	0.24	0.02	0.11	17.94 ^c

Source: Germany: Submission 2020; all other countries: CEIP (2019), NFR; IEFs calculated from original data

NE, IE: No data available for different reasons

^a Denmark without Greenland and Faroe Island

^b United Kingdom: Data for dairy cattle, which is dairy cows plus all dairy replacements (including calves going on to be dairy cows)

^c for feeding with silage

NMVOC-IEF values are also scattered strongly. The German value is striking, as it is far above the values of the other countries. Until Submission 2019, Germany

Auch die NMVOC-IEF-Werte streuen stark. Auffällig ist der deutsche Wert, der weit über den Werten der anderen Länder liegt. Bis Submission 2019 berechnete

calculated NMVOC emissions from manure management of cattle using the Tier 1 method (EMEP (2016)-3B-17f). Based on the TERT recommendation from the German IIR 2019 review, Germany calculates, as of Submission 2020, NMVOC emissions for cattle using the Tier 2 methodology (EMEP (2016)-3B-26f). What is striking is the big difference between the resulting Tier 2 emission factors and the Tier 1 emission factors: With $40.7 \text{ kg pl}^{-1} \text{ a}^{-1}$, the Tier 2 EF for dairy cows is more than twice as high as the Tier-1-EF with (rounded) $17.9 \text{ kg pl}^{-1} \text{ a}^{-1}$. This big difference is explained by the fact that Tier 1 and Tier 2 methodology are not consistent.

Deutschland die NMVOC-Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-management von Rindern mit der Tier-1-Methode (EMEP (2016)-3B-17f). Aufgrund der TERT-Empfehlung aus dem deutschen IIR-2019-Review berechnet Deutschland ab Submission 2020 die NMVOC-Emissionen für Rinder mit der Tier-2-Methodik (EMEP (2016)-3B-26f). Auffällig ist der große Unterschied zwischen den sich so ergebenden Tier-2-Emissionsfaktoren und den Tier-1-Emissionsfaktoren: Der Tier-2-EF für Milchkühe ist mit $40,7 \text{ kg pl}^{-1} \text{ a}^{-1}$ mehr als doppelt so hoch wie der Tier-1-EF mit rund $17,9 \text{ kg pl}^{-1} \text{ a}^{-1}$. Dieser große Unterschied erklärt sich dadurch, dass Tier-1- und Tier-2-Methodik nicht konsistent sind.

4.3.11 References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung

Table 4.27: Dairy cows, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)

			from	to
Emissions	Emissionen	CH ₄ enteric fermentation	EM1004.001	
		CH ₄ manure management	EM1005.001	
		NMVOC	EM1007.001	
		NH ₃	EM1009.001	EM1009.003
		N ₂ O	EM1009.091	
		NO	EM1009.121	
		TSP	EM1010.001	
		PM ₁₀	EM1010.031	
		PM _{2.5}	EM1010.061	
Activity data	Aktivitäten		AC1005.001	
Emission factors	Emissionsfaktoren	CH ₄ enteric fermentation	IEF1004.001	
		CH ₄ manure management	IEF1005.001	
		NMVOC	IEF1007.001	
		NH ₃	IEF1009.001	IEF1009.003
		N ₂ O	IEF1009.085	
		NO	IEF1009.113	
		TSP	IEF1010.001	
		PM ₁₀	IEF1010.029	
		PM _{2.5}	IEF1010.057	
Additional information	zusätzliche Informationen		AI1005CAT.001	AI1005CAT.035
Excretion rates	Ausscheidungen	N	EXCR.001	EXCR.005

4.4 Calves / Kälber

Calves can be brought up for replacement and for fattening. Fattening calves grow faster than calves for replacement. Therefore they show higher emissions per animal and unit of time. Due to lack of data, the relative shares of both subcategories cannot be separated. In the inventory all calves are treated as fattening calves. This is a „worst case“ estimate.

The animal category „calves“ used in the inventory comprises all cattle with weights below 125 kg an⁻¹ up to an age of 4 months. In the inventory the animal category „calves“ is part of the category „other cattle“, see also Chapter 4.9.

The emissions are calculated according to the methods compiled in Table 4.28.

For the definition of the methods see Chapter 3.2.3.

Kälber können der Aufzucht oder der Mast dienen. Mastkälber wachsen schneller als Kälber zur Aufzucht und weisen damit auch höhere Emissionen pro Tier und Zeiteinheit auf. Mangels Daten können die relativen Anteile beider Gruppen nicht abgegrenzt werden. Im Inventar werden im Sinne einer „worst-case“-Schätzung alle Kälber als Mastkälber angesehen.

Die im Inventar verwendete Tierkategorie „Kälber“ umfasst dabei alle Rinder mit einem Gewicht unter 125 kg an⁻¹ und jünger als 4 Monate. Sie sind eine Untergruppe der Gruppe der „übrigen Rinder“, siehe auch Kapitel 4.9.

Die Berechnung der Emissionen erfolgt nach den in Table 4.28 zusammengestellten Methoden.

Zur Methodendefinition siehe Kapitel 3.2.3.

Table 4.28: Calves, calculation methods applied

Species	Origin	Tier	Method applied
CH ₄	enteric fermentation	2	IPCC / national
CH ₄	manure management	2	IPCC / national
NM VOC	manure management	2	EMEP
NH ₃	manure management	2	EMEP
N ₂ O, NO, N ₂	manure management	2	IPCC / national
TSP, PM ₁₀ , PM _{2.5}	manure management	2	EMEP

4.4.1 Activity and performance data / Aktivitäts- und Leistungsdaten

4.4.1.1 Animal numbers / Tierzahlen

Cattle numbers are collected annually by the Statistical Offices of the federal states (STATLA C III 1 – vj 4) and published by the Federal Statistical Office in federal-state resolution and for Germany (STATBA FS3 R4, STATBA FS3 R4.1). The cattle numbers used to calculate the emissions in district resolution are provided by the Federal Statistical Office specifically for emissions reporting, see Chapter 4.1.1. For the uncertainties of the animal numbers see Chapter 4.1.

German statistics do not differentiate between animals of different sex and destiny.

As of 2009 official statistics count calves up to an age of 8 months; before 2009 the threshold was 6 months. In spite of that the inventory has a category „calves“ comprising young cattle up to an age of only 4 months. The numbers of calves in the inventory category „calves“ is derived from the official counts using the forementioned thresholds of age, see below. The remaining calves of the official statistics are attributed to the numbers of heifers and male beef cattle, see Chapters 4.5 and 4.6.

Rinderzahlen werden jährlich von den Statistischen Landesämtern erhoben (STATLA C III 1 – vj 4) und durch das Statistische Bundesamt in Bundeslandauflösung und für Deutschland veröffentlicht (STATBA FS3 R4, STATBA FS3 R4.1). Die zur Emissionsberechnung verwendeten Rinderzahlen in Kreisauflösung werden durch das Statistische Bundesamt speziell für die Emissionsberichterstattung bereitgestellt, siehe dazu Kapitel 4.1.1. Zu den Unsicherheiten der Tierzahlen siehe Kapitel 4.1.

Die deutsche Statistik unterscheidet nicht nach Geschlecht und Bestimmung der Kälber.

Die Officialstatistik erfasst seit 2009 Kälber bis zu einem Alter von 8 Monaten, davor bis zu einem Alter von 6 Monaten. Im Inventar umfasst die Kategorie „Kälber“ aber nur Tiere bis zu einem Alter von 4 Monaten. Deren Anzahl wird unter Verwendung der vorgenannten Altersgrenzen aus den Daten der Officialstatistik abgeleitet, siehe unten. Die damit nicht in die Inventarkategorie „Kälber“ fallenden Kälber der Officialstatistik werden den Färsen und den männlichen Mastrindern zugeschlagen, siehe Kapitel 4.5 und 4.6.

$$n_{ca} = x_{ca} \cdot n_A \quad (4.61)$$

n_{ca} number of calves considered in the inventory category „calves“
 x_{ca} fraction ($x_{ca} = 4/8$ as of 2009; $x_{ca} = 4/6$ before 2009)
 n_A number of calves in the German census (see Table 4.1)

4.4.1.2 *Animal weights and weight gains / Tiergewichte und Gewichtszunahmen*

The birth weight is of the inventory category "calves" assumed to be 41 kg an⁻¹, the final weight is defined by 125 kg an⁻¹ (DÄMMGEN ET AL., 2013). The mean live weight is estimated by the arithmetic mean (83 kg an⁻¹).

Due to the simple calculation methodology for emissions from calves, the calf weight is not used in those calculations.

Das Anfangsgewicht der Inventarkategorie „Kälber“ wird mit 41 kg an⁻¹ angesetzt, das Endgewicht mit 125 kg an⁻¹ (DÄMMGEN ET AL., 2013). Das mittlere Gewicht wird durch arithmetische Mittelung geschätzt: 83 kg an⁻¹.

Aufgrund der einfachen Berechnungsmethodik für die Emissionen aus der Kälberhaltung geht das Kalbgewicht nicht in die Berechnungen ein.

4.4.2 *Feed and energy intake / Futter- und Energieaufnahme*

The feed intake must be known to assess the amount of N excreted. However, for calves there is no need to calculate feed intake using energy requirements and the energy content of feed, because the N excretion is given as standard value, cf. Chapter 4.4.6.1.

Nevertheless, dry matter intake was calculated for reporting purposes: Amounts of colostrum, milk, concentrates, hay and silage fed as provided in Table 1 in Dämmgen et al. (2013) were multiplied with the pertinent dry matter contents given in Table 3 in Dämmgen et al. (2013). The overall dry matter content of concentrates was calculated using the mean composition of concentrates displayed in Table 2 in Dämmgen et al. (2013). The resulting dry matter intake is 681.5 kg per place and year.

For a lifespan of 18 weeks (126 days), DÄMMGEN ET AL. (2013) calculate a GE intake of 4632 MJ, corresponding to an daily GE intake of 36,8 MJ (rounded). This value can be transformed into an annual value of 13418 MJ for a continually used animal place.

Digestibility is given as 0 % for "calves on milk" by IPCC (2006) -10.73, and 65 % for "calves on forage". Digestibility is not used in the calf emission calculations because VS excretion is based on a standard value, see chapter 4.4.4.

Die Futteraufnahme wird für die Ermittlung der ausgeschiedenen N-Menge von Bedeutung. Die Berechnung mithilfe von Energiebedarf und Energiegehalt des Futters entfällt hier aber, da für die N-Ausscheidung ein Standardwert eingesetzt wird, siehe Kapitel 4.4.6.1.

Allerdings wurde für Berichtszwecke die Trockenmasseaufnahme berechnet: Die laut Tabelle 1 in Dämmgen et al. (2013) verfütterten Mengen an Kolostrum, Milch, Kraftfutter, Heu und Silage wurden mit den zugehörigen Trockenmassegehalten (aus Tabelle 3 in Dämmgen et al., 2013) multipliziert. Der effektive Trockenmassegehalt des Kraftfutters wurde anhand der in Tabelle 2 in Dämmgen et al. (2013) angegebenen mittleren Kraftfutterzusammensetzung berechnet. Die jährliche Trockenmasseaufnahme ergab sich zu 681,5 kg pro Platz.

DÄMMGEN ET AL. (2013) geben für eine Lebensdauer von 18 Wochen (126 Tage) eine GE-Aufnahme von 4632 MJ an, was einem Tageswert von rund 36,8 MJ entspricht. Für einen kontinuierlich besetzten Platz ergibt sich die GE-Jahresaufnahme zu 13418 MJ.

Die Verdaulichkeit wird von IPCC (2006)-10.73 für „calves on milk“ mit 0 % angegeben, für „calves on forage“ mit 65 %. Die Verdaulichkeit wird in den Kälber-Emissionsberechnungen nicht verwendet, weil die VS-Ausscheidung auf einem Standardwert beruht, siehe Kapitel 4.4.4.

4.4.3 *Methane from enteric fermentation / Methan aus der Verdauung*

The calculation of CH₄ emissions from enteric fermentation is based on the Tier 2 method described in Chapter 3.3.2. Input parameters are gross energy intake (see Chapter 4.4.2) for a lifespan of 18 weeks (126 days) and the CH₄ conversion factor $X_{CH_4, GE}$ (0.041 MJ MJ⁻¹ according to DÄMMGEN ET AL. (2013), S. 43).

No national data is available on the uncertainty of the emission factor for CH₄ from enteric fermentation do not exist. IPCC(2006)-10.33 estimates the uncertainty of Tier 2 approaches to be 20 %. This value is, according to the definition of uncertainty used in Chapter 3 in IPCC (2006a), interpreted as half the 95 % confidence interval. A normal distribution is assumed.

Die CH₄-Emission aus der Verdauung wird mit dem in Kapitel 3.3.2 beschriebenen Tier-2-Verfahren aus der Gesamtenergie-Aufnahme (siehe Kapitel 4.4.2) mithilfe des Methanumwandlungsfaktors $X_{CH_4, GE}$ berechnet. Dieser beträgt nach DÄMMGEN ET AL. (2013), S. 43, 0,041 MJ MJ⁻¹.

Zur Unsicherheit des Emissionsfaktors für CH₄ aus der Verdauung sind keine nationalen Daten verfügbar. IPCC(2006)-10.33 schätzt die Unsicherheit bei Anwendung von Tier-2-Verfahren auf 20 %. Dieser Wert wird im Sinne von IPCC (2006a), Kapitel 3, als halbes 95 %-Konfidenzintervall interpretiert. Es wird Normalverteilung angenommen.

4.4.4 *Methane from manure management / Methan aus dem Wirtschaftsdüngermanagement*

CH₄ emissions from manure management are quantified using a Tier 2 procedure, cf. Chapter 3.3.4.1.

Die CH₄-Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management werden mit einem Tier-2-Verfahren bestimmt, siehe Kapitel 3.3.4.1.

For a lifespan of 18 weeks (126 days), DÄMMGEN ET AL. (2013) calculate a VS excretion of 52.1 kg. This value can be transformed into an annual value of 151 kg for a continually used animal place. This annual value differs from the annual value of 144.1 kg given in DÄMMGEN ET AL. (2013), because the latter is based on calculations using an vacancy time of 7 days per round. However, that is not the way the inventory takes account of vacancy times, as vacancy times are considered in an implicit way, see Chapter 3.1.2.2.

Maximum methane producing capacity B_0 and conversion factors (MCF) for the manure storage systems are provided in Table 4.4 (see Chapter 4.2.1). In earlier years calves were kept in straw based tied systems or in deep bedding systems. Since 2003 (ban of tied systems) calves are kept solely in deep bedding systems. The frequencies of these systems have been estimated by expert judgment, see Chapter 3.4.3.2.1. In the inventory it is assumed that calves do not graze.

German data on the uncertainty of CH_4 emissions from manure management do not exist. IPCC(2006)-10.48 estimates the uncertainty of Tier 2 approaches to be 20 %. This value is, according to the definition of uncertainty used in Chapter 3 in IPCC (2006a), interpreted as half the 95 % confidence interval. A normal distribution is assumed.

4.4.5 NMVOC emissions / NMVOC-Emissionen

The calculation of the NMVOC emissions of cattle are calculated with a Tier 2 methodology, see Chapters 3.3.4.2.2 and 3.3.4.2.3.

Agricultural NMVOC emissions are reported, but are neglected regarding the NEC emission threshold, see Chapter 3.3.4.2.

Dämmgen et al. (2013) geben für eine Lebensdauer von 18 Wochen (126 Tage) eine VS-Ausscheidung von insgesamt 52,1 kg an. Daraus ergeben sich jährlich 151 kg auf einem kontinuierlich besetztem Tierplatz. Dieser Wert unterscheidet sich von dem in Dämmgen et al. (2013) angegebenen Jahreswert (144,1 kg), der unter Berücksichtigung einer Leerstandszeit von 7 Tage je Durchgang berechnet wurde. Leerstandszeiten werden im Inventar aber auf andere Weise, d. h. implizit, berücksichtigt, siehe Kapitel 3.1.2.2.

Die maximale Methan-Freisetzungskapazität B_0 sowie die Methanumwandlungsfaktoren (MCF) der Lager-systeme sind Table 4.4 in Kapitel 4.2.1 zu entnehmen. Kälber wurden in früheren Jahren in strohbasierter Anbindehaltung oder auf Tiefstreu gehalten. Seit 2003 erfolgt die Haltung aufgrund des Verbots der Anbindehaltung ausschließlich auf Tiefstreu. Die Häufigkeitsverteilung dieser Systeme wurde durch ein Expertenurteil abgeschätzt, siehe Kapitel 3.4.3.2.1. Weidegang ist im Inventar nicht vorgesehen.

Deutsche Zahlen zur Unsicherheit der CH_4 -Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management liegen nicht vor. IPCC(2006)-10.48 schätzt die Unsicherheit bei Anwendung von Tier-2-Verfahren auf 20 %. Dieser Wert wird im Sinne von IPCC (2006a), Kapitel 3, als halbes 95 %-Konfidenzintervall interpretiert. Es wird Normalverteilung angenommen.

Die NMVOC-Emissionen von Rindern werden mit einer Tier-2-Methode berechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.2 und 3.3.4.2.3.

Landwirtschaftliche NMVOC-Emissionen werden zwar berichtet, aber bzgl. der NEC-Emissionsobergrenze nicht angerechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.

4.4.6 Emissions of nitrogen species / Emissionen von Stickstoff-Spezies

For the methodology of the emission calculation see chapter 3.3.4.3. The relevant sub-aspects are discussed below.

Zur Methodik der Emissionsberechnung siehe Kapitel 3.3.4.3. Auf die relevanten Teilaspekte wird nachfolgend eingegangen.

4.4.6.1 N excretion / N-Ausscheidung

For a lifespan of 18 weeks (126 days), DÄMMGEN ET AL. (2013) calculate an excretion of N of 7.0 kg. This excretion can be transformed by multiplying with 365/126 into an annual value of 20.3 kg for a continually used animal place. This annual value differs from the annual value of 19.3 kg given in DÄMMGEN ET AL. (2013), because the latter is based on calculations using an vacancy time of 7 days per round. However, vacancy times are taken into account differently by the inventory, i. e. in an implicit way, see Chapter 3.1.2.2.

The relative TAN content of the N excretions is assumed to be 0.64 kg kg^{-1} (as calculated by DÄMMGEN ET AL. (2013)).

Dämmgen et al. (2013) berechnen für eine Lebensdauer von 18 Wochen (126 Tage) eine N-Ausscheidung von 7,0 kg. Auf 365 Tage umgerechnet ergibt sich die N-Jahresausscheidung pro kontinuierlich besetztem Tierplatz mit 20,3 kg. Dieser Wert unterscheidet sich von dem in Dämmgen et al. (2013) angegebenen Jahreswert (19.3 kg), der unter Berücksichtigung einer Leerstandszeit von 7 Tage je Durchgang berechnet wurde. Leerstandszeiten werden im Inventar aber auf andere Weise, d. h. implizit, berücksichtigt, siehe Kapitel 3.1.2.2.

Der relative Anteil von TAN an der N-Ausscheidung wird mit 0,64 $kg\ kg^{-1}$ aus DÄMMGEN ET AL. (2013) übernommen.

4.4.6.2 *N inputs with straw / N-Einträge mit Stroh*

For calves, straw-based tied systems (only up to the year 2002) and deep bedding systems have to be considered, see Chapter 4.4.4.

N inputs with straw are taken into account. The properties of straw are given in Chapter 3.3.4.3.2. All straw N is considered to be organic N, of which 50 % may mineralize to TAN during storage.

The amount of bedding material is $2.5 \text{ kg pl}^{-1} \text{ d}^{-1}$ fresh matter is (KTBL, 2006b, pg. 425, mean of the two data sets for "Tiefstreustall" [deep bedding]) or $12.5 \cdot 10^{-3} \text{ kg N (pl} \cdot \text{d)}^{-1}$ or $6.2 \cdot 10^{-3} \text{ kg TAN (pl} \cdot \text{d)}^{-1}$.

Für Kälber ist die strohbasierte Anbindehaltung (nur bis zum Jahr 2002) und die Haltung auf Tiefstreu zu berücksichtigen, siehe Kapitel 4.4.4.

Der N-Eintrag mit Einstreu (Stroh) wird berücksichtigt. Zu den Eigenschaften von Stroh siehe Kapitel 3.3.4.3.2. Das gesamte Stroh-N wird als organisch gebundenes N angesehen, von dem 50 % während des Lagers zu TAN mineralisieren.

Die Frischmasse der Einstreu beträgt $2,5 \text{ kg pl}^{-1} \text{ d}^{-1}$ (KTBL, 2006b, S. 425, Mittelwert aus „Tiefstreustall, Zweiflächenbucht“ und „Tiefstreustall, Einflächbucht“) bzw. $12,5 \cdot 10^{-3} \text{ kg N (pl} \cdot \text{d)}^{-1}$, entsprechend $6,2 \cdot 10^{-3} \text{ kg TAN (pl} \cdot \text{d)}^{-1}$.

4.4.6.3 *Emissions during housing and grazing / Emissionen aus dem Stall und auf der Weide*

The NH₃ emission factors for the housing (straw-based tied systems; deep litter) are provided in Table 4.3. Grazing is not considered for calves.

Die NH₃-Emissionsfaktoren für den Stall (strohbasierte Anbindehaltung; Tiefstreu) werden in Table 4.5 bereitgestellt. Weidegang ist für Kälber nicht vorgesehen.

4.4.6.4 *Emissions from storage and spreading / Emissionen aus Lager und Ausbringung*

For the emission factors for NH₃, N₂O, NO and N₂ from storage see Chapters 4.2 and 3.3.4.3.5.

The emission factors of NH₃ for the different spreading techniques and times before incorporation are given in Chapter 4.2.2.3.

NO emissions from manure management are reported (as NO_x), but are neglected regarding the NEC emission threshold, see Chapter 3.3.4.2.

Für die Emissionsfaktoren für NH₃, N₂O, NO und N₂ aus dem Lager siehe Kapitel 4.2 und 3.3.4.3.5.

Für die Emissionsfaktoren von NH₃ für die verschiedenen Ausbringungstechniken und Einarbeitungszeiten wird auf Kapitel 4.2.2.3 verwiesen.

NO aus dem Wirtschaftsdünger-Management wird berichtet (als NO_x), bzgl. der NEC-Emissionsobergrenze aber nicht angerechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.

4.4.6.5 *Indirect N₂O from manure management / Indirektes N₂O aus dem Wirtschaftsdünger-Management*

Indirect N₂O emissions from manure management (housing, storage; without spreading) are calculated according to Chapter 3.3.4.3.6. See Chapter 3.3.4.3.6 also for the uncertainties of activity data and emission factor.

(Indirect N₂O emissions from agricultural soils after spreading of manures or digested manures are reported in Sector 3.D. For the calculation of these emissions see Chapter 12.)

Indirekte N₂O-Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management (Stall, Lager; ohne Ausbringung) werden nach Kapitel 3.3.4.3.6 berechnet. Siehe dort auch wegen der Unsicherheiten von Aktivitätswert und Emissionsfaktor.

(Indirekte N₂O-Emissionen als Folge der Ausbringung von Wirtschaftsdüngern und Wirtschaftsdünger-Gärresten werden im Sektor 3.D berichtet. Zur Berechnung siehe Kapitel 12.)

4.4.6.6 *Uncertainty of emission factors and activity data / Unsicherheit der Emissionsfaktoren und Aktivitätsdaten*

For the uncertainties of the emission factors see Chapter 4.2.2.4 and 11.2.2.

The uncertainty of N excretion is discussed in Chapter 14.4.1. For the uncertainty of the amount of N spreaded see Chapter 11.2.1.

Zu den Unsicherheiten der Emissionsfaktoren siehe Kapitel 4.2.2.4 und 11.2.2.

Die Unsicherheit der N-Ausscheidung wird in Kapitel 14.4.1 diskutiert. Zur Unsicherheit der zur Ausbringung kommenden N-Menge siehe Kapitel 11.2.1.

4.4.7 *Emission of particulate matter / Partikelemissionen*

The method to calculate particle emissions is described in Chapter 3.3.4.5. The emission factors are listed in Table 4.29. For the uncertainty of the emission factors see Chapter 3.3.4.5.

Zur Berechnungsmethode für Partikelemissionen wird auf Kapitel 3.3.4.5 verwiesen. Die Emissionsfaktoren sind in Table 4.29 angegeben. Zur Unsicherheit der Emissionsfaktoren siehe Kapitel 3.3.4.5.

Table 4.29: Calves, emission factors for particle emissions from housing

Housing type	Haltungssystem	Emission factor for TSP kg pl ⁻¹ a ⁻¹	Emission factor for PM ₁₀ kg pl ⁻¹ a ⁻¹	Emission factor for PM _{2.5} kg pl ⁻¹ a ⁻¹
straw based	strohbasierend	0.35	0.16	0.10

Source: EMEP(2016)-3B-53, Table A1.6 (with TSP = ID [inhalable dust])

4.4.8 References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung

Table 4.30: Calves, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)

			from	to
Emissions	Emissionen	CH ₄ enteric fermentation	EM1004.002	
		CH ₄ manure management	EM1005.002	
		NMVOC	EM1007.002	
		NH ₃	EM1009.004	EM1009.006
		N ₂ O	EM1009.092	
		NO	EM1009.122	
		TSP	EM1010.002	
		PM ₁₀	EM1010.032	
		PM _{2.5}	EM1010.062	
Activity data	Aktivitäten		AC1005.002	
Emission factors	Emissionsfaktoren	CH ₄ enteric fermentation	IEF1004.002	
		CH ₄ manure management	IEF1005.002	
		NMVOC	IEF1007.002	
		NH ₃	IEF1009.004	IEF1009.006
		N ₂ O	IEF1009.086	
		NO	IEF1009.114	
		TSP	IEF1010.002	
		PM ₁₀	IEF1010.030	
		PM _{2.5}	IEF1010.058	
Additional information	zusätzliche Informationen		AI1005CAT.036	AI1005CAT.066
Excretion rates	Ausscheidungen	N	EXCR.006	EXCR.010

4.5 Heifers / Färsen

In the inventory, heifers are female cows that are heavier than 125 kg an⁻¹ and have not yet given birth to a calf. In addition, the animal category “heifers” also comprises female young cattle for slaughter, see Chapter 4.5.1.1.

In the inventory, the category “heifers” is a subcategory of „other cattle“, see Chapter 4.9.

The emissions are calculated according to the methods compiled in Table 4.31.

For the definition of the methods see Chapter 3.2.3.

Als Färsen werden im Inventar die weiblichen Kühe bezeichnet, die schwerer als 125 kg an⁻¹ sind und noch nicht gekalbt haben. Zusätzlich umfasst die Tierkategorie „Färsen“ auch junge weibliche Schlachttiere, siehe Kapitel 4.5.1.1.

Im Inventar ist die Kategorie „Färsen“ eine Unterkategorie der „übrigen Rinder“, siehe Kapitel 4.9.

Die Berechnung der Emissionen erfolgt nach den in Table 4.31 zusammengestellten Methoden.

Zur Methodendefinition siehe Kapitel 3.2.3.

Table 4.31: Heifers, calculation methods applied

Species	Origin	Tier	Method applied
CH ₄	enteric fermentation	2	IPCC / national
CH ₄	manure management	2	IPCC / national
NM VOC	manure management	2	EMEP
NH ₃	manure management	3	EMEP / national
N ₂ O, NO, N ₂	manure management	2	IPCC / national
TSP, PM ₁₀ , PM _{2.5}	manure management	2	EMEP

4.5.1 Activity and performance data /Aktivitäts- und Leistungsdaten

4.5.1.1 Animal numbers / Tierzahlen

The subcategory “heifers” in this inventory includes the census subcategories “female young cattle between 8 months and 1 year” (before 2009: “female young cattle between 6 months and 1 year”), “female young cattle from 1 to 2 years for slaughtering”, “female young cattle from 1 to 2 years for replacement”, “female cattle over 2 years for slaughtering”, “female cattle over 2 years for replacement”.

Additionally, the female share of the calves not considered in Chapter 4.4.1.1 is taken into account. Its calculation (see the term in squared brackets in the subsequent equation) is based on the assumption that the gender distribution is equal to that of young cattle.

Im Inventar umfasst die Tierkategorie „Färsen“ die Tierzahlen aus der Statistik für „Weibliches Jungvieh 8 Monate bis 1 Jahr“ (vor 2009: „Weibliches Jungvieh 6 Monate bis 1 Jahr“), „Weibliches Jungvieh 1 bis 2 Jahre zum Schlachten“, „Weibliches Jungvieh 1 bis 2 als Zucht- und Nutztiere“, „Weibliche Rinder über 2 Jahre (Schlachtfärsen)“ sowie „Weibliche Rinder über 2 Jahre (Zucht- und Nutzfärsen)“.

Hinzu kommt der weibliche Anteil der in Kapitel 4.4.1.1 nicht berücksichtigten Kälber, wobei angenommen wird, dass die Geschlechtsverteilung gleich der des Jungviehs ist, siehe eckige Klammer in nachfolgender Gleichung:

$$n_{bf} = n_C + n_E + n_F + n_H + n_I + n_A \cdot \left[(1 - x_{ca}) \cdot \frac{n_C}{n_B + n_C} \right] \quad (4.62)$$

n_{bf} number of heifers considered

n_A etc. animal numbers of type A (etc.) in the German census (see Table 4.1)

x_{ca} fraction ($x_{ca} = 4/8$ as of 2009; $x_{ca} = 4/6$ before 2009), see Chapter 4.4.1.1

Cattle numbers are collected annually by the Statistical Offices of the federal states (STATLA C III 1 – vj 4) and published by the Federal Statistical Office in federal-state resolution and for Germany (STATBA FS3 R4, STATBA FS3 R4.1). The cattle numbers used to calculate the emissions in district resolution are provided by the Federal Statistical Office specifically for emissions reporting, see Chapter 4.1.1. For the uncertainties of the animal numbers see Chapter 4.1.

Rinderzahlen werden jährlich von den Statistischen Landesämtern erhoben (STATLA C III 1 – vj 4) und durch das Statistische Bundesamt in Bundeslandauflösung und für Deutschland veröffentlicht (STATBA FS3 R4, STATBA FS3 R4.1). Die zur Emissionsberechnung verwendeten Rinderzahlen in Kreisauflösung werden durch das Statistische Bundesamt speziell für die Emissionsberichterstattung bereitgestellt, siehe dazu Kapitel 4.1.1. Zu den Unsicherheiten der Tierzahlen siehe Kapitel 4.1.

4.5.1.2 *Animal weights and weight gains / Tiergewichte und Gewichtszunahmen*

Data of initial and final weights of heifers as well as of the duration of that phase of life, and consequently of the daily weight gain are hardly available in Germany. As described in the two following sections, they are to be derived from other data.

Daten über Anfangs- und Endgewichte, Dauer der Haltung und demzufolge auch tägliche Gewichtszunahmen sind in Deutschland nur ausnahmsweise verfügbar. Sie sind, wie in den zwei folgenden Abschnitten beschrieben, aus anderen Daten abzuleiten.

4.5.1.2.1 *Animal weights / Tiergewichte*

German census data differentiate between heifers for slaughter and for replacement and use. However, existing management data describe heifers without differentiation. About 5 % of the heifers above 1 a are considered to be slaughtered. As the decision to slaughter an animal or use it for replacement is made comparatively late, it is assumed that, on average, the animals are kept and fed in the same way.

Die deutschen statistischen Daten unterscheiden zwischen Mastfärsen und Färsen für „Zucht und Nutzung“. Kennzahlen zu den Haltungsvorfahren liegen allerdings nur für Färsen insgesamt vor. Etwa 5 % der Tiere, die älter als 1 a sind, werden als Schlachtfärsen gemeldet. Da die Entscheidung, ob ein Tier zur Remontierung dient oder nicht, relativ spät fällt, wird davon ausgegangen, dass die Tiere im Mittel einheitlich gehalten und ernährt werden.

The initial weight of heifers is assumed to 125 kg kg an⁻¹, which is the final weight of the inventory category „calves“.

Das Anfangsgewicht der Kategorie „Färsen“ wird im Inventar mit 125 kg an⁻¹ abgesetzt, dem Endgewicht der Kategorie „Kälber“.

The final live weight of heifers is derived from carcass weight (for the definition of carcass weight see Chapter 3.1.2.4). For the calculation of the final live weight it is assumed that the equation used for dairy cows (see DÄMMGEN et al., 2010a) applies to heifers as well:

Das Lebendendgewichts der Färsen wird als Funktion des Schlachtgewichts berechnet (zur Schlachtgewicht-Definition s. Kapitel 3.1.2.4). Dazu wird angenommen, dass folgende, von DÄMMGEN et al. (2010a) für Milchkühe angegebenen Gleichung auch für Färsen verwendbar ist:

$$w_{fin,bf} = a + b \cdot w_{bf,cw}$$

(4.63)

$w_{fin,bf}$	final live weight of heifers (in kg an ⁻¹)
a	constant ($a = 221 \text{ kg an}^{-1}$)
b	coefficient ($b = 1.46 \text{ kg kg}^{-1}$)
$w_{bf,cw}$	carcass weight of heifers (in kg an ⁻¹)

For the carcass weights of heifers see Table 4.32. As The table size does not allow to present the complete timeseries, every other year is omitted before 2010.

Die Schlachtgewichte von Färsen sind in Table 4.32 zusammengestellt. Aus Platzgründen wurde bis 2010 jedes zweite Jahr weggelassen.

The missing data for the new federal states (former GDR) and the year 1990 were replaced with the respective data for 1991. For the City States, data for Hamburg were taken from Schleswig-Holstein, for Bremen from Niedersachsen, and for Berlin those from Brandenburg.

Für die fehlenden Daten im Jahr 1990 bei den Neuen Bundesländern werden die Daten von 1991 eingesetzt. Für die Stadtstaaten werden bei Hamburg die Daten von Schleswig-Holstein eingesetzt, bei Bremen die von Niedersachsen und bei Berlin die von Brandenburg.

Table 4.32: Heifers, carcass weights (in kg an⁻¹)

	1990	1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
BW	275	271	280	276	282	284	287	280	294	290	294	292	295	296	296	297	299	303	308
BY	288	287	297	291	296	303	303	300	308	306	309	309	311	312	311	315	316	319	324
BB		243	260	259	262	271	268	263	270	253	235	245	239	252	253	261	262	266	271
HE	269	277	277	273	263	274	260	249	270	248	264	286	282	285	282	287	291	293	294
MV		235	242	246	247	254	258	256	252	253	255	259	255	255	257	265	264	268	272
NI	235	240	231	275	280	286	286	280	285	279	271	278	286	286	284	283	280	278	283
NW	268	272	238	280	278	280	278	273	278	270	267	257	242	247	252	257	258	255	272
RP	251	257	274	264	261	264	264	260	268	262	264	268	272	272	271	272	274	266	272
SL	229	260	262	260	257	257	256	278	287	287	286	287	287	292	289	290	296	292	291
SN		240	254	234	248	245	250	241	254	258	250	252	251	253	255	262	263	266	266
ST		228	268	251	250	261	271	258	258	258	243	248	250	252	255	258	262	254	253
SH	271	273	281	275	279	286	286	281	288	288	290	285	282	281	282	291	292	294	292
TH		240	268	253	256	264	258	242	255	257	252	255	253	258	258	265	265	270	270

Source: Calculated from data in STATBA FS3 R4.2.1 (Schlachtungen und Fleischerzeugung); STATISTISCHES BUNDESAMT, GENESIS-Online Datenbank

4.5.1.2.2 *Life span and mean weight gain / Dauer des Lebensabschnitts und mittlere Gewichtszunahme*

The lifespan of a heifer is calculated from the time, when calves reach a weight of 125 kg an⁻¹, and the age of first calving. For this inventory, it is assumed that the heifers' phase of life begins at the age of four months (see Chapter 4.4.1.1). The age of first calving is available as complete time series, as provided by the breeders' association, see Table 4.16. According to this data the age of first calving is about 28 months.

No daily weight gain data are provided by the reference cited above. Hence they have to be estimated from weight data of slaughtered heifers: From the final weight of a calf, the final live weight of the heifer (as calculated from carcass weights) and the times mentioned above, the mean weight gain can be assessed as

$$\frac{\Delta w_{bf}}{\Delta t} = \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{w_{fin, bf} - w_{fin, ca}}{\tau_{calf} - \tau_{fin, ca}} \quad (4.64)$$

$\Delta w_{bf}/\Delta t$	mean daily weight gain of a heifer (in kg an ⁻¹ d ⁻¹)
α	time units conversion factor ($\alpha = 365 \text{ d a}^{-1}$)
$w_{fin, bf}$	final live weight of a heifer (in kg an ⁻¹)
$w_{fin, ca}$	final weight at the end of calf lifespan (in kg an ⁻¹)
τ_{calf}	age at first calving (in a)
$\tau_{fin, ca}$	end of calf lifespan (in a)

4.5.2 *Energy requirements / Energiebedarf*

The ME requirements of a heifer include the ME requirements for growth, maintenance, pregnancy and pasture.

The daily total ME requirements of a heifer, which is typical in Germany, is stated by the Committee for feeding standards of the Society of Nutrition Physiology (Ausschuss für Bedarfsnormen der Gesellschaft für Ernährungsphysiologie) in GfE (2001), Table 1.5.3, see also Table 4.33 below.

Der Lebensabschnitt „Färse“ liegt zwischen dem Zeitpunkt, zu dem das Kalb das Gewicht 125 kg an⁻¹ erreicht (im Inventar im Alter von vier Monaten siehe Kapitel 4.4.1.1) und dem Erstkalbealter. Daten zum Erstkalbealter sind als lückenlose Zeitreihe für ganz Deutschland aus Meldungen der Züchterverbände verfügbar (Table 4.16). Danach liegt das Erstkalbealter aktuell bei rund 28 Monaten.

Tägliche Gewichtszunahmen werden durch die erwähnten Quellen nicht bereitgestellt und müssen geschätzt werden. Hierzu wird auf Daten aus dem Schlachtfärsenbereich zurückgegriffen: Aus dem Endgewicht der Kälberhaltung, den errechneten Lebendgewichten vor Schlachtung und den oben beschriebenen Zeitpunkten folgt die mittlere Gewichtszunahme:

Der ME-Bedarf einer Färse umfasst die ME-Anforderungen für Wachstum, Erhaltung, Trächtigkeit und Weidegang.

Der in Deutschland typische tägliche Gesamt-ME-Bedarf einer Färse wird vom Ausschuss für Bedarfsnormen der Gesellschaft für Ernährungsphysiologie in GfE (2001), Tabelle 1.5.3, angegeben, siehe nachfolgende Table 4.33.

Table 4.33: Heifers, daily ME requirements as a function of animal weight and weight gain (in MJ an⁻¹ d⁻¹)

weight gain Δw_{bf} in g an ⁻¹ d ⁻¹	weight w in kg an ⁻¹								
	150	200	250	300	350	400	450	500	550
400			41.6	47.5	53.2	58.9	64.6	70.1	75.5
500	30.5	37.4	43.9	50.4	56.6	62.8	69.0	75.1	81.4
600	32.3	39.6	46.7	53.6	60.5	67.3	74.2	81.0	88.0
700	34.1	42.0	49.6	57.2	64.7	72.2	79.9	87.5	95.4
800	36.0	44.3	52.6	60.9	69.1	77.5	86.0	94.5	103.2
900		46.6	55.8	64.6	73.7	83.2	92.7	102.0	111.6
1000			59.0	68.6	78.5	89.3	100.0	110.0	120.6

Source: GfE (2001), pg. 29, Table 1.5.3

The national data provided in Table 4.33 are preferred to deriving the ME requirement from the GE calculation according to IPCC (2006), p. 10.15 ff, because they better reflect the conditions of heifer husbandry in Germany.

For the emission calculations, the GfE data of the daily ME requirement were converted into a continuous

Die in Table 4.33 angegebenen nationalen Daten werden einer Ableitung des ME-Bedarfs aus der GE-Berechnung nach IPCC (2006), S. 10.15 ff, vorgezogen, weil sie die Bedingungen der Färsenhaltung in Deutschland besser abbilden.

Die GfE-Daten des täglichen ME-Bedarfs wurden für die Emissionsberechnungen in eine kontinuierliche

function of mean growth rate and final weight (see Equation (4.65)³⁰) that describes the cumulative ME requirements during the life stage "heifer" (see Chapter 4.5.1.2.2). The coefficients of the equation implicitly account for the initial weight of 125 kg.

Funktion von mittlerer Zuwachsrate und Endgewicht überführt (siehe Gleichung (4.65)³⁰), die den kumulativen ME-Bedarf während des Lebensabschnitts „Färsen“ (siehe Kapitel 4.5.1.2.2) beschreibt. Die Koeffizienten der Gleichung berücksichtigen implizit das Anfangsgewicht von 125 kg.

$$\Sigma ME_{bf} = (o_1 \cdot \Delta w_{bf} + o_2) \cdot w_{bf,fin}^2 + (p_1 \cdot \Delta w_{bf} + p_2) \cdot w_{bf,fin} + (q_1 \cdot \Delta w_{bf} + q_2) \quad (4.65)$$

ΣME_{bf}	cumulative metabolisable energy requirement of a heifer for growth and maintenance (in MJ an ⁻¹)
o_1	constant ($o_1 = -0.095597 \text{ MJ kg}^{-3} \text{ an}^2 \text{ d}$)
Δw_{bf}	mean daily weight gain of a heifer (in kg an ⁻¹ d ⁻¹)
o_2	constant ($o_2 = 0.174377 \text{ MJ kg}^{-2} \text{ an}$)
$w_{bf,fin}$	final animal weight (in kg an ⁻¹)
p_1	constant ($p_1 = -50.0040 \text{ MJ kg}^{-2} \text{ an d}$)
p_2	constant ($p_2 = 50.4403 \text{ MJ kg}^{-1}$)
q_1	constant ($q_1 = 7763,63 \text{ MJ kg}^{-1} \text{ d}$)
q_2	constant ($q_2 = -9008.23 \text{ MJ an}^{-1}$)

This equation allows taking into account the temporal development of weight and growth rate since 1990 (see tables AI1005CAT.067 and AI1005CAT.067 in the data collection described in Chapter 2.4).

A statistical survey of data on the grazing of heifers is only available for 2010 (see Chapter 3.4.3.2.7). This data is available at federal state level. It shows that, on average for Germany, heifers were on pasture during 19.8 % of the year 2010. In the absence of more recent data, the 2010 federal state data were retained in the inventory for all subsequent years of the time series. However, as the grazing data differ between the federal states and the heifer populations of the federal states developed differently, the average German grazing time for 2018 is 19.9 % of the year. The RAUMIS data used for the years 1990 to 1993 (see Chapter 3.4.3.1) show an average grazing period of 19.6 % of the year. Since the data come from different sources, it is not possible to verify whether such an increase from 19.6 % to 19.9 % actually took place. It was therefore decided not to take into account a time trend of the grazing time in the ME calculations.

Using Equation (4.65) allows calculating the mean daily ME requirements:

$$ME_{bf} = \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{\Sigma ME_{bf}}{\tau_{fin,bf} - \tau_{fin,ca}} \quad (4.66)$$

ME_{bf}	mean daily metabolisable energy requirements of a heifer (in MJ an ⁻¹ d ⁻¹)
α	time units conversion factor ($\alpha = 365 \text{ d a}^{-1}$)
ΣME_{bf}	cumulative metabolisable energy requirement of a heifer for growth and maintenance (in MJ an ⁻¹), see above
$\tau_{fin,bf}$	date of first calving (in a), see Chapter 4.5.1.2.2
$\tau_{fin,ca}$	end of calf lifespan (in a), see Chapter 4.5.1.2.2

Mit dieser Gleichung wird die zeitliche Entwicklung von Gewicht und Zuwachsrate seit 1990 (siehe Tabellen AI1005CAT.067 und AI1005CAT.067 in der in Kapitel 2.4 beschriebenen Datensammlung) berücksichtigt.

Eine statistische Erhebung von Daten zum Weidegang von Färsen gibt es nur für das Jahr 2010 (siehe Kapitel 3.4.3.2.7). Diese Daten liegen auf Bundesland-Ebene vor. Danach standen Färsen im deutschen Durchschnitt 19,8 % des Jahres auf der Weide. Mangels neuerer Zahlen wurden die Bundesland-Daten von 2010 im Inventar für alle späteren Jahre beibehalten. Da sich die Daten zwischen den Bundesländern unterscheiden und die Färsenpopulationen in den Bundesländern sich unterschiedlich entwickelten, ergibt sich für 2018 eine mittlere deutsche Weidezeit von 19,9 % des Jahres. Aus den für die Jahre 1990 bis 1993 verwendeten RAUMIS-Daten (siehe Kapitel 3.4.3.1) folgt für Deutschland eine durchschnittliche Weidezeit von 19,6 % des Jahres. Da die Daten aus unterschiedlichen Quellen stammen, lässt sich nicht überprüfen, ob ein solcher Anstieg von 19,6 % auf 19,9 % tatsächlich stattgefunden hat. Es wird daher auf eine Berücksichtigung eines zeitlichen Trends der Weidedauer in der ME-Berechnung verzichtet.

Mit dem Ergebnis aus Gleichung (4.65) ergibt sich für den mittleren täglichen ME-Bedarf:

³⁰ The derivation of this equation is described in HAENEL et al. (2010), Chapter 4.5.2, where, however, the coefficients provided were incorrect, leading to underestimation of ME-requirements.

4.5.3 Feed and energy intake / Futter- und Energieaufnahme

The data provided in KTBL (2006), pg. 441, allow the derivation of a function quantifying the share of ME that is covered by the (annual) input of concentrates:

Die Daten in KTBL (2006), S. 441, ermöglichen die Ableitung einer Funktion, die die durch Kraftfutter der pro Jahr aufzunehmende ME-Menge beschreibt:

$$\Sigma ME_{\text{conc}} = \alpha \cdot ME_{\text{bf}} \cdot (r - s \cdot \alpha_m \cdot \tau_{\text{fin, bf}}) \quad (4.67)$$

ΣME_{conc}	share of ΣME_{bf} covered by concentrates (in MJ an ⁻¹)
α	time units conversion factor ($\alpha = 365 \text{ d a}^{-1}$)
ME_{bf}	mean daily metabolisable energy requirements of a heifer (in MJ an ⁻¹ d ⁻¹), see Chapter 4.5.2
r	constant ($r = 0.7694 \text{ MJ MJ}^{-1}$), derived from data in KTBL (2006), pg. 441
s	constant ($s = 0.0231 \text{ MJ MJ}^{-1} \text{ month}^{-1}$), derived from data in KTBL (2006), pg. 441
α_m	time units conversion factor ($\alpha_m = 12 \text{ month a}^{-1}$)
$\tau_{\text{fin, bf}}$	date of first calving (in a), see Chapter 4.5.1.2.2

The remainder of the energy required is provided by roughage, consisting of pasture grass, grass silage and maize silage.

Der darüber hinaus gehende Energiebedarf wird aus dem Grundfutter bestritten. Er setzt sich zusammen aus Beiträgen aus Weidegras, Grassilage und Maissilage.

$$\Sigma ME_{\text{rough}} = \Sigma ME_{\text{bf}} - \Sigma ME_{\text{conc}} = \Sigma ME_{\text{ma-s}} + \Sigma ME_{\text{gr-g}} + \Sigma ME_{\text{gr-s}} \quad (4.68)$$

ΣME_{rough}	annual intake of metabolisable energy with roughage (in MJ pl ⁻¹ a ⁻¹)
ΣME_{bf}	mean annual total of intake of metabolisable energy per heifer place, defined by the requirements for growth, maintenance and pregnancy (in MJ pl ⁻¹ a ⁻¹), see Chapter 4.5.2
ΣME_{conc}	annual intake of metabolisable energy with concentrates (in MJ pl ⁻¹ a ⁻¹)
$\Sigma ME_{\text{gr-g}}$	annual intake of metabolisable energy with grass during grazing (in MJ an ⁻¹ a ⁻¹)
$\Sigma ME_{\text{gr-s}}$	annual intake of metabolisable energy with grass silage (in MJ an ⁻¹ a ⁻¹)
$\Sigma ME_{\text{ma-s}}$	annual intake of metabolisable energy with maize silage (in MJ an ⁻¹ a ⁻¹)

The share of ME covered with maize silage input is calculated as follows:

Der Energiebeitrag aus Maissilage wird wie folgt berechnet:

$$\Sigma ME_{\text{ma-s}} = (1 - x_{\text{gr}}) \cdot \Sigma ME_{\text{rough}} \quad (4.69)$$

$\Sigma ME_{\text{ma-s}}$	annual intake of metabolisable energy with maize silage (in MJ pl ⁻¹ a ⁻¹)
x_{gr}	share of ME contribution by grass and grass silage (in MJ MJ ⁻¹), see below
ΣME_{rough}	annual intake of metabolisable energy with roughage (in MJ pl ⁻¹ a ⁻¹)

The share of ME resulting from the input of pasture grass and grass silage is unknown. As an alternative, the share of the roughage dry matter taken in with pasture grass and grasssilage is used. This value is supplied with RAUMIS (DÖHLER et al., 2002).

Der relative ME-Anteil, der aus Weidegras und Grassilage bereitgestellt wird, ist nicht bekannt. Als Ersatz wird der relative Anteil der Trockenmasse von Weidegras und Grassilage an der Gesamttrockenmasse des Raufutters verwendet. Dieser Wert wird von RAUMIS bereitgestellt (DÖHLER et al., 2002).

The energy input with pasture grass is given by:

Für den Energiebeitrag aus Weidegras gilt:

$$\Sigma ME_{\text{gr-g}} = ME_{\text{gr}} \cdot \tau_{\text{gr}} \quad (4.70)$$

$\Sigma ME_{\text{gr-g}}$	annual intake of metabolisable energy with grass during grazing (in MJ pl ⁻¹ a ⁻¹)
τ_{gr}	duration of grazing (in d a ⁻¹), see above

with

$$ME_{\text{gr}} = u + v \cdot \alpha_m \cdot \tau_{\text{fin, bf}} \quad (4.71)$$

ME_{gr}	daily intake of metabolisable energy with grass during grazing (in MJ pl ⁻¹ d ⁻¹)
u	constant ($u = 43.65 \text{ MJ pl}^{-1} \text{ d}^{-1}$), derived from data in KTBL (2006), pg. 441
v	constant ($v = 0.4573 \text{ MJ pl}^{-1} \text{ d}^{-1} \text{ month}^{-1}$), derived from data in KTBL (2006), pg. 441
α_m	time units conversion factor ($\alpha_m = 12 \text{ month a}^{-1}$)
$\tau_{\text{fin, bf}}$	date of first calving (in a), see Chapter 4.5.1.2.2

Accordingly, the share of ME supplied with grass silage is

$$\Sigma ME_{gr-s} = \Sigma ME_{rough} - \Sigma ME_{ma-s} - \Sigma ME_{gr-g} \quad (4.72)$$

ΣME_{gr-s}	annual intake of metabolisable energy with grass silage (in MJ an ⁻¹ a ⁻¹)
ΣME_{rough}	annual intake of metabolisable energy with roughage (in MJ pl ⁻¹ a ⁻¹)
ΣME_{ma-s}	annual intake of metabolisable energy with maize silage (in MJ an ⁻¹ a ⁻¹)
ΣME_{gr-g}	annual intake of metabolisable energy with grass during grazing (in MJ an ⁻¹ a ⁻¹)

The respective amounts of concentrates, maize silage, grass silage and pasture grass taken in to meet the ME requirements can be obtained from the specific ME contents of the various diet constituents. Concentrates serve as a example for the calculation procedure:

$$\Sigma m_{F, DM, conc} = \frac{\Sigma ME_{conc}}{\eta_{ME, conc}} \quad (4.73)$$

$\Sigma m_{F, DM, conc}$	annual intake of dry matter with concentrates (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
ΣME_{conc}	annual intake of metabolisable energy with concentrates (in MJ pl ⁻¹ a ⁻¹)
$\eta_{ME, conc}$	content of metabolisable energy in concentrates, related to dry matter (in MJ kg ⁻¹), see Table 4.34

Table 4.33 shows the feed components used in the inventory and their properties. Regarding ME content, crude protein content, ash content and digestibility of organic matter they correspond to dairy cow feeding, see Table 4.17. For the heifers' concentrates the standard concentrate MLF 18/3 for dairy cow feeding was adopted as proxy. Although heifers do not receive MLF 18/3, its ME and crude protein contents correspond to the respective values of the concentrates ("Kälberkraftfutter") used in young cattle rearing according to DLG (2005), p. 26/27, see DLG (2005), p. 13. Digestibility and metabolizability of energy (X_{DE} , X_{ME}) describe the ratios of the values of η_{DE} and η_{ME} to η_{GE} to be found in Table 4.17 (see also Chapter 3.3.1).

The data for crude protein contents are converted into data on N contents by multiplying the crude protein contents by 1/6.25 (IPCC(2006)-10.58).

Der ME-Beitrag aus Grassilage ergibt sich als Restglied:

Die Mengen an Kraftfutter, Maissilage, Grassilage und Weidegras, die zur Deckung des ME-Bedarfs benötigt werden, ergeben sich mithilfe des spezifischen ME-Gehalts der jeweiligen Futterkomponente, wie nachfolgend beispielhaft für das Kraftfutter gezeigt wird:

Table 4.34 zeigt die im Inventar verwendeten Futterkomponenten und ihre Eigenschaften. Sie entsprechen für ME-Gehalt, Rohproteingehalt, Aschegehalt und Verdaulichkeit organischer Substanz der Milchkuhfütterung, siehe Table 4.17. Dabei wurde das Kraftfutter mit dem Milchleistungsfutter MLF 18/3 der Milchkühe gleich gesetzt. Zwar erhalten Färsen kein MLF 18/3; dessen ME- und Rohproteingehalt entspricht aber dem nach DLG (2005), S. 26/27, in der Jungrinderaufzucht verwendeten Kälber-Kraftfutter, siehe DLG (2005), S. 13. Verdaulichkeit und Umsetzbarkeit von Energie (X_{DE} , X_{ME}) beschreiben die Verhältnisse der in Table 4.19 zu findenden Werte von η_{DE} und η_{ME} zu η_{GE} (siehe dazu auch Kapitel 3.3.1).

Die Angaben zum Rohproteingehalt werden mit dem Faktor 1/6,25 in N-Gehalte umgerechnet (IPCC(2006)-10.58).

Table 4.34: Heifers, diet constituent properties used in the inventory

(η_{ME} : content of metabolizable energy, related to dry matter; X_{DE} : digestibility of energy; X_{ME} : metabolizability of energy; x_{XP} : crude protein content of feed, related to dry matter; X_{DOM} : digestibility of organic matter; x_{ash} : ash content of feed, related to dry matter)

	$\eta_{ME, rough}$ MJ kg ⁻¹	X_{DE} MJ MJ ⁻¹	X_{ME} MJ MJ ⁻¹	$x_{XP, rough}$ kg kg ⁻¹	$X_{DOM, rough}$ kg kg ⁻¹	$x_{ash, rough}$ kg kg ⁻¹
grass (pasture)	10.0	0.689	0.558	0.180	0.72	0.125
grass silage	10.0	0.672	0.541	0.162	0.72	0.099
maize silage	10.2	0.693	0.571	0.080	0.73	0.082
concentrates	12.3	0.778	0.663	0.205	0.83	0.065

Source: see text.

In summary, the mean dry matter intake with feed amounts to

Die mittlere tägliche Trockenmasse-Aufnahme über die Nahrung ergibt sich zu:

$$m_{F, DM} = \frac{1}{\alpha} \cdot \left(\frac{\Sigma ME_{conc}}{\eta_{ME, conc}} + \frac{\Sigma ME_{ma-s}}{\eta_{ME, ma-s}} + \frac{\Sigma ME_{gr-g}}{\eta_{ME, gr-g}} + \frac{\Sigma ME_{gr-s}}{\eta_{ME, gr-s}} \right) \quad (4.74)$$

$m_{F, DM}$	daily dry matter intake with feed (in kg pl ⁻¹ d ⁻¹)
α	time units conversion factor ($\alpha = 365$ d a ⁻¹)
ΣME_{conc}	annual intake of metabolisable energy with concentrates (in MJ pl ⁻¹ a ⁻¹)
$\eta_{ME, conc}$	metabolisable energy content of concentrates, related to dry matter (in MJ kg ⁻¹), see Table 4.34
ΣME_{ma-s}	annual intake of metabolisable energy with maize silage (in MJ an ⁻¹ a ⁻¹)
$\eta_{ME, ma-s}$	metabolisable energy content of maize silage, related to dry matter (in MJ kg ⁻¹), see Table 4.34
ΣME_{gr-g}	annual intake of metabolisable energy with grass during grazing (in MJ an ⁻¹ a ⁻¹)
$\eta_{ME, gr-g}$	metabolisable energy content of grass (grazing), related to dry matter (in MJ kg ⁻¹), see Table 4.34
ΣME_{gr-s}	annual intake of metabolisable energy with grass silage (in MJ an ⁻¹ a ⁻¹)
$\eta_{ME, gr-s}$	metabolisable energy content of grass silage, related to dry matter (in MJ kg ⁻¹), see Table 4.34

The total amount of crude protein taken in with feed is obtained by multiplying each term in the equation given above with the respective x_{XP} value according to Table 4.34. This result is then to be divided by 6.25 in order to obtain the equivalent amount of nitrogen taken in with feed.

The daily gross energy is derived from the metabolisable energy and the metabolisabilities of the various feed components (assuming constant conditions over time and space).

Die mit dem Futter aufgenommene Rohproteinmenge erhält man, indem jeder Term in der vorstehenden Gleichung mit dem entsprechenden x_{XP} -Wert nach Table 4.34 multipliziert wird. Dieses Ergebnis ist dann noch durch 6,25 zu dividieren, um die äquivalente Stickstoffmenge zu erhalten.

Die tägliche Gesamtenergie wird aus der umsetzbaren Energie und den Umsetzbarkeiten der verschiedenen Futteranteile abgeleitet (zeitlich und örtlich konstante Standardwerte).

$$GE_{bf} = \frac{1}{\alpha} \cdot \left(\frac{\Sigma ME_{conc}}{X_{ME, conc}} + \frac{\Sigma ME_{ma-s}}{X_{ME, ma-s}} + \frac{\Sigma ME_{gr-g}}{X_{ME, gr-g}} + \frac{\Sigma ME_{gr-s}}{X_{ME, gr-s}} \right) \quad (4.75)$$

GE_{bf}	daily gross energy intake for heifers (in MJ pl ⁻¹ d ⁻¹)
α	time units conversion factor ($\alpha = 365$ d a ⁻¹)
ΣME_{conc}	annual intake of metabolisable energy with concentrates (in MJ pl ⁻¹ a ⁻¹)
$X_{ME, conc}$	mean metabolisability of concentrates (in MJ MJ ⁻¹), see Table 4.34
ΣME_{ma-s}	annual intake of metabolisable energy with maize silage (in MJ an ⁻¹ a ⁻¹)
$X_{ME, ma-s}$	mean metabolisability of maize silage (in MJ MJ ⁻¹), see Table 4.34
ΣME_{gr-g}	annual intake of metabolisable energy with grass during grazing (in MJ an ⁻¹ a ⁻¹)
$X_{ME, gr-g}$	mean metabolisability of grass (grazing) (in MJ MJ ⁻¹), see Table 4.34
ΣME_{gr-s}	annual intake of metabolisable energy with grass silage (in MJ an ⁻¹ a ⁻¹)
$X_{ME, gr-s}$	mean metabolisability of grass silage (in MJ MJ ⁻¹), see Table 4.34

The mean feed digestibility is obtained by averaging the digestibilities of the various feed components (see Table 4.34) weighted with the respective intakes of these feed components.

Die mittlere Verdaulichkeit des Futters ergibt sich aus der mit den einzelnen Futtermengen gewichteten Mittelung der Verdaulichkeiten der einzelnen Futterkomponenten, die in Table 4.34 aufgeführt sind.

4.5.4 Methane from enteric fermentation / Methan aus der Verdauung

For the calculation of CH₄ emissions from enteric fermentation the Tier 2 method described in Chapter 3.3.2 is used. This method needs the gross energy intake (see Chapter 4.5.3) and the methane conversion factor $x_{CH_4, GE}$ as input.

The methane conversion factor is used as provided by IPCC(2006)-10.30, Table 10.12: $x_{CH_4, bf} = 0.065$ MJ MJ⁻¹.

No national data is available on the uncertainty of the emission factor for CH₄ from enteric fermentation do not exist. IPCC(2006)-10.33 estimates the uncertainty of Tier 2 approaches to be 20 %. This value is, according

Die CH₄-Emission aus der Verdauung wird mit dem in Kapitel 3.3.2 beschriebenen Tier-2-Verfahren aus der Gesamtenergie-Aufnahme (siehe Kapitel 4.5.3) mithilfe des Methanumwandlungsfaktors $x_{CH_4, GE}$ berechnet.

Der Methanumwandlungsfaktor wird IPCC (2006)-10.30, Tabelle 10.12 entnommen: $x_{CH_4, bf} = 0,065$ MJ MJ⁻¹.

Zur Unsicherheit des Emissionsfaktors für CH₄ aus der Verdauung sind keine nationalen Daten verfügbar. IPCC(2006)-10.33 schätzt die Unsicherheit bei Anwendung von Tier-2-Verfahren auf 20 %. Dieser Wert wird

to the definition of uncertainty used in Chapter 3 in IPCC (2006a), interpreted as half the 95 % confidence interval. A normal distribution is assumed.

im Sinne von IPCC (2006a), Kapitel 3, als halbes 95 %-Konfidenzintervall interpretiert. Es wird Normalverteilung angenommen.

4.5.5 Methane from manure management / Methan aus dem Wirtschaftsdüngermanagement

CH₄ emissions from manure management are quantified using a Tier 2 procedure, cf. Chapter 3.3.4.1.

Volatile solids (VS) excretion rates are calculate using the modified IPCC approach described in DÄMMGEN et al. (2011a), see Chapter 3.3.3.1.

The necessary information on the digestability of organic matter and the ash contents of the diet are obtained as weighted means from the properties of feed constituents as listed in Table 4.34.

Maximum methane producing capacity B_0 and conversion factors (MCF) for the respective manure storage system are provided in Table 4.4 (see Chapter 4.2.1).

The frequency distribution of storage types is supplied by RAUMIS or derived from official census data (see Chapter 3.4.3).

German data on the uncertainty of CH₄ emissions from manure management do not exist. IPCC(2006)-10.48 estimates the uncertainty of Tier 2 approaches to be 20 %. This value is, according to the definition of uncertainty used in Chapter 3 in IPCC (2006a), interpreted as half the 95 % confidence interval. A normal distribution is assumed.

Die CH₄-Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management werden mit einem Tier-2-Verfahren bestimmt, siehe Kapitel 3.3.4.1.

Die VS-Ausscheidungen („volatile solids“) werden nach dem gegenüber IPCC modifizierten Verfahren von DÄMMGEN et al. (2011a) berechnet, siehe Kapitel 3.3.3.1.

Die dazu notwendigen Daten zur Verdaulichkeit von organischer Substanz und dem Aschegehalt im Futter ergeben sich im gewichteten Mittel aus den Angaben zu den Rationskomponenten in Table 4.34.

Zu maximaler Methan-Freisetzungskapazität B_0 und Methanumwandlungsfaktoren für die einzelnen Lagerungssysteme (MCF) siehe Table 4.4 in Kapitel 4.2.1.

Die Häufigkeitsverteilung der Lagerverfahren wird durch RAUMIS bereitgestellt bzw. aus offiziellen Erhebungen abgeleitet, siehe Kapitel 3.4.3.

Deutsche Zahlen zur Unsicherheit der CH₄-Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management liegen nicht vor. IPCC(2006)-10.48 schätzt die Unsicherheit bei Anwendung von Tier-2-Verfahren auf 20 %. Dieser Wert wird im Sinne von IPCC (2006a), Kapitel 3, als halbes 95 %-Konfidenzintervall interpretiert. Es wird Normalverteilung angenommen.

4.5.6 NMVOC emissions / NMVOC-Emissionen

The calculation of the NMVOC emissions of cattle are calculated with a Tier 2 methodology, see Chapters 3.3.4.2.2 and 3.3.4.2.3.

Agricultural NMVOC emissions are reported, but are neglected regarding the NEC emission threshold, see Chapter 3.3.4.2.

Die NMVOC-Emissionen von Rindern werden mit einer Tier-2-Methode berechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.2 und 3.3.4.2.3.

Landwirtschaftliche NMVOC-Emissionen werden zwar berichtet, aber bzgl. der NEC-Emissionsobergrenze nicht angerechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.

4.5.7 Emissions of nitrogen species / Emissionen von Stickstoff-Spezies

The calculation presupposes the knowledge of N excretions (their amounts and locations), of the N inputs with straw, the conversion of N_{org} and TAN as well as the frequency distributions of housing types and storage facilities, spreading techniques and incorporation times.

Die Berechnung beruht auf der Kenntnis der N-Ausscheidungen (Mengen und Orte), der N-Einträge mit Stroh, der Umwandlungen von N_{org} und TAN, der Häufigkeit von Stalltypen, Lagertypen, Ausbringungstechniken und Einarbeitungszeiten.

4.5.7.1 N excretion / N-Ausscheidung

N excretion data are obtained from the N mass balance using the amounts of N intake, N retention due to growth and N retained in the first calf.

The N intake rate is assessed from the dry matter intake rate of the various diet constituents and their specific N contents (see Chapter 4.5.3).

The N retention is based on an N content of the animals body of 0.0272 kg kg⁻¹ (LFL, 2006a, Table 8).

Die N-Ausscheidungen werden aus der Bilanz aus aufgenommenem, retiniertem und im ersten Kalb gespeichertem N berechnet.

Die N-Aufnahme ergibt sich aus der Trockenmassenaufnahme der einzelnen Rationskomponenten und deren spezifischen N-Gehalten (siehe Kapitel 4.5.3).

Der N-Retention liegt ein N-Gehalt des Tierkörpers von 0,0272 kg kg⁻¹ zugrunde (LFL, 2006a, Tabelle 8).

The birthweight of a calf is assumed to be 41 kg (arithmetic mean of 40 and 42 kg in KTBL, 2010, pg. 554) and the specific N content of cows and calves is assumed to be 0.0272 kg kg⁻¹ (LFL, 2006a).

The TAN content is calculated according to Chapter 3.3.3.2. It is variable.

Das Geburtsgewicht eines Kalbes wird mit 41 kg (Mittelwert aus 40 und 42 kg in KTBL, 2010, S. 554) und der spezifische N-Gehalt von Kuh und Kalb mit 0,0272 kg kg⁻¹ (LFL, 2006a) angesetzt.

Der TAN-Gehalt wird nach Kapitel 3.3.3.2 berechnet und ist variabel.

4.5.7.2 *N inputs with straw / N-Einträge mit Stroh*

For straw based systems N inputs with straw are taken into account. The amounts of N are given in Table 4.35. For the properties of straw and the mineralization of organic N to TAN see Chapter 3.3.4.3.2.

As no bedding is taken into account during the grazing period, the annual amount of bedding actually used depends on the duration of the grazing period.

Für Systeme mit Einstreu wird der N-Eintrag mit dem Stroh berücksichtigt, siehe dazu Table 4.35. Zu den Eigenschaften von Stroh und der Mineralisierung von organisch gebundenem N zu TAN siehe Kapitel 3.3.4.3.2.

Da für Weidezeiten keine Einstreu berücksichtigt wird, hängt die im Inventar für das gesamte Jahr verwendete Einstreumenge von der Weidedauer ab.

Table 4.35: Heifers, N inputs with straw in solid-manure systems

Housing type	Haltungssystem	straw input kg pl ⁻¹ d ⁻¹	dry matter (DM) kg pl ⁻¹ d ⁻¹	N input (in DM) kg pl ⁻¹ d ⁻¹	TAN kg pl ⁻¹ d ⁻¹
tied systems	Anbindehaltung	2.0 ^a	1.7	10.0·10 ⁻³	5.0·10 ⁻³
loose housing	Laufstall	3.0 ^b	2.6	15.0·10 ⁻³	7.5·10 ⁻³

^a Source: Expert judgement (EURICH-MENDEN B, KTBL)

^b Source: Expert judgement (EURICH-MENDEN B, WULF S, KTBL)

4.5.7.3 *Emissions from housing and grazing / Emissionen aus Stall und Weide*

The TAN related emission factors for cattle are used (see Table 4.5).

The NH₃-N emission factor for grazing is 0.06 kg kg⁻¹, related to TAN excreted (EMEP(2013)-3B-27, Table 3.7).

N₂O and NO emissions due to pasturing are calculated according to Chapter 11.5. (For more details see Chapters 3.3.4.3.5 and 4.3.8.5.1).

Es werden die auf TAN bezogenen Emissionsfaktoren für Rinder verwendet (vgl. Table 4.5).

Der auf TAN bezogene NH₃-N-Emissionsfaktor für Weidegang ist 0,06 kg kg⁻¹ (EMEP(2013)-3B-27, Table 3.7).

Die aus dem Weidegang resultierenden Emissionen von N₂O und NO werden nach Kapitel 11.5 berechnet. (Weitere Details: Siehe Kapitel 3.3.4.3.5 und 4.3.8.5.1.)

4.5.7.4 *Emissions from storage and spreading / Emissionen aus Lager und Ausbringung*

For the emission factors for NH₃, N₂O, NO and N₂ from storage see Chapters 4.2 and 3.3.4.3.5.

The emission factors of NH₃ for the different spreading techniques and times before incorporation are given in Chapter 4.2.2.3

NO emissions from manure management are reported (as NO_x), but are neglected regarding the NEC emission threshold, see Chapter 3.3.4.2.

Für die Emissionsfaktoren für NH₃, N₂O, NO und N₂ aus dem Lager siehe Kapitel 4.2 und 3.3.4.3.5.

Für die Emissionsfaktoren von NH₃ für die verschiedenen Ausbringungstechniken und Einarbeitungszeiten wird auf Kapitel 4.2.2.3 verwiesen.

NO aus dem Wirtschaftsdünger-Management wird berichtet (als NO_x), bzgl. der NEC-Emissionsobergrenze aber nicht angerechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.

4.5.7.5 *Indirect N₂O from manure management / Indirektes N₂O aus dem Wirtschaftsdünger-Management*

Indirect N₂O emissions from manure management (housing, storage; without spreading) are calculated according to Chapter 3.3.4.3.6. See Chapter 3.3.4.3.6 also for the uncertainties of activity data and emission factor.

(Indirect N₂O emissions from agricultural soils after spreading of manures or digested manures are reported in Sector 3.D. For the calculation of these emissions see Chapter 12.)

Indirekte N₂O-Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management (Stall, Lager; ohne Ausbringung) werden nach Kapitel 3.3.4.3.6 berechnet. Siehe dort auch wegen der Unsicherheiten von Aktivitätswert und Emissionsfaktor.

(Indirekte N₂O-Emissionen als Folge der Ausbringung von Wirtschaftsdüngern und Wirtschaftsdünger-Gärresten werden im Sektor 3.D berichtet. Zur Berechnung siehe Kapitel 12.)

4.5.7.6 *Uncertainties of emission factors and activity data / Unsicherheiten von Emissionsfaktoren und Aktivitätsdaten*

For the uncertainties of the emission factors see Chapter 4.2.2.4 and 11.2.2.

The uncertainty of N excretion is discussed in Chapter 14.4.1. For the uncertainty of the amount of N spreaded see Chapter 11.2.1.

Zu den Unsicherheiten der Emissionsfaktoren siehe Kapitel 4.2.2.4 und 11.2.2.

Die Unsicherheit der N-Ausscheidung wird in Kapitel 14.4.1 diskutiert. Zur Unsicherheit der zur Ausbringung kommenden N-Menge siehe Kapitel 11.2.1.

4.5.8 *Emissions of particulate matter / Partikelemissionen*

The method to calculate particle emissions is described in Chapter 3.3.4.5. The emission factors are listed in Table 4.36. For the uncertainty of the emission factors see Chapter 3.3.4.5.

Information on the frequency distribution of the various housing systems and the duration of grazing is obtained from RAUMIS and the respective data supplied by the official statistics (see Chapter 3.4.3).

Zur Berechnungsmethode für Partikelemissionen wird auf Kapitel 3.3.4.5 verwiesen. Die Emissionsfaktoren sind in Table 4.36 angegeben. Zur Unsicherheit der Emissionsfaktoren siehe Kapitel 3.3.4.5.

Die Angaben zur Verteilung der verschiedenen Stallformen und zur Dauer der Weidehaltung werden durch RAUMIS bereitgestellt bzw. aus der Agrarstatistik entnommen (siehe Kapitel 3.4.3).

Table 4.36: Heifers, emission factors for particle emissions from housing

Housing type	Haltungssystem	Emission factor for TSP kg pl ⁻¹ a ⁻¹	Emission factor for PM ₁₀ kg pl ⁻¹ a ⁻¹	Emission factor for PM _{2.5} kg pl ⁻¹ a ⁻¹
straw based	strohbasiert	0.52	0.24	0.16
slurry based	güllebasiert	0.69	0.32	0.21

Source: EMEP(2016)-3B-53, Table A1.6 (with TSP = ID [inhalable dust])

4.5.9 *References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung*

The subsequent table lists the references to information provided in the data collection (see Chapter 2.4).

Die nachfolgende Tabelle enthält Verweise auf die Informationen in der Datensammlung (siehe Kapitel 2.4).

Table 4.37: Heifers, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)

			from	to
Emissions	Emissionen	CH ₄ enteric fermentation	EM1004.003	
		CH ₄ manure management	EM1005.003	
		NMVOC	EM1007.003	
		NH ₃	EM1009.007	EM1009.009
		N ₂ O	EM1009.093	
		NO	EM1009.123	
		TSP	EM1010.003	
		PM ₁₀	EM1010.033	
		PM _{2.5}	EM1010.063	
Activity data	Aktivitäten		AC1005.003	
Emission factors	Emissionsfaktoren	CH ₄ enteric fermentation	IEF1004.003	
		CH ₄ manure management	IEF1005.003	
		NMVOC	IEF1007.003	
		NH ₃	IEF1009.007	IEF1009.009
		N ₂ O	IEF1009.087	
		NO	IEF1009.115	
		TSP	IEF1010.003	
		PM ₁₀	IEF1010.031	
		PM _{2.5}	IEF1010.059	
Additional information	zusätzliche Informationen		AI1005CAT.067	AI1005CAT.097
Excretion rates	Ausscheidungen	N	EXCR.011	EXCR.015

4.6 Male beef cattle / Männliche Mastrinder

In the inventory, male cattle above 125 kg and below 2 years of age are assigned to the animal category “Male beef cattle”, which is a subcategory of „other cattle“, see Chapter 4.9. (Mature males > 2 years constitute a separate animal category, see Chapter 4.8.)

The emissions are calculated according to the methods compiled in Table 4.38.

For the definition of the methods see Chapter 3.2.3.

Im Inventar werden männliche Rinder ab einem Gewicht von 125 kg und einem Alter von bis zu 2 Jahren der Kategorie „Männliche Mastrinder“ zugeordnet, einer Unterkategorie der „übrigen Rinder“ (Kapitel 4.9). (Männliche Rinder ab 2 Jahre bilden eine eigenständige Kategorie, siehe Kapitel 4.8.)

Die Emissionen werden nach den in Table 4.38 zusammengestellten Methoden berechnet.

Zur Methodendefinition siehe Kapitel 3.2.3.

Table 4.38: Male beef cattle, calculation methods applied

Species	Origin	Tier	Method applied
CH ₄	enteric fermentation	2	IPCC / national
CH ₄	manure management	2	IPCC / national
NM VOC	manure management	2	EMEP
NH ₃	manure management	3	EMEP / national
N ₂ O, NO, N ₂	manure management	2	IPCC / national
TSP, PM ₁₀ , PM _{2.5}	manure management	2	EMEP

4.6.1 Activity and performance data /Aktivitäts- und Leistungsdaten

4.6.1.1 Animal numbers / Tierzahlen

The subcategory “male beef cattle” in this inventory includes the census subcategories “male young cattle between 8 months and 1 year” (before 2009: “male young cattle between 6 months and 1 year”) and “male young cattle from 1 to 2 years”.

Additionally, the male share of the calves not considered in Chapter 4.4.1.1 is taken into account. Its calculation (see the term in squared brackets in the subsequent equation) is based on the assumption that the gender distribution is equal to that of young cattle.

Im Inventar umfasst die Tierkategorie „Männliche Mastrinder“ die Tierzahlen aus der Statistik für „Männliches Jungvieh 8 Monate bis 1 Jahr“ (vor 2009: „Männliches Jungvieh 6 Monate bis 1 Jahr“) und „Männliches Jungvieh 1 bis 2 Jahre“.

Hinzu kommt der männliche Anteil der in Kapitel 4.4.1.1 nicht berücksichtigten Kälber, wobei angenommen wird, dass die Geschlechtsverteilung gleich der des Jungviehs ist, siehe eckige Klammer in nachfolgender Gleichung:

$$n_{bm} = n_B + n_D + n_A \cdot \left[(1 - x_{ca}) \cdot \frac{n_B}{n_B + n_C} \right] \quad (4.76)$$

n_{bm} number of male beef cattle considered

n_B etc. animal numbers of type B (etc.) in the German census (see Table 4.1)

x_{ca} fraction ($x_{ca} = 4/8$ as of 2009; $x_{ca} = 4/6$ before 2009), see Chapter 4.4.1.1

Cattle numbers are collected annually by the Statistical Offices of the federal states (STATLA C III 1 – vj 4) and published by the Federal Statistical Office in federal-state resolution and for Germany (STATBA FS3 R4, STATBA FS3 R4.1). The cattle numbers used to calculate the emissions in district resolution are provided by the Federal Statistical Office specifically for emissions reporting, see Chapter 4.1.1. For the uncertainties of the animal numbers see Chapter 4.1.

Rinderzahlen werden jährlich von den Statistischen Landesämtern erhoben (STATLA C III 1 – vj 4) und durch das Statistische Bundesamt in Bundeslandauflösung und für Deutschland veröffentlicht (STATBA FS3 R4, STATBA FS3 R4.1). Die zur Emissionsberechnung verwendeten Rinderzahlen in Kreisauflösung werden durch das Statistische Bundesamt speziell für die Emissionsberichterstattung bereitgestellt, siehe dazu Kapitel 4.1.1. Zu den Unsicherheiten der Tierzahlen siehe Kapitel 4.1.

4.6.1.2 Animal weights and weight gains / Tiergewichte und Gewichtszunahmen

The emission calculations require data on animal weights, animal weight gains and diet composition. German statistics do not provide any complete time series, nor do they resolve data with space.

Die Emissionsberechnung benötigt Tiergewichte, Gewichtszunahmen sowie die Futterzusammensetzung. Die deutschen Statistiken liefern in keinem Fall vollständige und örtlich aufgelöste Zeitreihen.

The initial weight of male beef cattle is assumed to 125 kg kg an⁻¹, which is the final weight of the inventory category "calves".

Slaughter statistics report on the number and the overall weight of carcasses produced in the abattoirs of the respective federal state. From these data the live weight at the time of slaughtering was calculated (for the method see Chapter 3.1.2.4) using a factor $c_{w, mb} = \text{const} = 0.56 \text{ kg kg}^{-1}$ (Statistisches Bundesamt).

The HIT system (*Herkunftssicherungs- und Informationssystem für Tiere*, StMELF, undated) was introduced in Germany in accordance with the EU (1997) to guarantee the knowledge of origin of animals and to safeguard the respective information. It provides the age of slaughtering and slaughter weights (carcass weights, to some extent weights before slaughtering) for male cattle since 1999 (inclusively). These data cover single districts and are complete.

The inventory uses up to 1998 the carcass weights calculated from the *slaughter statistics*. From 1999 onwards the carcass weights of the HIT data base are used. The available carcass weights are listed in Table 4.39. As the table size does not allow to present the complete timeseries, every other year is omitted before 2010. For the City States, data for Hamburg were taken from Schleswig-Holstein, for Bremen from Niedersachsen, and for Berlin from Brandenburg.

Das Anfangsgewicht der Kategorie „Mastbullen“ wird im Inventar mit 125 kg an⁻¹ abgesetzt, dem Endgewicht der Kategorie „Kälber“.

Die *Schlachtstatistiken* erfassen die in einem Bundesland in Schlachthöfen geschlachteten Tiere und deren Schlachtgewichte. Daraus wurden unter Verwendung des festen Faktors $c_{w, mb} = 0,56 \text{ kg kg}^{-1}$ (Statistisches Bundesamt) für das Bundesland typische Lebendgewichte bei Schlachtung berechnet (s. dazu Kapitel 3.1.2.4).

Das *Herkunftssicherungs- und Informationssystem für Tiere (HIT)* (StMELF, o.J.), das gemäß den Vorgaben der Europäischen Gemeinschaft (1997) eingerichtet wurde, liefert Schlachtalter und Schlachtgewicht für männliche Rinder aufgeschlüsselt nach Landkreisen und Jahren für den Zeitraum ab 1999 einschließlich. Diese Erfassung ist vollständig.

Das Inventar verwendet bis einschließlich 1998 die aus den Schlachtstatistiken abgeleiteten Schlachtgewichte und ab 1999 die Schlachtgewichte aus der HIT-Datenbank. Zu den verfügbaren Schlachtgewichten siehe Table 4.39. Aus Platzgründen wurde bis 2010 jedes zweite Jahr weggelassen.

Für die Stadtstaaten werden bei Hamburg die Daten von Schleswig-Holstein verwendet, bei Bremen die von Niedersachsen und bei Berlin die von Brandenburg.

Table 4.39: Male beef cattle, carcass weight (in kg an⁻¹)

	1990	1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2016
BW	352	345	357	353	356	346	340	341	352	348	352	353	358	363	364	363	364	364	366
BY	369	364	370	365	370	380	380	379	390	391	394	396	400	404	404	404	402	393	391
BB		324	341	334	342	335	334	333	347	342	352	357	359	360	361	364	365	367	363
HE	353	346	359	350	351	344	337	338	349	343	355	353	357	361	361	358	364	367	370
MV		313	324	321	315	333	319	322	334	335	353	360	360	367	367	371	375	377	368
NI	352	348	355	348	351	359	358	357	370	369	377	377	380	386	387	389	396	398	400
NW	354	350	358	355	354	375	375	376	389	388	396	397	401	404	405	405	411	413	418
RP	341	335	354	343	335	338	331	336	346	342	353	354	358	358	360	365	371	371	374
SL	356	346	361	366	363	328	321	331	342	340	356	359	358	350	360	367	367	363	371
SN		319	344	335	338	338	336	336	348	346	349	349	354	354	354	359	360	358	352
ST		312	335	330	335	342	331	333	347	345	353	351	352	361	361	365	367	373	373
SH	344	339	347	339	333	339	339	337	355	352	363	357	353	358	360	364	368	366	368
TH		321	352	345	342	342	339	339	349	346	352	352	356	358	356	359	354	361	361

Source 1990 - 1998: Calculated from data in STATBA FS3 R4.2.1 (Schlachtungen und Fleischerzeugung)

Source from 1999 onwards: HIT, communicated data set

In their annual reports, the *German association of cattle breeders (ADR)* publish data on beef cattle production including details regarding live weight before slaughtering, age at slaughtering and weight gains for a random sample of about 6000 to 7000 animals (ADR, 1993 ff).

The three data sets (calculation, HIT, ADR) are incompatible. Consequently, a method to achieve a data gap closure had to be developed. It is described in the following:

Die *Arbeitsgemeinschaft Deutscher Rinderzüchter (ADR)* beschreibt in ihren jährlichen Berichten Ergebnisse der Fleischleistungsprüfung mit Angaben zu Lebendgewicht bei Schlachtung, Schlachtalter und täglichen Zunahmen für eine Stichprobe von 6000 bis 7000 Tieren (ADR, 1993 ff).

Die drei Datensätze (Berechnung, HIT, ADR) sind nicht ineinander überführbar. Folglich musste eine Methode zur Schließung der Datenlücken entwickelt werden. Sie ist im Folgenden beschrieben:

Weight before slaughtering

A comparison of the data calculated from official slaughter statistics with those provided by HIT shows that they do not differ much. Baden-Württemberg and Saarland are exceptions, where the number of animals slaughtered differs considerably from the number of animals produced.

Weight gains

From 1999 onwards, the data provided in the HIT data base allow for the derivation of mean weight gains in single federal states (see Table 4.40). For the City States, data for Hamburg were taken from Schleswig-Holstein, for Bremen from Niedersachsen, and for Berlin from Brandenburg. No differentiation was made with respect to races.

Lebendendgewichte

Die aus der Schlachtstatistik berechneten Lebendendgewichte und die HIT-Datensätze weichen nicht wesentlich voneinander ab. Ausnahmen sind Baden-Württemberg und Saarland. Dort weichen die Zahlen der im Land produzierten und der im Land geschlachteten Tiere stark voneinander ab.

Gewichtszunahmen

Die Datensatz der HIT-Datenbank erlauben die Ableitung von Gewichtszunahmen auf Bundeslandebene ab 1999, wie Table 4.40 zeigt. Für die Stadtstaaten werden bei Hamburg die Daten von Schleswig-Holstein verwendet, bei Bremen die von Niedersachsen und bei Berlin die von Brandenburg. Eine Differenzierung nach Rassen wurde nicht vorgenommen.

Table 4.40: Male beef cattle, mean weight gains $\Delta w_{bm, HIT}$ derived from HIT data (in $g\ an^{-1}\ d^{-1}$)

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
BW	1060	1058	1029	1014	1019	1029	1066	1076	1096	1069	1065	1075	1093	1110	1110	1106	1108	1105	1101	1110
BY	1223	1230	1221	1202	1199	1200	1234	1236	1255	1254	1256	1267	1283	1297	1305	1316	1327	1309	1272	1262
BB	1032	978	990	970	972	985	1005	1030	1032	1012	1032	1045	1069	1076	1058	1066	1099	1103	1113	1092
HE	1022	1023	1001	974	970	981	1018	1035	1051	1008	1017	1042	1054	1072	1061	1049	1049	1062	1079	1082
MV	1039	1027	1041	985	982	1014	1048	1064	1082	1056	1082	1109	1145	1131	1146	1134	1143	1159	1156	1135
NI	1094	1098	1090	1069	1071	1071	1101	1096	1113	1108	1118	1132	1151	1164	1159	1160	1179	1187	1201	1210
NW	1159	1169	1159	1130	1126	1140	1181	1184	1205	1196	1203	1223	1244	1257	1246	1250	1257	1267	1277	1290
RP	1012	1019	969	956	966	986	1020	1037	1059	1016	1023	1052	1074	1088	1058	1060	1079	1105	1097	1101
SL	943	956	924	917	949	960	990	1019	1036	998	1019	1054	1066	1079	1024	1032	1058	1074	1060	1066
SN	1063	1042	1029	1003	1006	1017	1032	1056	1079	1063	1066	1060	1074	1102	1099	1079	1090	1093	1067	1039
ST	1049	1066	1050	998	963	990	999	1046	1068	1028	1025	1041	1065	1074	1082	1084	1101	1099	1110	1102
SH	971	1006	994	981	985	985	1013	1017	1031	1023	1028	1042	1046	1032	1020	1022	1053	1050	1043	1045
TH	1072	1070	1059	1045	1041	1045	1068	1076	1103	1080	1093	1102	1106	1143	1131	1113	1120	1107	1135	1122
Germany	1119	1127	1113	1091	1090	1095	1130	1131	1149	1138	1145	1159	1178	1190	1187	1189	1203	1206	1203	1206

Source: HIT, communicated data set

DÄMMGEN et al. (2009a) developed an approximation to complete the time series shown in Table 4.40 for the years before 1999. The data in the respective time series were aggregated to form national means. These were compared to weight gains deduced from ADR reports (see Table 4.41). The ADR data set comprises the results of sample surveys for all races.

DÄMMGEN et al. (2009a) entwickelten ein Näherungsverfahren, um die in Table 4.40 gezeigten Zeitreihen für die Jahre vor 1999 zu ergänzen. Dazu wurden die aus diesen Zeitreihen aggregierten nationalen Werte mit Gewichtszunahmen verglichen, die aus den ADR-Berichten abgeleitet wurden, siehe Table 4.41. Die ADR-Daten beruhen auf Stichproben über alle Rassen.

Table 4.41: Male beef cattle, mean weight gains $\Delta w_{bm, ADR}$ ($g\ an^{-1}\ d^{-1}$)


	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Germany			1212	1219	1176	1223	1221	1247	1193	1196	1195	1229	1191	1279	1223	1217	1197

calculated from ADR data (ADR, 1993 ff)

As demonstrated by Figure 4.3, the ADR data for 1999 to 2006 exceed the means deduced from HIT data by about $100\ g\ an^{-1}\ d^{-1}$.

Wie Figure 4.3 zeigt, liegen die ADR-Daten in den Jahren 1999 bis 2006 im Mittel um $100\ g\ an^{-1}\ d^{-1}$ höher als die aus den HIT-Daten abgeleiteten Mittelwerte.

Figure 4.3: Male beef cattle, comparison of weight gain data (ADR and HIT data sets on the national level)



The HIT data set is based on a complete registration of all cattle, whereas the ADR data set is based on sample surveys. Hence it was decided to use the HIT data as target data for the gap closing procedure. The ADR data in Table 4.41 were corrected, and the weight gain reduced by $100 \text{ g an}^{-1} \text{ d}^{-1}$. In addition, a factor f_j was introduced to specifically address and complete the data sets for each single federal state shown in Table 4.40 for the years prior to 1999.

Die HIT-Daten beruhen auf einer vollständigen Erfassung aller Rinder, während die aus den ADR-Berichten abgeleiteten Daten auf Stichproben basieren. Daher wurde entschieden, die HIT-Daten als Zielgröße für das Lückenschlussverfahren zu verwenden und hierfür die ADR Daten aus Table 4.41 um $100 \text{ g an}^{-1} \text{ d}^{-1}$ nach unten zu korrigieren, wobei das Ergebnis noch mit einem für jedes Bundesland spezifischen Faktor f_j zu multiplizieren ist, um die in Table 4.40 gezeigten Zeitreihen auf Bundeslandebene vor 1999 zu ergänzen:

$$\Delta w_{\text{bm}, i, j} = (\Delta w_{\text{bm}, \text{ADR}, i} - a) \cdot f_j \quad (4.77)$$

$\Delta w_{\text{bm}, i, j}$ weight gain of male beef cattle in federal state j for the years i before 1999 in Table 4.40 (in $\text{g an}^{-1} \text{ d}^{-1}$)
 $\Delta w_{\text{bm}, \text{ADR}, i}$ weight gain of male beef cattle in year i as derived from ADR data on national level (in $\text{g an}^{-1} \text{ d}^{-1}$)
 a correction term ($a = 100 \text{ g an}^{-1} \text{ d}^{-1}$)
 f_j correction factor for federal state j (see below)

The correction factor f_j was derived from the data shown in Table 4.40 for the years from 1999 to 2006 as ratio between the weight gains achieved in a federal state and the national mean weight gain. These ratios are collated in Table 4.42. They proved to be almost constant for each federal state. So, a mean of these annual ratios was formed (the very right column in Table 4.42) and used as correction factor f_j .

Der Korrekturfaktor f_j wurde aus den Daten der Table 4.40 für die Jahre 1999 bis 2006 als Verhältnisse von bundeslandspezifischem Wert zu nationalem Mittelwert berechnet. Diese Verhältnisse, die in Table 4.42 gezeigt werden, erwiesen sich für die einzelnen Bundesländer über die Jahre als relativ konstant. Daher wurde der bundeslandspezifische zeitliche Mittelwert (ganz rechte Spalte in Table 4.42) als Korrekturfaktor f_j verwendet.

Table 4.42: Male beef cattle, correction factor f_j

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	mean (f_j)
BW	0.95	0.94	0.92	0.93	0.94	0.94	0.94	0.95	0.94
BY	1.09	1.09	1.10	1.10	1.10	1.10	1.09	1.09	1.10
BB	0.92	0.87	0.89	0.89	0.89	0.90	0.89	0.91	0.89
HE	0.92	0.91	0.90	0.89	0.89	0.90	0.90	0.92	0.90
MV	0.93	0.91	0.93	0.90	0.90	0.93	0.93	0.94	0.92
NI	0.98	0.97	0.98	0.98	0.98	0.98	0.97	0.97	0.98
NW	1.04	1.04	1.04	1.04	1.03	1.04	1.05	1.05	1.04
RP	0.90	0.90	0.87	0.88	0.89	0.90	0.90	0.92	0.90
SL	0.84	0.85	0.83	0.84	0.87	0.88	0.88	0.90	0.86
SN	0.95	0.92	0.92	0.92	0.92	0.93	0.91	0.93	0.93
ST	0.94	0.95	0.94	0.91	0.88	0.90	0.88	0.92	0.92
SH	0.87	0.89	0.89	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.89
TH	0.96	0.95	0.95	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95	0.95
StSt	0.87	0.91	0.91	0.91	0.94	0.91	0.94	0.95	0.92

The still remaining gaps, i.e. the weight gains in the years 1990 and 1991 were closed by using the respective data for 1992.

Für die damit in Table 4.40 noch verbliebenen Datenlücken in den Jahren 1990 und 1991 wurden die Daten von 1992 übernommen.

4.6.2 Energy requirements / Energiebedarf

The description of energy requirements is given in KTBL (2008), pp. 560 ff

DÄMMGEN et al. (2005) developed a relation to derive the cumulative metabolizable energy ΣME_2 as a function of the final weight of the animals:

$$\Sigma ME_2 = a \cdot w_{\text{fin}} - (b \cdot w_{\text{fin}} - c) \cdot \ln \left(\frac{\Delta w_{\text{mb}}}{\Delta w_{\text{unit,g}}} \right) - d \quad (4.78)$$

ΣME	cumulative metabolisable energy for fattening period 2 (in MJ an ⁻¹)
a	constant ($a = 444.6 \text{ MJ kg}^{-1}$)
w_{fin}	final live weight (in kg an ⁻¹), see Chapter 4.6.1.2
b	constant ($b = 48.936 \text{ MJ kg}^{-1}$)
c	constant ($c = 9020 \text{ MJ an}^{-1}$)
Δw_{mb}	mean live weight gain per day (in g an ⁻¹ d ⁻¹), see Chapter 4.6.1.2
$\Delta w_{\text{unit,g}}$	unit weight gain ($\Delta w_{\text{unit,g}} = 1 \text{ g an}^{-1} \text{ d}^{-1}$)
d	constant ($d = 91765 \text{ MJ an}^{-1}$)

4.6.3 Feed and energy intake / Futter- und Energieaufnahme

The overall ME requirements are covered by concentrates and roughage. The relative share of concentrates is described with the following relation, using a regression approach and the two variants of maize silage /concentrates provided in KTBL (2008), pg. 562 ($R^2 = 0.9998$).

Der Gesamtbedarf an ME wird durch Rindermastfutter sowie Raufutter gedeckt. Der relative Beitrag des Kraftfutters wird mit der nachstehenden Formel beschrieben, die mittels Regression aus Angaben in KTBL (2008), S. 562, zu zwei verschiedenen Rindermastfutter/Maissilage-Varianten abgeleitet wurde ($R^2 = 0.9998$).

$$X_{\text{F, ME, conc}} = a - b \cdot w_{\text{fin}} \quad (4.79)$$

$X_{\text{F, ME, conc}}$	share of total feed ME contributed by concentrates (in MJ MJ ⁻¹)
a	constant ($a = 0.353 \text{ MJ MJ}^{-1}$)
b	constant ($b = 7.798 \cdot 10^{-5} \text{ MJ MJ}^{-1} \text{ an kg}^{-1}$)
w_{fin}	final live weight (in kg an ⁻¹), see Chapter 4.6.1.2

Beef bulls are rarely grazed. However this topic has to be taken into account according to the results of the 2010 agricultural census (LZ2010). The calculation of ME requirements assumes that the ME input with roughage is proportional to the share of time during which the animals are grazed. ME is then taken in with pasture grass, whereas maize silage is the ME source for the remaining time.

Weidegang von männlichen Mastrindern ist selten, muss aber nach den Ergebnissen der Landwirtschaftszählung 2010 (LZ 2010) berücksichtigt werden. Dies erfolgt bei der ME-Bedarfsberechnung, indem der mit Raufutter aufzunehmende ME-Betrag proportional zur Weidedauer durch Weidegras gedeckt wird, während der Rest des Raufutter-ME aus Maissilage aufgenommen wird.

These assumptions combined with the knowledge of ME and N contents of all diet constituents (including concentrates) allow for a quantification of the dry matter and nitrogen intake (see Chapter 4.5.3 for a detailed description of the general approach).

Damit sowie mit dem ME-Gehalt und dem N-Gehalt von Maissilage und Rindermastfutter lassen sich die mit dem Futter aufgenommenen Mengen von Trockenmasse und Stickstoff berechnen. (Zur prinzipiellen Vorgehensweise siehe Kapitel 4.5.3).

The properties of the diet constituents are listed in Table 4.43.

Die im Inventar verwendeten Futterkennwerte sind Table 4.43 zu entnehmen.

Table 4.43: Male beef cattle, diet characteristics used in the inventory

(η_{ME} : content of metabolizable energy, related to dry matter; X_{DE} : digestibility of energy; X_{ME} : metabolizability of energy; x_{XP} : crude protein content of feed, related to dry matter; X_{DOM} : digestibility of organic matter; x_{ash} : ash content of feed, related to dry matter)

	η_{ME} MJ kg ⁻¹	X_{DE} MJ MJ ⁻¹	X_{ME} MJ MJ ⁻¹	x_{XP} kg kg ⁻¹	X_{DOM} kg kg ⁻¹	$x_{ash, feed}$ kg kg ⁻¹
grass (pasture) ^a	10.0	0.689	0.558	0.180	0.72	0.125
maize silage ^a	10.2	0.693	0.571	0.080	0.73	0.082
concentrates	12.3 ^b	0.778 ^c	0.663 ^c	0.250 ^b	0.86 ^d	0.096 ^d

^a see Table 4.34

^b according to "Rindermastfutter" in DLG (2005), pg. 13; fresh-matter related data transformed into dry-matter related data.

^c adopted from "concentrates" line in Table 4.34.

^d according to <http://www.riswick.de/pdf/tabellen-rindermastfutter-511.pdf> ("RIMA 22/3", Haneberg & Leusing, Schöppingen)

The data in Table 4.43 concerning pasture grass and maize silage equals those provided in Table 4.17.

The data for crude protein contents are converted into data on N contents by multiplying the crude protein contents by 1/6.25 (IPCC(2006)-10.58).

The GE intake during the entire fattening period is calculated by analogy to the procedure described for heifers (see Chapter 4.5.3).

The mean feed digestibility is obtained by averaging the digestibilities of the various feed components (see Table 4.34) weighted with the respective intakes of these feed components.

Die Angaben für Weidegras und Maissilage in Table 4.43 entsprechen den Daten in Table 4.1.

Die Angaben zum Rohproteingehalt werden mit dem Faktor 1/6,25 in N-Gehalte umgerechnet werden (IPCC(2006)-10.58).

Die Berechnung der über die gesamte Mastdauer gemittelten täglichen GE-Aufnahme erfolgt analog zur Vorgehensweise bei den Färsen, siehe Kapitel 4.5.3.

Die mittlere Verdaulichkeit des Futters ergibt sich aus der mit den einzelnen Futtermengen gewichteten Mittelung der Verdaulichkeiten der einzelnen Futterkomponenten, die in Table 4.34 aufgeführt sind.

4.6.4 Methane from enteric fermentation / Methan aus der Verdauung

For the calculation of CH₄ emissions from enteric fermentation the Tier 2 method described in Chapter 3.3.2 is used. This method needs the gross energy intake (see Chapter 4.6.3) and the methane conversion factor $x_{CH_4, GE}$ as input.

The methane conversion factor was used as provided by IPCC(2006)-10.30, Table 10.12: $x_{CH_4, bf} = 0,065$ MJ MJ⁻¹.

No national data is available on the uncertainty of the emission factor for CH₄ from enteric fermentation do not exist. IPCC(2006)-10.33 estimates the uncertainty of Tier 2 approaches to be 20 %. This value is, according to the definition of uncertainty used in Chapter 3 in IPCC (2006a), interpreted as half the 95 % confidence interval. A normal distribution is assumed.

Die CH₄-Emission aus der Verdauung wird mit dem in Kapitel 3.3.2 beschriebenen Tier-2-Verfahren aus der Gesamtenergie-Aufnahme (siehe Kapitel 4.6.3) mithilfe des Methanumwandlungsfaktors $x_{CH_4, GE}$ berechnet.

Der Methanumwandlungsfaktor wurde IPCC(2006)-10.30, Tabelle 10.12 entnommen: $x_{CH_4, bf} = 0,065$ MJ MJ⁻¹.

Zur Unsicherheit des Emissionsfaktors für CH₄ aus der Verdauung sind keine nationalen Daten verfügbar. IPCC(2006)-10.33 schätzt die Unsicherheit bei Anwendung von Tier-2-Verfahren auf 20 %. Dieser Wert wird im Sinne von IPCC (2006a), Kapitel 3, als halbes 95 %-Konfidenzintervall interpretiert. Es wird Normalverteilung angenommen.

4.6.5 Methane from manure management / Methan aus dem Wirtschaftdüngermanagement

CH₄ emissions from manure management are quantified using a Tier 2 procedure, cf. Chapter 3.3.4.1.

Volatile solids (VS) excretion rates are calculated using the modified IPCC approach described in DÄMMGEN et al. (2011a), see Chapter 3.3.3.1.

The necessary information on the digestibility of organic matter and the ash contents of the diet are obtained as weighted means from the properties of feed constituents as listed in Table 4.43. The national mean digestibility of organic matter for 2010 is 0.75 kg kg⁻¹, the national mean ash content (related to dry matter) for 2010 amounts to 0.076 kg kg⁻¹.

Die CH₄-Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management werden mit einem Tier-2-Verfahren bestimmt, siehe Kapitel 3.3.4.1.

Die VS-Ausscheidungen („volatile solids“) werden nach dem gegenüber IPCC modifizierten Verfahren von DÄMMGEN et al. (2011a) berechnet, siehe Kapitel 3.3.3.1.

Die dazu notwendigen Daten zur Verdaulichkeit von organischer Substanz und dem Aschegehalt im Futter ergeben sich im gewichteten Mittel aus den Angaben zu den Rationskomponenten in Table 4.43. Die mittlere Verdaulichkeit von organischer Substanz liegt im Deutschlandmittel für 2010 bei 0,75 kg kg⁻¹, das nationale Mittel des Aschegehaltes liegt im Jahr 2010 bei 0,076 kg kg⁻¹ (bezogen auf die Futtertrockenmasse).

Maximum methane producing capacity B_0 and conversion factors (MCF) for the respective manure storage system are provided in Table 4.4 (see Chapter 4.2.1).

The frequency distribution of storage types is supplied by RAUMIS or derived from official census data (see Chapter 3.4.3).

German data on the uncertainty of CH_4 emissions from manure management do not exist. IPCC(2006)-10.48 estimates the uncertainty of Tier 2 approaches to be 20 %. This value is, according to the definition of uncertainty used in Chapter 3 in IPCC (2006a), interpreted as half the 95 % confidence interval. A normal distribution is assumed.

4.6.6 NMVOC emissions / NMVOC-Emissionen

The calculation of the NMVOC emissions of cattle are calculated with a Tier 2 methodology, see Chapters 3.3.4.2.2 and 3.3.4.2.3.

Agricultural NMVOC emissions are reported, but are neglected regarding the NEC emission threshold, see Chapter 3.3.4.2.

4.6.7 Emissions of nitrogen species / Emissionen von Stickstoff-Spezies

The calculation of these emissions presupposes the knowledge of N excretions, of the N inputs with straw, the conversion of N_{org} and TAN as well as the frequency distributions of housing types and storage facilities, spreading techniques and times before incorporation.

4.6.7.1 N excretion / N-Ausscheidung

N excretions are calculated as difference between the amounts of N taken in and N retained.

The N intake rate is assessed from the dry matter intake rate of the various diet constituents and their specific N contents (see Chapter 4.5.3).

The amount of N retained is calculated assuming an N content of the animal body of $0.0272 \text{ kg kg}^{-1}$ (Lfl, 2006a, Table 8).

The overall N excretion rates entering storage are obtained from the overall N excretion rates reduced by a share dropped during grazing that is proportional to the duration of grazing (see Chapter 11.5).

The TAN content is calculated according to Chapter 3.3.3.2. It is variable.

4.6.7.2 N inputs with straw / N-Einträge mit Stroh

For straw based systems N inputs with straw are taken into account. The amounts of N are given in Table 4.44. For the properties of straw and the mineralization of organic N to TAN see Chapter 3.3.4.3.2.

As no bedding is taken into account during the grazing period, the annual amount of bedding actually used depends on the duration of the grazing period.

Maximale Methan-Freisetzungskapazität B_0 und Methanumwandlungsfaktoren für die einzelnen Lagerungssysteme (MCF) sind Table 4.4 in Kapitel 4.2.1 zu entnehmen.

Die Häufigkeitsverteilung der Lagerverfahren wird durch RAUMIS bereitgestellt bzw. aus offiziellen Erhebungen abgeleitet, siehe Kapitel 3.4.3.

Deutsche Zahlen zur Unsicherheit der CH_4 -Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management liegen nicht vor. IPCC(2006)-10.48 schätzt die Unsicherheit bei Anwendung von Tier-2-Verfahren auf 20 %. Dieser Wert wird im Sinne von IPCC (2006a), Kapitel 3, als halbes 95 %-Konfidenzintervall interpretiert. Es wird Normalverteilung angenommen.

Die NMVOC-Emissionen von Rindern werden mit einer Tier-2-Methode berechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.2 und 3.3.4.2.3.

Landwirtschaftliche NMVOC-Emissionen werden zwar berichtet, aber bzgl. der NEC-Emissionsobergrenze nicht angerechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.

Die Berechnung der Emissionen beruht auf der Kenntnis der N-Ausscheidungen, der N-Einträge mit Stroh, der Umwandlungen von N_{org} und TAN, der Häufigkeit von Stalltypen, Lagertypen, Ausbringungstechniken und Einarbeitungszeiten.

Die N-Ausscheidungen werden aus der Bilanz aus aufgenommenem und retiniertem N berechnet.

Die N-Aufnahme ergibt sich aus der Trockenmasseaufnahme der einzelnen Rationskomponenten und deren spezifischen N-Gehalte (siehe Kapitel 4.5.3).

Der retinierten N-Menge liegt ein N-Gehalt des Tierkörpers von $0,0272 \text{ kg kg}^{-1}$ zugrunde (Lfl, 2006a, Tabelle 8).

Von der Gesamt-N-Ausscheidung wird ein zur Weidedauer proportionaler Anteil subtrahiert und der Berechnung der Emissionen aus Weidegang zugrundegelegt (siehe Kapitel 11.5).

Der TAN-Gehalt wird nach Kapitel 3.3.3.2 berechnet und ist variabel.

Für Systeme mit Einstreu wird der N-Eintrag mit dem Stroh berücksichtigt. Die eingetragenen N-Mengen sind in Table 4.44 angegeben. Zu den Eigenschaften von Stroh und der Mineralisierung von organisch gebundenem N zu TAN wird auf Kapitel 3.3.4.3.2 verwiesen.

Da für Weidezeiten keine Einstreu berücksichtigt wird, hängt die im Inventar für das gesamte Jahr verwendete Einstreumenge von der Weidedauer ab.

Table 4.44: Male beef cattle, N inputs with straw in solid-manure systems

Housing type	Haltungssystem	straw input kg pl ⁻¹ d ⁻¹	dry matter (DM) kg pl ⁻¹ d ⁻¹	N input (in DM) kg pl ⁻¹ d ⁻¹	TAN kg pl ⁻¹ d ⁻¹
tied systems	Anbindehaltung	2.0 ^a	1.7	10.0·10 ⁻³	5.0·10 ⁻³
loose housing, sloped floor	Laufstall, Tretmist	2.5 ^b	2.2	12.5·10 ⁻³	6.2·10 ⁻³

^a Assumption: same value as for heifers, tied systems (cf. Table 4.35)

^b Source: KTBL (2006a), pg. 365

4.6.7.3 Emissions from housing and grazing / Emissionen aus Stall und von der Weide

The TAN related emission factors for cattle are used (see Table 4.5).

The NH₃-N emission factor for grazing is 0.06 kg kg⁻¹, related to TAN excreted (EMEP(2013)-3B-27, Table 3.7).

N₂O and NO emissions resulting from animal excreta dropped during grazing are calculated according to Chapter 11.5. For further details see Chapters 3.3.4.3.5 and 4.3.8.5.1.

Es werden die auf TAN bezogenen Emissionsfaktoren für Rinder verwendet (siehe Table 4.5).

Der auf die ausgeschiedene TAN-Menge bezogene NH₃-N-Emissionsfaktor für Weidegang beträgt 0,06 kg kg⁻¹ (EMEP(2013)-3B-27, Table 3.7).

Die aus dem Weidegang resultierenden Emissionen von N₂O und NO werden nach Kapitel 11.5 berechnet. Zu weiteren Einzelheiten siehe Kapitel 3.3.4.3.5 und 4.3.8.5.1.

4.6.7.4 Emissions from storage and spreading / Emissionen aus Lager und Ausbringung

For the emission factors for NH₃, N₂O, NO and N₂ from storage see Chapters 4.2 and 3.3.4.3.5.

The emission factors of NH₃ for the different spreading techniques and times before incorporation are given in Chapter 4.2.2.3.

NO emissions from manure management are reported (as NO_x), but are neglected regarding the NEC emission threshold, see Chapter 3.3.4.2.

Für die Emissionsfaktoren für NH₃, N₂O, NO und N₂ aus dem Lager siehe Kapitel 4.2 und 3.3.4.3.5.

Für die Emissionsfaktoren von NH₃ für die verschiedenen Ausbringungstechniken und Einarbeitungszeiten wird auf Kapitel 4.2.2.3 verwiesen.

NO aus dem Wirtschaftsdünger-Management wird berichtet (als NO_x), bzgl. der NEC-Emissionsobergrenze aber nicht angerechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.

4.6.7.5 Indirect N₂O from manure management / Indirektes N₂O aus dem Wirtschaftsdünger-Management

Indirect N₂O emissions from manure management (housing, storage; without spreading) are calculated according to Chapter 3.3.4.3.6. See Chapter 3.3.4.3.6 also for the uncertainties of activity data and emission factor.

(Indirect N₂O emissions from agricultural soils after spreading of manures or digestated manures are reported in Sector 3.D. For the calculation of these emissions see Chapter 12.)

Indirekte N₂O-Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management (Stall, Lager; ohne Ausbringung) werden nach Kapitel 3.3.4.3.6 berechnet. Siehe dort auch wegen der Unsicherheiten von Aktivitätswert und Emissionsfaktor.

(Indirekte N₂O-Emissionen als Folge der Ausbringung von Wirtschaftsdüngern und Wirtschaftsdünger-Gärresten werden im Sektor 3.D berichtet. Zur Berechnung siehe Kapitel 12.)

4.6.7.6 Uncertainties of emission factors and activity data / Unsicherheiten von Emissionsfaktoren und Aktivitätsdaten

For the uncertainties of the emission factors see Chapter 4.2.2.4 and 11.2.2.

The uncertainty of N excretion is discussed in Chapter 14.4.1. For the uncertainty of the amount of N spreaded see Chapter 11.2.1.

Zu den Unsicherheiten der Emissionsfaktoren siehe Kapitel 4.2.2.4 und 11.2.2.

Die Unsicherheit der N-Ausscheidung wird in Kapitel 14.4.1 diskutiert. Zur Unsicherheit der zur Ausbringung kommenden N-Menge siehe Kapitel 11.2.1.

4.6.8 Emissions of particulate matter / Partikelemissionen

The method to calculate particle emissions is described in Chapter 3.3.4.5. The emission factors are listed in Table 4.45. For the uncertainty of the emission factors see Chapter 3.3.4.5.

Zur Berechnungsmethode für Partikelemissionen wird auf Kapitel 3.3.4.5 verwiesen. Die Emissionsfaktoren sind in Table 4.45 angegeben. Zur Unsicherheit der Emissionsfaktoren siehe Kapitel 3.3.4.5.

Information on the frequency distribution of the various housing systems and the duration of grazing is obtained from RAUMIS and the respective data supplied by the official statistics (see Chapter 3.4.3).

Die Angaben zur Verteilung der verschiedenen Stallformen und zur Dauer der Weidehaltung werden durch RAUMIS bereitgestellt bzw. aus der Agrarstatistik entnommen (siehe Kapitel 3.4.3).

Table 4.45: Male beef cattle, emission factors for particle emissions from housing (first estimates)

Housing type	Haltungssystem	Emission factor for TSP kg pl ⁻¹ a ⁻¹	Emission factor for PM ₁₀ kg pl ⁻¹ a ⁻¹	Emission factor for PM _{2.5} kg pl ⁻¹ a ⁻¹
straw based	strohbasierend	0.52	0.24	0.16
slurry based	güllebasierend	0.69	0.32	0.21

Source: EMEP(2016)-3B-53, Table A1.6 (with TSP = ID [inhalable dust])

4.6.9 References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung

Table 4.46: Male beef cattle, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)

			from	to
Emissions	Emissionen	CH ₄ enteric fermentation	EM1004.004	
		CH ₄ manure management	EM1005.004	
		NM VOC	EM1007.004	
		NH ₃	EM1009.010	EM1009.012
		N ₂ O	EM1009.094	
		NO	EM1009.124	
		TSP	EM1010.004	
		PM ₁₀	EM1010.034	
		PM _{2.5}	EM1010.064	
Activity data	Aktivitäten		AC1005.004	
Emission factors	Emissionsfaktoren	CH ₄ enteric fermentation	IEF1004.004	
		CH ₄ manure management	IEF1005.004	
		NM VOC	IEF1007.004	
		NH ₃	IEF1009.010	EF1009.012
		N ₂ O	IEF1009.088	
		NO	IEF1009.116	
		TSP	IEF1010.004	
		PM ₁₀	IEF1010.032	
		PM _{2.5}	IEF1010.060	
Additional information	zusätzliche Informationen		AI1005CAT.098	AI1005CAT.128
Excretion rates	Ausscheidungen	N	EXCR.016	EXCR.020

4.7 Suckler cows / Mutterkühe

Suckler cow herds serve the production of saleable calves. The cows are kept in the house or grazing all year round. The category "suckler cows" is a subcategory of „other cattle“, see Chapter 4.9.

In the inventory the category "suckler cows" does not consider the calves. The calves of suckler cows are included in the inventory category "calves", see Chapter 4.4.

The animal category „suckler cows“ comprises not only the suckler cows (category K in Table 4.1), but also cows for fattening and slaughtering (category L in Table 4.1). This approach represents the practice used as of 2008 by the Federal Statistical Office, i. e. counting both types of cows together as "other cows". Before 2008, the category "other cows" was a separate category in official surveys (in 2007 about 0,6 % of total cattle number). As of 2008, "other cows" are inseparably included in the other categories of female cattle. Hence they do not constitute a separate category in the inventory. This in turn required, for sake of consistency, to include the numbers of those "other cows" in other female cattle categories for the years before 2008. As those "other cows" are no dairy cows and are likely to be older than heifers, the only plausible choice was to add their numbers to the numbers of suckler cows. This is a conservative approach as the "other cows" do not produce milk and hence should have a lower feed intake and therefore also a lower N excretion than suckler cows.

As of Submission 2015 the animal category „suckler cows“ also comprises, for the years 1990 – 2012, buffalo that constituted a separate animal category in former submissions. For details see Chapter 3.4.2.

The emissions of the category "Suckler cows" are calculated according to the methods listed in Table 4.47.

For the definition of the methods see Chapter 3.2.3.

Mutterkuh-Herden dienen der Produktion von absetzbaren Kälbern. Mutterkühe werden sowohl im Stall als auch ganzjährig auf der Weide gehalten. Die Kategorie „Mutterkühe“ ist eine Unterkategorie der „übrigen Rinder“, siehe Kapitel 4.9.

Im Inventar umfasst die Kategorie „Mutterkühe“ keine Kälber; diese werden in einer separaten Kategorie berücksichtigt, siehe Kapitel 4.4.

Die Tierkategorie „Mutterkühe“ umfasst neben den Mutterkühen (Kategorie K in Table 4.1) auch die Schlacht- und Mastkühe (Kategorie L in Table 4.1). Diese Vorgehensweise ist eine Anpassung an die seit 2008 geübte Praxis des Statistischen Bundesamtes, diese beiden Kategorien undifferenziert zusammen als „andere Kühe“ zu erfassen. Vor 2008 war die Kategorie "andere Kühe" in den amtlichen Erhebungen eine eigene Kategorie (2007 etwa 0,6% der Gesamtviehzahl). Ab 2008 sind "andere Kühe" untrennbar in den anderen Kategorien von weiblichen Rindern enthalten. Daher bilden sie keine gesonderte Kategorie im Inventar. Aus Konsistenzgründen war es aber erforderlich, die Anzahl dieser "anderen Kühe" in den anderen Kategorien von weiblichen Rindern für die Jahre vor 2008 zu berücksichtigen. Da diese "anderen Kühe" keine Milchkühe und wahrscheinlich älter sind als die Färsen, blieb als einzige plausible Option, ihre Anzahl zur Zahl der Mutterkühe zu addieren. Dies ist ein konservativer Ansatz, da die "anderen Kühe" keine Milch produzieren und daher eine geringere Futteraufnahme und somit eine geringere N-Ausscheidung als Mutterkühe haben sollten.

Seit Submission 2015 werden der Kategorie „Mutterkühe“ für die Zeitreihenjahre 1990 – 2012 zusätzlich noch die Büffel zugeschlagen, die bis zu Submission 2014 eine eigenständige Tierkategorie bildeten (siehe Kapitel 3.4.2).

Die Emissionen der Kategorie „Mutterkühe“ werden nach den in Table 4.47 zusammengestellten Methoden berechnet.

Zur Methodendefinition siehe Kapitel 3.2.3.

Table 4.47: Suckler cows, calculation methods applied

Species	Origin	Tier	Method applied
CH ₄	enteric fermentation	2	IPCC / national
CH ₄	manure management	2	IPCC / national
NMVOC	manure management	2	EMEP
NH ₃	manure management	2	EMEP / national
N ₂ O, NO, N ₂	manure management	2	IPCC / national
TSP, PM ₁₀ , PM _{2.5}	manure management	2	EMEP

4.7.1 Activity and performance data /Aktivitäts- und Leistungsdaten

4.7.1.1 Animal numbers / Tierzahlen

In the inventory, the subcategory "suckler cows" comprises "Ammen- und Mutterkühe" (suckler cows) and "Schlacht- und Mastkühe" (cows for slaughtering and fattening), and for 1990 – 2012 also buffalo as detailed in Chapter 4.7.

Die Tierzahl der Tierkategorie „Mutterkühe“ im Inventar umfasst die Tierzahlen aus der Statistik für „Ammen und Mutterkühe“ und „Schlacht- und Mastkühe“, sowie bis zum Zeitreihenjahr 2012 die Büffel, siehe Kapitel 4.7.

Cattle numbers are collected annually by the Statistical Offices of the federal states (STATLA C III 1 – vj 4) and published by the Federal Statistical Office in federal-state resolution and for Germany (STATBA FS3 R4, STATBA FS3 R4.1). The cattle numbers used to calculate the emissions in district resolution are provided by the Federal Statistical Office specifically for emissions reporting, see Chapter 4.1.1.

Therefore the total animal number of the animal category “suckler cows” is calculated as follows:

$$n_{sc} = n_K + n_L + n_{bu} \quad (4.80)$$

n_{sc}	number of suckler cows considered
n_K	animal numbers of type K in the German census (see Table 4.1)
n_L	animal numbers of type L in the German census (see Table 4.1)
n_{bu}	numbers of buffalo: $n_{bu} = 0$ as of 2013; for 1990 – 2012 see Chapters 4.7 and 4.1.1.2

For the uncertainties of the animal numbers see Chapter 4.1. These uncertainties are inevitably used also for buffalo numbers n_{bu} .

Rinderzahlen werden jährlich von den Statistischen Landesämtern erhoben (STATLA C III 1 – vj 4) und durch das Statistische Bundesamt in Bundeslandaauflösung und für Deutschland veröffentlicht (STATBA FS3 R4, STATBA FS3 R4.1). Die zur Emissionsberechnung verwendeten Rinderzahlen in Kreisauflösung werden durch das Statistische Bundesamt speziell für die Emissionsberichterstattung bereitgestellt, siehe dazu Kapitel 4.1.1.

Die Tierplatzzahl der Tierkategorie „Mutterkühe“ wird demnach wie folgt gebildet:

Zu den Unsicherheiten der Rinderzahlen siehe Kapitel 4.1. Diese Unsicherheiten werden zwangsläufig auf die Büffelanteile in Gleichung (4.80) übertragen.

4.7.1.2 *Animal weight / Tiergewicht*

The weight of the suckler cows is not used in the calculation of energy requirements and emissions, because a German standard value is used for the energy requirements, see chapter 4.7.2.

Since the mean weight of suckler cows is to be reported and no statistical data are available, this weight is estimated on the basis of data in KTBL (2008), p. 584: According to KTBL, the weight of a suckler cow varies, depending on the breed, between 600 kg an⁻¹ (medium-sized mother cow) and 800 kg an⁻¹ (large-sized suckler cow), but the medium-sized breeds are preferred. KTBL gives no information on the proportions of the different breeds in the total population. The unknown weight value must be between 600 kg an⁻¹ (medium-sized suckler cows only) and 700 kg an⁻¹ (equal proportions of medium-sized and large-sized mother cows). It therefore seems plausible to assume, as a first approximation, a mean suckler cow weight of 650 kg an⁻¹.

Das Gewicht der Mutterkühe geht nicht in die Energiebedarfs- und Emissionsberechnungen ein, da ein deutscher Standardwert für den Energiebedarf verwendet wird, siehe Kapitel 4.7.2.

Da das mittlere Gewicht der Mutterkühe zu berichten ist und keine statistischen Daten dazu verfügbar sind, wird dieses Gewicht anhand von Angaben in KTBL (2008), S. 584, geschätzt: Nach KTBL liegt das Gewicht einer Mutterkuh je nach Rasse zwischen 600 kg an⁻¹ (mittelrahmige Mutterkuh) und 800 kg an⁻¹ (großrahmige Mutterkuh), wobei aber die mittelrahmigen Rassen bevorzugt werden. KTBL macht dabei keine Angaben zu den Anteilen der verschiedenen Rassen an der Gesamtpopulation; der unbekannte Gewichtswert muss aber zwischen 600 kg an⁻¹ (nur mittelrahmige Mutterkühe) und 700 kg an⁻¹ (gleiche Anteile von mittel- und großrahmigen Mutterkühen) liegen. Es erscheint damit plausibel, in erster Näherung von einem mittleren Mutterkuhgewicht von 650 kg an⁻¹ auszugehen.

4.7.2 *Energy requirements and feed intake / Energiebedarf und Futteraufnahme*

The total ME requirements of a suckler cow include the ME requirements for maintenance, pregnancy, milk production and grazing.

Statistical data on pasture are available (see table AI1005CAT.130 in the data collection described in Chapter 2.4), but there are no statistical surveys on suckler cow performance data such as animal weight and milk yield in Germany. Based on KTBL (2006b), pg. 485, the weight of suckler cows is between 500 and 700 kg. According to HÄUSLER (2012), the annual milk yield in practice is between 2000 and 5000 kg; in a series of experiments of the Austrian teaching and research center Raumberg-Gumpenstein, a milk yield of between

Der ME-Gesamtbedarf einer Mutterkuh umfasst die ME-Anforderungen für Erhaltung, Trächtigkeit, Milchproduktion und Weidegang.

Statistische Daten zum Weidegang sind zwar verfügbar (siehe Tabelle AI1005CAT.130 in der in Kapitel 2.4 beschriebenen Datensammlung), aber es gibt in Deutschland keine statistischen Erhebungen zu Mutterkuh-Leistungsdaten wie Tiergewicht und Milchleistung. Geht man von KTBL (2006b), S. 485, aus, liegt das Gewicht von Mutterkühen zwischen 500 und 700 kg. Nach HÄUSLER (2012) liegt die jährliche Milchleistung in der Praxis zwischen 2000 und 5000 kg; in einer Versuchsreihe des österreichischen Lehr- und Forschungszentrums

2245 and 3351 kg was obtained depending on the duration of suckling period (9 or 12 months). There are no German statistics on the duration of suckling period.

Because of this lack of Germany-representative performance data, it is not possible to model the ME requirements of suckler cows for the purpose of emission reporting. Reference is therefore made to the German standard value for total annual ME requirements stated in KTBL (2006b), pg. 485: 35,766 MJ an⁻¹ a⁻¹. The feed ration described at the same place includes a contribution from grazing, so that it can be assumed that the grazing period has been taken into account in a way that is appropriate for average German conditions.

A statistical survey of data on the grazing of suckler cows is only available for 2010 (see Chapter 3.4.3.2.7). This data is available at federal state level. It shows, on average for Germany, that suckler cows were on pasture during 47.3 % of the year. In the absence of more recent data, the 2010 grazing data were retained in the inventory for all subsequent years of the time series. This results in an average German grazing time of 47.3% of the year also for 2018. The RAUMIS data used for the years 1990 to 1993 (see Chapter 3.4.3.1) show an average grazing period of 41.5 % of the year. Since the data come from different sources, it is not possible to verify whether such an increase from 41.5 % to 47.3 % actually took place. In addition, it is not possible to clarify exactly how much the proportion of grazing time was included in the total ME requirements specified by KTBL (2006) (N. Dreisbach, KTBL, personal communication, 2018).

According to KTBL, the increase in grazing time used in the inventory on the basis of the above data (despite their uncertainties) corresponds to an additional annual ME requirement of 141 MJ per suckler cow (N. Dreisbach, N. Dreisbach, KTBL, personal announcement, 2018). This would add up to 35,766 + 141 = 35,901 MJ an⁻¹ a⁻¹ for the total annual ME requirements. The inventory conservatively calculates with the value rounded up to 1000 MJ, i.e. with 36,000 MJ an⁻¹ a⁻¹.

However, this comparatively simple approach, which according to the IPCC definition corresponds to an Tier 2 methodology (since a national ME value is used), seems justified, since, according to the decision trees in IPCC (2006), Chapter 10, Figures 10.2 to 10.4 a Tier 2 methodology is only required if an animal category contributes 25-30 % or more to the emissions of a source category (i. e. CH₄ from enteric fermentation, CH₄ from manure management, N₂O from manure management). With the above mentioned total ME requirements of 36,000 MJ an⁻¹ a⁻¹ German suckler cows contribute less than 10 % in each of the three source categories. The emissions of suckler cows could therefore have been calculated using a much simpler Tier 1 methodology.

Raumberg-Gumpenstein wurde in Abhängigkeit von der Säugedauer (9 bzw. 12 Monate) eine Milchleistung zwischen 2245 und 3351 kg ermittelt. Auch zur Säugedauer gibt es keine deutsche Statistik.

Wegen des Mangels an deutschlandrepräsentativen Leistungsdaten ist es nicht möglich, den ME-Gesamtbedarf der Mutterkühe für die Zwecke der Emissionsberichterstattung zu modellieren. Es wird daher auf den in KTBL (2006b), S. 485, angegebenen deutschen Standardwert für den jährlichen ME-Gesamtbedarf zurückgegriffen: 35.766 MJ an⁻¹ a⁻¹. Die an gleicher Stelle beschriebene Futterration beinhaltet einen Beitrag aus Weidegang, so dass davon auszugehen ist, dass die Weidedauer in einer für mittlere deutsche Verhältnisse angemessenen Weise berücksichtigt wurde.

Eine statistische Erhebung von Daten zum Weidegang von Mutterkühen gibt es nur für das Jahr 2010 (siehe Kapitel 3.4.3.2.7). Diese Daten liegen auf Bundeslandebene vor. Aus ihnen folgt für 2010, dass Mutterkühe im deutschen Durchschnitt 47,3 % des Jahres auf der Weide standen. Mangels neuerer Zahlen wurden die Bundesland-Weidedaten von 2010 im Inventar für alle weiteren Jahre der Zeitreihe beibehalten. Daraus folgt auch für 2018 eine mittlere deutsche Weidezeit von 47,3 % des Jahres. Aus den für die Jahre 1990 bis 1993 verwendeten RAUMIS-Daten (siehe Kapitel 3.4.3.1) ergibt sich eine durchschnittliche Weidezeit von 41,5 % des Jahres. Da die Daten aus unterschiedlichen Quellen stammen, lässt sich nicht überprüfen, ob ein solcher Anstieg von 41,5 % auf 47,3 % tatsächlich stattgefunden hat. Ebenso wenig lässt sich klären, wie hoch genau der Anteil der Weidedauer war, der in dem von KTBL (2006) angegebenen ME-Gesamtbedarf enthalten ist (N. Dreisbach, KTBL, persönliche Mitteilung, 2018).

Der im Inventar aufgrund der vorstehend genannten Daten (trotz ihrer Unsicherheiten) zugrunde gelegte Anstieg der Weidedauer entspricht laut KTBL - unter Rückgriff auf die IPCC-2006-Methodik - einem zusätzlichen jährlichen ME-Bedarf von 141 MJ pro Mutterkuh (N. Dreisbach, KTBL, persönliche Mitteilung, 2018). Dies ergäbe für den jährlichen ME-Gesamtbedarf in der Summe 35.766 + 141 = 35.901 MJ an⁻¹ a⁻¹. Das Inventar rechnet konservativ mit dem auf ganze 1000 MJ aufgerundeten Wert von 36.000 MJ an⁻¹ a⁻¹.

Diese vergleichsweise einfache Vorgehensweise, die nach IPCC-Definition aber einer Tier-2-Methodik entspricht (da ein nationaler ME-Wert verwendet wird), erscheint berechtigt, da nach den Entscheidungsbäumen in IPCC (2006), Kapitel 10, Abbildungen 10.2 bis 10.4 eine Tier-2-Methodik erst dann erforderlich ist, wenn eine Tierkategorie 25 – 30 % oder mehr zu den Emissionen einer Quellenkategorie (d. h. CH₄ aus Verdauung, CH₄ aus Wirtschaftsdüngermanagement, N₂O aus Wirtschaftsdüngermanagement) beiträgt. Mit dem o.g. ME-Gesamtbedarf von 36.000 MJ an⁻¹ a⁻¹ tragen die deutschen Mutterkühe in den genannten drei Quellenkategorie jeweils weniger als 10 % bei. Die Emissionen der Mutterkühe hätten demnach auch mit einer erheblich einfacheren Tier-1-Methodik berechnet werden können.

According to KTBL (2006b), pg. 485, a share of 1,620 MJ $\text{an}^{-1} \text{a}^{-1}$ of the annual total ME requirements is covered by concentrates. This is taken into account in the suckler cow model, which also calculates the provision of the remaining energy through the intake of pasture grass and grass silage: the intake of pasture grass is proportional to the relative proportion of a year spent on pasture; the ME contribution from grass silage is the remainder.

ME contents, digestibilities and metabolizabilities of these feed components are provided in Table 4.34 in Chapter 4.5.3. With these parameters the daily intake of dry matter and gross energy (GE) is calculated by analogy to the procedures described for heifers, see Chapter 4.5.3, equations (4.74) and (4.75).

4.7.3 Methane from enteric fermentation /Methan aus der Verdauung

For the calculation of CH_4 emissions from enteric fermentation the Tier 2 method described in Chapter 3.3.2 is used. This method needs the gross energy intake (see Chapter 4.7.2) and the methane conversion factor $\chi_{\text{CH}_4, \text{GE}}$ as input.

The methane conversion factor was used as provided by IPCC(2006)-10.30, Table 10.12: $\chi_{\text{CH}_4, \text{bf}} = 0.065 \text{ MJ MJ}^{-1}$.

No national data is available on the uncertainty of the emission factor for CH_4 from enteric fermentation do not exist. IPCC(2006)-10.33 estimates the uncertainty of Tier 2 approaches to be 20 %. This value is, according to the definition of uncertainty used in Chapter 3 in IPCC (2006a), interpreted as half the 95 % confidence interval. A normal distribution is assumed.

Laut KTBL (2006b), S. 485, wird vom jährlichen ME-Gesamtbedarf ein Anteil von 1.620 MJ $\text{an}^{-1} \text{a}^{-1}$ durch Kraftfutter gedeckt. Dies wird im Mutterkuhmodell berücksichtigt, welches darüber hinaus die Bereitstellung der übrigen Energie über die Aufnahme von Weidegras und Grassilage berechnet: Die Aufnahme von Weidegras erfolgt dabei proportional zum relativen Anteil eines Jahres, der auf der Weide verbracht wird; der ME-Beitrag aus Grassilage ergibt sich als Restglied.

Zu ME-Gehalt, Verdaulichkeit und Umsetzbarkeit dieser Futterrationenkomponenten siehe Table 4.34 in Kapitel 4.5.3. Mit diesen Kennwerten erfolgt die Berechnung der täglichen Aufnahme von Trockenmasse und Gesamtenergie (GE) analog zur Vorgehensweise bei den Färsen, siehe Kapitel 4.5.3, Gleichungen (4.74) und (4.75).

Die CH_4 -Emission aus der Verdauung wird mit dem in Kapitel 3.3.2 beschriebenen Tier-2-Verfahren aus der Gesamtenergie-Aufnahme (siehe Kapitel 4.7.2) mithilfe des Methanumwandlungsfaktors $\chi_{\text{CH}_4, \text{GE}}$ berechnet.

Der Methanumwandlungsfaktor wurde IPCC (2006)-10.30, Tabelle 10.12 entnommen: $\chi_{\text{CH}_4, \text{bf}} = 0,065 \text{ MJ MJ}^{-1}$.

Zur Unsicherheit des Emissionsfaktors für CH_4 aus der Verdauung sind keine nationalen Daten verfügbar. IPCC(2006)-10.33 schätzt die Unsicherheit bei Anwendung von Tier-2-Verfahren auf 20 %. Dieser Wert wird im Sinne von IPCC (2006a), Kapitel 3, als halbes 95 %-Konfidenzintervall interpretiert. Es wird Normalverteilung angenommen.

4.7.4 Methane from manure management / Methan aus dem Wirtschaftdüngermanagement

CH_4 emissions from manure management are quantified using a Tier 2 procedure, cf. Chapter 3.3.4.1.

Volatile solids (VS) excretion rates are calculated using the modified IPCC approach described in DÄMMGEN et al. (2011a), see Chapter 3.3.3.1.

The necessary information on the digestibility of organic matter and the ash contents of the diet are obtained as weighted means from the properties of feed constituents, see Chapter 4.7.2.

For the diet-related input data needed for the IPCC approach see Chapter 4.7.2. In accordance with IPCC(2006)-10.42, the ash content is assumed to be 0.08 kg kg^{-1} .

Maximum methane producing capacity B_0 and conversion factors (MCF) for the respective manure storage system are provided in Table 4.4 (see Chapter 4.2.1).

The frequency distribution of storage types is supplied by RAUMIS or derived from official census data (see Chapter 3.4.3).

Die CH_4 -Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management werden mit einem Tier-2-Verfahren bestimmt, siehe Kapitel 3.3.4.1.

Die VS-Ausscheidungen („volatile solids“) werden nach dem gegenüber IPCC modifizierten Verfahren von DÄMMGEN et al. (2011a) berechnet, siehe Kapitel 3.3.3.1.

Die dazu notwendigen Daten zur Verdaulichkeit von organischer Substanz und dem Aschegehalt im Futter ergeben sich im gewichteten Mittel aus den Angaben zu den Rationskomponenten, siehe Kapitel 4.7.2.

Die für den IPCC-Ansatz benötigten futterbezogenen Daten sind in Kapitel 4.7.2 angegeben. Für den Aschegehalt wird nach IPCC(2006)-10.42 0,08 kg kg^{-1} angenommen.

Maximale Methan-Freisetzungskapazität B_0 und Methanumwandlungsfaktoren für die einzelnen Lagerungssysteme (MCF) sind Table 4.4 in Kapitel 4.2.1 zu entnehmen.

Die Häufigkeitsverteilung der Lagerverfahren wird durch RAUMIS bereitgestellt bzw. aus offiziellen Erhebungen abgeleitet, siehe Kapitel 3.4.3.

German data on the uncertainty of CH₄ emissions from manure management do not exist. IPCC(2006)-10.48 estimates the uncertainty of Tier 2 approaches to be 20 %. This value is, according to the definition of uncertainty used in Chapter 3 in IPCC (2006a), interpreted as half the 95 % confidence interval. A normal distribution is assumed.

Deutsche Zahlen zur Unsicherheit der CH₄-Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management liegen nicht vor. IPCC(2006)-10.48 schätzt die Unsicherheit bei Anwendung von Tier-2-Verfahren auf 20 %. Dieser Wert wird im Sinne von IPCC (2006a), Kapitel 3, als halbes 95 %-Konfidenzintervall interpretiert. Es wird Normalverteilung angenommen.

4.7.5 NMVOC emissions / NMVOC-Emissionen

The calculation of the NMVOC emissions of cattle are calculated with a Tier 2 methodology, see Chapters 3.3.4.2.2 and 3.3.4.2.3.

Agricultural NMVOC emissions are reported, but are neglected regarding the NEC emission threshold, see Chapter 3.3.4.2.

Die NMVOC-Emissionen von Rindern werden mit einer Tier-2-Methode berechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.2 und 3.3.4.2.3.

Landwirtschaftliche NMVOC-Emissionen werden zwar berichtet, aber bzgl. der NEC-Emissionsobergrenze nicht angerechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.

4.7.6 Emissions of nitrogen species / Emissionen von Stickstoff-Spezies

4.7.6.1 N excretion / N-Ausscheidung

The data on feed intake given in Section 4.7.2 enable calculation of the N intake. However, due to the lack of representative data on milk production, which is also mentioned there, it is not possible to draw up an N balance from which the N excretion can be derived.

KTBL (2006b), p. 490, specifies an annual N excretion of 82 kg pl⁻¹ a⁻¹ for the suckler cow. Up to and including Submission 2019, this value was used in the inventory. However, a review as part of quality assurance (KTBL, 2019b) showed that this N excretion represents an underestimate. The N excretion values given in DLG (2005, p. 33, and 2014, p. 47) cannot be used directly because they include the N excretions of the calf. The latter can, however, be eliminated from the N calculation, resulting in an N excretion "without calf" of 90.7 kg pl⁻¹ a⁻¹ (KTBL, 2019b). This value is used for the inventory calculations as of Submission 2020.

No German source is known for the TAN content of the N excretions. The TAN content is therefore set at 60% according to EMEP (2016)-3B-29, Table 3.9.

Die Futteraufnahmedaten in Kapitel 4.7.2 ermöglichen eine Berechnung der N-Aufnahme; wegen des Mangels an repräsentativen Daten zur Milchleistung ist es aber nicht möglich, eine N-Bilanz zu erstellen, aus der sich die N-Ausscheidung ableiten ließe.

Bis einschließlich Submission 2019 verwendete das Inventar die von KTBL (2006b), S. 490, abgegebene jährliche N-Ausscheidung von 82 kg pl⁻¹ a⁻¹. Damit wird einer Überprüfung im Rahmen der Qualitätssicherung zufolge die N-Ausscheidung unterschätzt (KTBL, 2019b). Die in DLG (2005, S. 33, sowie 2014, S. 47) angegebenen N-Ausscheidungswerte lassen sich nicht direkt verwenden, weil sie die N-Ausscheidungen des Kalbes mit einschließen. Letztere lassen sich aber herausrechnen, wobei sich eine N-Ausscheidung „ohne Kalb“ von 90,7 kg pl⁻¹ a⁻¹ ergibt (KTBL, 2019b). Dieser Wert wird für die Inventarberechnungen ab Submission 2020 übernommen.

Für den TAN-Gehalt der N-Ausscheidungen ist keine deutsche Quelle bekannt. Der TAN-Gehalt wird daher nach EMEP (2016)-3B-29, Table 3.9, mit 60 % angesetzt.

4.7.6.2 N input with straw / N-Einträge mit Stroh

For straw based systems N inputs with straw are taken into account. The amounts of N are given in Table 4.48. For the properties of straw and the mineralization of organic N to TAN see Chapter 3.3.4.3.2.

As no bedding is taken into account during the grazing period, the annual amount of bedding actually used depends on the duration of the grazing period.

Für Systeme mit Einstreu wird der N-Eintrag mit dem Stroh berücksichtigt. Die eingetragenen N-Mengen sind in Table 4.48 angegeben. Zu den Eigenschaften von Stroh und der Mineralisierung von organisch gebundenem N zu TAN wird auf Kapitel 3.3.4.3.2 verwiesen.

Da für Weidezeiten keine Einstreu berücksichtigt wird, hängt die im Inventar für das gesamte Jahr verwendete Einstreumenge von der Weidedauer ab.

Table 4.48: Suckler cows, N inputs with straw in solid-manure systems

Housing type	Haltungssystem	straw input kg pl ⁻¹ d ⁻¹	dry matter (DM) kg pl ⁻¹ d ⁻¹	N input (in DM) kg pl ⁻¹ d ⁻¹	TAN kg pl ⁻¹ d ⁻¹
tied systems	Anbindehaltung	5.0 ^a	4.3	24.9·10 ⁻³	12.5·10 ⁻³
loose housing, deep bedding	Laufstall, Tiefstreu	8.0 ^b	6.9	39.9·10 ⁻³	20.0·10 ⁻³

^a Source: KTBL (2006a), pg. 221

^b Source: KTBL (2006a), pg. 385

4.7.6.3 Emissions from housing and grazing / Emissionen aus Stall und von der Weide

For housing, the TAN related emission factors for cattle are used (see Table 4.5).

The $\text{NH}_3\text{-N}$ emission factor for grazing is 0.06 kg kg^{-1} , related to TAN excreted (EMEP (2016)-3B-29, Table 3.9).

Für den Stall werden die auf TAN bezogenen Emissionsfaktoren für Rinder verwendet (vgl. Table 4.5).

Der auf TAN bezogene $\text{NH}_3\text{-N-EF}$ für Weidegang beträgt $0,06 \text{ kg kg}^{-1}$ (EMEP (2016)-3B-29, Table 3.9).

4.7.6.4 Emissions from storage and spreading / Emissionen aus Lager und Ausbringung

For the emission factors for NH_3 , N_2O , NO and N_2 from storage see Chapters 4.2 and 3.3.4.3.5.

The emission factors of NH_3 for the different spreading techniques and times before incorporation are given in Chapter 4.2.2.3

NO emissions from manure management are reported (as NO_x), but are neglected regarding the NEC emission threshold, see Chapter 3.3.4.2.

Für die Emissionsfaktoren für NH_3 , N_2O , NO und N_2 aus dem Lager siehe Kapitel 4.2 und 3.3.4.3.5.

Für die Emissionsfaktoren von NH_3 für die verschiedenen Ausbringungstechniken und Einarbeitungszeiten wird auf Kapitel 4.2.2.3 verwiesen.

NO aus dem Wirtschaftsdünger-Management wird berichtet (als NO_x), bzgl. der NEC-Emissionsobergrenze aber nicht angerechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.

4.7.6.5 Indirect N_2O from manure management / Indirektes N_2O aus dem Wirtschaftsdünger-Management

Indirect N_2O emissions from manure management (housing, storage; without spreading) are calculated according to Chapter 3.3.4.3.6. See Chapter 3.3.4.3.6 also for the uncertainties of activity data and emission factor.

(Indirect N_2O emissions from agricultural soils after spreading of manures or digestated manures are reported in Sector 3.D. For the calculation of these emissions see Chapter 12.)

Indirekte N_2O -Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management (Stall, Lager; ohne Ausbringung) werden nach Kapitel 3.3.4.3.6 berechnet. Siehe dort auch wegen der Unsicherheiten von Aktivitätswert und Emissionsfaktor.

(Indirekte N_2O -Emissionen als Folge der Ausbringung von Wirtschaftsdüngern und Wirtschaftsdünger-Gärresten werden im Sektor 3.D berichtet. Zur Berechnung siehe Kapitel 12.)

4.7.6.6 Uncertainties of emission factors and activity data / Unsicherheiten der Emissionsfaktoren und Aktivitätsdaten

For the uncertainties of the emission factors see Chapter 4.2.2.4 and 11.2.2.

The uncertainty of N excretion is discussed in Chapter 14.4.1. For the uncertainty of the amount of N spreaded see Chapter 11.2.1.

Zu den Unsicherheiten der Emissionsfaktoren siehe Kapitel 4.2.2.4 und 11.2.2.

Die Unsicherheit der N-Ausscheidung wird in Kapitel 14.4.1 diskutiert. Zur Unsicherheit der zur Ausbringung kommenden N-Menge siehe Kapitel 11.2.1.

4.7.7 Emissions of particulate matter / Partikelemissionen

The method to calculate particle emissions is described in Chapter 3.3.4.5. The emission factors are listed in Table 4.49. For the uncertainty of the emission factors see Chapter 3.3.4.5.

Zur Berechnungsmethode für Partikelemissionen wird auf Kapitel 3.3.4.5 verwiesen. Die Emissionsfaktoren sind in Table 4.49 angegeben. Zur Unsicherheit der Emissionsfaktoren siehe Kapitel 3.3.4.5.

Table 4.49: Suckler cows, emission factors for particle emissions from housing

Housing type	Haltungssystem	Emission factor for TSP $\text{kg pl}^{-1} \text{a}^{-1}$	Emission factor for PM_{10} $\text{kg pl}^{-1} \text{a}^{-1}$	Emission factor for $\text{PM}_{2.5}$ $\text{kg pl}^{-1} \text{a}^{-1}$
straw based	strohbasierend	0.52	0.24	0.16
slurry based	güllebasierend	0.69	0.32	0.21

Source: EMEP(2016)-3B-53, Table A1.6 (with TSP = ID [inhalable dust])

Information on the frequency distribution of the various housing systems and the duration of grazing is obtained from RAUMIS and the respective data supplied by the official statistics (see Chapter 3.4.3).

Die Angaben zur Verteilung der verschiedenen Stallformen und zur Dauer der Weidehaltung werden durch RAUMIS bereitgestellt bzw. aus der Agrarstatistik entnommen (siehe Kapitel 3.4.3).

4.7.8 References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung

The subsequent table lists the references to information provided in the data collection (see Chapter 2.4).

Die nachfolgende Tabelle enthält Verweise auf die Informationen in der Datensammlung (siehe Kapitel 2.4).

Table 4.50: Suckler cows, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)

			from	to
Emissions	Emissionen	CH ₄ enteric fermentation	EM1004.005	
		CH ₄ manure management	EM1005.005	
		NM VOC	EM1007.005	
		NH ₃	EM1009.013	EM1009.015
		N ₂ O	EM1009.095	
		NO	EM1009.125	
		TSP	EM1010.005	
		PM ₁₀	EM1010.035	
		PM _{2.5}	EM1010.065	
Activity data	Aktivitäten		AC1005.005	
Emission factors	Emissionsfaktoren	CH ₄ enteric fermentation	IEF1004.005	
		CH ₄ manure management	IEF1005.005	
		NM VOC	IEF1007.005	
		NH ₃	IEF1009.013	IEF1009.015
		N ₂ O	IEF1009.089	
		NO	IEF1009.117	
		TSP	IEF1010.005	
		PM ₁₀	IEF1010.033	
		PM _{2.5}	IEF1010.061	
Additional information	zusätzliche Informationen		AI1005CAT.129	AI1005CAT.158
Excretion rates	Ausscheidungen	N	EXCR.021	EXCR.025

4.8 Mature males > 2 years / Männliche Rinder > 2 Jahre

In the inventory, the category “Mature males > 2 years” is a subcategory of „other cattle“, see Chapter 4.9.

The emissions are calculated according to the methods listed in Table 4.51.

For the definition of the methods see Chapter 3.2.3.

Im Inventar ist die Kategorie „Männliche Rinder > 2 Jahre“ eine Unterkategorie der „übrigen Rinder“, siehe Kapitel 4.9.

Die Berechnung der Emissionen erfolgt nach den in Table 4.51 zusammengestellten Methoden.

Zur Methodendefinition siehe Kapitel 3.2.3.

Table 4.51: Mature males > 2 years, calculation methods applied

Species	Origin	Tier	Method applied
CH ₄	Enteric fermentation	2	IPCC / national
CH ₄	Manure management	2	IPCC / national
NM VOC	manure management	2	EMEP
NH ₃	Manure management	2	EMEP / national
N ₂ O, NO, N ₂	Manure management	2	IPCC / national
TSP, PM ₁₀ , PM _{2.5}	manure management	2	EMEP

4.8.1 Activity and performance data / Aktivitäts- und Leistungsdaten

4.8.1.1 Animal numbers / Tierzahlen

The category “Mature males > 2 years” used in the inventory corresponds to the category G in Table 4.1.

Cattle numbers are collected annually by the Statistical Offices of the federal states (STATLA C III 1 – vj 4) and published by the Federal Statistical Office in federal-state resolution and for Germany (STATBA FS3 R4, STATBA FS3 R4.1). The cattle numbers used to calculate the emissions in district resolution are provided by the Federal Statistical Office specifically for emissions reporting, see Chapter 4.1.1. For the uncertainties of the animal numbers see Chapter 4.1.

Die im Inventar verwendete Kategorie „Männliche Rinder > 2 Jahre“ entspricht der Kategorie G in Table 4.1.

Rinderzahlen werden jährlich von den Statistischen Landesämtern erhoben (STATLA C III 1 – vj 4) und durch das Statistische Bundesamt in Bundeslandauflösung und für Deutschland veröffentlicht (STATBA FS3 R4, STATBA FS3 R4.1). Die zur Emissionsberechnung verwendeten Rinderzahlen in Kreisauflösung werden durch das Statistische Bundesamt speziell für die Emissionsberichterstattung bereitgestellt, siehe dazu Kapitel 4.1.1. Zu den Unsicherheiten der Tierzahlen siehe Kapitel 4.1.

4.8.1.2 Animal weights and weight gains / Tiergewichte und Gewichtszunahmen

The weight of mature males > 2 years is assumed to be 1000 kg per animal as given in KTBL (2004), pg. 350, for stud bulles.

The weight gain of the mature males > 2 years is considered negligible.

Due to the simple calculation methodology for emissions from male cattle older than two years, the animal weight is not used in those calculations.

Für das Gewicht von männlichen Rindern > 2 Jahre wird das in KTBL (2004), S. 350, für Zuchtbullen angegebene Gewicht angesetzt: 1000 kg.

Das Wachstum der männlichen Rinder > 2 Jahre wird als vernachlässigbar angesehen.

Aufgrund der einfachen Berechnungsmethodik für die Emissionen aus der Haltung der männlichen Rinder älter als zwei Jahre geht das Tiergewicht nicht in die Berechnungen ein.

4.8.2 Energy requirements and feed intake / Energiebedarf und Futteraufnahme

As the weight gain of the mature males > 2 years is considered negligible, only the requirements of metabolizable energy for maintainance have to be taken into account. It is assumed that these requirements can be represented by the requirements of a stud bull which, according to KIRCHGEßNER et al. (2008), pg. 460, are 110 MJ pl⁻¹ d⁻¹ for an animal weight of 1000 kg an⁻¹.

For the inventory calculations data on digestibility and metabolizability of the feed is needed:

There is no IPCC default value for the metabolizability. KIRCHGEßNER et al. (2008), pg. 461, present two examples of feed compositions which mostly consist of

Da das Wachstum der männlichen Rinder > 2 Jahre als vernachlässigbar angesehen wird, ist lediglich der Bedarf an metabolisierbarer Energie (ME) für Erhaltung von Bedeutung. Hierfür wird der Erhaltungsbedarf eines Zuchtbullen zugrunde gelegt, der nach KIRCHGEßNER et al. (2008), S. 460, für ein Tiergewicht von 1000 kg an⁻¹ mit 110 MJ pl⁻¹ d⁻¹ angesetzt wird.

Für die Inventarberechnungen werden die Verdaulichkeit und die Umsetzbarkeit des Futters benötigt:

Für die Umsetzbarkeit existiert kein IPCC-Standardwert. Die von Gras- und Maisilage dominierten Rationsbeispiele I und II in KIRCHGEßNER et al. (2008), S.

grass and maize silage (examples No. I and No. II). Using typical feed component properties (see e. g. Table 4.34), an order of magnitude of 55 % can be estimated for the metabolizability. This value is used in the inventory.

The digestibility of the feed is taken to be 60 % according to IPCC (2006)-10.73.

Then, assuming a feed intake according to the requirements, the ME requirements given above lead to a daily gross energy intake of $GE_{mm} = 200 \text{ MJ an}^{-1} \text{ d}^{-1}$.

This leads, using the IPCC default for the GE content of the dry matter intake (18.45 MJ kg^{-1} , IPCC (2006)-10.21), to an annual intake of dry matter of $200 \cdot 365 / 18.45 = 3956.6 \text{ kg an}^{-1} \text{ a}^{-1}$.

As a default N excretion rate is used (see Chapter 4.8.6.1), there is no need to calculate feed intake.

4.8.3 Methane from enteric fermentation / Methan aus der Verdauung

For the calculation of CH_4 emissions from enteric fermentation the Tier 2 method described in Chapter 3.3.2 is used. It requires gross energy intake (see Chapter 4.8.2) and methane conversion factor $X_{\text{CH}_4, \text{GE}}$.

The methane conversion factor is used as provided by IPCC(2006)-10.30, Table 10.12: $X_{\text{CH}_4, \text{bf}} = 0,065 \text{ MJ MJ}^{-1}$.

No national data is available on the uncertainty of the emission factor for CH_4 from enteric fermentation do not exist. IPCC(2006)-10.33 estimates the uncertainty of Tier 2 approaches to be 20 %. This value is, according to the definition of uncertainty used in Chapter 3 in IPCC (2006a), interpreted as half the 95 % confidence interval. A normal distribution is assumed.

4.8.4 Methane from manure management / Methan aus dem Wirtschaftsdüngermanagement

CH_4 emissions from manure management are quantified using a Tier 2 procedure, see Chapter 3.3.4.1.

The amounts of "volatile solids" (VS) excreted are principally calculated according to the approach of DÄMMGEN et al. (2011a). However, missing input data on dry matter intake and ash content have to be approximated by using data given in IPCC (2006), see Chapter 3.3.3.1. In accordance with IPCC(2006)-10.42 the inventory assumes an ash content of 0.08 kg kg^{-1} .

For the treatment of digestibility see Chapter 4.8.2.

Maximum methane producing capacity B_0 and conversion factors (MCF) for the respective manure storage system are provided in Table 4.4 (see Chapter 4.2.1).

The frequency distribution of storage types is supplied by RAUMIS or derived from official census data (see Chapter 3.4.3).

German data on the uncertainty of CH_4 emissions from manure management do not exist. IPCC(2006)-10.48 estimates the uncertainty of Tier 2 approaches to be 20 %. This value is, according to the definition of

461, lassen unter Berücksichtigung von typischen Futterkennwerten (siehe u. a. Table 4.34) auf eine Umsetzbarkeit in der Größenordnung von 55 % schließen. Mit diesem Wert wird im Inventar gerechnet.

Die Verdaulichkeit des Futters wird nach IPCC (2006)-10.73 mit 60 % angesetzt.

Damit folgt aus dem täglichen ME-Bedarf bei der vorausgesetzten bedarfsgerechter Fütterung eine tägliche Gesamtenergie-Aufnahme von $GE_{mm} = 200 \text{ MJ an}^{-1} \text{ d}^{-1}$.

Daraus wird mithilfe des IPCC-Defaultwertes zum GE-Gehalt der aufgenommenen Trockenmasse ($18,45 \text{ MJ kg}^{-1}$, IPCC (2006)-10.21) auf die jährlich aufgenommene Trockenmasse zurückgerechnet: $200 \cdot 365 / 18,45 = 3956,6 \text{ kg an}^{-1} \text{ a}^{-1}$.

Da mit einem Standardwert für die N-Ausscheidung gerechnet wird (siehe Kapitel 4.8.6.1), erübrigt sich die Berechnung der aufgenommen Futtermenge.

Die CH_4 -Emission aus der Verdauung wird mit dem in Kapitel 3.3.2 beschriebenen Tier-2-Verfahren aus der Gesamtenergie-Aufnahme (siehe Kapitel 4.8.2) mithilfe des Methanumwandlungsfaktors $X_{\text{CH}_4, \text{GE}}$ berechnet.

Der Methanumwandlungsfaktor wird IPCC(2006)-10.30, Tabelle 10.12 entnommen: $X_{\text{CH}_4, \text{bf}} = 0,065 \text{ MJ MJ}^{-1}$.

Zur Unsicherheit des Emissionsfaktors für CH_4 aus der Verdauung sind keine nationalen Daten verfügbar. IPCC(2006)-10.33 schätzt die Unsicherheit bei Anwendung von Tier-2-Verfahren auf 20 %. Dieser Wert wird im Sinne von IPCC (2006a), Kapitel 3, als halbes 95 %-Konfidenzintervall interpretiert. Es wird Normalverteilung angenommen.

Zur Bestimmung der CH_4 -Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management wird ein Tier-2-Verfahren angewandt, siehe Kapitel 3.3.4.1.

Die Berechnung der VS-Ausscheidung erfolgt zwar prinzipiell nach dem aktualisierten Verfahren von DÄMMGEN et al. (2011a), muss aber fehlende Daten zu Trockenmasseaufnahme und Aschegehalt nach IPCC (2006) approximieren, siehe dazu Kapitel 3.3.3.1). Nach IPCC(2006)-10.42 wird für den Aschegehalt $0,08 \text{ kg kg}^{-1}$ angenommen.

Zur Verdaulichkeit siehe Kapitel 4.8.2.

Maximale Methan-Freisetzungskapazität B_0 und Methanumwandlungsfaktoren für die einzelnen Lagerungssysteme (MCF) sind Table 4.4 in Kapitel 4.2.1 zu entnehmen.

Die Häufigkeitsverteilung der Lagerverfahren wird durch RAUMIS bereitgestellt bzw. aus offiziellen Erhebungen abgeleitet, siehe Kapitel 3.4.3.

Deutsche Zahlen zur Unsicherheit der CH_4 -Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management liegen nicht vor. IPCC(2006)-10.48 schätzt die Unsicherheit bei Anwendung von Tier-2-Verfahren auf 20 %. Dieser Wert

uncertainty used in Chapter 3 in IPCC (2006a), interpreted as half the 95 % confidence interval. A normal distribution is assumed.

4.8.5 NMVOC emissions / NMVOC-Emissionen

The calculation of the NMVOC emissions of cattle are calculated with a Tier 2 methodology, see Chapters 3.3.4.2.2 and 3.3.4.2.3.

Agricultural NMVOC emissions are reported, but are neglected regarding the NEC emission threshold, see Chapter 3.3.4.2.

wird im Sinne von IPCC (2006a), Kapitel 3, als halbes 95 %-Konfidenzintervall interpretiert. Es wird Normalverteilung angenommen.

Die NMVOC-Emissionen von Rindern werden mit einer Tier-2-Methode berechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.2 und 3.3.4.2.3.

Landwirtschaftliche NMVOC-Emissionen werden zwar berichtet, aber bzgl. der NEC-Emissionsobergrenze nicht angerechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.

4.8.6 Emissions of nitrogen species / Emissionen von Stickstoff-Spezies

The calculation of these emissions presupposes the knowledge of N excretions (their amounts and locations), of the N inputs with straw, the conversion of N_{org} and TAN as well as the frequency distributions of housing types and storage facilities, spreading techniques and times before incorporation.

Die Berechnung der Emissionen beruht auf der Kenntnis der N-Ausscheidungen (Mengen und Orte), der N-Einträge mit Stroh, der Umwandlungen von N_{org} und TAN, der Häufigkeit von Stalltypen, Lagertypen, Ausbringungstechniken und Einarbeitungszeiten.

4.8.6.1 N excretion / N-Ausscheidung

In accordance with KTBL (2006b), pg. 412, the nitrogen excretion is assumed to amount to $84 \text{ kg pl}^{-1} \text{ a}^{-1} \text{ N}$, 60 % of which is assumed to be TAN (according to (EMEP, 2016-3B-29, Table 3.9, other cattle).

Nach KTBL (2006b), S. 412, werden N-Ausscheidungen von $84 \text{ kg pl}^{-1} \text{ a}^{-1} \text{ N}$ angenommen. Der TAN-Gehalt der N-Ausscheidungen wird mit 60 % angesetzt (EMEP, 2016-3B-29, Table 3.9, andere Rinder).

4.8.6.2 N input with straw / N-Eintrag mit Stroh

For straw based systems N inputs with straw are taken into account. For the properties of straw and the mineralization of organic N to TAN see Chapter 3.3.4.3.2.

Für Systeme mit Einstreu wird der N-Eintrag mit dem Stroh berücksichtigt. Zu den Eigenschaften von Stroh und der Mineralisierung von organisch gebundenem N zu TAN wird auf Kapitel 3.3.4.3.2 verwiesen.

The amount of straw fresh matter is $2.6 \text{ kg pl}^{-1} \text{ d}^{-1}$, corresponding to $13.0 \cdot 10^{-3} \text{ kg N (pl} \cdot \text{d)}^{-1}$ or $6.5 \cdot 10^{-3} \text{ kg TAN (pl} \cdot \text{d)}^{-1}$.

Die Menge der Einstreu wird für alle Haltungssysteme gleich mit $2,6 \text{ kg pl}^{-1} \text{ d}^{-1}$ Strohfrischmasse angesetzt bzw. $13,0 \cdot 10^{-3} \text{ kg N (pl} \cdot \text{d)}^{-1}$, entsprechend $6,5 \cdot 10^{-3} \text{ kg TAN (pl} \cdot \text{d)}^{-1}$.

As no bedding is required during the grazing period, the amount of bedding actually used depends on the duration of the grazing period.

Da für Weidezeiten keine Einstreu berücksichtigt wird, hängt die im Inventar für das gesamte Jahr verwendete Einstreumenge von der Weidedauer ab.

4.8.6.3 Emissions from housing and grazing / Emissionen aus Stall und von der Weide

For housing, the TAN related emission factors for cattle are used (see Table 4.5).

Für den Stall werden die auf TAN bezogenen Emissionsfaktoren für Rinder verwendet (vgl. Table 4.5).

As $\text{NH}_3\text{-N}$ emission factor for grazing 0.06 kg kg^{-1} , related to TAN excreted, is assumed ((EMEP, 2016-3B-29, Table 3.9, other cattle).

Für Weidegang wird der auf die ausgeschiedene TAN-Menge bezogene $\text{NH}_3\text{-N}$ -Emissionsfaktor mit $0,06 \text{ kg kg}^{-1}$ angenommen ((EMEP, 2016-3B-29, Table 3.9, andere Rinder).

4.8.6.4 Emissions from storage and spreading / Emissionen aus Lager und Ausbringung

For the emission factors for NH_3 , N_2O , NO and N_2 from storage see Chapters 4.2 and 3.3.4.3.5.

Für die Emissionsfaktoren für NH_3 , N_2O , NO und N_2 aus dem Lager siehe Kapitel 4.2 und 3.3.4.3.5.

The emission factors of NH_3 for the different spreading techniques and times before incorporation are given in Chapter 4.2.2.3.

Für die Emissionsfaktoren von NH_3 für die verschiedenen Ausbringungstechniken und Einarbeitungszeiten wird auf Kapitel 4.2.2.3 verwiesen.

NO emissions from manure management are reported (as NO_x), but are neglected regarding the NEC emission threshold, see Chapter 3.3.4.2.

NO aus dem Wirtschaftsdünger-Management wird berichtet (als NO_x), bzgl. der NEC-Emissionsobergrenze aber nicht angerechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.

4.8.6.5 *Indirect N₂O from manure management / Indirektes N₂O aus dem Wirtschaftsdünger-Management*

Indirect N₂O emissions from manure management (housing, storage; without spreading) are calculated according to Chapter 3.3.4.3.6.

(Indirect N₂O emissions from agricultural soils after spreading of manures or digestated manures are reported in Sector 3.D. For the calculation of these emissions see Chapter 12.)

Indirekte N₂O-Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management (Stall, Lager; ohne Ausbringung) werden nach Kapitel 3.3.4.3.6 berechnet.

(Indirekte N₂O-Emissionen als Folge der Ausbringung von Wirtschaftsdüngern und Wirtschaftsdünger-Gärresten werden im Sektor 3.D berichtet. Zur Berechnung siehe Kapitel 12.)

4.8.6.6 *Uncertainties of emission factors and activity data / Unsicherheiten von Emissionsfaktoren und Aktivitätsdaten*

For the uncertainties of the emission factors see Chapter 4.2.2.4 and 11.2.2.

The uncertainty of N excretion is discussed in Chapter 14.4.1. For the uncertainty of the amount of N spreaded see Chapter 11.2.1.

Zu den Unsicherheiten der Emissionsfaktoren siehe Kapitel 4.2.2.4 und 11.2.2.

Die Unsicherheit der N-Ausscheidung wird in Kapitel 14.4.1 diskutiert. Zur Unsicherheit der zur Ausbringung kommenden N-Menge siehe Kapitel 11.2.1.

4.8.7 *Emissions of particulate matter / Partikelemissionen*

The method to calculate particle emissions is described in Chapter 3.3.4.5. The emission factors are listed in Table 4.52. For the uncertainty of the emission factors see Chapter 3.3.4.5.

Information on the frequency distribution of the various housing systems and the duration of grazing is obtained from RAUMIS and the respective data supplied by the official statistics (see Chapter 3.4.3).

Zur Berechnungsmethode für Partikelemissionen wird auf Kapitel 3.3.4.5 verwiesen. Die Emissionsfaktoren sind in Table 4.52 angegeben. Zur Unsicherheit der Emissionsfaktoren siehe Kapitel 3.3.4.5.

Die Angaben zur Verteilung der verschiedenen Stallformen und zur Dauer der Weidehaltung werden durch RAUMIS bereitgestellt bzw. aus der Agrarstatistik entnommen (siehe Kapitel 3.4.3).

Table 4.52: Mature males > 2 years, emission factors for particle emissions from housing (first estimates)

Housing type	Haltungssystem	Emission factor for TSP kg pl ⁻¹ a ⁻¹	Emission factor for PM ₁₀ kg pl ⁻¹ a ⁻¹	Emission factor for PM _{2.5} kg pl ⁻¹ a ⁻¹
straw based	strohbasierend	0.52	0.24	0.16
slurry based	güllebasierend	0.69	0.32	0.21

Source: EMEP(2016)-3B-53, Table A1.6 (with TSP = ID [inhalable dust])

4.8.8 *References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung*

The subsequent table lists the references to information provided in the data collection (see Chapter 2.4).

Die nachfolgende Tabelle enthält Verweise auf die Informationen in der Datensammlung (siehe Kapitel 2.4).

Table 4.53: Mature males > 2 years, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)

			from	to
Emissions	Emissionen	CH ₄ enteric fermentation	EM1004.006	
		CH ₄ manure management	EM1005.006	
		NMVOC	EM1007.006	
		NH ₃	EM1009.016	EM1009.018
		N ₂ O	EM1009.096	
		NO	EM1009.126	
		TSP	EM1010.006	
		PM ₁₀	EM1010.036	
		PM _{2.5}	EM1010.066	
Activity data	Aktivitäten		AC1005.006	
Emission factors	Emissionsfaktoren	CH ₄ enteric fermentation	IEF1004.006	
		CH ₄ manure management	IEF1005.006	
		NMVOC	IEF1007.006	
		NH ₃	IEF1009.016	IEF1009.018
		N ₂ O	IEF1009.090	
		NO	IEF1009.118	
		TSP	IEF1010.006	
		PM ₁₀	IEF1010.034	
		PM _{2.5}	IEF1010.062	
Additional information	zusätzliche Informationen		AI1005CAT.159	AI1005CAT.188
Excretion rates	Ausscheidungen	N	EXCR.026	EXCR.030

4.9 Aggregated data for cattle except dairy cows (other cattle) / Zusammenfassung: Rinder ohne Milchkühe (übrige Rinder)

In the following subchapters, the data for the animal categories Calves (Chapter 4.4), heifers (Chapter 4.5), male beef cattle (Chapter 4.6), suckler cows (Chapter 4.7) and mature males > 2 years (Chapter 4.8) are summarised as “other cattle” for reporting purposes. As the guidance documents available do not provide explicit methods to derive mean properties, the aggregation equations used in the German inventory are shown in the subsequent sub-chapters.

The emissions are calculated according to the methods compiled in Table 4.54.

For the definition of the methods see Chapter 3.2.3.

In den nachfolgenden Unterkapiteln werden die Daten der Tierkategorien Kälber (Kapitel 4.4), Färsen (Kapitel 4.5), männliche Mastrinder (Kapitel 4.6), Mutterkühe (Kapitel 4.7) und männliche Rinder > 2 Jahre (Kapitel 4.8) für die Berichterstattung als „übrige Rinder“ zusammengefasst. Da die verfügbaren Regelwerke keine expliziten Verfahren für die Berechnung mittlerer Eigenschaften aufweisen, werden nachfolgend auch die verwendeten Aggregationsgleichungen aufgeführt.

Die Emissionen werden nach den in Table 4.54 zusammengestellten Methoden berechnet.

Zur Methodendefinition siehe Kapitel 3.2.3.

Table 4.54: Other cattle, calculation methods applied

Species	Origin	Tier	Method applied
CH ₄	enteric fermentation	2	IPCC / national
CH ₄	manure management	2	IPCC / national
NM VOC	manure management	2	EMEP
NH ₃	manure management	2/3	EMEP / national
N ₂ O, NO, N ₂	manure management	2	IPCC / national
TSP, PM ₁₀ , PM _{2.5}	manure management	2	EMEP

4.9.1 Animal numbers / Tierzahlen

In some subcategories animal numbers differ from those of the official statistics. The overall number of other cattle is given by

Die Tierzahlen der Unterkategorien weichen teilweise von denen der amtlichen Statistik ab. Ihre Summe ist gegeben durch

$$\begin{aligned}
 n_{oc} &= n_{ca} + n_{bf} + n_{bm} + n_{sc} + n_{mm} \\
 &= n_A + n_B + n_C + n_D + n_E + n_F + n_G + n_H + n_I + n_J + n_K + n_L
 \end{aligned}
 \tag{4.81}$$

n_{oc}	number of other cattle places (in pl)
n_{ca}	number of calf places, as described in Chapter 4.4.1.1 (in pl)
n_{bf}	number of heifer places, as described in Chapter 4.5.1.1 (in pl)
n_{bm}	number of male beef cattle places, as described in Chapter 4.6.1.1 (in pl)
n_{sc}	number of suckler cow places, as described in Chapter 4.7.1.1 (in pl)
n_{mm}	number of mature males > 2 years places, as described in Chapter 4.8.1.1 (in pl)
$n_A, \text{ etc}$	number of cattle places subcategory A, etc., as described in Table 4.1 (in pl)

The quantity n_{oc} is equivalent to the total number of cattle places minus the number of dairy cow places.

For the uncertainties of the numbers of animal places see Chapter 4.1

Die Größe n_{oc} entspricht der Summe aller Rinder-Plätze abzüglich der Anzahl der Milchkuh-Plätze.

Zu den Unsicherheiten der Tierplatzzahlen siehe Kapitel 4.1.

4.9.2 Aggregation of IEF and animal characteristics / Aggregation von IEF und Tiercharakteristika

For the aggregation of the animal category “other cattle” the mean values of the following quantities are calculated:

Für die Aggregation der Kategorie „Übrigen Rinder“ wird jeweils der Mittelwert der folgenden Größen berechnet:

- emission factors (IEF)
- animal weight
- intake of feed dry matter (DM)
- intake of gross energy (GE)
- VS excretions
- N excretions
- Emissionsfaktoren (IEF)
- Tiergewicht
- Aufnahme von Futter-Trockenmasse (DM)
- Aufnahme von Futter-Gesamtenergie (GE)
- VS-Ausscheidung
- N-Ausscheidung

- relative content of TAN in N excretions
- Methane conversion factor, enteric fermentation ($X_{CH_4, GE}$)
- digestibility of organic matter (X_{DOM})
- digestibility of energy (X_{DE})
- ash content of feed (x_{ash})
- shares of manure management systems
- methane conversion factor, manure management (MCF)
- pregnancy

These data can be grouped into two categories: On the one hand the quantities that are related to the animal or the animal place (IEF, animal weight, intake of DM and GE, excretions of VS and N); on the other hand the relative quantities (often given as percentages). For the first category the averaging is performed by weighting with the animal place numbers (see Chapter 4.9.2.1), while the quantities of the second category require a more specific consideration as will be addressed in Chapter 4.9.2.2.

Relative shares of manure management systems represent a special case as they have the units $pl\ pl^{-1}$ (or % of the animal population) and should a priori be treated like animal-place related quantities as described in Chapter 4.9.2.1. However, for emission reporting, relative shares of manure management systems have to be calculated as percentages of the amounts of VS or N excreted, see Chapter 4.9.2.2.

The mean value of the quantity “pregnancy” is dealt with in Chapter 4.9.2.3.

- Relativer TAN-Gehalt der N-Ausscheidung
- Methanumwandlungsfaktor, Verdauung ($X_{CH_4, GE}$)
- Verdaulichkeit organischer Substanz (X_{DOM})
- Verdaulichkeit von Energie (X_{DE})
- Aschegehalt des Futters (x_{ash})
- relative Wirtschaftsdüngersysteme-Anteile
- Methanumwandlungsfaktor, Wirtschaftsdünger-Management (MCF)
- Trächtigkeit

Diese Daten bilden zwei Kategorien: Zum Einen handelt es sich um tier- bzw. tierplatzbezogenen Größen (IEF, Tiergewicht, Aufnahme von DM und GE, Ausscheidungen von VS und N); zum Anderen sind es relative Größen (oftmals mit der Einheit %). Die Mittelbildung für die erstgenannte Kategorie erfolgt durch Wichtung mit den Tierplatzzahlen (siehe Kapitel 4.9.2.1), während die Kategorie der relativen Größen eine differenziertere Betrachtung erfordert, auf die Kapitel 4.9.2.2 näher eingeht.

Relative Anteile von Wirtschaftsdünger-Managementsystemen stellen insofern einen Sonderfall dar, als sie die Einheit $pl\ pl^{-1}$ (bzw. % der Tierpopulation) haben und daher a priori tierplatzbezogene Größen sind, die nach Kapitel 4.9.2.1 zu mitteln sind. Für die Emissionsberichterstattung werden allerdings auch relative Anteile von Wirtschaftsdünger-Managementsystemen in Prozent der ausgeschiedenen Mengen von VS und N benötigt. Siehe dazu Kapitel 4.9.2.2.

Zur mittleren Trächtigkeit siehe Kapitel 4.9.2.3.

4.9.2.1 *Animal place-related quantities / Tierplatzbezogene Größen*

The general rule for the averaging of quantities that are related to the animal or the animal place like IEF, animal weight, intake of DE and GE as well as excretions of VS and N is given by:

$$\varphi_{oc} = \frac{\sum_j (n_j \cdot \varphi_j)}{\sum_j n_j} \quad (4.82)$$

φ_{oc}	mean of the quantity φ for other cattle
n_j	number of animal places in subcategory j of other cattle
φ_j	quantity φ for subcategory j other cattle

The numbers of animal places used for weighting are those derived from the official statistics, as described in the respective chapters dealing with the cattle subcategories (see the respective subchapters in the animal description chapters).

Equation (4.82) is also used for the calculation of the mean excretions of TAN. This is needed in order to enable the calculation of the relative content of TAN in the N excretions, see Chapter 4.9.2.2.

Relative shares of manure management systems with the units $pl\ pl^{-1}$ (or % of the animal population) are

Die allgemeine Vorschrift zur Mittelung von tier- bzw. tierplatzbezogenen Größen wie IEF, Tiergewicht, DE- und GE-Aufnahme sowie VS- und N-Ausscheidungen lautet:

Die zur Wichtung verwendeten Tierplatzzahlen entsprechen den im Inventar verwendeten Tierplatzzahlen, die aus den Tierzahlen der Officialstatistik abgeleitet wurden (siehe entsprechende Unterkapitel in den Tierkapiteln).

Gleichung (4.82) wird auch zur Berechnung der mittleren TAN-Ausscheidung verwendet. Dies ist erforderlich, um den relativen TAN-Gehalt der N-Ausscheidungen in Kapitel 4.9.2.2 zu berechnen.

Relative Anteile von Wirtschaftsdünger-Managementsystemen in der Einheit $pl\ pl^{-1}$ (bzw. % der Tierpo-

related to the animal or the animal place and have to be averaged according to equation (4.82).

In the following the application of equation (4.82) is demonstrated for the animal weight:

The mean animal weights of “other cattle” are the weighted means of the mean weights of calves, heifers, female and male beef cattle, suckler cows and mature males > 2 years. For this purpose the mean weights of calves (83 kg an⁻¹), mature males older than 2 years (1000 kg an⁻¹) and suckler cows (650 kg an⁻¹) are assumed to be constant, whereas the mean weight of male beef cattle is the arithmetic mean of the final weight of calves (125 kg an⁻¹) and the respective (variable) slaughter weight.

$$w_{oc} = \frac{n_{ca} \cdot \frac{w_{start,ca} + w_{fin,ca}}{2} + n_{bf} \cdot \frac{w_{fin,ca} + w_{fin,bf}}{2} + n_{bm} \cdot \frac{w_{fin,ca} + w_{fin,bm}}{2} + n_{sc} \cdot w_{sc} + n_{mm} \cdot w_{mm}}{n_{ca} + n_{bf} + n_{bm} + n_{sc} + n_{mm}} \quad (4.83)$$

w_{oc}	mean animal weight in category other cattle (in kg an ⁻¹)
n_{ca} , etc.	number of calf places, etc. (in pl)
$w_{start,ca}$, etc.	weight at the beginning of the lifespan of a calf, etc. (in kg an ⁻¹)
$w_{fin,ca}$, etc.	weight at the end of the lifespan of a calf, etc. (in kg an ⁻¹)

The weighting by animal numbers results in a mean weight for other cattle that represents the mean weight at a reference date. As the the number of animal places is assumed to be constant throughout the year, the mean animal weight is also constant within a year.

pulation) sind tierplatzbezogene Größen und daher ebenfalls nach Gleichung (4.82) zu mitteln.

Die Anwendung von Gleichung (4.82) wird im Folgenden für das Tiergewicht verdeutlicht.

Das mittlere Gewicht aller übrigen Rinder zusammen ist das tierplatzzahlgewichtete Mittel der mittleren Gewichte von Kälbern, Färsen, männlichen Mastrindern, Mutterkühen und männlichen Rindern über 2 Jahre. Dazu werden die mittleren Gewichte von Kälbern (83 kg an⁻¹), männlichen Rindern über 2 Jahre (1000 kg an⁻¹) und Mutterkühen (650 kg an⁻¹) als konstant angesehen. Bei Färsen und männlichen Mastrindern wird das arithmetische Mittel zwischen Endgewicht der Kälber (125 kg an⁻¹) und variablem Schlachtgewicht angesetzt.

Durch die Tierzahlwichtung stellt das mittlere Gewicht aller übrigen Rinder einen auf einen Stichtag bezogenen Wert dar. Dieses mittlere Gewicht wird wie die Tierplatzzahlen als zeitlich konstant während eines Jahres angesehen.

4.9.2.2 Relative quantities / Relative Größen

A relative quantity represents the ratio of two absolute quantities A and B. As an example, the mean relative TAN content is the ratio of mean TAN excretion to mean N excretion. Both N excretion and TAN excretion have to be averaged separately using equation (4.82) before both quantities can be combined by division to obtain the relative TAN content.

The same principle applies to the calculation of the methane conversion factor for enteric fermentation (xCH₄, GE). The calculation can be based on equation (3.13) in Chapter 3.3.2 by rearranging this equation to yield $x_{CH_4, GE}$ and using mean quantities of EF and GE obtained by averaging with equation (4.82).

The mean digestibility of organic matter is the ratio of the total of digested organic matter to the total of organic matter available (i.e. the total intake of organic matter). Note that the undigestible fraction of ash in the dry matter intake must be subtracted. The averaging rule for the animal category-specific digestibilities represents a weighted mean of the animal category-specific digestibilities:

Relative Größen stellen den Quotient zweier absoluter Größen A und B dar. So ist der mittlere relative TAN-Gehalt das Verhältnis von mittlerer TAN-Ausscheidung zu mittlerer N-Ausscheidung. Sowohl TAN- als auch N-Ausscheidung müssen erst mit Gleichung (4.82) gemittelt werden, ehe aus diesen beiden Teilergebnissen durch Division der mittlere relative TAN-Gehalt berechnet werden kann.

Analog geschieht dies bei der Berechnung des Methanumwandlungsfaktor bei der Verdauung ($x_{CH_4, GE}$). Zur Berechnung kann Gleichung (3.13) in Kapitel 3.3.2 verwendet werden, indem diese nach $x_{CH_4, GE}$ aufgelöst wird und für EF und GE die zuvor nach Gleichung (4.82) berechneten mittleren Werte eingesetzt werden.

Die mittlere Verdaulichkeit der organischen Substanz stellt das Verhältnis von insgesamt verdauter organischer Substanz zu insgesamt verfügbarer (d. h. aufgenommenen) organischer Substanz dar. Dabei muss der nicht verdauliche Ascheanteil der Trockenmasse subtrahiert werden. Die Mittelungsvorschrift, die letztlich eine gewichtete Mittelung der tierkategorie-spezifischen Verdaulichkeiten darstellt, lautet damit:

$$X_{\text{DOM,oc}} = \frac{\sum_j [X_{\text{DOM,j}} \cdot n_j \cdot m_{\text{F, dm,j}} \cdot (1 - x_{\text{ash, feed,j}})]}{\sum_j [n_j \cdot m_{\text{F, dm,j}} \cdot (1 - x_{\text{ash, feed,j}})]} \quad (4.84)$$

$X_{\text{DOM,oc}}$	mean digestibility of organic matter for other cattle (in MJ MJ ⁻¹)
$X_{\text{DOM,j}}$	digestibility of organic matter for cattle category j (in MJ MJ ⁻¹)
n_j	number of animal places in subcategory j of other cattle
$m_{\text{F, dm,j}}$	feed intake rate per place (dry matter) for cattle category j (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
$x_{\text{ash, feed,j}}$	ash content of feed for cattle category j (in kg kg ⁻¹)

The mean digestibility of energy is the ratio of the total intake of digestible energy DE to the total intake of gross energy GE:

Die mittlere Verdaulichkeit von Energie ist der Quotient von Gesamtaufnahme an verdaulicher Energie DE zu Gesamtaufnahme an Bruttoenergie GE:

$$X_{\text{DE,oc}} = \frac{\sum_j [X_{\text{DE,j}} \cdot n_j \cdot GE_j]}{\sum_j [n_j \cdot GE_j]} \quad (4.85)$$

$X_{\text{DE,oc}}$	mean digestibility of energy for other cattle (in MJ MJ ⁻¹)
$X_{\text{DE,j}}$	digestibility of energy for cattle category j (in MJ MJ ⁻¹)
n_j	number of animal places in subcategory j of other cattle
GE_j	gross energy intake per place for cattle category j (in MJ pl ⁻¹ a ⁻¹)

The mean ash content of the dry matter taken in with feed is the ratio of the total of feed ash taken in to the total of dry matter intake.

Der mittlere Aschegehalt der Futter-Trockenmasse ergibt sich als Verhältnis von Gesamt-Aschemenge zu Gesamt-Trockenmasseaufnahme:

$$x_{\text{ash, feed, oc}} = \frac{\sum_j (x_{\text{ash, feed,j}} \cdot n_j \cdot m_{\text{F, dm,j}})}{\sum_j (n_j \cdot m_{\text{F, dm,j}})} \quad (4.86)$$

$x_{\text{ash, feed, oc}}$	mean ash content of feed (dry matter) for other cattle (in kg kg ⁻¹)
$x_{\text{ash, feed,j}}$	ash content of feed for cattle category j (in kg kg ⁻¹)
n_j	number of animal places in subcategory j of other cattle
$m_{\text{F, dm,j}}$	feed intake rate (dry matter) for cattle category j (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)

For emission reporting, relative shares of manure management systems are required not only in units of pl pl⁻¹ (or % of animal population) but also in terms of “% of VS excreted” oder “% of N excreted”. For the latter, the calculation procedure will be presented in the following for the example of VS excretions. The averaging procedure represents the ratio of VS excreted in a given manure management system to the total of VS excreted:

Für die Emissionsberichterstattung werden relative Anteile von Wirtschaftsdünger-Managementsystemen nicht nur in der Einheit pl pl⁻¹ (bzw. % der Tierpopulation) benötigt, sondern auch in der Einheit „% des ausgeschiedenen VS“ oder „% des ausgeschiedenen N“. Die Berechnung sei exemplarisch am VS-Beispiel dargestellt. Die Mittelungsvorschrift ergibt sich aus dem Verhältnis der Summe der in einem bestimmten Managementsystem ausgeschiedenen VS-Menge zur insgesamt ausgeschiedenen VS-Menge:

$$\omega_{i,oc} = \frac{\sum_j (\omega_{i,j} \cdot n_j \cdot VS_j)}{\sum_j (n_j \cdot VS_j)} \quad (4.87)$$

$\omega_{i,oc}$	mean of the relative share of manure management system i for other cattle (as fraction of VS excreted)
$\omega_{i,j}$	relative share of manure management system i for subcategory j of other cattle (as fraction of VS excreted)
n_j	number of animal places in subcategory j of other-cattle
VS_j	VS excretions per place and year in subcategory j of other cattle

Averaging the equation of methane emissions from manure management (equation (3.29) in Chapter 3.3.4.1) and taking into account that the national value of the maximum methane production capacity B_0 is identical for all cattle categories provides a rule for averaging the methane conversion factor of liquid manure systems over all cattle categories and liquid manure systems available:

$$MCF_{\text{liquid,mean}} = \frac{\sum_{i,j} (MCF_{\text{liquid},i,j} \cdot MS_{\text{liquid},i,j} \cdot VS_{\text{liquid},i,j} \cdot n_j)}{\sum_{i,j} (MS_{\text{liquid},i,j} \cdot VS_{\text{liquid},i,j} \cdot n_j)} \quad (4.88)$$

$MCF_{\text{liquid,mean}}$	mean methane conversion factor for liquid systems (in kg kg ⁻¹)
$MCF_{\text{liquid},i,j}$	methane conversion factor for a liquid system i and an animal subcategory j (in kg kg ⁻¹)
$MS_{\text{liquid},i,j}$	frequency of a liquid system i and an animal subcategory j (in pl pl ⁻¹)
$VS_{\text{liquid},i,j}$	share of VS excreted in a liquid system i for an animal subcategory j (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
n_j	number of animal places in a subcategory j (in pl)

The overall methane conversion factor of solid manure systems can be calculated by analogy.

Aus der Mittelung der Methan-Emissionsgleichung für die Wirtschaftsdüngerlagerung (Gleichung (3.29) in Kapitel 3.3.4.1) und dem für alle Rinder einheitlichen Wert der maximalen Methanbildungskapazität B_0 (Kapitel 4.2.1), folgt die Berechnungsvorschrift für den effektiven Methanumwandlungsfaktor von Flüssigmistsystemen, der über alle Kategorien der übrigen Rinder und über alle Flüssigmistsysteme gemittelt ist:

Die Berechnung des effektiven Methanumwandlungsfaktors von Festmistsystemen erfolgt sinngemäß.

4.9.2.3 Pregnancy / Trächtigkeit

The calculation of mean pregnancy data considers adult female animals only. It was assumed that 30 % of the heifers younger than 2 a are pregnant, 100 % of all heifers older than 2 a and 90 % of the suckler cows (expert judgement HENNING, FAL-TZ/FLI-ING). City States were not considered for the calculation of the mean. The resulting pregnancy data was provided for emission reporting on an informative basis; it was not used for emission calculations.

Die Berechnung der mittleren Trächtigkeit berücksichtigt nur erwachsene weibliche Tiere. Es wurde angenommen, dass 30 % der Färsen unter 2 a trächtig sind, alle Färsen älter als 2 a sowie 90 % der Mutterkühe (Expertenurteil HENNING, FAL-TZ/FLI-ING). Die Stadtstaaten wurden bei der Mittelwertbildung nicht berücksichtigt. Diese Trächtigkeitsergebnisse werden informationshalber für die Berichterstattung bereitgestellt, sie werden aber nicht für die Emissionsberechnung benötigt.

4.9.3 International comparison / Internationaler Vergleich

Within the framework of quality assurance a comparison of input data and inventory results was made on European level. (For details of the procedure of the comparison see Chapter 4.3.10.)

Im Zuge der Qualitätssicherung wurde ein Vergleich von Eingangsdaten und Inventarergebnissen auf mitteleuropäischer Ebene durchgeführt. (Nähere Angaben zur Durchführung: Siehe Kapitel 4.3.10.)

4.9.3.1 Methane from enteric fermentation / Methan aus der Verdauung

Table 4.55 allows for a comparison of implied emission factors for enteric fermentation and relevant governing entities.

Table 4.55 zeigt die Vergleichsdaten für die Emissionen aus der Verdauung mit wichtigen Einflussgrößen.

Germany is close to the respective median in terms of IEF, digestibility and methane conversion factor. For the GE intake Germany reaches 97% of the median, for the mean animal weight 92%.

Deutschland liegt bzgl. IEF, Verdaulichkeit und Methanumwandlungsfaktor nahe am jeweiligen Median. Bei der GE-Aufnahme liegt Deutschland bei 97 % des Medians, beim mittleren Tiergewicht bei 92 %.

Table 4.55: Other cattle, 2017, international comparison of emission explaining variables and implied emission factors for CH₄ from enteric fermentation

	IEF _{CH₄, ent}	GE intake	mean animal weight	digestibility	Methane conversion factor
	kg pl ⁻¹ a ⁻¹	MJ pl ⁻¹ d ⁻¹	kg an ⁻¹	%	MJ MJ ⁻¹
Austria	59.25	138.99	414.19	73.22	0.065
Belgium	50.39	131.05	406.96	75.00	0.061
Czech Republic	55.25	142.43	396.30	65.00	0.050
Denmark ^a	40.70	130.21	320.00	71.00	0.065
France	53.49	126.15	443.35	NE	0.064
Germany	49.70	118.71	371.17	69.33	0.064
Netherlands ^b	36.46	72.69	n/c	NE	0.076
Poland	50.34	118.08	321.33	68.43	0.065
Switzerland ^b	46.66	118.19	n/c	62.24	0.060
United Kingdom ^c	55.14	104.78	425.80	74.28	0.080
Median	50.37	122.43	401.63	70.17	0.065
IPCC(2006)-10.15-10.21, 10.29, 10.73, 10.78, Western Europe	57	Equations 10.3-10.16	420	60 to 65	0.065

Source: Germany: Submission 2020; all other countries: UNFCCC (2019), CRF Tables

n/c: no calculation possible due to missing input data; NE: No data available

^a Denmark without Greenland and Faroe Island

^b Netherlands and Switzerland: N excretions and animal numbers calculated from CRF data

^c United Kingdom: cattle without dairy cows and all dairy replacements (including calves going on to be dairy cows)

4.9.3.2 Methane from manure management / Methan aus dem Wirtschaftsdünger-Management

Table 4.56 summarizes CH₄ emissions (IEF) from manure management and some governing parameters. According to the CRF Tables the percentages of liquid systems and the pertinent MCF values relate only to liquid systems that do not encompass the option for anaerobic digestion of slurry.

The German IEF is relatively close to the median. The wide range of IEF values is, in addition to different VS excretions and MCF values, mainly a consequence of the very different distribution of liquid-manure systems. The German VS excretion is below the median and roughly at the level of Belgium.

Table 4.56 zeigt den IEF für CH₄ aus dem Wirtschaftsdünger-Management sowie wichtige Einflussgrößen. Entsprechend der CRF-Vorgabe beziehen sich die prozentualen Anteile von Flüssigmistsystemen und die entsprechenden MCF-Werte nur auf Flüssigmistsysteme, deren Gülle nicht in einer Biogasanlage vergoren wird.

Der deutsche IEF liegt relativ nahe am Median. Die große Schwankungsbreite der IEF-Werte ist, neben unterschiedlichen VS-Ausscheidungen und MCF-Werten, vor allem eine Folge der sehr unterschiedlichen Verbreitung von Flüssigmist-Systemen. Die deutsche VS-Ausscheidung liegt unterhalb des Medians und dabei in etwa auf dem Niveau von Belgien.

Table 4.56: Other cattle, 2017, international comparison of emission explaining variables and implied emission factors for CH₄ from manure management

	IEF _{CH₄}	VS excreted	liquid systems (without anaerobic digestion)	
	manure management		frequency	MCF
	kg pl ⁻¹ a ⁻¹	kg pl ⁻¹ d ⁻¹	%	%
Austria	6.16	2.14	35.08	8.11
Belgium	2.98	1.62	16.00	19.00
Czech Republic	9.34	2.84	42.00	17.00
Denmark ^a	12.62	3.26	31.63	4.59
France	3.08	1.92	2.76	18.20
Germany	7.49	1.53	32.41	15.38
Netherlands ^b	8.04	1.21	53.88	17.00
Poland	2.18	1.92	5.06	17.00
Switzerland	6.85	2.48	33.40	13.50
United Kingdom ^c	7.90	1.98	18.47	17.00
Median	7.17	1.95	32.02	17.00
IPCC(2006)- 10.78, Western Europe, cool region, 10°C/11°C	6 to 7	2.6	25.2	17 to 19

Source: Germany: Submission 2020; all other countries: UNFCCC (2019), CRF Tables

^a Denmark without Greenland and Faroe Island

^b calculated from original CRF data

^c United Kingdom: cattle without dairy cows and all dairy replacements (including calves going on to be dairy cows)

4.9.3.3 Emissions of nitrogen species / Emissionen von Stickstoff-Spezies

Table 4.57 shows the average N excretions (including N excreted on pasture) as well as the IEF for NH₃ and N₂O from manure management (without spreading) for the category "other cattle".

The German value of the N excretion is 10 % above the median. As the NH₃ IEF is not directly reported it had to be calculated for all other countries than Germany from reported NH₃ emissions and animal numbers. The German NH₃ IEF is 51 % above the median. The German IEF for direct N₂O from manure management is 3 % below the median.

The large areas of variation are partly due to the fact that the category "other bovine animals" is composed of very different emitting sub-categories and that their relative population shares may be very different from country to country.

Table 4.57 zeigt die mittlere N-Ausscheidung (einschließlich Weidegang) sowie die IEF für NH₃ und N₂O aus dem Wirtschaftsdünger-Management (ohne Ausbringung) der Kategorie „übrige Rinder“.

Der deutsche Wert der N-Ausscheidung liegt 10 % über dem Median. Da der IEF nicht direkt berichtet wird, musste er für alle Länder außer Deutschland aus berichteten NH₃-Emissionen und Tierzahlen berechnet werden. Der deutsche NH₃-IEF liegt 51 % über dem Median. Beim direkten N₂O aus dem Wirtschaftsdünger-Management liegt Deutschland 3 % unter dem Median.

Die großen Schwankungsbereiche sind zum Teil darauf zurückzuführen, dass sich die Kategorie „übrige Rinder“ aus sehr unterschiedlich emittierenden Unterkategorien zusammensetzt, und dass deren relative Populationsanteile in den Vergleichsländern stark voneinander abweichen können.

Table 4.57: Other cattle, 2017, international comparison of N excretion rates and implied emission factors of NH₃ from manure management (housing and storage, without spreading)

	N excreted (incl. grazing)	number of animals	NH ₃ emission	IEF _{NH3}	IEF _{N2O, direct}
	kg pl ⁻¹ a ⁻¹	1000 pl	(manure management without spreading) Gg a ⁻¹	kg pl ⁻¹ a ⁻¹	kg pl ⁻¹ a ⁻¹
Austria	45.58	1400.06	10.2	7.29	0.381
Belgium	53.79	1905.51	12.7	6.65	0.550
Czech Republic	66.90	835.35	10.1	12.11	0.915
Denmark ^a	42.41	975.38	3.3	3.43	0.367
France	60.21	15220.67	84.4	5.55	0.183
Germany	49.76	8082.18	75.7	9.36	0.344
Netherlands ^b	40.95	2351.30	10.6	4.49	0.229
Poland	34.69	3768.70	21.7	5.75	0.240
Switzerland ^b	39.51	975.43	7.4	7.57	0.145
United Kingdom ^c	44.76	7935.85	35.8	4.52	0.583
Median	45.17			6.20	0.355
IPCC(2006)-10.59 ^d	50.6				
EMEP(2013)-3B-27, 14	41			9.2 to 13.4	
EMEP(2016)-3B-29, 16	41			6.2 to 6.9	

Sources: Germany: Submission 2020; all other countries: UNFCCC (2019), CRF Tables; CEIP (2019), NFR Table

^a Denmark without Greenland and Faroe Island

^b calculated from original CRF data

^c United Kingdom: cattle without dairy cows and all dairy replacements (including calves going on to be dairy cows)

^d IPCC N excretion: calculated using the IPCC default animal weight (420 kg)

4.9.3.4 Emissions of particulate matter and NMVOC / Partikel- und NMVOC-Emissionen

The table below shows IEF values of TSP, PM₁₀ and PM_{2.5} of the different countries spreading up to a ten or more. It is not clear whether these major differences can be justified solely by the fact that there are different proportions of straw-based and slurry-based systems from country to country. Differences in grazing times contribute as well, because no TSP and PM emissions are calculated for grazing times.

Die nachstehende Tabelle zeigt IEF-Werte von TSP, PM₁₀ und PM_{2.5} der verschiedenen Länder, die bis zu über eine Zehnerpotenz und mehr streuen. Ob diese großen Unterschiede allein dadurch zu begründen sind, dass von Land zu Land unterschiedliche Anteile stroh- und güllebasierter Systeme vorliegen, kann nicht geklärt werden. Auch Unterschiede in der Weidegangdauer wirken sich aus, da für Weidegang keine TSP- und PM-Emissionen berechnet werden.

Table 4.58: Other cattle, 2017, international comparison of implied emission factors of TSP, PM and NMVOC

	IEF _{TSP} kg pl ⁻¹ a ⁻¹	IEF _{PM10} kg pl ⁻¹ a ⁻¹	IEF _{PM2.5} kg pl ⁻¹ a ⁻¹	IEF _{NMVOC} kg pl ⁻¹ a ⁻¹
Austria	0.24	0.11	0.02	NA
Belgium	0.43	0.20	0.13	5.088
Czech Republic	0.23	0.11	0.07	NE
Denmark ^a	0.49	0.22	0.15	7.559
France	0.24	0.11	0.07	IE
Germany	0.48	0.22	0.15	12.837
Netherlands	0.05	0.05	0.01	5.249
Poland	0.47	0.22	0.14	5.855
Switzerland	0.32	0.09	0.02	6.991
United Kingdom ^b	0.31	0.14	0.09	4.076
Median	0.31	0.13	0.08	5.855
EMEP (2016)-3B-19, 18 (Tier 1)	0.59 (calves: 0.34)	0.27 (calves: 0.16)	0.18 (calves: 0.10)	8.902^c

Source: Germany: Submission 2020; all other countries: CEIP (2019), IEFs calculated from original NFR data

IE, NA: No data available for different reasons

^a Denmark without Greenland and Faroe Island

^b United Kingdom: cattle without dairy cows and all dairy replacements (including calves going on to be dairy cows)

^c for feeding with silage

The German NMVOC IEF is significantly above the level of the other countries (at 2.2 times the median). In Submission 2019 and earlier submissions, Germany calculated NMVOC emissions from the manure management of cattle using the Tier 1 method (EMEP (2016)-3B-17f). Based on the TERT recommendation from the German IIR 2019 review, Germany calculates as, of Submission 2020, NMVOC emissions for cattle using the Tier 2 methodology (EMEP (2016)-3B-26f). The big difference between the resulting emission factors and the Tier 1 emission factors is striking: At (rounded) 12.8 kg pl⁻¹ a⁻¹, the Tier 2 EF for "other cattle" is almost one and a half times the size of the Tier 1 EF with (rounded) 8.9 kg pl⁻¹ a⁻¹. This big difference suggests that Tier 1 and Tier 2 methodology are not consistent.

Der deutsche NMVOC-IEF-Wert liegt erheblich über dem Niveau der anderen Länder (beim 2,2-Fachen des Medians). Bis Submission 2019 berechnete Deutschland die NMVOC-Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management von Rindern mit der Tier-1-Methode (EMEP (2016)-3B-17f). Als Ergebnis des deutschen IIR-2019-Review berechnet Deutschland ab Submission 2020 die NMVOC-Emissionen für Rinder mit der Tier-2-Methodik (EMEP (2016)-3B-26f). Auffällig ist der große Unterschied zwischen den sich so ergebenden Emissionsfaktoren und den Tier-1-Emissionsfaktoren: Der Tier-2-EF für „übrige Rinder“ ist mit rund 12,8 kg pl⁻¹ a⁻¹ fast eineinhalb mal so groß wie der Tier-1-EF mit rund 8,9 kg pl⁻¹ a⁻¹. Tier-1- und Tier-2-Methodik sind also wahrscheinlich nicht konsistent.

4.9.4 References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung

Table 4.59: Other cattle, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)

			from	to
Emissions	Emissionen	CH ₄ enteric fermentation	EM1004.007	
		CH ₄ manure management	EM1005.007	
		NMVOC	EM1007.007	
		NH ₃	EM1009.019	EM1009.021
		N ₂ O	EM1009.097	
		NO	EM1009.127	
		TSP	EM1010.007	
		PM ₁₀	EM1010.037	
		PM _{2.5}	EM1010.067	
Activity data	Aktivitäten		AC1005.007	
Emission factors	Emissionsfaktoren	CH ₄ enteric fermentation	IEF1004.007	
		CH ₄ manure management	IEF1005.007	
		NMVOC	IEF1007.007	
		NH ₃	IEF1009.019	IEF1009.021
		N ₂ O	IEF1009.091	
		NO	IEF1009.119	
		TSP	IEF1010.007	
		PM ₁₀	IEF1010.035	
		PM _{2.5}	IEF1010.063	
Additional information	zusätzliche Informationen		AI1005CAT.189	AI1005CAT.221
Excretion rates	Ausscheidungen	N	EXCR.031	EXCR.035

5 Pigs / Schweine

5.1 Animal numbers / Tierzahlen

5.1.1 Formation of subcategories / Zur Untergliederung in Subkategorien

In CRF/NFR emissions are reported for pigs altogether. Differences in housing and feeding of the subcategories result in considerable differences in the respective emission generating processes. Therefore, emissions are calculated separately for each subcategory. The results obtained are finally aggregated (see Chapter 5.7).

Table 5.1 shows the pig subcategories used in the German census as well as their aggregation and disaggregation for the emission inventory. Sucking pigs do not constitute a distinct animal category in the inventory; there are accounted for together with the sows.

The animal numbers used and their derivation are explained in the respective subchapters of the subsequent animal category chapters.

In CRF/NFR werden die Emissionen für Schweine insgesamt berichtet. Aufgrund unterschiedlicher Haltung und Fütterung weisen die Unterkategorien der Schweine ein unterschiedliches Emissionsverhalten auf. Daher erfolgt die Emissionsberechnung zunächst getrennt nach Unterkategorien. Die Ergebnisse werden anschließend aggregiert, siehe Kapitel 5.7.

Die Untergliederung der Schweine in der deutschen Tierzählung sowie ihre Aufteilung und Aggregation zum Zwecke der Emissionsberechnung gehen aus Table 5.1 hervor. Saugferkel bilden keine separate Tierkategorie im Inventar, sondern werden bei den Sauen mit berücksichtigt.

Die verwendeten Tierzahlen bzw. ihre Berechnung werden in den entsprechenden Unterkapiteln der einzelnen Tierkategorien erläutert.

Table 5.1: Pigs, categorisation and characterisation

animal subcategory according to German census			animal subcategories used in this inventory			
type	descriptor		type	category	weight 1	weight 2
M	Ferkel unter 20 kg	piglets	*)	suckling-pigs	1.5 kg an ⁻¹	8 kg an ⁻¹
			we	weaners	8 kg an ⁻¹	$w_{fin, we}$
N	Jungschweine bis unter 50 kg Lebendgewicht	young pigs lighter than 50 kg live weight	fp	fattening pigs	$w_{fin, we}$	$w_{fin, fp}$
O	Mastschweine 50 bis 80 kg	fattening pigs 50 to 80 kg				
P	Mastschweine 80 bis 110 kg	fattening pigs 80 to 110 kg				
Q	Mastschweine 110 kg und mehr	fattening pigs heavier than 110 kg				
R	Jungsauen trächtig	young sows gestating	so	sows	220 kg an ⁻¹	
S	Andere Sauen trächtig	other sows gestating				
T	Jungsauen nicht trächtig	young sows not gestating				
U	Andere Sauen nicht trächtig	other sows not gestating				
V	Eber zur Zucht	boars	bo	boars	200 kg an ⁻¹	

weight 1: weight at the beginning of the respective period, weight 2: weight at the end of the respective period; w_{fin} : variable final weight
 *) Suckling-pigs do not constitute a separate animal category. They are accounted for within the calculations of energy and feed requirements of the sows.

5.1.2 Uncertainties / Unsicherheiten

On the national scale, the standard error for the number of animal places of the subcategories "sows", "weaners" and "fattening pigs" is lower than 2 % according to German official statistics. Larger standard errors may exist for single federal states. However, as emission reporting is on the national level, the standard error for subcategory "sows" is fixed to 2 %, accordingly the uncertainty as half the 95 % confidence interval to 4 %. A normal distribution is assumed.

Auf Deutschlandebene wird der Standardfehler für diejenigen Tiere, die in die Inventarkategorien „Sauen“, „Aufzuchtferkel“ und „Mastschweine“ fallen, durch das Statistische Bundesamt mit „bis unter 2 %“ beziffert. In den einzelnen Bundesländern können auch höhere Standardfehler auftreten. Da die Emissionsberichterstattung auf nationaler Ebene erfolgt, wird für „Sauen“ ein Standardfehler von 2 % angesetzt, d. h. 4 % für das halbe 95 %-Konfidenzintervall (Normalverteilung).

Also on the national scale, the standard error for the number of animal places of the subcategory “breeding boars” is “about 5 to 10 %”. Larger standard errors may exist for single federal states. However, as emission reporting is on the national level, the standard error for “breeding boars” (the boar subcategory in the inventory) is fixed to 10 %, accordingly the uncertainty as half the 95 % confidence interval to 20 %. A normal distribution is assumed.

Ebenfalls auf Deutschlandebene wird der Standardfehler für diejenigen Tiere, die in die Inventarkategorie „Eber“ fallen, mit „5 bis 10 %“ angegeben. In den einzelnen Bundesländern können auch höhere Standardfehler auftreten. Da die Emissionsberichterstattung auf nationaler Ebene erfolgt, wird für die Inventarkategorie „Zuchteber“ ein Standardfehler von 10 % angesetzt, d. h. 20 % für das halbe 95 %-Konfidenzintervall (Normalverteilung).

5.2 Parameters common to all pigs / Gemeinsame Parameter aller Schweine

5.2.1 Methane from manure management / Methan aus dem Wirtschaftsdünger-Management

In the emission inventory, the formation of methane from manure storage is characterized by two parameters (see Chapter 3.3.4.1): the animal-specific maximum methane formation capacity B_0 and the storage-specific methane conversion factor MCF . MCF gives the fraction of B_0 that is typically produced in the various storage systems.

For pigs, a national value for B_0 is used (DÄMMGEN et al., 2012a), siehe Table 4.4.

Table 5.2 also shows the MCF values derived for the storage systems most frequent for pigs in Germany. The MCF values assumed according to DÄMMGEN et al. (2012a) are given in bold figures.

“Slurry with floating cover” (chaff or plastic film) is conservatively treated by adopting the MCF of “slurry without natural crust”. The MCF values for deep bedding and pasture are provided by IPCC (2006)-10.44 ff. The MCF for deep bedding in cattle husbandry equals the MCF of slurry without crust; hence, the same is assumed to hold for pigs. As free range husbandry of pigs (“pasture”) is of insignificant relevance in Germany, it is not considered in the inventory.

Table 5.2 does not provide MCF values for anaerobic digestion of manure including storage of digestate. These MCF have to be calculated and are not constant (see Chapter 3.3.4.4.1).

Uncertainty estimates are provided in the subsequent animal chapters, see subchapters on calculation CH_4 emissions from manure management.

Die Entstehung von Methan aus der Wirtschaftsdüngerlagerung wird im Emissionsinventar durch zwei Parameter charakterisiert (siehe Kapitel 3.3.4.1): die tier-spezifische maximale Methan-Bildungsrate B_0 und den lagerspezifischen Methanumwandlungsfaktor MCF , der angibt, welcher Anteil von B_0 in den verschiedenen Lagerungssystemen tatsächlich produziert wird.

Für Schweine wird ein nationaler B_0 -Wert verwendet (DÄMMGEN et al., 2012a), siehe Table 4.4.

Table 5.2 zeigt überdies für die in Deutschland bei Schweinen häufigsten Lagerungsverfahren die MCF -Werte, wobei die nach DÄMMGEN et al. (2012a) angenommenen Werte fettgedruckt sind.

Für „Gülle mit fester Abdeckung“ und „Gülle mit schwimmender Abdeckung“ (Strohhäcksel oder Folie) wurde konservativ der MCF von „Gülle ohne natürliche Schwimmdecke“ übernommen. Da bei den Rindern der MCF für „Tiefstreu“ gleich dem für Flüssigmist ohne Schwimmdecke ist, wurde dies auch für die Schweine angenommen. Freilandhaltung von Schweinen („Weide“) ist in Deutschland von sehr geringer Bedeutung und wird daher im Inventar nicht berücksichtigt.

Die MCF -Werte für die Wirtschaftsdünger-Vergärung incl. Gärrestlagerung sind in Table 5.2 nicht angegeben, da sie berechnet werden (siehe Kapitel 3.3.4.4.1) und nicht konstant sind.

Zur Bestimmung der Unsicherheiten wird auf die Unterabschnitte der nachfolgenden Tier-Kapitel verwiesen, in denen die Berechnung der CH_4 -Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management beschrieben wird.

Table 5.2: Pigs, maximum methane producing capacity (B_0) and methane conversion factors (MCF)

Maximum methane producing capacity B_0	Maximale Methanbildungs-Kapazität B_0	0.30	$m^3 CH_4 (kg VS)^{-1}$
Methane conversion factor MCF	Methanumwandlungsfaktor MCF		
slurry (untreated)	Gülle (unbehandelt)		
slurry (tank)	Güllelager		
open tank (without natural crust)	offen (ohne natürliche Schwimmdecke)	0.25	$m^3 m^{-3}$
solid cover (incl. tent structures)	feste Abdeckung (inkl. Zelt)	0.25	$m^3 m^{-3}$
natural crust	natürliche Schwimmdecke	0.15	$m^3 m^{-3}$
floating cover (chaff)	schwimmende Abdeckung (Strohhäcksel)	0.25	$m^3 m^{-3}$
floating cover (plastic film)	schwimmende Abdeckung (Folie)	0.25	$m^3 m^{-3}$
underneath slatted floor > 1 month	Lager unter Spaltenboden > 1 Monat	0.25	$m^3 m^{-3}$
solid manure/heap (deep bedding)	Festmist/Misthaufen (Tiefstremist)	0.25	$m^3 m^{-3}$
solid manure/heap (other systems)	Festmist/Misthaufen (übrige Systeme)	0.03	$m^3 m^{-3}$

Sources: see text

5.2.2 Emission factors for nitrogen emissions / Emissionsfaktoren für Stickstoffemissionen

5.2.2.1 NH_3 emission factors for housing / NH_3 -Emissionsfaktoren für Ställe

Partial NH_3 emission factors were fixed for all relevant housing systems, cf. Table 5.3. They are based on national animal-place related emission factors provided by DÖHLER et al. (2002) and converted into TAN related data by DÄMMGEN et al. (2010b). For the uncertainties of the emission factors see Chapter 5.2.2.4.

Die für die relevanten Stallssysteme angesetzten partiellen NH_3 -Emissionsfaktoren beruhen auf nationalen tierplatzbezogenen Emissionsfaktoren von DÖHLER et al. (2002), die von DÄMMGEN et al. (2010b) auf TAN-Bezug umgerechnet wurden, siehe Table 5.3. Zur Unsicherheit der Emissionsfaktoren siehe Kapitel 5.2.2.4.

Table 5.3: pigs, partial emission factors for NH_3 -N from housing (related to TAN)

		sows and suckling-pigs, boars	fattening pigs, weaners
Housing type	Haltungssystem	$EF_{\text{house}} \text{ (kg kg}^{-1}\text{)}$	$EF_{\text{house}} \text{ (kg kg}^{-1}\text{)}$
slurry based	güllebasiert	0.34	
closed insulated stable ^a	wärmegeädämter Stall ^a		
fully slatted floor	Vollspaltenboden		0.3
partly slatted floor	Teilspaltenboden		0.3
free ventilated	Außenklimastall		
kennel house	Kistenstall		0.2
straw based	strohbasierend	0.34	
closed insulated stable ^a	wärmegeädämter Stall ^a		
deep bedding	Tiefstreu		0.4
plane floor with bedding	planbefestigt mit Einstreu		0.4
free ventilated	Außenklimastall		
kennel house	Kistenstall		0.2
deep bedding	Tiefstreu		0.35

^a synonymous with "housing with forced ventilation"

Source: Dämmgen et al. (2010b)

The emission factors for solid manure systems are higher than those of the other systems. Döhler et al. (2002), pg. 55, justify this by saying that the initial emission-reducing effect of the litter is overcompensated by the following effects: (1) A high number of animals leads to a large displacement of the straw, combined with a substantially enlarged surface of the straw-faeces-urine mixture. (2) Microbial degradation of the readily degradable C fraction leads to an again narrowing C / N ratio.

The frequency distributions of housing types are supplied by RAUMIS or derived from official census data (see Chapter 3.4.3).

For the uncertainties of the emission factors see Chapter 5.2.2.4.

The mitigation of NH_3 emissions by air scrubbers is taken into account, see Chapter 3.4.5.2.

Die Emissionsfaktoren für Einstreusysteme sind höher sind als die der anderen Systeme. Döhler et al. (2002), S. 55, begründen dies damit, dass die zunächst emissionsmindernde Wirkung der Einstreu durch folgende Effekte überkompensiert wird: (1) Eine hohe Tierbelegung führt zu einer starken Umsetzung des Strohs, verbunden mit einer wesentlich vergrößerten Oberfläche des Stroh-Kot-Harn-Gemisches. (2) Mikrobieller Abbau der leicht abbaubaren C-Fraktion führt zu einem wieder enger werdenden C/N-Verhältnis.

Die Häufigkeitsverteilungen der Haltungsverfahren werden durch RAUMIS bereitgestellt bzw. aus offiziellen Erhebungen abgeleitet, siehe Kapitel 3.4.3.

Zur Unsicherheit der Emissionsfaktoren siehe Kapitel 5.2.2.4

Die Minderung von NH_3 -Emissionen durch Abluftreinigungsanlagen wird berücksichtigt, s. Kapitel 3.4.5.2.

5.2.2.2 NH_3 , N_2O and NO emission factors for storage / NH_3 , N_2O - und NO-Emissionsfaktoren der Lagerung

Except for the storage of residues from anaerobic digestion of slurry, the partial NH_3 -N emission factors for the storage systems used in Germany are based on data of DÖHLER et al. (2002, pg. 62 ff). They are valid for all pig subcategories. DÄMMGEN et al. (2010b) recalculated the emission factors and related them to TAN. By DÖHLER et al. (2002), the reference value of 0.15 kg kg^{-1} for the NH_3 -N emission factor in Table 5.4 was related to total N. However, according to EAGER expert judgement it has to be related to TAN (cf. REIDY et al., 2008, Table 6).

Mit Ausnahme der Lagerung von Gärresten aus der anaeroben Güllevergärung beruhen die partiellen NH_3 -N-Emissionsfaktoren für die in Deutschland üblichen Lagerverfahren auf Daten von DÖHLER et al. (2002, S. 62f). Sie gelten für alle Schweinekategorien. DÄMMGEN et al. (2010b) berechneten die Emissionsfaktoren neu und bezogen sie auf TAN, siehe Table 5.4. Der Referenzwert von $0,15 \text{ kg kg}^{-1}$ für den NH_3 -N-Emissionsfaktor wurde bei DÖHLER et al (2002) auf das gesamte N bezogen. Nach EAGER-Expertenurteil ist dagegen TAN als Bezug zu

According to IPCC (2006), the anaerobic digestion of manure represents a separate type of manure storage. This storage type, however, in the German methodology, consists of three compartments: pre-stoage, digester, storage of digestate. The effective emission factor of this combination is not a constant and must be calculated (see Chapter 3.3.4.4).

wählen (vgl. REIDY et al., 2008, Table 6).

Die Vergärung von Wirtschaftsdünger wird nach IPCC (2006) als eigenständiger Lagertyp betrachtet. Er umfasst im deutschen Inventar die drei Komponenten Vorlager, Fermenter und Gärrestelager. Der effektive Emissionsfaktor für diese Kombination ist nicht konstant und muss berechnet werden (siehe Kapitel 3.3.4.4).

Table 5.4: Pigs, partial emission factors for $\text{NH}_3\text{-N}$ losses from storage (related to TAN)

Storage type	Lagerungsart	emission factor (kg kg ⁻¹)
slurry (untreated)	Gülle (unbehandelt)	
slurry tank	Güllelager	
open tank (without natural crust)	offen (ohne natürliche Schwimmdecke)	0.150 ^a
solid cover (incl. tent structures)	feste Abdeckung (inkl. Zelt)	0.015 ^b
natural crust	natürliche Schwimmdecke	0.105 ^b
floating cover (chaff)	schwimmende Abdeckung (Strohhäcksel)	0.030 ^b
floating cover (plastic film)	schwimmende Abdeckung (Folie)	0.023 ^b
underneath slatted floor > 1 month	Lager unter Spaltenboden > 1 Monat	0.105 ^a
leachate, storage with solid cover	Jauche, Lagerung mit fester Abdeckung	0.030 ^a
solid manure/heap (deep bedding)	Festmist/Misthaufen (Tiefstreumist)	0.600 ^a
solid manure/heap (other systems)	Festmist/Misthaufen (übrige Systeme)	0.600 ^a

^a estimated according to DÄMMGEN et al. (2010b)

^b calculated according to DÖHLER et al. (2002), Table 3.14

According to IPCC (2006) there are two different categories of N_2O emissions from animal husbandry: Direct emissions from the compartments housing and storage, and indirect emissions. The German inventory considers only the indirect emissions due to deposition of reactive nitrogen that is a consequence of emissions of NH_3 and NO from the compartments housing and storage, see Chapter 3.3.4.3.6.

The emission factors for direct N_2O from housing/storage were, as far as available, taken from IPCC (2006). For floating cover consisting of chaff the emission factor of natural crust ($0.005 \text{ N}_2\text{O-N (kg N)}^{-1}$) is used (worst-case assumption). This assumption has little impact on total N_2O emissions, as floating covers consisting of chaff are seldom.

Germany differentiates solid-manure systems according to whether they include solid-manure storage or use deep bedding. For solid manure systems the default emission factor provided in IPCC (2006)-10.62 is used: $0.005 \text{ kg N}_2\text{O-N (kg N)}^{-1}$. As in Germany deep bedding systems are used without active mixing (see Chapter 3.4.3.2.2), the lower default emission factor of IPCC (2006) is adopted: $0.01 \text{ kg N}_2\text{O-N (kg N)}^{-1}$.

Like for NH_3 , the effective N_2O emission factor of anaerobic digestion of manure has to be calculated, see Chapter 3.3.4.4. It is not a constant.

Table 5.5 shows the emission factors used in the inventory for direct N_2O . They are related to the sum of N excreted and N input with bedding material.

Like for NH_3 (see above), the effective N_2O emission factor of anaerobic digestion of manure has to be calculated, see Chapter 3.3.4.4. It is not a constant.

Nach IPCC (2006) werden der Tierhaltung neben direkten N_2O -Emissionen aus dem Bereich Stall/Lager auch indirekte N_2O -Emissionen zugeordnet. Im deutschen Inventar werden dabei lediglich die indirekten Emissionen aufgrund der Deposition von reaktivem Stickstoff berücksichtigt, die auf die Emissionen von NH_3 und NO aus dem Bereich Stall/Lager zurückgeht. Siehe dazu auch Kapitel 3.3.4.3.6.

Die Emissionsfaktoren für direktes N_2O aus Stall/Lager stammen, soweit verfügbar, aus IPCC (2006). Für eine schwimmende Abdeckung aus Häckseln wird der Emissionsfaktor im Sinne einer worst-case-Annahme mit dem Emissionsfaktor für die natürliche Schwimmdecke gleichgesetzt ($0.005 \text{ N}_2\text{O-N (kg N)}^{-1}$). Wegen geringer Verbreitung der Abdeckung aus Häckseln ist die Auswirkung auf die Gesamt- N_2O -Emissionen sehr gering.

Bei Festmistsystemen differenziert Deutschland nach Festmistlagerung und Tiefstreu. Für Festmistssysteme wird der Default-Emissionsfaktor von IPCC (2006)-10.62 verwendet: $0.005 \text{ kg N}_2\text{O-N (kg N)}^{-1}$. Da Tiefstreusysteme in Deutschland ohne Durchmischung betrieben werden (siehe Kapitel 3.4.3.2.2), verwendet das Inventar den niedrigeren Default-Emissionsfaktor von IPCC (2006): $0.01 \text{ kg N}_2\text{O-N (kg N)}^{-1}$.

Für die Vergärung von Wirtschaftsdünger wird wie bei NH_3 auch für N_2O der effektive Emissionsfaktor berechnet, siehe Kapitel 3.3.4.4. Er ist nicht konstant.

Table 5.5 gibt einen Überblick über die im Inventar verwendeten Emissionsfaktoren für direktes N_2O . Sie beziehen sich auf die Summe aus ausgeschiedenem und durch Einstreu eingebrachtem N .

Für die Vergärung von Wirtschaftsdünger wird wie bei NH_3 (siehe oben) auch für N_2O der effektive Emissionsfaktor berechnet, siehe Kapitel 3.3.4.4. Er ist nicht konstant.

According to IPCC (2006) the emission factor for indirect N_2O -N emissions due to deposition of reactive N from housing/storage is 0.01 kg kg^{-1} . It is to be applied to the amount of reactive N deposited.

Der Emissionsfaktor für indirekte N_2O -N-Emissionen aufgrund der Deposition von reaktivem N aus Stall/Lager ist nach IPCC (2006) $0,01 \text{ kg kg}^{-1}$ (anzuwenden auf die Menge an reaktivem N).

Table 5.5: Pigs, partial emission factors for N_2O -N from housing and storage (applied to $N_{\text{excr}} + N_{\text{straw}}$)

Storage type	Lagerungsart	Emission factor (kg kg^{-1})
slurry (untreated)	Gülle (unbehandelt)	
slurry tank	Güllelager	
open tank (without natural crust)	offen (ohne natürliche Schwimmdecke)	0.000 ^a
solid cover (incl. tent structures)	feste Abdeckung (inkl. Zelt)	0.005 ^b
natural crust	natürliche Schwimmdecke	0.005 ^a
floating cover (chaff)	schwimmende Abdeckung (Strohhäcksel)	0.005 ^c
floating cover (plastic film)	schwimmende Abdeckung (Folie)	0.000 ^d
underneath slatted floor > 1 month	Lager unter Spaltenboden > 1 Monat	0.002 ^a
leachate, storage with solid cover	Jauche, Lagerung mit fester Abdeckung	0.005 ^e
solid manure/heap (deep bedding)	Festmist/Misthaufen (Tiefstreumist)	0.010 ^a
solid manure/heap (other systems)	Festmist/Misthaufen (übrige Systeme)	0.005 ^a

^a Source: IPCC(2006)-10.62 ff; for details see text

^b A natural crust can develop; enough oxygen is available for N_2O formation. Hence the EF of natural crust is adopted.

^c Assumption (worst case) due to missing data: Floating covers produced by chaff act like natural crusts.

^d Even though a natural crust may develop there is not enough oxygen for N_2O formation.

^e Assumption: comparable to solid-covered storage of slurry

In accordance with Chapter 3.3.4.3.5, the emission factor for NO -N from housing/storage is assumed to be one tenth of the N_2O -N emissions factor, the emission factor for N_2 from housing/storage is estimated thrice the factor for N_2O . Again, the emission factors for NO and N_2 are related to the sum of nitrogen excreted and N input with bedding material.

Entsprechend Kapitel 3.3.4.3.5 wird der Emissionsfaktor für NO -N aus Stall/Lager mit einem Zehntel, der Emissionsfaktor für N_2 aus Stall/Lager mit dem Dreifachen des N_2O -N-Emissionsfaktors angesetzt. Die Emissionsfaktoren für NO und N_2 beziehen sich auf die Summe aus ausgeschiedenem und durch Einstreu eingebrachtem N.

For the uncertainties of the emission factors see Chapter 5.2.2.4.

Zur Unsicherheit der Emissionsfaktoren siehe Kapitel 5.2.2.4

5.2.2.3 NH_3 , N_2O and NO emission factors for spreading / NH_3 -, N_2O - und NO -Emissionsfaktoren der Ausbringung

Table 5.6 bis Table 5.8 provide the partial NH_3 -N emission factors used in the inventory for the spreading of pig manure. The basis of these emission factors is data provided in DÖHLER et al. (2002). In some cases, emission factors had to be corrected, and missing emission factors were added.

Table 5.6 bis Table 5.8 zeigen die im Inventar für Schweine eingesetzten partiellen NH_3 -N-Emissionsfaktoren für die Wirtschaftsdünger-Ausbringung. Als Basis für diese Emissionsfaktoren dienten die Angaben in DÖHLER et al. (2002). In einigen Fällen war es erforderlich die Emissionsfaktor zu korrigieren oder fehlende Werte zu ergänzen.

No NH_3 -N emission factors are available for the application of pig slurry after anaerobic digestion. Hence, according to Chapter 3.3.4.4.3, the emission factors of untreated *cattle slurry* were used (see Table 4.8).

Für die Ausbringung von Gärresten aus der Vergärung von Schweinegülle sind keine NH_3 -N-Emissionsfaktoren verfügbar. Nach Kapitel 3.3.4.4.3 wurden daher die Emissionsfaktoren für die Ausbringung von unbehandelter *Rindergülle* übernommen, siehe Table 4.8.

For the uncertainties of the emission factors see Chapter 5.2.5.

Zur Unsicherheit der Emissionsfaktoren siehe Kapitel 5.2.5.

Emission factors for N_2O and NO emissions due to spreading of manure or digestate of manure are provided in Chapters 11.2 and 12.

Zu Emissionsfaktoren für die Berechnung von N_2O - und NO -Emissionen als Folge der Ausbringung von Wirtschaftsdünger und Wirtschaftsdünger-Gärresten siehe Kapitel 11.2 und 12.

Table 5.6: Pigs, NH₃-N emission factors for application of slurry (related to TAN)

Application type	Ausbringungstechnik	Emission factor (kg kg ⁻¹) ^a
broadcast, without incorporation	Breitverteiler, ohne Einarbeitung	0.25
broadcast, incorporation ≤ 1 h	Breitverteiler, Einarbeitung ≤ 1 h	0.04
broadcast, incorporation ≤ 4 h	Breitverteiler, Einarbeitung ≤ 4 h	0.09
broadcast, incorporation ≤ 6 h	Breitverteiler, Einarbeitung ≤ 6 h	0.11
broadcast, incorporation ≤ 8 h	Breitverteiler, Einarbeitung ≤ 8 h	0.13 ^b
broadcast, incorporation ≤ 12 h	Breitverteiler, Einarbeitung ≤ 12 h	0.16
broadcast, incorporation ≤ 24 h	Breitverteiler, Einarbeitung ≤ 24 h	0.21
broadcast, incorporation ≤ 48 h	Breitverteiler, Einarbeitung ≤ 48 h	0.25
broadcast, vegetation	Breitverteiler, Vegetation	0.25 ^c
broadcast, grassland	Breitverteiler, Grünland	0.30
trailing hose, without incorporation	Schleppschlauch, ohne Einarbeitung	0.175
trailing hose, incorporation ≤ 1 h	Schleppschlauch, Einarbeitung ≤ 1 h	0.02
trailing hose, incorporation ≤ 4 h	Schleppschlauch, Einarbeitung ≤ 4 h	0.06
trailing hose, incorporation ≤ 6 h	Schleppschlauch, Einarbeitung ≤ 6 h	0.08
trailing hose, incorporation ≤ 8 h	Schleppschlauch, Einarbeitung ≤ 8 h	0.0925 ^b
trailing hose, incorporation ≤ 12 h	Schleppschlauch, Einarbeitung ≤ 12 h	0.11
trailing hose, incorporation ≤ 24 h	Schleppschlauch, Einarbeitung ≤ 24 h	0.14
trailing hose, incorporation ≤ 48 h	Schleppschlauch, Einarbeitung ≤ 48 h	0.17
trailing hose, short vegetation	Schleppschlauch, kurze Vegetation	0.175 ^d
trailing hose, beneath vegetation	Schleppschlauch, unterhalb der Vegetation	0.125
trailing hose, grassland	Schleppschlauch, Grünland	0.21
trailing shoe, incorporation ≤ 1 h	Schleppschuh, Einarbeitung ≤ 1 h	0.02 ^e
trailing shoe, incorporation ≤ 4 h	Schleppschuh, Einarbeitung ≤ 4 h	0.06 ^e
trailing shoe, incorporation ≤ 8 h	Schleppschuh, Einarbeitung ≤ 8 h	0.0925 ^e
trailing shoe, incorporation ≤ 12 h	Schleppschuh, Einarbeitung ≤ 12 h	0.11 ^e
trailing shoe, grassland	Schleppschuh, Grünland	0.12
injection techniques	Injektionsverfahren/Schlitzverfahren	0.06
slurry cultivator	Güllegrubber	0.02 ^f

^a Source: The emission factors are calculated from Table 3.19 and pg. 69 in DÖHLER et al. (2002), except for the EFs denoted by ^b, ^c, ^d, ^e.

^b broadcast or trailing hose with incorporation within 8 h: no data available in DÖHLER et al. (2002), hence emission factor estimated in agreement with KTBL.

^c broadcast, vegetation: worst case assumption of "no reduction" as no emission factor available.

^d Expert judgment (S. Wulf, KTBL, 2018): EF of "trailing hose, short vegetation" is assumed to be equal to the EF of "trailing hose, without incorporation".

^e As there is no data available on these trailing shoe emission factors, the respective emission factors of trailing hose were adopted.

^f Expert judgment (S. Wulf, KTBL, 2016): The EF of the slurry cultivator is assumed to be equal to the EF of trailing hose with incorporation within 1 hour.

Table 5.7: Pigs, NH₃-N emission factors for application of leachate ("Jauche") (related to TAN)

Application type	Ausbringungstechnik	Emission factor (kg kg ⁻¹)
broadcast, without incorporation	Breitverteiler, ohne Einarbeitung	0.20 ^a
broadcast, incorporation ≤ 1 h	Breitverteiler, Einarbeitung ≤ 1 h	0.02 ^a
broadcast, incorporation ≤ 4 h	Breitverteiler, Einarbeitung ≤ 4 h	0.07 ^a
broadcast, incorporation ≤ 8 h	Breitverteiler, Einarbeitung ≤ 8 h	0.116 ^b
broadcast, incorporation ≤ 12 h	Breitverteiler, Einarbeitung ≤ 12 h	0.144 ^b
broadcast, vegetation	Breitverteiler, Vegetation	0.20 ^b
Broadcast, grassland	Breitverteiler, Grünland	0.20 ^a
trailing hose, without incorporation	Schleppschlauch, ohne Einarbeitung	0.18 ^b
trailing hose, incorporation ≤ 1 h	Schleppschlauch, Einarbeitung ≤ 1 h	0.01 ^b
trailing hose, incorporation ≤ 4 h	Schleppschlauch, Einarbeitung ≤ 4 h	0.05 ^b
trailing hose, incorporation ≤ 8 h	Schleppschlauch, Einarbeitung ≤ 8 h	0.09 ^b
trailing hose, incorporation ≤ 12 h	Schleppschlauch, Einarbeitung ≤ 12 h	0.12 ^b
trailing hose, vegetation	Schleppschlauch, Vegetation	0.10 ^b
trailing hose, grassland	Schleppschlauch, Grünland	0.14 ^c
trailing shoe, incorporation ≤ 1 h	Schleppschuh, Einarbeitung ≤ 1 h	0.01 ^d
trailing shoe, incorporation ≤ 4 h	Schleppschuh, Einarbeitung ≤ 4 h	0.05 ^d
trailing shoe, incorporation ≤ 8 h	Schleppschuh, Einarbeitung ≤ 8 h	0.09 ^d
trailing shoe, incorporation ≤ 12 h	Schleppschuh, Einarbeitung ≤ 12 h	0.12 ^d
trailing shoe, grassland	Schleppschuh, Grünland	0.08 ^c
injection techniques	Injektionsverfahren/Schlitzverfahren	0.04 ^c
slurry cultivator	Güllegrubber	0.01 ^e

^a DÖHLER et al. (2002), Table 3.20

^b Source: emission factors estimated in agreement with KTBL, based on a emission decay curve as function of the duration of incorporation similar to that of pig slurry (see DÖHLER et al., 2002, Table 3.19)

^c estimated with the respective emission reduction factor for pig slurry (DÖHLER et al., 2002, Table 3.19)

^d As there is no data available on these trailing shoe emission factors, the respective emission factors of trailing hose were adopted.

^e Expert judgment (S. Wulf, KTBL, 2016): The EF of the slurry cultivator is assumed to be equal to the EF of trailing hose with incorporation within 1 hour.

Table 5.8: Pigs, NH₃-N emission factors for application of solid manure (FYM) (related to TAN)

Application type	Ausbringungstechnik	Emission factor (kg kg ⁻¹)
broadcast, without incorporation	Breitverteiler, ohne Einarbeitung	0.90 ^a
broadcast, incorporation ≤ 1 h	Breitverteiler, Einarbeitung ≤ 1 h	0.09 ^a
broadcast, incorporation ≤ 4 h	Breitverteiler, Einarbeitung ≤ 4 h	0.45 ^a
broadcast, incorporation ≤ 8 h	Breitverteiler, Einarbeitung ≤ 8 h	0.72 ^b
broadcast, incorporation ≤ 12 h	Breitverteiler, Einarbeitung ≤ 12 h	0.81 ^b
broadcast, incorporation ≤ 24 h	Breitverteiler, Einarbeitung ≤ 24 h	0.90 ^a
broadcast, incorporation ≤ 48 h	Breitverteiler, Einarbeitung ≤ 48 h	0.90 ^a

^a calculated according to DÖHLER et al. (2002), Table 3.24

^b estimated from data in DÖHLER et al. (2002), Table 3.24, in agreement with KTBL

5.2.2.4 Uncertainties of the nitrogen emission factors / Unsicherheiten der Stickstoff-Emissionsfaktoren

For the uncertainties of the emission factors see Chapter 4.2.2.4.

(With pigs, uncertainties for grazing are not needed as the inventory does not consider the option of pigs being held in free range.)

Zu den Unsicherheiten der Emissionsfaktoren siehe Kapitel 4.2.2.4.

(Unsicherheiten für Weidegang bei Schweinen sind nicht erforderlich, da das Inventar keinen Freiland-aufenthalt für Schweine vorsieht.)

5.3 Sows and suckling-pigs / Sauen und Saugferkel

The category “sows” covers all subcategories of sows for breeding irrespective of their age and weight. The calculation of energy and feed requirements includes the suckling-pigs as they do not constitute a separate animal category in the inventory.

The emissions are calculated according to the methods compiled in Table 5.9.

For the definition of the methods see Chapter 3.2.3.

Die Kategorie „Sauen“ umfasst alle Unterkategorien von Zuchtsauen unabhängig von ihrem Alter und Gewicht. Bei den Berechnungen zum Energie- und Futterbedarf werden die Saugferkel mit berücksichtigt. (Saugferkel bilden keine separate Tierkategorie im Inventar.)

Die Berechnung der Emissionen erfolgt nach den in Table 5.9 zusammengestellten Methoden.

Zur Methodendefinition siehe Kapitel 3.2.3.

Table 5.9: Sows, calculation methods applied

Species	Origin	Tier	Method applied
CH ₄	enteric fermentation	2	IPCC / national
CH ₄	manure management	2	IPCC / national
NM VOC	manure management	1	EMEP
NH ₃	manure management	3	EMEP / national
N ₂ O, NO, N ₂	manure management	2	IPCC / national
TSP, PM ₁₀ , PM _{2.5}	manure management	2	EMEP

5.3.1 Activity and performance data /Aktivitäts- und Leistungsdaten

5.3.1.1 Animal numbers / Tierzahlen

Animal numbers are provided by the statistical offices of the Länder (STATLA C III 1 – vj 4). The overall number of sows used in the inventory is calculated as follows:

$$n_{so} = n_R + n_S + n_T + n_U \quad (5.1)$$

n_{so} number of sows considered

n_R etc. animal numbers of type R (etc.) in the German census (see Table 5.1)

Tierzahlen werden von den Statistischen Landesämtern bereitgestellt (STATLA C III 1 – vj 4). Für das Inventar berechnet sich die Anzahl der Sauen gemäß:

For the number of the piglets raised per sow see Chapter 5.3.2.

For the uncertainty of the animal numbers see Chapter 5.1.2.

Zur Anzahl der bei einer Sau zu berücksichtigen Saugferkel siehe Kapitel 5.3.2.

Zur Unsicherheit der Tierzahlen siehe Kapitel 5.1.2.

5.3.1.2 Animal weights and weight gains / Tiergewichte und Gewichtszunahmen

As mean weight the inventory adopts the value used by HAENEL et al. (2011a) which is based on data discussed in GfE (2006), pg. 74. It is 220 kg sow⁻¹. Due to lack of information, the live weight of 220 kg sow⁻¹ is used for the whole time series from 1990 onwards.

Using a mean live weight disregards the fact that the live weight of sows oscillates. However this cannot be reproduced in the inventory whose time steps are one year and hence exceed that of a reproduction cycle.

For piglets, the inventory is based on a birth weight of 1.5 kg piglet⁻¹. This can be derived from feeding recommendations in DLG (2008), Table 4.1, where the piglet weight after the first week with a daily weight gain of 0.2 kg piglet⁻¹ d⁻¹ reaches 2.9 kg piglet⁻¹.

HAENEL et al. (2011a) also recommended to use a piglet weight of 8.0 kg piglet⁻¹ at weaning. The age of the piglets at weaning is assumed to coincide with the duration of the lactation period (see Table Table 5.10 in Chapter 5.3.2).

Das mittlere Gewicht wird nach HAENEL et al. (2011a) auf Grundlage von Gewichtsdaten in GfE (2006), S. 74, auf 220 kg sow⁻¹ geschätzt. Mangels besserer Kenntnis wird dieser Wert für die zurückliegenden Jahre ab 1990 als konstant angesetzt.

Die in der Praxis zu beobachtenden Gewichtsänderungen können im Inventar nicht berücksichtigt werden, da der Inventar-Zeitschritt von einem Jahr erheblich länger als die Dauer eines Durchgangs ist.

Im Inventar werden als Geburtsgewicht der Ferkel 1,5 kg piglet⁻¹ angenommen. Dieser Wert ist den Fütterungsempfehlungen in DLG (2008), Tabelle 4.1, entnommen, in denen Ferkel nach einer Woche ein Gewicht von 2,9 kg piglet⁻¹ bei einer Gewichtszunahme von 0,2 kg piglet⁻¹ d⁻¹ aufweisen.

Das Absetzgewicht der Saugferkel wird nach HAENEL et al. (2011a) mit 8,0 kg piglet⁻¹ angenommen. Für das Absetzalter der Saugferkel wird die Dauer der Laktationsphase angesetzt, siehe Table 5.10 in Kapitel 5.3.2.

5.3.2 Energy requirements / Energiebedarf

Energy requirements according to the current state of knowledge are provided in GfE (2006). To a large extent, the literature cited herein dates the period that is covered by the inventory. Hence it is assumed that the details provided in GfE (2006) are representative of the timeseries from 1990 onwards and that the methodology based on GfE (2006) can be applied to all years since 1990.

The data and methods provided in GfE (2006) had been incorporated into the inventory model as described in HAENEL et al. (2010). They were partly revised in HAENEL et al. (2011a). Table 5.10 shows the data used in the inventory for a single cycle of piglets production. (there are somewhat more than two such production cycles per year.) The piglet-dependent ME requirements during lactation have been converted into a linear function for the inventory model.

Daten zum Energiebedarf finden sich in GfE (2006). Die zugrunde liegende Literatur stammt weitgehend aus demjenigen Zeitbereich, über den im Inventar zu berichten ist. Es wird daher davon ausgegangen, dass die Angaben in GfE (2006) als repräsentativ für die Zeitreihen ab 1990 angesehen werden können, so dass das Emissionsberechnungsverfahren für alle Jahre gleich angewendet werden kann.

Die Umsetzung der Vorgaben in GfE (2006) wurde in HAENEL et al. (2010) erstmals beschrieben und im Rahmen der Publikation von HAENEL et al. (2011a) überarbeitet. Table 5.10 zeigt die im Inventar verwendeten Kennwerte, die für einen einzelnen Ferkel-Produktionszyklus gelten. (Es gibt etwas mehr als zwei Produktionszyklen pro Jahr). Der von der Ferkelzahl abhängige ME-Bedarf während der Laktation wurde für das Inventarmodell in eine lineare Funktion überführt.

Table 5.10: Sows, production cycle: Definition of pases and respective ME requirements

phases		duration in d	number of piglets born per sow ($n_{\text{piglets, birth}}$ in piglet sow ⁻¹)	ME requirements ^a in MJ sow ⁻¹ d ⁻¹	
pregnancy	pregnancy 1	84 ^b		$ME_{\text{preg},1}$ =	33.3
	pregnancy 2	30 ^b		$ME_{\text{preg},2}$ =	40.7
lactating		28 ^c	8	ME_{lact} =	79.5
			9		86.3
			10		93.1
			11		99.9
			12		106.7
			13		113.5
weaning to covering		11 ^d		ME_{wtc} =	40.7
total (τ_{sow})		153			

^a Source: HAENEL et al. (2011a), based on GfE (2006) data

^b Source: GfE (1987)

^c Source: Expert judgement SCHULZ E (co-author of GfE, 2006)

^d Source: KTBL (2008), pg. 617

As can be seen in Table 5.10, the number of piglets per sow and birth are needed as input data for the calculation of the energy requirements. These input data can be derived from the number of piglets raised per sow and year:

Aus Table 5.10 geht hervor, dass die Anzahl der Saugferkel pro Sau und Wurf als Eingangsgröße für die Berechnung des Energiebedarfs benötigt wird. Diese Eingangsgröße lässt sich aus der Anzahl der pro Sau und Jahr aufgezogenen Ferkel ableiten:

$$n_{\text{piglets, birth}} = n_{\text{piglets, year}} \cdot \frac{\tau_{\text{sow}}}{\alpha} \quad (5.2)$$

$n_{\text{piglets, birth}}$ number of piglets raised per sow and birth (in piglet sow⁻¹)
 $n_{\text{piglets, year}}$ number of piglets raised per sow and year (in piglet sow⁻¹ a⁻¹)
 τ_{sow} duration of piglet production cycle (in d), see Table 5.10
 α time units conversion factor ($\alpha = 365 \text{ d a}^{-1}$)

The number of piglets raised per sow and year varies with time and region. The data available is compiled in Table 5.11. As the table size does not allow to present the complete timeseries, every other year is omitted in the years before 2010.

Die Zahl der pro Sau und Jahr aufgezogenen Ferkel variiert örtlich und zeitlich. Table 5.11 fasst die verfügbaren Informationen zusammen. Aus Platzgründen wurde bis 2010 jedes zweite Jahr weggelassen.

Table 5.11: Sows, number of piglets raised per sow and year, $n_{\text{piglets, year}}$ (primary statistical information)

	1990	1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
BW					19.20	18.20	18.90		20.50	21.10	22.10	22.60	23.50	23.40	24.00	25.20	25.40	25.80	26.00
BY	18.00	17.70	17.70	18.10	18.80	18.90	19.60	19.70	20.40	21.00	22.00	22.30	22.80	22.90	23.40	23.90	24.10	24.40	*)
BB					18.20	19.50		20.80	22.20	22.80	24.50	25.20	25.90		27.90		*)	*)	*)
HE	17.00	16.60	17.10	16.90	18.00	18.50	19.10	19.90	21.60	21.20	23.50	24.00	24.00	24.00	25.50	25.70	*)	*)	*)
MV					19.60	21.10	21.30			23.84	25.60	26.00	26.80		27.80	28.31	*)	*)	*)
NI	18.90	18.90	18.50	18.40	19.30	19.70	19.60	20.60	21.40	22.80	23.40	25.60	26.60	27.10	28.10	28.70	*)	*)	*)
NW	19.00	18.40	19.00	19.10	20.10	20.30	20.30	21.80	22.30	23.70	25.00	25.80	27.30	27.40	28.20	28.50	29.00	29.20	29.70
RP	17.20	17.20	17.40	17.60	18.00	18.50	18.40	19.00		20.60	20.30	21.90	21.60	23.00	24.00	24.10	*)	*)	*)
SL	17.20	17.20	17.40	17.60	18.00	18.50	18.40	19.00											
SN			18.40	18.64	19.88	20.45	20.67	21.40	22.38	23.31	23.70	26.60	28.20	27.90	31.57	33.07			
ST					18.50	20.00	20.66	21.01	22.00	22.99	23.90	24.20	25.60	26.30	27.20	27.00	27.60	27.90	
SH		18.60	18.70	18.80	19.70	20.10	20.30	21.60	22.90	24.30	26.30	27.20	27.70	28.00	29.00	29.90	30.50	30.40	31.70
TH				18.30	20.10	21.23	21.25	21.66	22.72	23.94	26.26	26.00	26.70	26.96	28.45	28.11	29.49	28.87	28.28

Sources: ASSE & ZACHARIAS (2012a, 2012c, 2013a, 2015a, 2016a, 2017a); ERZEUGERRING.INFO (2015, 2016, 2017, 2018, 2019) (personal communication Schulz/ZDS); ERZEUGERRING WESTFALEN (2016, 2017, 2018, 2019); HMULV (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011); LFL (2004c, 2006b); LKV-BY (2011, 2012, 2013, 2015a, 2016a, 2018a, 2019); LKV-SN (2013, 2014, 2015); LKV-ST (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019); LSZ-BW (2007, 2008b, 2009b, 2010, 2018, 2019); LWK-SH (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018); MLUR-BB (2002); MLUV-BB (2005, 2006, 2007, 2008); NMELF, various years; SEGGER (2005a); SMUL (2000, 2002, 2007, 2008, 2009, 2012); QNETICS (2019); THMLNU (2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009); TLL (2011); TMLFUN (2011); TVL (2014, 2015, 2016, 2017, 2018); ZDS, various years

*) confidential data provided by ERZEUGERRING.INFO

Within a time series in Table 5.11, data gaps are closed by linear interpolation. Missing data at the end of a time series is generated by adopting the latest value reported. Data gaps at the beginning of a times series are closed as follows:

- New Bundesländer (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen): The number of piglets raised per sow and year in 1990 is assumed to be 17.0. In addition, a linear increase towards the earliest year of reporting is assumed (expert judgement Schnabel, Rönsch, Bodenstein).
- Schleswig Holstein: For 1990 the value given for 1991 is used.
- Baden-Württemberg: Going backwards from the first value reported (1998), the absolute annual differences given by the times series of Bavaria are applied.

For the City States, data for Hamburg were taken from Schleswig-Holstein, for Bremen from Niedersachsen, and for Berlin from Brandenburg.

Datenlücken innerhalb einer Zeitreihe in Table 5.11 werden durch lineare Interpolation geschlossen. Fehlende Werte am Ende einer Zahlenreihe werden durch Fortschreiben des letzten jeweils berichteten Wertes erzeugt. Fehlende Werte zu Beginn einer Zeitreihe werden wie folgt generiert:

- Neue Bundesländer (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen): Die Ferkelzahl pro Sau und Jahr 1990 wird mit 17,0 angenommen. Ein linearer Anstieg von 1990 bis zum jeweils ersten berichteten Jahr ist nach Expertenschätzung realistisch (Expertenschätzung Schnabel, Rönsch, Bodenstein).
- Schleswig Holstein: Für 1990 wird der Wert von 1991 eingesetzt.
- Baden-Württemberg: Vom ersten berichteten Wert an (1998) werden rückwärts schreitend die Beträge der Jahresdifferenzen aus der Zeitreihe von Bayern subtrahiert.

Bei den Stadtstaaten werden für Hamburg die Daten von Schleswig-Holstein eingesetzt, bei Bremen die von Niedersachsen und bei Berlin die von Brandenburg.

5.3.3 Feed and energy intake / Futter- und Energieaufnahme

Sows are fed phase-dependent. Typical feed properties are listed in Table 5.12. They were used nationwide for the emission calculations for all years of the time series.

Specific N reduced feeding of sows is not relevant in practice (expert judgement Brigitte Eurich-Menden, KTBL). Hence it is not applied in the inventory.

Sauen werden phasenabhängig gefüttert. Table 5.12 zeigt typische Futtereigenschaften, wie sie den Emissionsberechnungen deutschlandweit für alle Jahre der Zeitreihe zugrunde gelegt wurden.

Die N-reduzierte Fütterung von Sauen ist nicht praxisrelevant (Expertenurteil Brigitte Eurich-Menden, KTBL) und ist deshalb im Inventar nicht vorgesehen.

Table 5.12: Sows, diets used in the inventory, and their properties

(X_{DE} : digestibility of energy; X_{ME} : metabolisability; η_{ME} : content of metabolisable energy, related to dry matter; x_N : N content of feed, related to dry matter; x_{ash} : ash content of feed, related to dry matter; X_{DOM} : digestibility of organic matter)

feed type	phase	major components	X_{DE} MJ MJ ⁻¹	X_{ME} MJ MJ ⁻¹	η_{ME} MJ kg ⁻¹	x_N kg kg ⁻¹	x_{ash} kg kg ⁻¹	X_{DOM} kg kg ⁻¹
A	weaning to covering (wtc), lactating (lact)	wheat bran, wheat, barley, triticale, peas, soybean meal	0.82948	0.79616	13.0	0.02829	0.065	0.86
B	pregnancy 1 (preg 1), pregnancy 2 (preg 2)	wheat bran, wheat, barley, triticale, sun- flower meal, soybean meal	0.78539	0.74245	12.0	0.02386	0.056	0.81

Source: Feed composition according to deuka Deutsche Tiernahrung GmbH & Co. KG, privat communication; energy and protein/nitrogen contents according to BEYER et al. (2004) and LfL (2004b).

The subsequent equation describes the calculation of the daily feed intake (dry matter) averaged over the production cycle. For the input data see Table 5.10 and Table 5.12. It was used that in this case the units "pl⁻¹" and "sow⁻¹" are equivalent (see Chapter 3.1.2.2.1).

Die nachfolgende Gleichung beschreibt die Berechnung der im Mittel erforderlichen täglichen Futtermenge (Trockenmasse). Zu den Eingangsdaten siehe Table 5.10 und Table 5.12. Es wurde davon Gebrauch gemacht, dass in diesem Fall die Einheiten „pl⁻¹“ und „sow⁻¹“ äquivalent sind (siehe Kapitel 3.1.2.2.1).

$$m_{F,DM} = \frac{\frac{ME_{wtc} \cdot \tau_{wtc}}{\eta_{ME,wtc}} + \frac{ME_{preg,1} \cdot \tau_{preg,1}}{\eta_{ME,preg,1}} + \frac{ME_{preg,2} \cdot \tau_{preg,2}}{\eta_{ME,preg,2}} + \frac{ME_{lact} \cdot \tau_{lact}}{\eta_{ME,lact}}}{\tau_{wtc} + \tau_{preg,1} + \tau_{preg,2} + \tau_{lact}} \quad (5.3)$$

$m_{F,DM}$	mean daily feed intake of a sow, dry matter (in kg pl ⁻¹ d ⁻¹)
ME_{wtc}	daily metabolisable energy requirements between weaning and covering (in MJ sow ⁻¹ d ⁻¹)
τ_{wtc}	time between weaning and covering (in d)
$\eta_{ME, wtc}$	specific metabolisable energy content of feed between weaning and covering (MJ kg ⁻¹), related to dry matter
$ME_{preg, 1}$	daily metabolisable energy requirements during phase "pregnancy 1" (in MJ sow ⁻¹ d ⁻¹)
$\tau_{preg, 1}$	duration of phase "pregnancy 1" (in d)
$\eta_{ME, preg, 1}$	specific metabolisable energy content of feed during phase "pregnancy 1" (MJ kg ⁻¹), related to dry matter
$ME_{preg, 2}$	daily metabolisable energy requirements during phase "pregnancy 2" (in MJ sow ⁻¹ d ⁻¹)
$\tau_{preg, 2}$	duration of phase "pregnancy 2" (in d)
$\eta_{ME, preg, 2}$	specific metabolisable energy content of feed during phase "pregnancy 2" (MJ kg ⁻¹), related to dry matter
ME_{lact}	daily metabolisable energy requirements during lactation (in MJ sow ⁻¹ d ⁻¹)
τ_{lact}	duration of lactation period (in d)
$\eta_{ME, lact}$	specific metabolisable energy content of feed during lactation (MJ kg ⁻¹), related to dry matter

By analogy, the mean digestibility is obtained as a weighted mean over all phases of a production cycle.

The amount of nitrogen taken in with feed is obtained by multiplying each term in the numerator of the previous equation with the respective x_N value given in Table 5.12.

By analogy to the calculation of the daily feed intake with Equation (5.3), the amount of gross energy taken in daily with the feed is given by (averaged over the production cycle):

$$GE_{sow} = \frac{\frac{ME_{wtc} \cdot \tau_{wtc}}{X_{ME, wtc}} + \frac{ME_{preg,1} \cdot \tau_{preg,1}}{X_{ME, preg,1}} + \frac{ME_{preg,2} \cdot \tau_{preg,2}}{X_{ME, preg,2}} + \frac{ME_{lact} \cdot \tau_{lact}}{X_{ME, lact}}}{\tau_{wtc} + \tau_{preg,1} + \tau_{preg,2} + \tau_{lact}} \quad (5.4)$$

Die durchschnittliche Verdaulichkeit X_{DE} ergibt sich analog als gewichtetes Mittel über alle Phasen eines Produktionszyklusses.

Die mit dem Futter aufgenommene Stickstoffmenge erhält man, indem jeder Term im Zähler der vorstehenden Gleichung mit dem entsprechenden x_N -Wert nach Table 5.12 multipliziert wird.

Analog zur Vorgehensweise zur Futtermengenberechnung mit Gleichung (5.3) ergibt sich die mit dem Futter täglich aufgenommene Gesamtenergie (Mittelwert über einen Produktionszyklus):

GE_{sow}	daily gross energy requirements of a sow (in MJ $pl^{-1} d^{-1}$)
ME_{wtc}	daily metabolisable energy requirements between weaning and covering (in MJ $sow^{-1} d^{-1}$)
τ_{wtc}	time between weaning and covering (in d)
$X_{ME, wtc}$	metabolisability of feed between weaning and covering (in MJ MJ^{-1})
$ME_{preg, 1}$	daily metabolisable energy requirements during phase “pregnancy 1” (in MJ $sow^{-1} d^{-1}$)
$\tau_{preg, 1}$	duration of phase “pregnancy 1” (in d)
$X_{ME, preg, 1}$	metabolisability of feed during phase “pregnancy 1” (in MJ MJ^{-1})
$ME_{preg, 2}$	daily metabolisable energy requirements during phase “pregnancy 2” (in MJ $sow^{-1} d^{-1}$)
$\tau_{preg, 2}$	duration of phase “pregnancy 2” (in d)
$X_{ME, preg, 2}$	metabolisability of feed during phase “pregnancy 2” (in MJ MJ^{-1})
ME_{lact}	daily metabolisable energy requirements during lactation (in MJ $sow^{-1} d^{-1}$)
τ_{lact}	duration of lactation period (in d)
$X_{ME, lact}$	metabolisability of feed during lactation (in MJ MJ^{-1})

5.3.4 Methane from enteric fermentation / Methan aus der Verdauung

For the calculation of CH_4 emissions from enteric fermentation the Tier 2 method described in Chapter 3.3.2 is used. This method needs the gross energy intake (see Chapter 5.3.3) and the methane conversion factor $x_{CH_4, GE}$ as input.

The source of the national methane conversion factor of 0.0071 MJ MJ^{-1} is DÄMMGEN ET. AL. (2012c). (IPCC(2006) does not provide such a factor for pigs.)

No national data is available on the uncertainty of the emission factor for CH_4 from enteric fermentation do not exist. IPCC(2006)-10.33 estimates the uncertainty of Tier 2 approaches to be 20 %. This value is, according to the definition of uncertainty used in Chapter 3 in IPCC (2006a), interpreted as half the 95 % confidence interval. A normal distribution is assumed.

Die CH_4 -Emission aus der Verdauung wird mit dem in Kapitel 3.3.2 beschriebenen Tier-2-Verfahren aus der Gesamtenergie-Aufnahme (siehe Kapitel 5.3.3) mithilfe des Methanumwandlungsfaktors $x_{CH_4, GE}$ berechnet.

Der nationale Methanumwandlungsfaktor von 0,0071 MJ MJ^{-1} ist DÄMMGEN ET. AL. (2012c) entnommen. (Ein entsprechender Faktor wird in IPCC(2006) nicht bereitgestellt.)

Zur Unsicherheit des Emissionsfaktors für CH_4 aus der Verdauung sind keine nationalen Daten verfügbar. IPCC(2006)-10.33 schätzt die Unsicherheit bei Anwendung von Tier-2-Verfahren auf 20 %. Dieser Wert wird im Sinne von IPCC (2006a), Kapitel 3, als halbes 95 %-Konfidenzintervall interpretiert. Es wird Normalverteilung angenommen.

5.3.5 Methane from manure management / Methan aus dem Wirtschaftsdünger-Management

A Tier 2 approach is used to calculate CH_4 emissions from manure management (cf. Chapter 3.3.4.1).

Volatile solids (VS) excretion rates are calculated using the modified IPCC approach described in DÄMMGEN et al. (2011a), see Chapter 3.3.3.1.

The necessary information on the digestability of organic matter and the ash contents of the diet are obtained as weighted means from the properties of feed constituents as listed in Table 5.12.

Maximum methane producing capacity B_0 and conversion factors (MCF) for the respective manure storage system are provided in Table 5.2 (see Chapter 5.2.1).

The frequency distribution of storage types is supplied by RAUMIS or derived from official census data (see Chapter 3.4.3).

German data on the uncertainty of CH_4 emissions from manure management do not exist. IPCC(2006)-10.48 estimates the uncertainty of Tier 2 approaches to be 20 %. This value is, according to the definition of uncertainty used in Chapter 3 in IPCC (2006a), interpreted as half the 95 % confidence interval. A normal distribution is assumed.

CH_4 aus dem Wirtschaftsdünger-Management wird mit einem Tier-2-Verfahren berechnet, s. Kap. 3.3.4.1.

Die VS-Ausscheidungen („volatile solids“) werden nach dem gegenüber IPCC modifizierten Verfahren von DÄMMGEN et al. (2011a) berechnet, siehe Kapitel 3.3.3.1.

Die dazu notwendigen Daten zur Verdaulichkeit von organischer Substanz und dem Aschegehalt im Futter ergeben sich im gewichteten Mittel aus den Angaben zu den Rationen in Table 5.12.

Zu maximaler Methan-Freisetzungskapazität B_0 und Methanumwandlungsfaktoren (MCF) für die einzelnen Lagerungssysteme siehe Table 5.2 in Kapitel 5.2.1.

Die Häufigkeitsverteilung der Lagerverfahren wird durch RAUMIS bereitgestellt bzw. aus offiziellen Erhebungen abgeleitet, siehe Kapitel 3.4.3.

Deutsche Zahlen zur Unsicherheit der CH_4 -Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management liegen nicht vor. IPCC(2006)-10.48 schätzt die Unsicherheit bei Anwendung von Tier-2-Verfahren auf 20 %. Dieser Wert wird im Sinne von IPCC (2006a), Kapitel 3, als halbes 95 %-Konfidenzintervall interpretiert. Es wird Normalverteilung angenommen.

5.3.6 NMVOC emissions / NMVOC-Emissionen

The calculation of the NMVOC emissions of all animals except cattle are calculated with a Tier 1 methodology, see Chapters 3.3.4.2.1 and 3.3.4.2.3.

Die NMVOC-Emissionen von allen Tieren außer den Rindern werden mit einer Tier-1-Methode berechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.1 und 3.3.4.2.3.

Agricultural NMVOC emissions are reported, but are neglected regarding the NEC emission threshold, see Chapter 3.3.4.2.

Landwirtschaftliche NMVOC-Emissionen werden zwar berichtet, aber bzgl. der NEC-Emissionsobergrenze nicht angerechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.

5.3.7 Emissions of nitrogen species / Emissionen von Stickstoff-Spezies

The calculation of these emissions presupposes the knowledge of N excretions (their amounts and locations), of the N inputs with straw, the conversion of N_{org} and TAN as well as the frequency distributions of housing types and storage facilities, spreading techniques and times before incorporation.

Die Berechnung der Emissionen beruht auf der Kenntnis der N-Ausscheidungen (Mengen und Orte), der N-Einträge mit Stroh, der Umwandlungen von N_{org} und TAN, der Häufigkeit von Stalltypen, Lagertypen, Ausbringungstechniken und Einarbeitungszeiten.

5.3.7.1 N excretion / N-Ausscheidung

From the animal's N balance the amount of nitrogen excreted can be assessed as follows:

Mithilfe der tierischen N-Bilanz berechnet sich die N-Ausscheidung wie folgt:

$$m_{\text{excr}} = m_{\text{intake, sow}} - m_{\text{g, sow}} - m_{\text{g, piglet}} \quad (5.5)$$

m_{excr}	amount of nitrogen excreted (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
$m_{\text{intake, sow}}$	annual N intake of a sow (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
$m_{\text{g, sow}}$	amount of N retained in the sow (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹), see below
$m_{\text{g, piglet}}$	amount of N retained in piglets (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹), see below

The annual N intake of sows is a function of dry matter intake and N content of dry matter:

Die jährliche N-Aufnahme der Sau ergibt sich aus der Trockenmasseaufnahme und deren N-Gehalt:

$$m_{\text{intake}} = \alpha \cdot m_{\text{F, DM}} \cdot X_{\text{N}} \quad (5.6)$$

$m_{\text{intake, sow}}$	annual N intake of a sow (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
α	time units conversion factor ($\alpha = 365 \text{ d a}^{-1}$)
$m_{\text{F, DM}}$	daily feed intake of a sow, dry matter (in kg pl ⁻¹ d ⁻¹), see Chapter 5.3.3
X_{N}	nitrogen content of feed, related to dry matter (in kg kg ⁻¹), see Chapter 5.3.3

The temporal variation during a production cycle of sows' weight cannot be incorporated in the inventory. However, the mean net weight gain can be taken into account. According to GrF (2006), pg. 74, and DLG (2008), pgs 13 and 14, this can be estimated to be 35 kg per production cycle, a fact that has to be taken into account for the calculation of the N balance of the system sow-pigs.

Die zeitlich variable Gewichtsentwicklung einer Sau während eines Durchganges kann im Inventar zwar nicht berücksichtigt werden; dagegen ist das mittlere Nettowachstum einer Sau, das nach GrF (2006), S. 74, und DLG (2008), S. 13 f. in konservativer Weise zu rund 35 kg pro Produktionszyklus geschätzt wird, bei der Berechnung der N-Bilanz des Systems Sau/Ferkel zu berücksichtigen:

$$m_{\text{g, sow}} = \alpha \cdot X_{\text{N, pig}} \cdot \frac{\Delta w_{\text{sow}}}{\tau_{\text{sow}}} \quad (5.7)$$

$m_{\text{g, sow}}$	amount of N retained in the sow (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
α	time units conversion factor ($\alpha = 365 \text{ d a}^{-1}$)
$X_{\text{N, pig}}$	nitrogen content of a pig's body ($X_{\text{N, pig}} = 0.0256 \text{ kg kg}^{-1}$) (LFL, 2004a)
τ_{sow}	duration of one production cycle of a sow (in d), see Table 5.10
Δw_{sow}	net weight gain of a sow during one production cycle (in kg pl ⁻¹), see text

The amount of N retained in the piglets between birth and weaning ($m_{\text{g, piglet}}$) is derived from the weight of the conception products, the piglet weight gain between birth and weaning and the mean N content of pigs:

Die in den Saugferkeln bis zum Absetzen gebundene N-Menge $m_{\text{g, piglet}}$ wird aus dem Gewicht der Konzeptionsprodukte, dem Gesamtzuwachs sowie dem mittleren N-Gehalt von Schweinen berechnet.

$$m_{g, \text{ piglets}} = n_{\text{piglets, year}} \cdot [a_{cp} + (w_{\text{piglet, w}} - w_{\text{piglet, b}})] \cdot x_{N, \text{ pig}} \quad (5.9)$$

$m_{g, \text{ piglets}}$	amount of N retained in conception products and growing piglets (in kg sow ⁻¹ a ⁻¹)
$n_{\text{piglets, year}}$	number of piglets raised per sow and year (in piglet sow ⁻¹ a ⁻¹), see Chapter 5.3.2
a_{cp}	mass of conception products developed per piglet (in kg piglet ⁻¹), see below
$w_{\text{piglet, w}}$	weaning weight of a piglet (in kg piglet ⁻¹), see Chapter 5.3.1.2
$w_{\text{piglet, b}}$	birth weight of a piglet (in kg piglet ⁻¹), see Chapter 5.3.1.2
$x_{N, \text{ pig}}$	nitrogen content of a pig's body ($x_{N, \text{ pig}} = 0.0256 \text{ kg kg}^{-1}$) (LFL, 2004a)

The mass of conception products per piglet is the the overall mass of the conception products (25 kg per sow and litter, see DLG, 2008, pg. 13) divided by the pertinent number of piglets (13 piglets per litter, see GfE, 2006, pg. 74). The resulting mass of conception products per piglet is $a_{cp} = 1.923 \text{ kg per piglet}$.

Based on the digestibilities provided in Table 5.12 the calculation of the TAN content of excreta yields above 75 % of total N excreted (see Chapter 3.3.4.3.5).

Die auf das einzelne Ferkel bezogene Masse der Konzeptionsprodukte (a_{cp}) ist der Quotient aus der typischerweise insgesamt angesetztten Masse der Konzeptionsprodukte (25 kg pro Sau und Wurf, siehe DLG, 2008, S. 13) und der dazu konsistenten Anzahl an Ferkeln (13 Ferkel pro Wurf, siehe GfE, 2006, S. 74). In diesem Fall erhält man $a_{cp} = 1,923 \text{ kg pro Ferkel}$.

Mit den Verdaulichkeiten nach Table 5.12 errechnet sich ein TAN-Gehalt der Ausscheidungen von über 75 % der Gesamt-N-Ausscheidung (siehe Kapitel 3.3.4.3.5).

5.3.7.2 Nitrogen inputs with straw / Stickstoff-Einträge mit Stroh

For straw based systems N inputs with straw are taken into account. For the properties of straw and the mineralization of organic N to TAN see Chapter 3.3.4.3.2.

For sows, KTBL provides amounts of straw (fresh matter) between $0.4 \text{ kg pl}^{-1} \text{ d}^{-1}$ and $0.7 \text{ kg pl}^{-1} \text{ d}^{-1}$ (e. g. KTBL, 2006a, pg. 469 and pg. 461). Bedding in sow housings with a special piglets' nest („Ferkelnest“) amounts to $0.5 \text{ kg pl}^{-1} \text{ d}^{-1}$ (KTBL, 2006a, pg. 499 and pg. 507). However, as no frequency distributions are available, there is no distinction between various sow housing types. Hence the inventory is based on a straw input (fresh matter) of $0.5 \text{ kg pl}^{-1} \text{ d}^{-1}$ equivalent to $2.5 \cdot 10^{-3} \text{ kg N (pl} \cdot \text{a)}^{-1}$ or $1.25 \cdot 10^{-3} \text{ kg TAN (pl} \cdot \text{a)}^{-1}$.

Für Systeme mit Einstreu wird der N-Eintrag mit dem Stroh berücksichtigt. Zu den Eigenschaften von Stroh und der Mineralisierung von organisch gebundenem N zu TAN wird auf Kapitel 3.3.4.3.2 verwiesen.

KTBL gibt für Sauen Strohmenngen (Frischmasse) zwischen $0,4 \text{ kg pl}^{-1} \text{ d}^{-1}$ und $0,7 \text{ kg pl}^{-1} \text{ d}^{-1}$ an (z. B. KTBL, 2006a, S. 469 und S. 461). In der Sauenhaltung mit Ferkelnestern wird nach KTBL (2006a), S. 499 und S. 507, von $0,5 \text{ kg pl}^{-1} \text{ d}^{-1}$ ausgegangen. Da im Inventar verschiedene Haltungsformen mangels Häufigkeitsverteilungen nicht unterschieden werden können, wird generell mit einer Strohmenge (Frischmasse) von $0,5 \text{ kg pl}^{-1} \text{ d}^{-1}$ bzw. $2,5 \cdot 10^{-3} \text{ kg N (pl} \cdot \text{a)}^{-1}$ oder $1,25 \cdot 10^{-3} \text{ kg TAN (pl} \cdot \text{a)}^{-1}$ gerechnet.

5.3.7.3 Emissions from housing / Emissionen aus dem Stall

The NH₃ emission factors for housing can be found in Chapter 5.2.2.1.

The mitigation of NH₃ emissions by air scrubbers is taken into account, see Chapter 3.4.5.2.

Die NH₃-Emissionsfaktoren für Ställe finden sich im Kapitel 5.2.2.1.

Die Minderung von NH₃-Emissionen durch Abluftreinigungsanlagen wird berücksichtigt, s. Kapitel 3.4.5.2.

5.3.7.4 Emissions from storage and spreading / Emissionen aus Lager und Ausbringung

The emission factors for NH₃, N₂O, NO and N₂ are the same for all pig categories, see Chapters 5.2.2 and 3.3.4.3.5.

NO emissions from manure management are reported (as NO_x), but are neglected regarding the NEC emission threshold, see Chapter 3.3.4.2.

Die Emissionsfaktoren NH₃, N₂O, NO und N₂ sind für alle Schweinekategorien gleich, siehe Kapitel 5.2.2 und 3.3.4.3.5.

NO aus dem Wirtschaftsdünger-Management wird berichtet (als NO_x), bzgl. der NEC-Emissionsobergrenze aber nicht angerechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.

5.3.7.5 Indirect N₂O from manure management / Indirektes N₂O aus dem Wirtschaftsdünger-Management

Indirect N₂O emissions from manure management (housing, storage; without spreading) are calculated according to Chapter 3.3.4.3.6. See Chapter 3.3.4.3.6 also for the uncertainties of activity data and emission factor.

Indirekte N₂O-Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management (Stall, Lager; ohne Ausbringung) werden nach Kapitel 3.3.4.3.6 berechnet. Siehe dort auch wegen der Unsicherheiten von Aktivitätswert und Emissionsfaktor.

(Indirect N₂O emissions from agricultural soils after spreading of manures or digestated manures are reported in Sector 3.D. For the calculation of these emissions see Chapter 12.)

(Indirekte N₂O-Emissionen als Folge der Ausbringung von Wirtschaftsdüngern und Wirtschaftsdünger-Gärresten werden im Sektor 3.D berichtet. Zur Berechnung siehe Kapitel 12.)

5.3.7.6 *Uncertainties of emission factors and activity data / Unsicherheiten von Emissionsfaktoren und Aktivitätsdaten*

For the uncertainties of the emission factors see Chapter 4.2.2.4 and 11.2.2.

The uncertainty of N excretion is discussed in Chapter 14.4.1. For the uncertainty of the amount of N spreaded see Chapter 11.2.1.

(With pigs, uncertainties for grazing are not needed as the inventory does not consider the option of pigs being held in free range.)

Zu den Unsicherheiten der Emissionsfaktoren siehe Kapitel 4.2.2.4 und 11.2.2.

Die Unsicherheit der N-Ausscheidung wird in Kapitel 14.4.1 diskutiert. Zur Unsicherheit der zur Ausbringung kommenden N-Menge siehe Kapitel 11.2.1.

(Unsicherheiten für Weidegang bei Schweinen sind nicht erforderlich, da das Inventar keinen Freiland-aufenthalt für Schweine vorsieht.)

5.3.8 *Emissions of particulate matter / Partikelemissionen*

The method to calculate particle emissions is described in Chapter 3.3.4.5. The emission factors are listed in Table 5.13. For the uncertainty of the emission factors see Chapter 3.3.4.5.

The mitigation of PM emissions by air scrubbers is taken into account, see Chapter 3.4.5.2.

Zur Berechnungsmethode für Partikelemissionen wird auf Kapitel 3.3.4.5 verwiesen. Die Emissionsfaktoren sind in Table 5.13 angegeben. Zur Unsicherheit der Emissionsfaktoren siehe Kapitel 3.3.4.5.

Die Minderung von Partikelemissionen durch Abluft-reinigungsanlagen wird berücksichtigt, s. Kapitel 3.4.5.2.

Table 5.13: Sows, emission factors for particle emissions from housing

Housing type	Haltungssystem	Emission factor for TSP kg pl ⁻¹ a ⁻¹	Emission factor for PM ₁₀ kg pl ⁻¹ a ⁻¹	Emission factor for PM _{2.5} kg pl ⁻¹ a ⁻¹
all types	alle Systeme	0.62	0.17	0.01

Source: EMEP(2016)-3B-19, Table 3.5

5.3.9 *References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung*

Table 5.14: Sows, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)

			from	to
Emissions	Emissionen	CH ₄ enteric fermentation	EM1004.009	
		CH ₄ manure management	EM1005.009	
		NMVOC	EM1007.009	
		NH ₃	EM1009.025	EM1009.027
		N ₂ O	EM1009.099	
		NO	EM1009.129	
		TSP	EM1010.009	
		PM ₁₀	EM1010.039	
		PM _{2.5}	EM1010.069	
Activity data	Aktivitäten		AC1005.009	
Emission factors	Emissionsfaktoren	CH ₄ enteric fermentation	IEF1004.009	
		CH ₄ manure management	IEF1005.009	
		NMVOC	IEF1007.009	
		NH ₃	IEF1009.022	IEF1009.024
		N ₂ O	IEF1009.092	
		NO	IEF1009.120	
		TSP	IEF1010.008	
		PM ₁₀	IEF1010.036	
		PM _{2.5}	IEF1010.064	
Additional information	zusätzliche Informationen		AI1005PSH.001	AI1005PSH.032
Excretion rates	Ausscheidungen	N	EXCR.041	EXCR.045

5.4 Weaners / Aufzuchtferkel

Weaners are young pigs between weaning and the begin of fattening.

The emissions are calculated according to the methods compiled in Table 5.15.

For the definition of the methods see Chapter 3.2.3.

Aufzuchtferkel sind die jungen Schweine nach dem Absetzen von der Sau bis zum Beginn der Mast.

Die Berechnung der Emissionen erfolgt nach den in Table 5.15 zusammengestellten Methoden.

Zur Methodendefinition siehe Kapitel 3.2.3.

Table 5.15: Weaners, calculation methods applied

Species	Origin	Tier	Method applied
CH ₄	enteric fermentation	2	IPCC / national
CH ₄	manure management	2	IPCC / national
NM VOC	manure management	1	EMEP
NH ₃	manure management	3	EMEP / national
N ₂ O, NO, N ₂	manure management	2	IPCC / national
TSP, PM ₁₀ , PM _{2.5}	manure management	2	EMEP

5.4.1 Activity and performance data /Aktivitäts- und Leistungsdaten

5.4.1.1 Animal numbers / Tierzahlen

The piglet numbers n_M (siehe Table 5.1) provided by the statistical offices of the federal states (STATLA C III 1 – vj 4) include all animals with live weights up to 20 kg an^{-1} . In the inventory, this number cannot be used directly as the number of weaners, as it comprises the suckling-pigs (these are all piglets up to 8 kg, considered together with the sows, see Chapter 5.3.2) and does not cover those weaners heavier than 20 kg an^{-1} . (The end weight of a weaner is in the order of 30 kg, see Chapter 5.4.1.2 below). Weaners exceeding the weight of 20 kg an^{-1} are contained in the official numbers of “young pigs” (Jungschweine, see category N in Table 5.1). Based on these considerations the following approach for the calculation of the number of animals in the inventory category “weaners” is used (see HAENEL et al., 2011a):

Die Ferkelzahlen n_M der Statistischen Landesämtern (STATLA C III 1 – vj 4), siehe Kategorie M in Table 5.1, umfassen die Ferkel bis 20 kg Gewicht. Diese Zahl kann aus folgenden Gründen nicht unmittelbar als Zahl der Aufzuchtschweine im Inventar verwendet werden: Einerseits umfasst sie die bei der Emissionsberechnung der Sauen bereits berücksichtigte Saugferkel-Population (d. h. alle Ferkel bis zu einem Gewicht von 8 kg, siehe Kapitel 5.3.2). Andererseits enthält sie aber nicht diejenigen Aufzuchtferkel, die schwerer als 20 kg sind. (Das Endgewicht der Ferkelaufzucht-Phase liegt bei größenordnungsmäßig 30 kg, siehe Kapitel 5.4.1.2 unten). Die Aufzuchtschweine über 20 kg sind, sind in der offiziellen Jungschweinezahl (siehe Kategorie N in Table 5.1) enthalten. Für die Inventarkategorie „Aufzuchtschweine“ gilt daher (HAENEL et al., 2011a):

$$n_{\text{we}} = n_M - n_{\text{sp}} + n_{\text{piglets}} \quad (5.10)$$

n_{we}	mean annual population in the inventory category “weaners” (in pl)
n_M	number of piglets counted in German census category M, see Table 5.1 (in pl)
n_{sp}	mean annual population of suckling-pigs (in pl)
n_{piglets}	mean annual population of weaners contained in German census category N, see Table 5.1 (in pl)

The mean suckling pig population n_{sp} , the emissions of which are already included in the calculation of the sows' emissions, is calculated according to HAENEL et al. (2011b):

Die mittlere Saugferkel-Population n_{sp} , deren Emissionen bereits in der Berechnung der Emissionen der Sauen enthalten sind, wird nach HAENEL et al. (2011b) berechnet:

$$n_{\text{sp}} = c_{\text{sp}} \cdot n_M \quad (5.11)$$

n_{sp}	mean annual population of suckling-pigs (in pl)
c_{sp}	constant ($c_{\text{sp}} = 0.5771 \text{ piglet piglet}^{-1}$), see HAENEL et al., (2011b)
n_M	number of piglets counted in German census category M, see Table 5.1 (in pl)

The number of weaners included in the official statistics of the young pigs is calculated as follows:

Die Zahl der Aufzuchtschweine, die in der Officialstatistik bei den Jungen Schweinen mitgezählt wurden, wird wie folgt berechnet:

$$n_{\text{piglets}+} = x_{\text{pN}} \cdot n_{\text{N}} \quad (5.12)$$

$n_{\text{piglets}+}$	mean annual population of weaners contained in German census category N, see Table 5.1 (in pl)
x_{pN}	fraction of young pigs to be regrouped into the category of weaners (in pl pl ⁻¹), see below
n_{N}	number of young pigs counted in German census category N, see Table 5.1 (in pl)

The fraction of young pigs (Jungschweine), x_{pN} , in the inventory attributed to the category of weaners, is estimated from weight data as follows:

Der relative Anteil x_{pN} der Jungschweine, die im Inventar der Kategorie der Aufzuchtferkel zugeordnet werden, wird mithilfe von Gewichtsdaten geschätzt:

$$x_{\text{pN}} = \frac{w_{\text{we, fin}} - w_{\text{yp, start}}}{w_{\text{yp, fin}} - w_{\text{yp, start}}} \quad (5.13)$$

x_{pN}	fraction of young pigs to be regrouped into the category of weaner (in pl pl ⁻¹)
$w_{\text{we, fin}}$	weaner weight at the end of the production period (in pl), see Chapter 5.4.1.2
$w_{\text{yp, start}}$	lower weight boundary of the official category of young pigs ($w_{\text{yp, start}} = 20 \text{ kg an}^{-1}$, see Table 5.1)
$w_{\text{yp, fin}}$	upper weight boundary of the official category of young pigs ($w_{\text{yp, start}} = 50 \text{ kg an}^{-1}$, see Table 5.1)

For the uncertainty of the animal numbers see Chapter 5.1.2.

Zur Unsicherheit der Tierzahlen siehe Kapitel 5.1.2.

5.4.1.2 *Animal weights and weight gains / Tiergewichte und Gewichtszunahmen*

The start weight of weaners is the weight of a suckling-pig at the end of the lactation period (8 kg an⁻¹, see Chapter 5.3.1.2. The final weaner weight is identical to the initial fattening pig weight (24 – 35 kg an⁻¹, see Table 5.22 in Chapter 5.5.1.2).

Das Aufzuchtferkel-Anfangsgewicht entspricht dem Saugferkelgewicht zum Zeitpunkt des Absetzens (8 kg an⁻¹, siehe Kapitel 5.3.1.2). Die Endgewichtdaten in der Ferkelaufzucht entsprechen den Anfangsgewichten der Mastschweine (24 – 35 kg an⁻¹, siehe Table 5.22 in Kapitel 5.5.1.2).

No data is available on the spatial and temporal distribution of the mean daily weight gain. Thus, the daily weight gain has to be estimated. For this purpose, it is assumed that the weight gain rates of weaners and fattening pigs have developed similarly in given areas and years.

Da regional und zeitlich differenzierte Daten des mittleren täglichen Zuwachses nicht verfügbar sind, muss dieser geschätzt werden. Dazu wird angenommen, dass sich die Gewichtszuwächse von Aufzuchtferkeln und Mastschweinen regional und zeitlich ähnlich entwickelt haben:


$$\frac{\Delta w_{\text{we}}}{\Delta t} = c_{\text{we}} \cdot \frac{\Delta w_{\text{fp}}}{\Delta t} \quad (5.14)$$

$\Delta w_{\text{we}}/\Delta t$	mean daily weight gain of weaners (in g an ⁻¹ d ⁻¹)
c_{we}	constant, see below
$\Delta w_{\text{fp}}/\Delta t$	mean daily weight gain of fattening pigs (in g an ⁻¹ d ⁻¹), see Chapter 5.5.1.2

It may be seen as a certain drawback that this approach doesn't take into account that the daily weight gain rate is a function of time and therefore of animal weight as is shown exemplarily in Figure 5.1.

Ein scheinbarer Nachteil dieses Ansatzes ist, dass er nicht berücksichtigt, dass die Gewichtszunahme eine Funktion der Lebenszeit und damit des Tiergewichtes ist, siehe Beispiel in Figure 5.1.

Figure 5.1: Weaners, weight gain as a function of live weight. Variable data: LfL (2004b); solid line: linear approximation.



However, example calculations showed that the total energy requirements of weaners during one round can well be calculated by using a constant mean daily weight gain (see linear approximation in Figure 5.1). Hence, it seems appropriate to use a constant mean daily weight gain also in Equation (5.14).

A constant of proportionality $c_{we} = 0.6216$ was obtained from

Beispielrechnungen haben aber gezeigt, dass der Gesamtenergiebedarf mit hinreichender Genauigkeit auch durch Annahme einer konstanten mittleren Gewichtszunahme (siehe lineare Approximation in Figure 5.1) berechnet werden kann. Diesen Ansatz verfolgt das Inventar (siehe Gleichung (5.14)).

Die Proportionalitätskonstante $c_{we} = 0,6216$ wurde mit folgender Gleichung berechnet:

$$c_{we} = \frac{1}{\Delta t_{we, KTBL}} \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left[(w_{we, fin, i} - w_{we, start, i}) \cdot \left(\frac{\Delta w_{fp}}{\Delta t} \right)^{-1} \right] \quad (5.15)$$

c_{we}	constant
n	total number of original data sets available from the federal-state data base for the years 1990 to 2008
i	running index
$w_{we, fin, i}$	weaner weight at the end of the production period (in kg animal ⁻¹), see above
$w_{we, start, i}$	weaner weight at the beginning of the production period, i. e. piglet weight at weaning (in kg animal ⁻¹), see above
$\Delta t_{we, KTBL}$	typical duration of weaner production period (national mean, excluding service times) as provided by KTBL (2004), pg. 466 ($\Delta t_{we, KTBL} = 48$ d)
$\Delta w_{fp}/\Delta t$	mean daily weight gain of fattening pigs (in g animal ⁻¹ d ⁻¹), see above

Using $c_{we} = 0.6216$, the daily weaner weight gain rates vary between 377 g an⁻¹ d⁻¹ and 466 g an⁻¹ d⁻¹, depending on federal state and year. The national mean for 1990 to 2006 is 420 g an⁻¹ d⁻¹, which is identical with the typical value given by KTBL (2004), pg. 465.

The calculated duration of weaner production, τ_{we} , is between 40 and 59 d (for the original data without data gap closure), a range similar to that reported by KTBL (2004), pg. 466, of 45 to 60 d.

Mit $c_{we} = 0,6216$ ergeben sich abhängig von Bundesland und Jahr tägliche Gewichtszunahmen zwischen 377 g an⁻¹ d⁻¹ und 466 g an⁻¹ d⁻¹. Als deutscher Mittelwert für 1990 bis 2006 ergibt sich 420 g an⁻¹ d⁻¹. Dieser Wert wird in KTBL (2004), S. 465, als typischer Wert angesehen.

Die berechnete Dauer der Aufzuchtferkelproduktion τ_{we} beträgt 40 bis 59 d (Originaldaten ohne Schließung der Datenlücken). Dies entspricht recht gut dem in KTBL (2004), S. 466, angegebenen Bereich von 45 bis 60 d.

5.4.1.3 Duration of weaner lifespan / Dauer der Aufzuchtferkel-Lebensphase

The duration of weaner production (τ_{we}) is obtained as ratio of total weight gain to average daily weight gain:

Die Aufzuchtdauer τ_{we} ergibt sich als Verhältnis von Gesamtzuwachs zu mittlerem täglichen Zuwachs:

$$\tau_{we} = \frac{w_{we, fin} - w_{we, start}}{\beta \cdot \frac{\Delta w_{we}}{\Delta t}} \quad (5.16)$$

τ_{we}	duration of lifespan as weaner (in d)
$w_{we, fin}$	weaner weight at the end of the production period (in g animal ⁻¹ d ⁻¹), see Chapter 5.4.1.2
$w_{we, start}$	weaner weight at the beginning of the production period, i. e. piglet weight at weaning (in g animal ⁻¹ d ⁻¹), see Chapter 5.4.1.2
β	mass units conversion factor ($\beta = 10^{-3}$ kg g ⁻¹)
$\Delta w_{we}/\Delta t$	mean daily weight gain of weaners (in g animal ⁻¹ d ⁻¹), see Chapter 5.4.1.2

5.4.2 Energy requirements / Energiebedarf

For weaners, the metabolic energy (ME) requirements comprise the requirements for both maintenance and growth. The calculation in the inventory is based on the recommendations in GfE (2006). These recommendations can be combined to a general formula describing the total ME requirements for the growth between two animal weights $w_{we, 0}$ und $w_{we, 1}$ (HAENEL, 2011a):

Bei Aufzuchtferkeln umfasst der Bedarf an umsetzbarer Energie (ME) den Bedarf für Erhaltung und Zuwachs. Der Berechnung im Inventar liegen die Empfehlungen von GfE (2006) zugrunde. Diese können zu einer allgemeinen Formel kombiniert werden, die den ME-Gesamtbedarf für das Wachstum zwischen zwei Tiergewichten $w_{we, 0}$ und $w_{we, 1}$ beschreibt (HAENEL, 2011a):

$$\Sigma ME_{we}(w_{we, 0}, w_{we, 1}) = \eta_{ME, m, we} \cdot \frac{w_{unit}^2}{1.75 \cdot (\Delta w / \Delta t)_{we}^*} \cdot \left[\left(\frac{w_{we, 1}}{w_{unit}} \right)^{1.75} - \left(\frac{w_{we, 0}}{w_{unit}} \right)^{1.75} \right] + \eta_{ME, g, we}^* \cdot (w_{we, 1} - w_{we, 0}) \quad (5.17)$$

$\Sigma ME(w_0, w_1)$	ME required for the fattening phase between the weights w_0 and w_1 (in MJ an ⁻¹)
$\eta_{ME, m, we}$	specific metabolisable energy required for maintenance ($\eta_{ME, m, we} = 1.25 \cdot 0.44$ MJ kg ⁻¹ d ⁻¹ , see GfE, 2006, pg. 23)
w_{unit}	unit weight ($w_{unit} = 1$ kg an ⁻¹)
$w_{we, 0}, w_{we, 1}$	animal weights limiting a special fattening phase, with $w_{we, 0} < w_{we, 1}$ (in kg an ⁻¹)
$(\Delta w / \Delta t)_{we}^*$	mean daily weight gain during the entire fattening period (in kg an ⁻¹ d ⁻¹)

and

$$\eta_{ME, g, we}^* = \frac{\alpha_{p, we}}{k_{p, we}} \cdot P_{we} + \frac{\alpha_{f, we}}{k_{f, we}} \cdot \left(a_{F, we} + b_{F, we} \cdot \frac{w_{we, 0} + w_{we, 1}}{2} \right) \quad (5.18)$$

$\eta_{ME, g, we}^*$	effective specific metabolizable energy required for growth, to be used for the entire fattening period (in MJ kg ⁻¹ ME)
$\alpha_{p, we}$	ME content of protein ($\alpha_{p, we} = 23.8$ MJ kg ⁻¹ , see GfE, 2006, pg. 32)
$\alpha_{f, we}$	ME content of fat ($\alpha_{f, we} = 39.7$ MJ kg ⁻¹ , see GfE, 2006, pg. 33)
$k_{p, we}$	partial efficiency ($k_{p, we} = 0.7$ MJ MJ ⁻¹ , see GfE, 2006, pg. 33)
$k_{f, we}$	partial efficiency ($k_{f, we} = 0.7$ MJ MJ ⁻¹ , see GfE, 2006, pg. 33)
P_{we}	constant ratio of protein gain to weight gain ($P_{we} = 0.17$ kg kg ⁻¹ , see GfE, 2006, pg. 29)
$a_{F, we}$	constant ($a_{F, we} = 0.08$ kg kg ⁻¹)
$b_{F, we}$	constant ($b_{F, we} = 0.003$ kg ⁻¹ an)
$w_{we, 0}, w_{we, 1}$	animal weights limiting a special fattening phase, with $w_{we, 0} < w_{we, 1}$ (in kg an ⁻¹)

The procedure given above for the calculation of the cumulative ME requirements is based on the assumption that, other than displayed in Figure 5.1, the daily weight gain rate can be taken as a constant mean value. Exemplary calculations have shown that the effect of this simplification is negligible.

Die oben angegebene Prozedur zur Berechnung des kumulativen ME-Bedarfs beruht im Gegensatz zu Figure 5.1 auf der Annahme einer mittleren, d. h. vom Lebendgewicht unabhängigen täglichen Gewichtszunahme. Beispielrechnungen haben gezeigt, dass die Auswirkung dieser Vereinfachung vernachlässigbar ist.

5.4.3 Feed and energy intake / Futter- und Energieaufnahme

The inventory accounts for two feeding phases. The change from phase 1 to phase 2 is at an approximate weight of 12 kg an⁻¹.

Typical properties of the phase feeding are listed in Table 5.16. The feed composition in the new federal states (former GDR) in the years after the German unification did not differ in principle from that listed in Table 5.16 (expert judgement SCHNABEL, RÖNSCH, BODENSTEIN).

Das Inventar berücksichtigt zwei Fütterungsphasen. Die Grenze zwischen den beiden Phasen wird durch ein Tiergewicht von 12 kg an⁻¹ definiert.

Typische Eigenschaften der Phasenfütterung gehen aus Table 5.16 hervor. In den neuen Bundesländern unterschied sich auch unmittelbar nach der Wende das Futter nicht von dem in Table 5.16 angegebenen (Expertenschätzung SCHNABEL, RÖNSCH, BODENSTEIN).

N reduced feeding of weaners is of minor relevance (expert judgement KÜSTER, LWK Niedersachsen) and no reliable data are available. Hence, the inventory does not consider N reduced feeding of weaners.

Eine mögliche N-reduzierte Fütterung von Aufzuchtferkeln wird wegen geringer Bedeutung (Expertenurteil KÜSTER, LWK Niedersachsen) und entsprechend unsicherer Datenlage im Inventar nicht berücksichtigt.

Table 5.16: Weaners, diets used in the inventory, and their properties

(X_{DE} : digestibility of energy; X_{ME} : metabolisability; η_{ME} : content of metabolisable energy, related to dry matter; X_{DOM} : digestibility of organic matter; x_N : N content of feed, related to dry matter; $x_{N, red}$: N content of N reduced feed, related to dry matter; x_{ash} : ash content of feed, related to dry matter)

Feed type	Phase	Major components	X_{DE}^a in MJ MJ ⁻¹	X_{ME}^a in MJ MJ ⁻¹	η_{ME}^a MJ kg ⁻¹	x_N^a in kg kg ⁻¹	X_{DOM}^a in kg kg ⁻¹	x_{ash}^a in kg kg ⁻¹
weaners A	1	wheat, barley, soybeans and soybean meal, maize	0.8626	0.8524	14.0	0.0290	0.89	0.058
weaners B	2	wheat, barley, soybeans (full fat), maize, soybean oil	0.8498	0.8064	13.8	0.0266	0.88	0.057

^a Source: Feed composition according to deuka Deutsche Tiernahrung GmbH & Co. KG, private communication; energy and protein/nitrogen contents according to BEYER et al. (undated) and LFL (2004b).

The daily intakes of feed, nitrogen, and gross energy (GE_{we}) are averaged over both feeding phases by analogy to the method described in Chapter 5.3.3. Digestibility X_{DE} and metabolizability X_{ME} are obtained by analogy.

The calculation of dry matter intake is based on the cumulative ME intake in the two different feeding phases (for ME intake see Chapter 5.4.2) and the phase-specific ME contents of the dry mass in the diets (see Table 5.16).

Die über beide Phasen gemittelte tägliche Aufnahme an Futter, Stickstoff und Gesamtenergie GE_{we} wird analog zu Kapitel 5.3.3 berechnet. Entsprechendes gilt für die Verdaulichkeit X_{DE} und die Umsetzbarkeit X_{ME} .

Die Trockenmasseaufnahme wird über die kumulative ME-Aufnahme in den beiden Fütterungsphasen (zur ME-Aufnahme siehe Kapitel 5.4.2) und die phasenspezifischen ME-Gehalte in der Futtertrockenmasse (siehe Table 5.16) berechnet.

5.4.4 Methane from enteric fermentation / Methan aus der Verdauung

The calculation of CH_4 emissions from enteric fermentation is based on the Tier 2 method described in Chapter 3.3.2, using gross energy intake (see Chapter 5.4.3) and the methane conversion factor $x_{CH_4, GE}$.

The source of the national methane conversion factor of 0.0044 MJ MJ⁻¹ is DÄMMGEN et al. (2012c). (IPCC(2006) does not provide a methane conversion factor for pigs.)

No national data is available on the uncertainty of the emission factor for CH_4 from enteric fermentation do not exist. IPCC(2006)-10.33 estimates the uncertainty of Tier 2 approaches to be 20 %. This value is, according to the definition of uncertainty used in Chapter 3 in IPCC (2006a), interpreted as half the 95 % confidence interval. A normal distribution is assumed.

Die CH_4 -Emission aus der Verdauung wird mit dem in Kapitel 3.3.2 beschriebenen Tier-2-Verfahren aus der Gesamtenergie-Aufnahme (siehe Kapitel 5.4.3) mithilfe des Methanumwandlungsfaktors $x_{CH_4, GE}$ berechnet.

Der nationale Methanumwandlungsfaktor von 0,0044 MJ MJ⁻¹ ist DÄMMGEN et al. (2012c) entnommen. (Ein entsprechender Faktor wird in IPCC(2006) nicht bereitgestellt.)

Zur Unsicherheit des Emissionsfaktors für CH_4 aus der Verdauung sind keine nationalen Daten verfügbar. IPCC(2006)-10.33 schätzt die Unsicherheit bei Anwendung von Tier-2-Verfahren auf 20 %. Dieser Wert wird im Sinne von IPCC (2006a), Kapitel 3, als halbes 95 %-Konfidenzintervall interpretiert. Es wird Normalverteilung angenommen.

5.4.5 Methane from manure management / Methan aus dem Wirtschaftdüngermanagement

A Tier 2 approach is used to calculate CH_4 emissions from manure management (cf. Chapter 3.3.4.1).

Volatile solids (VS) excretion rates are calculated using the modified IPCC approach described in DÄMMGEN et al. (2011a), see Chapter 3.3.3.1.

The necessary information on the digestibility of organic matter and the ash contents of the diet are obtained as weighted means from the properties of feed constituents as listed in Table 5.16. The national mean digestibility of organic matter for 2010 is 0.88 kg kg⁻¹, the national mean ash content (related to dry matter) for 2010 amounts to 0.057 kg kg⁻¹.

CH_4 aus dem Wirtschaftsdünger-Management wird mit einem Tier-2-Verfahren berechnet (Kapitel 3.3.4.1).

Die VS-Ausscheidungen („volatile solids“) werden nach dem gegenüber IPCC modifizierten Verfahren von DÄMMGEN et al. (2011a) berechnet, siehe Kapitel 3.3.3.1.

Die erforderlichen Daten zur Verdaulichkeit organischer Substanz und zum Aschegehalt im Futter ergeben sich als gewichtetes Mittel der Daten in Table 5.16. Die mittlere Verdaulichkeit organischer Substanz liegt im Deutschlandmittel für 2010 bei 0,88 kg kg⁻¹, das nationale Mittel des Aschegehaltes liegt im Jahr 2010 bei 0,057 kg kg⁻¹ (bezogen auf die Futtertrockenmasse).

Maximum methane producing capacity B_0 and conversion factors (MCF) for the respective manure storage system are provided in Table 5.2 (see Chapter 5.2.1).

The frequency distribution of storage types is supplied by RAUMIS or derived from official census data (see Chapter 3.4.3).

German data on the uncertainty of CH_4 emissions from manure management do not exist. IPCC(2006)-10.48 estimates the uncertainty of Tier 2 approaches to be 20 %. This value is, according to the definition of uncertainty used in Chapter 3 in IPCC (2006a), interpreted as half the 95 % confidence interval. A normal distribution is assumed.

Zu maximaler Methan-Freisetzungskapazität B_0 und Methanumwandlungsfaktoren (MCF) für die einzelnen Lagerungssysteme siehe Table 5.2 in Kapitel 5.2.1.

Die Häufigkeitsverteilung der Lagerverfahren wird durch RAUMIS bereitgestellt bzw. aus offiziellen Erhebungen abgeleitet, siehe Kapitel 3.4.3.

Deutsche Zahlen zur Unsicherheit der CH_4 -Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management liegen nicht vor. IPCC(2006)-10.48 schätzt die Unsicherheit bei Anwendung von Tier-2-Verfahren auf 20 %. Dieser Wert wird im Sinne von IPCC (2006a), Kapitel 3, als halbes 95 %-Konfidenzintervall interpretiert. Es wird Normalverteilung angenommen.

5.4.6 NMVOC emissions / NMVOC-Emissionen

The calculation of the NMVOC emissions of all animals except cattle are calculated with a Tier 1 methodology, see Chapters 3.3.4.2.1 and 3.3.4.2.3.

Agricultural NMVOC emissions are reported, but are neglected regarding the NEC emission threshold, see Chapter 3.3.4.2.

Die NMVOC-Emissionen von allen Tieren außer den Rindern werden mit einer Tier-1-Methode berechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.1 und 3.3.4.2.3.

Landwirtschaftliche NMVOC-Emissionen werden zwar berichtet, aber bzgl. der NEC-Emissionsobergrenze nicht angerechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.

5.4.7 Emissions of nitrogen species / Emissionen von Stickstoff-Spezies

The emission calculations require the knowledge of N excretions (amounts and locations), of the N inputs with straw, the conversion of N_{org} and TAN as well as the frequency distributions of housing and storage types, spreading techniques and times before incorporation.

Die Berechnung der Emissionen beruht auf der Kenntnis der N-Ausscheidungen (Mengen und Orte), der N-Einträge mit Stroh, der Umwandlungen von N_{org} und TAN, der Häufigkeit von Stalltypen, Lagertypen, Ausbringungstechniken und Einarbeitungszeiten.

5.4.7.1 N excretion / N-Ausscheidung

The amount of N taken in with feed is calculated using typical diet composition and amounts of feed. The N intake is a function of performance (growth). The amount of N retained is subtracted (N content of weaners' bodies: $0.0256 \text{ kg kg}^{-1}$; LFL, 2004a).

Die N-Aufnahme mit dem Futter wird für typische Futterzusammensetzungen und -mengen in Abhängigkeit von der Leistung (Zuwachs) berechnet. Hiervon wird die im Körper verbleibende N-Menge abgezogen (N-Gehalt des Gesamtkörpers $0,0256 \text{ kg kg}^{-1}$; LFL, 2004a).

$$m_{\text{excr}} = \frac{\alpha}{\tau_{\text{we}}} \cdot (m_{\text{F, FD}} \cdot x_{\text{N}} - \Delta w_{\text{we}} \cdot x_{\text{N, pig}}) \quad (5.19)$$

m_{excr}	amount of nitrogen excreted (in $\text{kg pl}^{-1} \text{ a}^{-1}$)
α	time units conversion factor ($\alpha = 365 \text{ d a}^{-1}$)
τ_{we}	duration of lifespan as weaner (in d), see Chapter 5.4.1.2
$m_{\text{F, DM}}$	daily feed intake of a weaner, dry matter (in $\text{kg pl}^{-1} \text{ d}^{-1}$), see Chapter 5.4.3
x_{N}	nitrogen content of feed, related to dry matter (in kg kg^{-1}), see Chapter 5.4.3
Δw_{we}	weight gain (in kg a^{-1}), see Chapter 5.4.1.2
$x_{\text{N, pig}}$	nitrogen content of a pig's body ($x_{\text{N, pig}} = 0.0256 \text{ kg kg}^{-1}$) (LFL, 2004a)

The content of ammoniacal N (TAN) is calculated (see Chapter 3.3.4.3.5). It amounts to about the value given by DÖHLER et al. (2002), which is 66 % of the N excreted.

Der TAN-Gehalt wird berechnet (siehe Kapitel 3.3.4.3.5). Er liegt im Bereich des von DÖHLER et al. (2002) angegebenen Wertes von 66 % der ausgeschiedenen N-Menge.

5.4.7.2 N inputs with straw / N-Einträge mit Stroh

For straw based systems N inputs with straw are taken into account. The amounts of N are given in Table

Für Systeme mit Einstreu wird der N-Eintrag mit dem Stroh berücksichtigt, siehe Table 5.17. Zu Eigenschaften

5.17. For the properties of straw and the mineralization of organic N to TAN see Chapter 3.3.4.3.2.

All straw N is considered to be organic N, of which 50 % may mineralize to TAN during storage.

von Stroh und der Mineralisierung von organisch gebundenem N zu TAN wird auf Kapitel 3.3.4.3.2 verwiesen.

Das gesamte Stroh-N wird als organisch gebundenes N angesehen, von dem 50 % während des Lagers zu TAN mineralisieren.

Table 5.17: Weaners, N inputs with straw in solid-manure systems

Housing type	Haltungssystem	straw input ^a kg pl ⁻¹ d ⁻¹	dry matter (DM) kg pl ⁻¹ d ⁻¹	N input (in DM) kg pl ⁻¹ d ⁻¹	TAN kg pl ⁻¹ d ⁻¹
plane floor with bedding	planbefestigter Boden mit Einstreu	0.15 ^{a, b}	0.13	0.75·10 ⁻³	0.37·10 ⁻³
deep bedding	Tiefstreu	0.20 ^c	0.17	1.00·10 ⁻³	0.50·10 ⁻³

^a KTBL (2006a), pg. 577; ^b Source: KTBL (2006a), pg. 581; ^c KTBL (2006a), pg. 585

5.4.7.3 *Frequency distribution of housing systems / Häufigkeitsverteilung der Stalltypen*

The frequency distribution of housing, storage and application methods are assumed to be the same as for fattening pigs (see Chapter 5.5.7.3).

Für die Häufigkeiten von Haltungsverfahren, Lagerungsverfahren und Ausbringungsverfahren werden die Mastschweine-Daten verwendet (siehe Kapitel 5.5.7.3).

5.4.7.4 *Emissions from housing / Emissionen aus dem Stall*

The NH₃ emission factors for housing can be found in Chapter 5.2.2.1.

The mitigation of NH₃ emissions by air scrubbers is taken into account, see Chapter 3.4.5.2.

Die NH₃-Emissionsfaktoren für Ställe finden sich im Kapitel 5.2.2.1.

Die Minderung von NH₃-Emissionen durch Abluftreinigungsanlagen wird berücksichtigt, s. Kapitel 3.4.5.2.

5.4.7.5 *Emissions from storage and spreading / Emissionen aus Lager und Ausbringung*

The emission factors for NH₃, N₂O, NO and N₂ are the same for all pig categories, see Chapters 5.2.2 and 3.3.4.3.5.

NO emissions from manure management are reported (as NO_x), but are neglected regarding the NEC emission threshold, see Chapter 3.3.4.2.

Die Emissionsfaktoren für NH₃, N₂O, NO und N₂ sind für alle Schweinekategorien gleich, siehe Kapitel 5.2.2 und 3.3.4.3.5.

NO aus dem Wirtschaftsdünger-Management wird berichtet (als NO_x), bzgl. der NEC-Emissionsobergrenze aber nicht angerechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.

5.4.7.6 *Indirect N₂O from manure management / Indirektes N₂O aus dem Wirtschaftsdünger-Management*

Indirect N₂O emissions from manure management (housing, storage; without spreading) are calculated according to Chapter 3.3.4.3.6. See Chapter 3.3.4.3.6 also for the uncertainties of activity data and emission factor.

(Indirect N₂O emissions from agricultural soils after spreading of manures or digested manures are reported in Sector 3.D. For the calculation of these emissions see Chapter 12.)

Indirekte N₂O-Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management (Stall, Lager; ohne Ausbringung) werden nach Kapitel 3.3.4.3.6 berechnet. Siehe dort auch wegen der Unsicherheiten von Aktivitätswert und Emissionsfaktor.

(Indirekte N₂O-Emissionen als Folge der Ausbringung von Wirtschaftsdüngern und Wirtschaftsdünger-Gärresten werden im Sektor 3.D berichtet. Zur Berechnung siehe Kapitel 12.)

5.4.7.7 *Uncertainties of emission factors and activity data / Unsicherheiten von Emissionsfaktoren und Aktivitätsdaten*

For the uncertainties of the emission factors see Chapter 4.2.2.4 and 11.2.2.

The uncertainty of N excretion is discussed in Chapter 14.4.1. For the uncertainty of the amount of N spreaded see Chapter 11.2.1.

(With pigs, uncertainties for grazing are not needed as the inventory does not consider the option of pigs being held in free range.)

Zu den Unsicherheiten der Emissionsfaktoren siehe Kapitel 4.2.2.4 und 11.2.2.

Die Unsicherheit der N-Ausscheidung wird in Kapitel 14.4.1 diskutiert. Zur Unsicherheit der zur Ausbringung kommenden N-Menge siehe Kapitel 11.2.1.

(Unsicherheiten für Weidegang bei Schweinen sind nicht erforderlich, da das Inventar keinen Freilandaufenthalt für Schweine vorsieht.)

5.4.8 Emissions of particulate matter / Partikelemissionen

The method to calculate particle emissions is described in Chapter 3.3.4.5. The emission factors are listed in Table 5.18. For the uncertainty of the emission factors see Chapter 3.3.4.5.

The mitigation of PM emissions by air scrubbers is taken into account, see Chapter 3.4.5.2.

Zur Berechnungsmethode für Partikelemissionen wird auf Kapitel 3.3.4.5 verwiesen. Die Emissionsfaktoren sind in Table 5.18 angegeben. Zur Unsicherheit der Emissionsfaktoren siehe Kapitel 3.3.4.5.

Die Minderung von Partikelemissionen durch Abluftreinigungsanlagen wird berücksichtigt, s. Kapitel 3.4.5.2.

Table 5.18: Weaners, emission factors for particle emissions from housing

Housing type	Haltungssystem	Emission factor for TSP kg pl ⁻¹ a ⁻¹	Emission factor for PM ₁₀ kg pl ⁻¹ a ⁻¹	Emission factor for PM _{2.5} kg pl ⁻¹ a ⁻¹
all types	alle Systeme	0.27	0.05	0.002

Source: EMEP(2016)-3B-19, Table 3.5

5.4.9 References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung

Table 5.19: Weaners, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)

			from	to
Emissions	Emissionen	CH ₄ enteric fermentation	EM1004.010	
		CH ₄ manure management	EM1005.010	
		NMVOC	EM1007.010	
		NH ₃	EM1009.028	EM1009.030
		N ₂ O	EM1009.100	
		NO	EM1009.130	
		TSP	EM1010.010	
		PM ₁₀	EM1010.040	
		PM _{2.5}	EM1010.070	
Activity data	Aktivitäten		AC1005.011	
Emission factors	Emissionsfaktoren	CH ₄ enteric fermentation	IEF1004.010	
		CH ₄ manure management	IEF1005.010	
		NMVOC	IEF1007.010	
		NH ₃	IEF1009.025	IEF1009.027
		N ₂ O	IEF1009.093	
		NO	IEF1009.121	
		TSP	IEF1010.009	
		PM ₁₀	IEF1010.037	
		PM _{2.5}	IEF1010.065	
Additional information	zusätzliche Informationen		AI1005PSH.033	AI1005PSH.063
Excretion rates	Ausscheidungen	N	EXCR.046	EXCR.050

5.5 Fattening pigs / Mastschweine

Fattening pigs are all pigs in the final fattening stages, i.e. with weights above about 28 kg an⁻¹ till slaughtering (ca. 105 bis 120 kg an⁻¹ live weight).

The emissions are calculated according to the methods compiled in Table 5.20.

For the definition of the methods see Chapter 3.2.3.

Als Mastschweine werden alle Schweine bezeichnet, die von Gewichten ab ca. 28 kg an⁻¹ bis zur Schlachtreife (etwa 105 bis 120 kg an⁻¹) gehalten werden.

Die Berechnung der Emissionen erfolgt nach den in Table 5.20 zusammengestellten Methoden.

Zur Methodendefinition siehe Kapitel 3.2.3.

Table 5.20: Fattening pigs, calculation methods applied

Species	Origin	Tier	Method applied
CH ₄	enteric fermentation	2	IPCC / national
CH ₄	manure management	2	IPCC / national
NMVOC	manure management	1	EMEP
NH ₃	manure management	3	EMEP / national
N ₂ O, NO, N ₂	manure management	2	IPCC / national
TSP, PM ₁₀ , PM _{2.5}	manure management	2	EMEP

5.5.1 Activity and performance data /Aktivitäts- und Leistungsdaten

5.5.1.1 Animal numbers / Tierzahlen

The animal numbers relevant for the inventory can be obtained from statistical data (STATLA C III 1 –vj 4) taking into account that the number $n_{\text{piglets}+}$ of weaners exceeding a weight of 20 kg has to be subtracted, because it is included in n_N (HAENEL et al, 2011b):

Die im Inventar zu verwendenden Tierzahlen können aus statistisch verfügbaren Daten (STATLA C III 1 – vj 4) berechnet werden, wobei mit $n_{\text{piglets}+}$ die in n_N enthaltene Anzahl von Aufzuchtschweinen schwerer als 20 kg zu subtrahieren ist (HAENEL et al., 2011b):

$$n_{\text{fp}} = n_N + n_O + n_P + n_Q - n_{\text{piglets}+} \quad (5.20)$$

n_{fp}	number of fattening pigs considered
n_N etc.	animal numbers of type N (etc.) in the German census (see Table 5.1)
$n_{\text{piglets}+}$	number of weaners contained in the official pig category “young pigs”, see Chapter 5.4.1.1

For the uncertainty of the animal numbers see Chapter 5.1.2.

Zur Unsicherheit der Tierzahlen siehe Kapitel 5.1.2.

5.5.1.2 Animal weights and weight gains / Tiergewichte und Gewichtszunahmen

Official German statistics do not report weights (initial and final live weight) and weight gains of fattening pigs.

Hence, the inventory uses data published by pig producers' associations and data available in agricultural reports of the various federal states (Table 5.21 to Table 5.23). These times series partially exhibit data gaps, especially in the new federal states. No data is available for the City States Hamburg, Bremen and Berlin.

As the table size does not allow to present the complete timeseries, every other year is omitted in the years before 2010.

Tiergewichte (Anfangs- und Endgewicht) und Gewichtszunahmen von Mastschweinen werden von der offiziellen deutschen Statistik nicht berichtet.

Daher werden die von den Schweineproduzenten veröffentlichten Daten sowie Daten aus Agrarberichten der verschiedenen Bundesländern verwendet (Table 5.21 bis Table 5.23). Die Zeitreihen sind z. T. lückenhaft (v. a. in den neuen Bundesländern). Für die Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Berlin gibt es keine Daten.

Aus Platzgründen wurde in den nachfolgenden Tabellen bis 2010 jedes zweite Jahr weggelassen.

Table 5.21: Fattening pigs, weight at beginning of the fattening period (in kg an⁻¹)

	1990	1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
BW	28	28	29	30	29.3	29.9	29.5	30	30.9	32.3	31.7	32.2	32.6	32.8	32.4	32.6	31.7	30.8	30.7
BY	27	28	29	29	29	29.4	29.8		30.4	30.8	30.7	30.8	30.6	30.5	30.2	30.3	30.1	30.2	*)
BB					27	27	27		28	28.2		29.4	29.1		28.8	*)	*)	*)	*)
HE	26	27	27	28	28	29	30		30	31	30	31	30	31	30.5	30.2	*)	*)	*)
MV					27	27	27		28.8	29.8		29.3	28.9		28.6	28.7	*)	*)	*)
NI	25.5	26	28	28.5	28.5	29	28.5	30	30	30.3	29.8	30.0	29.6	29.5	29.4	30.1	*)	*)	*)
NW	24	25	27	27	28	28	28	28	29.1	29.2	28.9	29.1	28.5	28.6	28.6	29.0	29.0	29.0	29.0
RP	25	26	28	28	28	30	33	32	33.5	32.9	33.9	32	27.6	29.5	34.6	35.2	*)	*)	*)
SL	25	26	28	28	28	30	33												
SN			27		28	27	27		28.8	28.5		30.1	27.9	27.4	29.4	28.4			
ST										27.5		29.2	28.5	28.5	28.8	28.4	28.5		
SH	25	26	27	28	28	28	28	29	29.8	30.7	30.6	30.9	30.1	30.2	30.1	30.6	30.7	30.5	30.5
TH				28	28	28	27		28.0	27.5	29.8	29.1	28	29.3	30.2	29.8	29.8	29.4	29.4

Sources: ASSE & ZACHARIAS (2011, 2012b, 2013b, 2015b, 2016b, 2017b); BD (2011); ERZEUGERRING.INFO (2015, 2016, 2017, 2018, 2019) (personal communication Schulz/ZDS); ERZEUGERRING WESTFALEN (2016, 2017, 2018, 2019); LKV-BY (2003, 2011, 2012, 2013, 2015b, 2016b, 2018b, 2019); LKV-SN (2012, 2013, 2014); LKV-ST (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016); LSZ-BW (2007, 2008a, 2009a, 2018, 2019); LWK-SH (2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018); QNETICS (2019); SCHOLZ & ZACHARIAS (2008); SMUL (2008, 2009) THLMNU (2002, 2009), TLL (2011); TVL (2014, 2015, 2016, 2017, 2018); ZDS, various years; *) confidential data provided by ERZEUGERRING.INFO

Table 5.22: Fattening pigs, final weight after fattening (live weight, in kg an⁻¹)

	1990	1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
BW	106	106	110	112	113	113	116	118	119	119	120	120.3	120.7	120.5	120.1	120.0	120.0	122.0	122.9
BY	105	106	109	111	114	114.4	116	117	118	117.6	118.5	120.5	120.8	121.2	121.0	121.9	122.4	122.3	*)
BB					113	113	114		115	115.6	116	117.1	117.7		118.6	*)	*)	*)	*)
HE	107	109	111	114	116	116	119		121	121	121	122	122	124	123.0	121.0	*)	*)	*)
MV					113	115	117		117	116.2	117.5	117.8	118.0		119.3	120.3	*)	*)	*)
NI	109.5	110.5	116	117	118	116	117.5	118.5	119.7	119	119.5	120.7	121.1	121.3	121.4	121.9	*)	*)	*)
NW	109	112	115	118	119	118	120	120	119.8	120	120.9	121.4	121.0	120.8	120.6	121.0	121.0	122.0	122.0
RP	106	107	109	111	114	114	117	118	119.1	116.4	116.9	119.0	112.0	119.5	120.1	120.8	*)	*)	*)
SL	106	107	109	111	114	114	117												
SN			109	111.3	114.4	114.6	115.0	115.7	116.4	116.8	118.3	118.8	118.6	118.0	118.3	120.1			
ST										117.5	117.9	117.7	118.7	120.3	120.1	120.9			
SH	106	110	114	117	117	116	117	118	119	118.3	120.2	119.9	120.0	120.0	120.8	121.0	121.0	121.0	122.0
TH				113	119	113	115		117	116.1	119.2	117.7	116.9	119.6	120.1	121.9	121.9	121.8	123.5

Sources: ASSE & ZACHARIAS (2011, 2012b, 2013b, 2015b, 2016b, 2017b); BD (2011); ERZEUGERRING.INFO (2015, 2016, 2017, 2018, 2019) (personal communication Schulz/ZDS); ERZEUGERRING WESTFALEN (2016, 2017, 2018, 2019); LKV-BY (2003, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015b, 2016b, 2018b, 2019); LKV-SN (2013, 2014); LKV-ST (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016); LSZ-BW (2007, 2008a, 2009a, 2018, 2019); LWK-SH (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018); MLUR-BB (2002); QNETICS (2019); SCHOLZ & ZACHARIAS (2008); SEGGER (2005b); SLL (2004); SMUL (2002, 2008, 2009, 2010, 2012); THMLNU (2002, 2009), TLL (2011); TMLFUN (2011); TVL (2014, 2015, 2016, 2017, 2018); ZDS, various years; *) confidential data provided by ERZEUGERRING.INFO

Table 5.23: Fattening pigs, weight gain during fattening (in g an⁻¹ d⁻¹)

	1990	1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
BW	627	623	638	641	660	671	684	688	688	701	708	723	728	739	745	733	749	743	760
BY	653	651	653	658	672	684	699	695	705	709	740	758	768	772	779	788	793	806	*)
BB				620	647	654	675		704	718	750	767	769		810	*)	*)	*)	*)
HE	651	641	665	661	665	683	695	702	715	719	743	744	761	752	772	769	*)	*)	*)
MV					656	676	689		749	752	796	799	806		843	856	*)	*)	*)
NI	647	648	651	671	685	704	702	700	724	730	747	776	788	801	810	822	*)	*)	*)
NW	638	641	658	671	704	722	716	721	728	732	752	764	772	779	789	801	808	817	828
RP	643	643	645	647	665	707	683	707	721	708	731	735	726	741	799	798	*)	*)	*)
SL	643	643	645	647	665	707	683												
SN			621	627	668	699	709	711	749	781	814	825	825	819	841	842			
ST					684	681	671	704	721	734	740	797	812	817	858	851	864		
SH	634	647	666	688	708	732	740	731	750	760	792	788	806	828	848	862	875	880	894
TH				653	657	671	691		737	773	807	818	835	828	832	845	830	856	871

Sources: ASSE & ZACHARIAS (2011, 2012b, 2013b, 2015b, 2016b, 2017b); BD (2011); ERZEUGERRING.INFO (2015, 2016, 2017, 2018, 2019) (personal communication Schulz/ZDS); ERZEUGERRING WESTFALEN (2016, 2017, 2018, 2019); HMULV (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011); LKV-BY (2003, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015b, 2016b, 2018b, 2019); LKV-SN (2013, 2014); LKV-ST (2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016); LSZ-BW (2007, 2008a, 2009a, 2018, 2019); LWK-SH (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018); MLUR-BB (2002); MLUV-BB (2007, 2008); QNETICS (2019); SCHOLZ & ZACHARIAS (2008); SEGGER (2005b); SLL (2004); SMUL (2002, 2008, 2009, 2010, 2012); THMLNU (2002, 2009); TLL (2011); TMLFUN (2011); TVL (2014, 2015, 2016, 2017, 2018); ZDS, various years
*) confidential data provided by ERZEUGERRING.INFO

Data gaps within a time series are closed by linear interpolation. In case of missing data at the end of a time series, the last known value of the time series is adopted as an estimate. Missing data for Sachsen-Anhalt is replaced by data of Thüringen, as fattening conditions are similar in both federal states. The same applies to Saarland where data from Rheinland-Pfalz are used for gap closing.

Data gaps for the new federal states (Neue Bundesländer) at the beginning of the time series are closed as follows: In the year 1990, initial and final animal weights exceeded those in the old federal states (Alte Bundesländer), but the weight gains were smaller. An expert judgement (SCHNABEL, RÖNSCH, BODENSTEIN) was necessary, as official data were misleading. For 1990, a uniform weight of 35 kg an⁻¹ was assumed for the beginning of fattening together with a final weight of 115 kg an⁻¹. The weight gain was set to 550 g an⁻¹ d⁻¹. From 1991 onwards until official data was available again, the data of Hessen were applied to describe the situation in the new federal states.

For the City States, data for Hamburg were taken from Schleswig-Holstein, for Bremen from Niedersachsen, and for Berlin from Brandenburg.

Datenlücken innerhalb einer Zeitreihe werden durch lineare Interpolation geschlossen. Fehlende Werte am Ende von Zeitreihen werden durch Beibehaltung des jeweils letzten bekannten Wertes geschätzt. Bei Sachsen-Anhalt fehlende Daten werden durch Übernahme der Daten von Thüringen generiert (vergleichbare Schweinemast). Für das Saarland werden die Daten von Rheinland-Pfalz übernommen.

Die Datenlücken zu Beginn der Zeitreihen in den neuen Bundesländern werden wie folgt geschlossen: Die Schweinemast in diesen Bundesländern änderte sich nach 1990 erheblich. Im Jahre 1990 waren die Tiergewichte am Anfang und am Ende der Mast in diesen Ländern deutlich höher als in den alten Bundesländern, die Gewichtszunahmen deutlich geringer. Daher wurden für 1990 einheitlich 35 kg an⁻¹ für den Anfang der Mast und 115 kg an⁻¹ für das Ende der Mast angenommen (typische Gewichtszunahme: 550 g an⁻¹ d⁻¹). Von 1991 an bis zur Verfügbarkeit eigener Werte werden die Daten für Hessen für alle neuen Bundesländer übernommen. (Expertenurteil SCHNABEL, RÖNSCH, BODENSTEIN).

Für die Stadtstaaten werden bei Hamburg die Daten von Schleswig-Holstein eingesetzt, bei Bremen die von Niedersachsen und bei Berlin die von Brandenburg.

5.5.1.3 Duration of fattening / Mastdauer

The duration of fattening (τ_{fp}) is a function of total weight gain and average daily weight gain rate:

$$\tau_{fp} = \frac{w_{fp, fin} - w_{fp, start}}{\beta \cdot \frac{\Delta w_{fp}}{\Delta t}} \quad (5.21)$$

τ_{fp}	duration of fattening (in d)
$w_{fp, fin}$	weight at the end of fattening (in g animal ⁻¹ d ⁻¹), see Chapter 5.5.1.2
$w_{fp, start}$	weight at the beginning of fattening (in g animal ⁻¹ d ⁻¹), see Chapter 5.5.1.2
β	mass units conversion factor ($\beta = 10^{-3}$ kg g ⁻¹)
$\Delta w_{fp}/\Delta t$	mean daily weight gain of weaners (in g animal ⁻¹ d ⁻¹), see Chapter 5.5.1.2

Die Mastdauer τ_{fp} ist eine Funktion von Gesamtzuwachs und mittlerem täglichen Gewichtszuwachs:

5.5.2 Energy requirements / Energiebedarf

The energy requirements of fattening pigs are calculated according to the recommendations in GfE (2006), cf. HAENEL et al. (2011a). These recommendations refer to animal weights from 30 kg an⁻¹ to 100 kg an⁻¹, but are used in the inventory for all fattening pigs (from below 30 kg an⁻¹ to over 100 kg an⁻¹), because no other data are available.

Metabolic energy (ME) requirements comprise the requirements for both maintenance and growth:

Der Energiebedarf von Mastschweinen wird nach den Empfehlungen in GfE (2006) berechnet, vgl. HAENEL et al. (2011a). Die Angaben in GfE (2006) gelten für Tiergewichte von 30 kg an⁻¹ bis 100 kg an⁻¹, werden im Inventar aber für alle Mastschweine verwendet (von unter 30 kg an⁻¹ bis über 100 kg an⁻¹), weil keine anderen Daten verfügbar sind.

Der Bedarf an umsetzbarer Energie (ME) umfasst den Bedarf für Erhaltung und Zuwachs:

$$\Sigma ME = \sum_{j=1}^{k_{fin}} \tau_{day} \cdot ME_{m, j} + \sum_{j=1}^{k_{fin}} \tau_{day} \cdot ME_{g, j} \quad (5.22)$$

ΣME	total metabolizable energy for the duration of one fattening period (in MJ an ⁻¹)
τ_{day}	unit time period ($\tau_{\text{day}} = 1 \text{ d}$)
ME_j	total metabolizable energy requirements for day j (in MJ an ⁻¹ d ⁻¹)
j	index of day
k_{fin}	number of final day of the fattening period
$\Sigma \tau_{\text{day}} \cdot ME_{m,j}$	total of $ME_{m,j}$ for one fattening period (in MJ an ⁻¹)
$ME_{m,j}$	metabolizable energy required for maintenance for day j (in MJ an ⁻¹ d ⁻¹)
$\Sigma \tau_{\text{day}} \cdot ME_{g,j}$	total of $ME_{g,j}$ for one fattening period (in MJ an ⁻¹)
$ME_{g,j}$	metabolizable energy required for growth for day j (in MJ an ⁻¹ d ⁻¹)

The maintenance energy is given by:

Für die Erhaltungsenergie gilt:

$$ME_{m,j} = \eta_{ME,m} \cdot w_{\text{unit}} \cdot \left(\frac{w_j}{w_{\text{unit}}} \right)^{0.75} \quad (5.23)$$

$ME_{m,j}$	metabolisable energy required for maintenance for day j (in MJ an ⁻¹ d ⁻¹)
$\eta_{ME,m}$	specific metabolisable energy required for maintenance (in MJ kg ⁻¹ d ⁻¹ , see below)
w_j	live weight on day j (in kg an ⁻¹)
w_{unit}	unit weight ($w_{\text{unit}} = 1 \text{ kg an}^{-1}$)

According to GfE (2006), pg. 23, the specific energy for maintenance is given by:

Die spezifische Erhaltungsenergie ist nach GfE (2006), S. 23, gegeben durch:

$$\eta_{ME,m} = \eta_{ME,m,n} \cdot \left(a_m - b_m \cdot \frac{w_j - w_n}{w_x - w_n} \right) \quad (5.24)$$

$\eta_{ME,m}$	specific metabolisable energy required for maintenance (in MJ kg ⁻¹ d ⁻¹)
$\eta_{ME,m,n}$	reference value of specific metabolisable energy for maintenance ($\eta_{ME,m,n} = 0.44 \text{ MJ kg}^{-1} \text{ d}^{-1}$, GfE, 2006, pg. 23))
a_m	constant ($a_m = 1.25 \text{ MJ MJ}^{-1}$)
b_m	constant ($b_m = 0.25 \text{ MJ MJ}^{-1}$)
w_j	live weight on day j (in kg an ⁻¹)
w_n	lower threshold of animal weight (in kg an ⁻¹), see below
w_x	upper threshold of animal weight (in kg an ⁻¹), see below

GfE (2006) uses $w_n = 30 \text{ kg an}^{-1}$ and $w_x = 100 \text{ kg an}^{-1}$. For animal weights lower than w_n the term in brackets is set equal to a_m , while for weights greater than w_x it equals $a_m - b_m$.

GfE (2006) setzt $w_n = 30 \text{ kg an}^{-1}$ und $w_x = 100 \text{ kg an}^{-1}$, wobei für Tiergewichte kleiner als w_n der Wert der Klammer gleich a_m und für Tiergewichte größer als w_x gleich $a_m - b_m$ gesetzt wird.

The energy required for growth is given by

Die für Zuwachs benötigte Energie ergibt sich aus:

$$ME_{g,j} = \eta_{ME,g,j} \cdot \left(\frac{\Delta w}{\Delta t} \right)_j \quad (5.25)$$

$ME_{g,j}$	metabolizable energy required for daily growth on day j (in MJ an ⁻¹ d ⁻¹)
j	index of day
$\eta_{ME,g,j}$	specific metabolizable energy required for growth on day j (in MJ kg ⁻¹), see below
$(\Delta w/\Delta t)_j$	daily weight gain per animal and day j (in kg an ⁻¹ d ⁻¹)

The specific energy requirements for growth, $\eta_{ME,g,j}$, is a function of protein and fat gain, which means it is a function of life time:

Der spezifische Energiebedarf für Zuwachs, $\eta_{ME,g,j}$, ist von Protein- und Fettzunahme und damit von der Lebenszeit abhängig:

$$\eta_{ME,g,j} = \frac{\alpha_p}{k_p} \cdot P_j + \frac{\alpha_f}{k_f} \cdot F_j \quad (5.26)$$

$\eta_{ME,g,j}$	day-dependent specific metabolizable energy required for growth (in MJ kg ⁻¹)
j	index of day
α_p	ME content of protein ($\alpha_p = 23.8 \text{ MJ kg}^{-1}$, see GfE, 2006, pg. 32)

α_f	ME content of fat ($\alpha_f = 39.7 \text{ MJ kg}^{-1}$, see GfE, 2006, pg. 33)
k_p	partial efficiency ($k_p = 0.56 \text{ MJ MJ}^{-1}$, see GfE, 2006, pg. 33)
k_f	partial efficiency ($k_f = 0.74 \text{ MJ MJ}^{-1}$, see GfE, 2006, pg. 33)
P_j	day-dependent ratio of protein gain to weight gain (in kg kg^{-1}), see below
F_j	day-dependent ratio of fat gain to weight gain (in kg kg^{-1}), see below

The relative protein gain P can be obtained by differentiation of Equation 8 in GfE (2006), pg. 30, with respect to animal weight.

Die relative Proteinzunahme P erhält man durch Differenzieren von Gleichung 8 in GfE (2006), S. 30, nach dem Tiergewicht:

$$P_j = a_p - b_p \cdot w_j \quad (5.27)$$

P_j	day-dependent ratio of protein gain to weight gain (in kg kg^{-1}), see below
j	index of day
a_p	constant ($a_p = 0.168 \text{ kg kg}^{-1}$)
b_p	constant ($b_p = 2 \cdot 0.0000914 \text{ kg}^{-1} \text{ an}$)
w_j	live weight on day j (in kg an^{-1})

Differentiation of Equation 9 in GfE (2006), pg. 30 with respect to animal weight and the introduction of a reduction factor 0.94 kg kg^{-1} (GfE, 2006, pp. 28 and 31) yields the relative fat gain F :

Die Differenzierung von Gleichung 9 in GfE (2006), S. 30, nach dem Tiergewicht sowie die Berücksichtigung eines Reduktionsfaktors von $0,94 \text{ kg kg}^{-1}$ (GfE, 2006, S. 28 und 31) ergibt die relative Fettzunahme F :

$$F_j = a_F \cdot (b_F + c_F \cdot w_j) \quad (5.28)$$

F_j	day-dependent ratio of fat gain to weight gain (in kg kg^{-1})
j	index of day
a_F	constant ($a_F = 0.94 \text{ kg kg}^{-1}$)
b_F	constant ($b_F = 0.1162 \text{ kg kg}^{-1}$)
c_F	constant ($c_F = 2 \cdot 0.001389 \text{ kg}^{-1} \text{ an}$)
w_j	live weight on day j (in kg an^{-1})

By analogy to the procedure used for weaners (see Chapter 5.4.2) the summation formula given above is transformed into an equation, which allows to calculation of the cumulative metabolisable energy from two limiting animal weights, either the start weight and the live end weight, or the weights limiting a specific feeding phase.

For this purpose the summation formula is transformed into an integral equation as described by HAENEL et al. (2011a). In order to account for the fact that the specific metabolisable energy $\eta_{\text{ME}, m}$ is defined separately for the animal weight intervals „lower than 30 kg an^{-1} “, „30 to 100 kg an^{-1} “ und „greater than 100 kg an^{-1} “, the integration has to be performed separately for these three intervals.

Like for the weaners (Chapter 5.4.2), the integration is performed under the assumption of a constant (i. e. mean) weight gain rate, cf. HAENEL et al. (2011a).

Integration leads to a formula for the ME amount required for the growth between animal weights w_0 and w_1 (prerequisite: $w_0 < w_B$ und $w_1 > w_A$)

Wie bei den Aufzuchtferkeln (siehe Kapitel 5.4.2) wird die obige Summenformel in eine Gleichung umgewandelt, mit deren Hilfe der kumulative Energiebedarf zwischen zwei Tiergewichten berechnet werden kann, die entweder Anfangs- und Endgewicht der Mastphase darstellen oder aber auch nur eine Fütterungsphase begrenzen können.

Zu diesem Zweck erfolgt wie in HAENEL et al. (2011a) beschrieben eine Transformation der Summengleichung in eine Integralgleichung. Zur Berücksichtigung der stückweise linear definierten spezifischen metabolisierbaren Energie $\eta_{\text{ME}, m}$ (siehe oben) ist die Integration allerdings getrennt für die Tiergewichtsbereiche „kleiner als 30 kg an^{-1} “, „30 bis 100 kg an^{-1} “ und „größer als 100 kg an^{-1} “ durchzuführen.

Wie bei den Aufzuchtferkeln (Kapitel 5.4.2) erfolgt die Integration unter der Annahme einer konstanten (d. h. mittleren) täglichen Wachstumsrate, vgl. HAENEL et al. (2011a).

Damit ergibt sich eine Formel für den Bedarf an ME, der benötigt wird, um von Gewicht w_0 zu Gewicht w_1 zu gelangen (Voraussetzung: $w_0 < w_B$ und $w_1 > w_A$):

$$\Sigma ME_{fp}(w_0, w_1) = \eta_{\text{ME}, m, n} \cdot \left[\frac{\varphi_1(w_0, w_1, w_A) + \varphi_2(w_0, w_1, w_A, w_B) + \varphi_3(w_0, w_1, w_B)}{(\Delta w / \Delta t)^*} \right] + \eta_{\text{ME}, g}^* \cdot (w_1 - w_0) \quad (5.29)$$

$\Sigma ME_{fp}(w_0, w_1)$	ME required for the fattening phase between the weights w_0 and w_1 (in MJ an ⁻¹)
$\eta_{ME, m, n}$	reference value of specific metabolisable energy for maintenance ($\eta_{ME, m, n} = 0.44$ MJ kg ⁻¹ d ⁻¹ , GfE, 2006, pg. 23)
w_0, w_1	animal weights limiting a special fattening phase, with $w_0 < w_1$ (in kg an ⁻¹)
w_A	reference weight according to GfE (2006, pg. 23) ($w_A = 30$ kg an ⁻¹)
w_B	reference weight according to GfE (2006, pg. 23) ($w_B = 100$ kg an ⁻¹)
$(\Delta w / \Delta t)^*$	mean weight gain during the entire fattening period (in kg an ⁻¹ d ⁻¹)

and

$$\varphi_1 = \frac{a_m \cdot w_{unit}^2}{1.75} \cdot \left[\left(\frac{\min(w_1, w_A)}{w_{unit}} \right)^{1.75} - \left(\frac{\min(w_0, w_A)}{w_{unit}} \right)^{1.75} \right] \quad (5.30)$$

$$\varphi_2 = \left\{ \begin{array}{l} \frac{w_{unit}^2}{1.75} \cdot \left(a_m + \frac{b_m \cdot w_A}{w_B - w_A} \right) \cdot \left[\left(\frac{\max(w_A, \min(w_1, w_B))}{w_{unit}} \right)^{1.75} - \left(\frac{\min(w_B, \max(w_0, w_A))}{w_{unit}} \right)^{1.75} \right] - \\ \frac{b_m \cdot w_{unit}^3}{2.75 \cdot (w_B - w_A)} \cdot \left[\left(\frac{\max(w_A, \min(w_1, w_B))}{w_{unit}} \right)^{2.75} - \left(\frac{\min(w_B, \max(w_0, w_A))}{w_{unit}} \right)^{2.75} \right] \end{array} \right\} \quad (5.31)$$

$$\varphi_3 = \frac{w_{unit}^2}{1.75} \cdot \left[\left(\frac{\max(w_1, w_B)}{w_{unit}} \right)^{1.75} - \left(\frac{\max(w_0, w_B)}{w_{unit}} \right)^{1.75} \right] \quad (5.32)$$

$$\eta_{ME, g}^* = \frac{\alpha_p}{k_p} \cdot \left(a_p - b_p \cdot \frac{w_0 + w_1}{2} \right) + \frac{\alpha_f}{k_f} \cdot a_f \cdot \left(b_f + c_f \cdot \frac{w_0 + w_1}{2} \right) \quad (5.33)$$

$\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$	functions of w_0, w_1, w_A , and w_B (in kg ² an ⁻²)
w_0, w_1	animal weights limiting a special fattening phase, with $w_0 < w_1$ (in kg an ⁻¹)
w_A	reference animal according to GfE (2006, pg. 23) ($w_A = 30$ kg an ⁻¹)
w_B	reference animal according to GfE (2006, pg. 23) ($w_B = 100$ kg an ⁻¹)
w_{unit}	unit weight ($w_{unit} = 1$ kg an ⁻¹)
a_m	constant ($a_m = 1.25$ MJ MJ ⁻¹ , see GfE, 2006, pg. 23)
b_m	constant ($b_m = 0.25$ MJ MJ ⁻¹ , see GfE, 2006, pg. 23)
$\eta_{ME, g}^*$	effective specific metabolizable energy required for growth, see below (in MJ kg ⁻¹)
α_p	ME coefficient ($\alpha_p = 23.8$ MJ kg ⁻¹ , see GfE, 2006, pg. 32)
k_p	efficiency coefficient ($k_p = 0.56$ MJ MJ ⁻¹ , see GfE, 2006, pg. 33)
a_p	constant ($a_p = 0.168$ kg kg ⁻¹ , see above)
b_p	constant ($b_p = 2 \cdot 0.0000914$ kg ⁻¹ an, see above)
α_f	ME coefficient ($\alpha_f = 39.7$ MJ kg ⁻¹ , see GfE, 2006, pg. 33)
k_f	efficiency coefficient ($k_f = 0.74$ MJ MJ ⁻¹ , see GfE, 2000, pg. 33)
a_f	constant ($a_f = 0.94$ kg kg ⁻¹ , see above)
b_f	constant ($b_f = 0.1162$ kg kg ⁻¹ , see above)
c_f	constant ($c_f = 2 \cdot 0.001389$ kg ⁻¹ an, see above)

5.5.3 Feed and energy intake / Futter- und Energieaufnahme

An essential prerequisite for the modelling of the feed-ing of fattening pigs is the data set obtained by the Federal Statistical Office during the 2010/2011 inquiry on protein feeding of fattening pigs (see Chapter 3.4.5.1). This inquiry queried the frequencies of various phase-feeding concepts on federal state level as well as the protein contents in the first phase and – in case of two-or-multiphase feeding – of the second or the last phase.

According to these data, 10.1 % of the German fat-tening pigs were fed single-phasedly in 2010/2011, while 89.9 % were fed in two or more phases. For the years

Die Modellierung der Mastschweine-Fütterung geht von der Erhebung des Statistischen Bundesamtes zum Proteineinsatz in der Schweinefütterung 2010/2011 (siehe Kapitel 3.4.5.1) aus. In dieser Erhebung wurden die Verbreitung verschiedener Phasenfütterungsvarianten auf Bundeslandebene sowie die Proteingehalte des Futters für die erste und – bei Zwei- und Mehrphasen-fütterung – für die zweite bzw. letzte Phase abgefragt.

2010/2011 wurden danach im Bundesdurchschnitt 10,1 % der Mastschweine einphasig gefüttert, 89,9 % in zwei oder mehr Phasen. Für die Jahre vor und nach der

before and after the inquiry of the Federal Statistical Office no data on phase feeding are available. For the years as of 2010, the data obtained by the inquiry are kept in agreement with the Federal Statistical Office and KTBL. For 1990 it is assumed in agreement with KTBL that the Bavarian frequencies provided by LINDERMAYER (2010), Tabelle 1, can plausibly be adopted nationwide (80 % of the fattening pig population fed single-phasedly, 20 % with two-phase feeding). This leads to the conclusion that the frequency of single-phase feeding has decreased in Germany over the years. The transition between single-phase feeding and multi-phase feeding in the years 1990 – 2010 on national level is then obtained by linear interpolation.

Based on the available data, the model concept knows only two feeding phases (A and B). Single-phase feeding is simulated by assigning the same protein content to both model phases. Example calculations with feeding data provided by KTBL showed that this two-phase concept can reasonably well approximate three-phase and multi-phase feeding if first and second model phase are equally long and for the first and second model phases the feed protein contents of the first and last real phases are used, respectively. This approach slightly overestimates the actual total of protein intake during a production cycle, because in practice the decrease of the feed protein content is not linear with time (which in fact is assumed by the simple two-phase model concept) but slightly concave, meaning a stronger-than-linear decrease of the feed protein content in the early fattening stages. Hence the model assumption of a linear decrease avoids underestimation of emissions.

In the model the boundary between the two feeding phases is defined by the animal weight $w_{50\%}$ obtained from arithmetically averaging the animals's start weight and final weight. This approach is consistent with the assumption of a constant daily weight gain in the calculation of the cumulative ME requirements, see Chapter 5.5.2.

The feed properties used in the inventory are shown in Table 5.24.

Datenerhebung durch das Statistische Bundesamt liegen keine bundesweiten Informationen zur Schweinefütterung vor. Für die Jahre ab 2010 werden daher in Abstimmung mit dem Statistischen Bundesamt und dem KTBL die Werte aus der Erhebung verwendet. Für 1990 wird nach Rücksprache mit KTBL die von LINDERMAYER (2010), Tabelle 1, für Bayern angegebene Verteilung (80 % des Mastschweinebestandes mit einphasiger, 20 % mit zweiphasiger Fütterung) für das ganze Bundesgebiet als plausibel übernommen. Die einphasige Fütterung hat demnach in Deutschland über die Jahre abgenommen. Der zeitliche Verlauf des Übergangs von der einphasigen zur mehrphasigen Fütterungsweise zwischen 1990 und 2010 wird auf Bundeslandebene linear interpoliert.

Aufgrund der verfügbaren Datenbasis kennt das Modellkonzept lediglich zwei Phasen (A und B). Einphasige Fütterung wird simuliert, indem beide Modellphasen den gleichen Proteinwert zugewiesen bekommen. Beispielrechnungen mit Fütterungsdaten des KTBL haben gezeigt, dass mit dem 2-Phasen-Konzept auch die 3- und Mehr-Phasen-Fütterung approximiert werden kann, indem für die erste Modell-Phase der Proteingehalt der ersten realen Phase und für die zweite Modell-Phase der Proteingehalt der letzten realen Phase verwendet wird, und die beiden Modellphasen gleich lang sind. Dieses Konzept überschätzt die tatsächliche Gesamt-Proteinaufnahme während der Mastdauer geringfügig, da die Abnahme des Futter-Proteingehalts in der Praxis nicht linear verläuft (wie es das Modellkonzept unterstellt), sondern leicht konkav, d. h. anfangs stärker als linear abnehmend. Durch die lineare Modellannahme sind Emissionsunterschätzungen ausgeschlossen.

Im Modell wird die Grenze zwischen der ersten und der zweiten Phase durch dasjenige Tiergewicht definiert, das dem Anfangsgewicht zuzüglich des halben Gesamtzuwachses entspricht ($w_{50\%}$). Dies ist konsistent mit der Annahme eines mittleren täglichen Gewichtszuwachses in der Berechnung des kumulativen ME-Bedarfs, siehe Kapitel 5.5.2.

Die Kennwerte der im Inventar verwendeten Fütterung sind in Table 5.24 wiedergegeben.

Table 5.24: Fattening pigs, diets used, related energies, and crude protein contents

(X_{DE} : digestibility of energy; X_{ME} : metabolisability; η_{ME} : content of metabolisable energy, related to fresh matter; x_{XP} : crude protein content of feed, related to fresh matter; X_{DOM} : digestibility of organic matter; x_{ash} : ash content of feed, related to fresh matter)

Model concept of feeding	Weight range	Major components	X_{DE}^a MJ MJ ⁻¹	X_{ME}^a MJ MJ ⁻¹	η_{ME}^a MJ kg ⁻¹	x_{XP}^b kg kg ⁻¹	X_{DOM}^a kg kg ⁻¹	x_{ash}^a kg kg ⁻¹
one single phase		wheat, rye, wheat gluten	0.8239	0.8013	13.2	0.163	0.85	0.055
two phases	phase A	meal, soybean meal, triticale, rapeseed meal	0.8307	0.8119	13.4	0.172	0.86	0.053
	phase B		0.8170	0.7907	13.0	0.152	0.84	0.057

^a Source: (1) Two-phase feeding: Feed composition according to deuka Deutsche Tiernahrung GmbH & Co. KG, privat communication; energy and protein/nitrogen contents according to BEYER et al. (2004) and LfL (2004b), (2) one-phase feeding: arithmetic means of the respective data of the two-phase feed.

^b Mean values on national level, derived from the results of the survey of the Federal Statistical Office on the use of protein in pig fattening in 2010 (see Chapter 3.4.5.1)

^c Definition of $w_{50\%}$: Start weight plus half the total growth during fattening

The N contents of the feed are derived from the crude protein contents (xXP) by dividing by 6.25. Due to lack of more detailed information the data in Table 5.24 are assumed to be constant in space and time. The temporal development since 1990 of the N reduced feeding via phase feeding is governed solely by the increase of the share of animal population fed with two-phase or multi-phase feeding.

The intake of fresh matter during phase A is calculated from the requirements of metabolizable energy and the ME content of phase A feed:

$$m_{F, FM, A} = \frac{\Sigma ME_A}{\eta_{ME, A}} \quad (5.34)$$

$m_{F, FM, A}$ amount of feed intake (fresh matter) in phase A (in kg pl⁻¹)
 ΣME_A total of ME intake during phase A (in MJ pl⁻¹)
 $\eta_{ME, A}$ ME content of feed in phase A, related to fresh matter (in MJ kg⁻¹), see Table 5.24

The calculations for phase B and for single-phase feeding are done by analogy.

Dry matter intake is calculated by multiplying fresh matter intake with a dry matter content of the diet of 0.88 kg kg⁻¹. This value is the dry matter content of the feed of sows and weaners³¹ which is assumed to be valid for fattening pigs' diets as well. Dry matter intake is calculated for reporting purposes only; it is not used in the emission calculations.

The annual mean of the daily intake of gross energy is obtained according to the subsequent equation.

This equation shows the calculation scheme for two-phase feeding as used as an approximation of multi-phase feeding, see above. The equation can also be applied to one-phase feeding by omitting the term for phase B.

$$GE_{fp} = \frac{m_{F, FM, A} \cdot \eta_{GE, A} + m_{F, FM, B} \cdot \eta_{GE, B}}{\tau_{fp}} \quad (5.35)$$

GE_{fp} mean daily gross energy requirements of a fattening pig (in MJ pl⁻¹ d⁻¹)
 $m_{F, FM, A}$ amount of feed intake (fresh matter) in phase A (in kg pl⁻¹), see above
 $\eta_{GE, A}$ GE content of feed in phase A, related to fresh matter (in MJ kg⁻¹), see below
 $m_{F, FM, B}$ amount of feed intake (fresh matter) in phase B (in kg pl⁻¹), see above
 $\eta_{GE, B}$ GE content of feed in phase B, related to fresh matter (in MJ kg⁻¹), see below
 τ_{fp} duration of fattening (in d), see Chapter 5.5.1.3

The GE content of phase A feed can be derived from the data provided in Table 5.24 as is described by the subsequent equation which applies to phase B as well.

$$\eta_{GE, A} = \frac{\eta_{ME, A}}{X_{ME, A}} \quad (5.36)$$

Die N-Gehalte werden mithilfe der Division durch 6,25 aus den Rohprotein-Werten (xXP) berechnet. Die Daten in Table 5.24 werden mangels besserer Kenntnisse als räumlich und zeitlich konstant angesehen. Die zeitliche Entwicklung der N-angepassten Fütterung seit 1990 wird allein durch die Zunahme der N-angepassten gefütterten Populationsanteile bestimmt.

Die in Phase A aufgenommene Futtermasse (Frischmasse) berechnet sich aus dem Bedarf an umsetzbarer Energie und dem ME-Gehalt des Futters in Phase A:

Die Berechnung für Phase B erfolgt analog, ebenso für den Fall einphasiger Fütterung.

Die Trockenmasseaufnahme wird im Inventar durch Multiplikation der Frischmasseaufnahme mit einem Trockenmassegehalt des Futters von 0,88 kg kg⁻¹ berechnet. Dieser Wert wird in Anlehnung an den typischen Trockenmassegehalt von Sauen- und Aufzuchtferkelfutter³¹ angenommen. Die Trockenmasseaufnahme wird nur zu Berichtszwecken berechnet; sie geht nicht in die Emissionsberechnungen ein.

Die übers Jahr gemittelte tägliche Gesamtenergieaufnahme ergibt sich aus der nachfolgenden Gleichung:

Diese Gleichung zeigt das Berechnungsschema für eine Zwei-Phasen-Fütterung, wie sie als Approximation der Mehrphasenfütterung verwendet wird, siehe oben. Die Gleichung kann auch für Ein-Phasen-Fütterung angewendet werden, indem der Summand für Phase B weggelassen wird.

Der GE-Gehalt des Futters in Phase A lässt sich anhand der Daten in Table 5.24 bestimmen (analog für Phase B):

³¹ http://www.definitiv-ba.de/pdf_files/aktuelles/stalljohann-dba2010.pdf

$\eta_{GE, A}$	GE content of feed in phase A, related to fresh matter (in MJ kg ⁻¹)
$\eta_{ME, A}$	ME content of feed in phase A, related to fresh matter (in MJ kg ⁻¹), see Table 5.24
$X_{ME, A}$	metabolizability of feed in phase A (in MJ MJ ⁻¹)

The GE content of the feed used in single-phase feeding is calculated by analogy.

Der GE-Gehalt des Futters bei einphasiger Fütterung wird analog berechnet.

5.5.4 Methane from enteric fermentation / Methan aus der Verdauung

CH₄ from enteric fermentation is calculated according to a Tier 2 method (see Chapter 3.3.2) that needs the gross energy intake (see Chapter 5.5.3) and the methane conversion factor $x_{CH_4, GE}$ as input.

The source of the national methane conversion factor of 0.0046 MJ MJ⁻¹ is DÄMMGEN ET. AL. (2012c). (IPCC(2006) does not provide a methane conversion factor for pigs.)

Die CH₄-Emission aus der Verdauung wird mit dem in Kapitel 3.3.2 beschriebenen Tier-2-Verfahren aus der Gesamtenergie-Aufnahme (siehe Kapitel 5.5.3) mithilfe des Methanumwandlungsfaktors $x_{CH_4, GE}$ berechnet.

Der nationale Methanumwandlungsfaktor von 0,0046 MJ MJ⁻¹ ist DÄMMGEN ET. AL. (2012c) entnommen. (IPCC(2006) gibt keinen entsprechenden Faktor an.)

No national data is available on the uncertainty of the emission factor for CH₄ from enteric fermentation do not exist. IPCC(2006)-10.33 estimates the uncertainty of Tier 2 approaches to be 20 %. This value is, according to the definition of uncertainty used in Chapter 3 in IPCC (2006a), interpreted as half the 95 % confidence interval. A normal distribution is assumed.

Zur Unsicherheit des Emissionsfaktors für CH₄ aus der Verdauung sind keine nationalen Daten verfügbar. IPCC(2006)-10.33 schätzt die Unsicherheit bei Anwendung von Tier-2-Verfahren auf 20 %. Dieser Wert wird im Sinne von IPCC (2006a), Kapitel 3, als halbes 95 %-Konfidenzintervall interpretiert. Es wird Normalverteilung angenommen.

5.5.5 Methane from manure management / Methan aus dem Wirtschaftdüngermanagement

A Tier 2 approach is used to treat CH₄ emissions from manure management of dairy cows (cf. Chapter 3.3.4.1).

VS excretions are calculated according to the method described in DÄMMGEN et al. (2011a) which differs from the method given in IPCC, see Chapter 3.3.3.1.

This modified method requires data on the digestibility of organic matter and the ash content of feed. These quantities are obtained as weighted means from the data sets provided in Table 5.24. In 2010, the national mean digestibility of organic matter is 0.84 kg kg⁻¹ while the national mean of the ash content is 0,056 kg kg⁻¹ (related to dry matter).

Maximum methane producing capacity B_0 and conversion factors (MCF) for the respective manure storage system are provided in Table 5.2 (see Chapter 5.2.1).

The frequency distribution of storage types is supplied by RAUMIS or derived from official census data (see Chapter 3.4.3).

German data on the uncertainty of CH₄ emissions from manure management do not exist. IPCC(2006)-10.48 estimates the uncertainty of Tier 2 approaches to be 20 %. This value is, according to the definition of uncertainty used in Chapter 3 in IPCC (2006a), interpreted as half the 95 % confidence interval. A normal distribution is assumed.

Zur Bestimmung der CH₄-Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management wird ein Tier-2-Verfahren angewandt, siehe Kapitel 3.3.4.1.

Die VS-Ausscheidungen („volatile solids“) werden nach dem gegenüber IPCC modifizierten Verfahren von DÄMMGEN et al. (2011a) berechnet, siehe Kapitel 3.3.3.1.

Die dazu notwendigen Daten zur Verdaulichkeit von organischer Substanz und dem Aschegehalt im Futter ergeben sich im gewichteten Mittel aus den Angaben zu den Rationen in Table 5.24. Die mittlere Verdaulichkeit von organischer Substanz liegt im Deutschlandmittel für 2010 bei 0,84 kg kg⁻¹, das nationale Mittel des Aschegehaltes liegt im Jahr 2010 bei 0,056 kg kg⁻¹ (bezogen auf die Futtertrockenmasse).

Maximale Methan-Freisetzungskapazität B_0 und Methanumwandlungsfaktoren (MCF) für die einzelnen Lagerungssysteme sind Table 5.2 in Kapitel 5.2.1 zu entnehmen.

Die Häufigkeitsverteilung der Lagerverfahren wird durch RAUMIS bereitgestellt bzw. aus offiziellen Erhebungen abgeleitet, siehe Kapitel 3.4.3.

Deutsche Zahlen zur Unsicherheit der CH₄-Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management liegen nicht vor. IPCC(2006)-10.48 schätzt die Unsicherheit bei Anwendung von Tier-2-Verfahren auf 20 %. Dieser Wert wird im Sinne von IPCC (2006a), Kapitel 3, als halbes 95 %-Konfidenzintervall interpretiert. Es wird Normalverteilung angenommen.

5.5.6 NMVOC emissions / NMVOC-Emissionen

The calculation of the NMVOC emissions of all animals except cattle are calculated with a Tier 1 methodology, see Chapters 3.3.4.2.1 and 3.3.4.2.3.

Agricultural NMVOC emissions are reported, but are neglected regarding the NEC emission threshold, see Chapter 3.3.4.2.

Die NMVOC-Emissionen von allen Tieren außer den Rindern werden mit einer Tier-1-Methode berechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.1 und 3.3.4.2.3.

Landwirtschaftliche NMVOC-Emissionen werden zwar berichtet, aber bzgl. der NEC-Emissionsobergrenze nicht angerechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.

5.5.7 Emissions of nitrogen species / Emissionen von Stickstoff-Spezies

The calculation presupposes the knowledge of N excretions, of the N inputs with straw, the conversion of N_{org} and TAN as well as the frequency distributions of housing types and storage facilities, spreading techniques and times before incorporation.

Die Berechnung der Emissionen beruht auf der Kenntnis der N-Ausscheidungen, der N-Einträge mit Stroh, der Umwandlungen von N_{org} und TAN, der Häufigkeit von Stalltypen, Lagertypen, Ausbringungstechniken und Einarbeitungszeiten.

5.5.7.1 N excretion / N-Ausscheidung

The amount of N taken in with feeds is calculated for typical diet composition and rations in accordance with performance data. The amount of N retained is subtracted.

The following equation shows the calculation scheme for two-phase feeding as used as an approximation of multiphase feeding, see Chapter 5.5.3. The equation can also be applied to one-phase feeding by omitting the term for phase B.

Die mit dem Futter aufgenommene N-Menge wird für typische Futterzusammensetzungen und -mengen leistungsbezogen berechnet. Hiervon wird die im Körper verbleibende N-Menge abgezogen.

Die nachfolgende Gleichung zeigt das Berechnungsschema für eine Zwei-Phasen-Fütterung, wie sie als Approximation der Mehrphasenfütterung verwendet wird, siehe Kapitel 5.5.3. Die Gleichung kann auch für Ein-Phasen-Fütterung angewendet werden, indem der Summand für Phase B weggelassen wird.

$$m_{\text{excr}} = \frac{\alpha}{\tau_{\text{fp}}} \cdot (m_{\text{F, FM, A}} \cdot x_{\text{N, A}} + m_{\text{F, FM, B}} \cdot x_{\text{N, B}} - \Delta w_{\text{fp}} \cdot x_{\text{N, pig}}) \quad (5.37)$$

m_{excr}	amount of nitrogen excreted (in kg $\text{pl}^{-1} \text{a}^{-1}$)
α	time units conversion factor ($\alpha = 365 \text{ d a}^{-1}$)
τ_{fp}	duration of fattening (in d), see Chapter 5.5.1.3
$m_{\text{F, FM, A}}$	amount of feed intake (fresh matter) in phase A within one production cycle (in kg pl^{-1}), see Chapter 5.5.3
$m_{\text{F, FM, B}}$	amount of feed intake (fresh matter) in phase B within one production cycle (in kg pl^{-1}), see Chapter 5.5.3
$x_{\text{N, A}}$	N content of feed in phase A, related to fresh matter (in kg kg^{-1}), derived from the XP content given in Table 5.24
$x_{\text{N, B}}$	N content of feed in phase B, related to fresh matter (in kg kg^{-1}), derived from the XP content given in Table 5.24
Δw_{fp}	total weight gain during fattening (in kg a^{-1})
$x_{\text{N, pig}}$	nitrogen content of a pig's body ($x_{\text{N, pig}} = 0.0256 \text{ kg kg}^{-1}$) (LFL, 2004a)

The calculated N excretions agree with range of N excretions provided by DLG (2005), pg. 40.

The TAN contents calculated vary with the feed composition. More than 70 % of the N excreted is ammoniacal N (TAN), which is somewhat higher than the value of 66 % given by DÖHLER et al. (2002).

Die so berechneten N-Ausscheidungen liegen im Bereich der Angaben in DLG (2005), S. 40.

Die berechneten TAN-Gehalte der Ausscheidungen sind in Abhängigkeit von der Futter-Zusammensetzung variabel. Sie liegen über 70 % und damit höher als der von DÖHLER et al. (2002) angegebene Wert von 66 %.

5.5.7.2 Nitrogen inputs with straw / Stickstoff-Einträge mit Stroh

For straw based systems N inputs with straw are taken into account. The amounts of N are given in Table 5.25 Table 5.17. For the properties of straw and the mineralization of organic N to TAN see Chapter 3.3.4.3.2.

Für Systeme mit Einstreu wird der N-Eintrag mit dem Stroh berücksichtigt. Die eingetragenen N-Mengen sind in Table 5.25 angegeben. Zu den Eigenschaften von Stroh und der Mineralisierung von organisch gebundenem N zu TAN wird auf Kapitel 3.3.4.3.2 verwiesen.

Table 5.25: Fattening pigs, N inputs with straw in solid-manure systems

Housing type	Haltungssystem	straw input kg pl ⁻¹ d ⁻¹	dry matter (DM) kg pl ⁻¹ d ⁻¹	N input (in DM) kg pl ⁻¹ d ⁻¹	TAN kg pl ⁻¹ d ⁻¹
plane floor with bedding	planbefestigter Boden mit Einstreu	0.3 ^a	0.26	1.5·10 ⁻³	0.75·10 ⁻³
deep bedding	Tiefstreu	1.0 ^b	0.86	5.0·10 ⁻³	2.50·10 ⁻³

^a expert judgement EURICH-MENDEN B/KTBL on the basis of housing system MS0007 in KTBL (2006a)

^b housing system MS0006 in KTBL (2006a)

5.5.7.3 *Frequency distribution of housing systems / Häufigkeitsverteilung der Stalltypen*

The frequency distributions of the storage and spreading systems types are supplied by RAUMIS or derived from official census data (see Chapter 3.4.3).

Die Häufigkeitsverteilungen der Lager- und Ausbringungsverfahren werden durch RAUMIS bereitgestellt bzw. aus offiziellen Erhebungen abgeleitet, siehe Kapitel 3.4.3.

5.5.7.4 *Emissions from housing / Emissionen aus dem Stall*

The NH₃ emission factors for housing can be found in Chapter 5.2.2.1.

The mitigation of NH₃ emissions by air scrubbers is taken into account, see Chapter 3.4.5.2.

Die NH₃-Emissionsfaktoren für Ställe finden sich im Kapitel 5.2.2.1.

Die Minderung von NH₃-Emissionen durch Abluftreinigungsanlagen wird berücksichtigt, s. Kapitel 3.4.5.2.

5.5.7.5 *Emissions from storage and spreading / Emissionen aus Lager und Ausbringung*

The emission factors for NH₃, N₂O, NO and N₂ are the same for all pig categories, see Chapters 5.2.2 and 3.3.4.3.5.

Die Emissionsfaktoren NH₃, N₂O, NO und N₂ sind für alle Schweinekategorien gleich, siehe Kapitel 5.2.2 und 3.3.4.3.5.

NO emissions from manure management are reported (as NO_x), but are neglected regarding the NEC emission threshold, see Chapter 3.3.4.2.

NO aus dem Wirtschaftsdünger-Management wird berichtet (als NO_x), bzgl. der NEC-Emissionsobergrenze aber nicht angerechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.

5.5.7.6 *Indirect N₂O from manure management / Indirektes N₂O aus dem Wirtschaftsdünger-Management*

Indirect N₂O emissions from manure management (housing, storage; without spreading) are calculated according to Chapter 3.3.4.3.6. See Chapter 3.3.4.3.6 also for the uncertainties of activity data and emission factor.

(Indirect N₂O emissions from agricultural soils after spreading of manures or digested manures are reported in Sector 3.D. For the calculation of these emissions see Chapter 12.)

Indirekte N₂O-Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management (Stall, Lager; ohne Ausbringung) werden nach Kapitel 3.3.4.3.6 berechnet. Siehe dort auch wegen der Unsicherheiten von Aktivitätswert und Emissionsfaktor.

(Indirekte N₂O-Emissionen als Folge der Ausbringung von Wirtschaftsdüngern und Wirtschaftsdünger-Gärresten werden im Sektor 3.D berichtet. Zur Berechnung siehe Kapitel 12.)

5.5.7.7 *Uncertainties of emission factors and activity data / Unsicherheiten von Emissionsfaktoren und Aktivitätsdaten*

For the uncertainties of the emission factors see Chapter 4.2.2.4 and 11.2.2.

The uncertainty of N excretion is discussed in Chapter 14.4.1. For the uncertainty of the amount of N spreaded see Chapter 11.2.1.

(With pigs, uncertainties for grazing are not needed as the inventory does not consider the option of pigs being held in free range.)

Zu den Unsicherheiten der Emissionsfaktoren siehe Kapitel 4.2.2.4 und 11.2.2.

Die Unsicherheit der N-Ausscheidung wird in Kapitel 14.4.1 diskutiert. Zur Unsicherheit der zur Ausbringung kommenden N-Menge siehe Kapitel 11.2.1.

(Unsicherheiten für Weidegang bei Schweinen sind nicht erforderlich, da das Inventar keinen Freilandaufenthalt für Schweine vorsieht.)

5.5.8 Emissions of particulate matter / Partikelemissionen

The method to calculate particle emissions is described in Chapter 3.3.4.5. The emission factors are listed in Table 5.26. For the uncertainty of the emission factors see Chapter 3.3.4.5.

The mitigation of PM emissions by air scrubbers is taken into account, see Chapter 3.4.5.2.

Zur Berechnungsmethode für Partikelemissionen wird auf Kapitel 3.3.4.5 verwiesen. Die Emissionsfaktoren sind in Table 5.26 angegeben. Zur Unsicherheit der Emissionsfaktoren siehe Kapitel 3.3.4.5.

Die Minderung von Partikelemissionen durch Abluftreinigungsanlagen wird berücksichtigt, s. Kapitel 3.4.5.2.

Table 5.26: Fattening pigs, emission factors for particle emissions from housing

Housing type	Haltungssystem	Emission factor for TSP kg pl ⁻¹ a ⁻¹	Emission factor for PM ₁₀ kg pl ⁻¹ a ⁻¹	Emission factor for PM _{2.5} kg pl ⁻¹ a ⁻¹
all types	alle Systeme	1.05	0.14	0.006

Source: EMEP(2016)-3B-19, Table 3.5

5.5.9 References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung

The subsequent table lists the references to information provided in the data collection (see Chapter 2.4).

Die nachfolgende Tabelle enthält Verweise auf die Informationen in der Datensammlung (siehe Kapitel 2.4).

Table 5.27: Fattening pigs, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)

			from	to
Emissions	Emissionen	CH ₄ enteric fermentation	EM1004.011	EM1009.033
		CH ₄ manure management	EM1005.011	
		NMVOC	EM1007.011	
		NH ₃	EM1009.031	
		N ₂ O	EM1009.101	
		NO	EM1009.131	
		TSP	EM1010.011	
		PM ₁₀	EM1010.041	
		PM _{2.5}	EM1010.071	
Activity data	Aktivitäten		AC1005.012	
Emission factors	Emissionsfaktoren	CH ₄ enteric fermentation	IEF1004.011	IEF1009.030
		CH ₄ manure management	IEF1005.011	
		NMVOC	IEF1007.011	
		NH ₃	IEF1009.028	
		N ₂ O	IEF1009.094	
		NO	IEF1009.122	
		TSP	IEF1010.010	
		PM ₁₀	IEF1010.038	
		PM _{2.5}	IEF1010.066	
Additional information	zusätzliche Informationen		AI1005PSH.064	AI1005PSH.095
Excretion rates	Ausscheidungen	N	EXCR.051	EXCR.055

5.6 Breeding boars / Zuchteber

Breeding boars form an own subcategory in the German census.

The emissions are calculated according to the methods compiled in Table 5.28.

For the definition of the methods see Chapter 3.2.3.

Zuchteber sind alle als solche in der Statistik bezeichneten männlichen Schweine.

Die Berechnung der Emissionen erfolgt nach den in Table 5.28 zusammengestellten Methoden.

Zur Methodendefinition siehe Kapitel 3.2.3.

Table 5.28: Boars, calculation methods applied

Species	Origin	Tier	Method applied
CH ₄	enteric fermentation	2	IPCC / national
CH ₄	manure management	2	IPCC / national
NM VOC	manure management	1	EMEP
NH ₃	manure management	2	EMEP / national
N ₂ O, NO, N ₂	manure management	2	IPCC / national
TSP, PM ₁₀ , PM _{2.5}	manure management	2	EMEP

5.6.1 Activity and performance data /Aktivitäts- und Leistungsdaten

5.6.1.1 Animal numbers / Tierzahlen

Animal numbers are provided by the statistical offices of the Länder (STATLA C III 1 – vj 4). They can be used without any further transformation. For the uncertainty of the animal numbers see Chapter 5.1.2.

Tierzahlen werden von den Statistischen Landesämtern bereitgestellt (STATLA C III 1 – vj 4) und sind ohne Umrechnung verwendbar. Zur Unsicherheit der Tierzahlen siehe Kapitel 5.1.2.

$$n_{bo} = n_V$$

n_{bo} number of boars

n_V animal numbers of type V in the German census (see Table 5.1)

(5.38)

5.6.1.2 Animal weight / Tiergewicht

The mean boar weight is assumed to be 200 kg an⁻¹ (expert judgement, see HAENEL et al., 2011a).

Due to the simple calculation methodology for emissions from breeding boars, the boar weight is not used in those calculations.

Das mittlere Ebergewicht wird nach Expertenurteil (siehe HAENEL et al., 2011a) mit 200 kg an⁻¹ angesetzt.

Aufgrund der einfachen Berechnungsmethodik für die Emissionen aus der Zuchteberhaltung geht das Ebergewicht nicht in die Berechnungen ein.

5.6.2 Energy requirements / Energiebedarf

For breeding boars, the metabolic energy requirements comprise the requirements for both maintenance and growth. However, as the contribution of boars to the overall emissions from pig husbandry is almost negligible, the inventory simply assumes all boars counted by the official census to be adult boars the weight gain of which is restricted (GfE, 2006, pg. 84).

Due to the boars' limited importance and the scarcity of data (GfE, 2006, pg. 84) the inventory does not attempt to model energy requirements of boars. While GfE (1987), pg. 68, suggested mean ME requirements of 30 MJ pl⁻¹ d⁻¹, GfE (2006), pg. 84, recommends a range of 30 to 35 MJ pl⁻¹ d⁻¹. A rough estimate based on the data provided in GfE (2006), pg. 83, and the use of ME calculation approach for fattening pigs (see Chapter 5.5.2) indicates that the value of 35 MJ pl⁻¹ d⁻¹ better matches a mean boar weight of 200 kg an⁻¹ than 30 MJ pl⁻¹ d⁻¹. Hence the inventory assumes daily ME requirements of 35 MJ pl⁻¹ d⁻¹ leading to cumulative annual ME requirements of 12775 MJ pl⁻¹ a⁻¹.

Für Zuchteber umfasst der Bedarf an umsetzbarer Energie den Bedarf für Erhaltung und Zuwachs. Da der Beitrag der Zuchteber zur Gesamtemission aus der Schweinehaltung nahezu vernachlässigbar ist, wird für das Inventar vereinfachend angenommen, dass alle in der Officialstatistik erfassten Eber erwachsene Tiere mit begrenzter Gewichtszunahme sind (GfE, 2006, pg. 84).

Aufgrund der begrenzten Bedeutung der Eber und dem Mangel an Daten (GfE, 2006, pg. 84) verzichtet das Inventar darauf, den Energiebedarf zu berechnen. Während GfE (1987), S. 68, einen mittleren ME-Bedarf von 30 MJ pl⁻¹ d⁻¹ empfiehlt, wird in GfE (2006), S. 84, ein Bereich von 30 bis 35 MJ pl⁻¹ d⁻¹ angegeben. Eine Überschlagsrechnung mithilfe der in GfE (2006), S. 83, angegebenen Daten und der Berechnungsmethode für Mastschweine (siehe Kapitel 5.5.2) zeigt, dass ein Wert von 35 MJ pl⁻¹ d⁻¹ besser zu einem Ebergewicht von 200 kg an⁻¹ passt als 30 MJ pl⁻¹ d⁻¹. Das Inventar geht daher von 35 MJ pl⁻¹ d⁻¹ aus, was zu einem kumulativen ME-Bedarf von 12775 MJ pl⁻¹ a⁻¹ führt.

5.6.3 Feed and energy intake / Futter- und Energieaufnahme

Neither GfE (1987) nor GfE (2006) recommend specific feeds for boars. The inventory uses the feed fed to sows during Phase A. For the feed properties see Chapter 5.3.3, Table 5.12.

The daily intake of feed (dry matter) and gross energy is calculated by analogy to the method described in Chapter 5.3.3. The daily dry matter intake is $2.7 \text{ kg an}^{-1} \text{ d}^{-1}$, the daily gross energy intake amounts to $GE_{bo} = 44 \text{ MJ pl}^{-1} \text{ d}^{-1}$.

Weder GfE (1987) noch GfE (2006) geben spezielle Ernährungsempfehlungen für Eber an. Das Inventar geht von der Futterzusammensetzung für Sauen in der Phase A aus (siehe Kapitel 5.3.3, Table 5.12).

Die tägliche Futtermenge (Trockenmasse) sowie die damit aufgenommene tägliche Gesamtenergie GE_{bo} wird sinngemäß wie in Kapitel 5.3.3 beschrieben berechnet. Die tägliche Trockenmasseaufnahme liegt bei $2,7 \text{ kg pl}^{-1} \text{ d}^{-1}$, die tägliche GE-Aufnahme GE_{bo} bei $44 \text{ MJ pl}^{-1} \text{ d}^{-1}$.

5.6.4 Methane from enteric fermentation / Methan aus der Verdauung

CH_4 from enteric fermentation is calculated according to a Tier 2 method (see Chapter 3.3.2) that needs the gross energy intake (see Chapter 5.6.3) and the methane conversion factor $x_{\text{CH}_4, \text{GE}}$ as input.

The source of the national methane conversion factor of $0.0071 \text{ MJ MJ}^{-1}$ is DÄMMGEN ET. AL. (2012c). (IPCC(2006) does not provide a methane conversion factor for pigs.)

No national data is available on the uncertainty of the emission factor for CH_4 from enteric fermentation do not exist. IPCC(2006)-10.33 estimates the uncertainty of Tier 2 approaches to be 20 %. This value is, according to the definition of uncertainty used in Chapter 3 in IPCC (2006a), interpreted as half the 95 % confidence interval. A normal distribution is assumed.

Die CH_4 -Emission aus der Verdauung wird mit dem in Kapitel 3.3.2 beschriebenen Tier-2-Verfahren aus der Gesamtenergie-Aufnahme (siehe Kapitel 5.6.3) mithilfe des Methanumwandlungsfaktors $x_{\text{CH}_4, \text{GE}}$ berechnet.

Der nationale Methanumwandlungsfaktor von $0,0071 \text{ MJ MJ}^{-1}$ ist DÄMMGEN ET. AL. (2012c) entnommen. (Ein entsprechender Faktor wird in IPCC(2006) nicht bereitgestellt.)

Zur Unsicherheit des Emissionsfaktors für CH_4 aus der Verdauung sind keine nationalen Daten verfügbar. IPCC(2006)-10.33 schätzt die Unsicherheit bei Anwendung von Tier-2-Verfahren auf 20 %. Dieser Wert wird im Sinne von IPCC (2006a), Kapitel 3, als halbes 95 %-Konfidenzintervall interpretiert. Es wird Normalverteilung angenommen.

5.6.5 Methane from manure management / Methan aus dem Wirtschaftdüngermanagement

A Tier 2 approach is used to treat CH_4 emissions from manure management of dairy cows (cf. Chapter 3.3.4.1).

Volatile solids (VS) excretion rates are calculated using the modified IPCC approach described in DÄMMGEN et al. (2011a), see Chapter 3.3.3.1.

Maximum methane producing capacity B_0 and conversion factors (MCF) for the respective manure storage systems are provided in Table 5.2 (see Chapter 5.2.1).

For the necessary information on the digestibility of organic matter and the ash contents of the diet are obtained see Chapter 5.6.3; Therefore the national mean digestibility of organic matter is 0.81 kg kg^{-1} , the national mean ash content (related to dry matter) amounts to 0.056 kg kg^{-1} .

The frequency distribution of storage types is supplied by RAUMIS or derived from official census data (see Chapter 3.4.3).

German data on the uncertainty of CH_4 emissions from manure management do not exist. IPCC(2006)-10.48 estimates the uncertainty of Tier 2 approaches to be 20 %. This value is, according to the definition of uncertainty used in Chapter 3 in IPCC (2006a), interpreted as half the 95 % confidence interval. A normal distribution is assumed.

Zur Bestimmung der CH_4 -Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management wird ein Tier-2-Verfahren angewandt, siehe Kapitel 3.3.4.1.

Die VS-Ausscheidungen („volatile solids“) werden nach dem gegenüber IPCC modifizierten Verfahren von DÄMMGEN et al. (2011a) berechnet, siehe Kapitel 3.3.3.1).

Zu maximaler Methan-Freisetzungskapazität B_0 und Methanumwandlungsfaktoren (MCF) für die einzelnen Lagerungssysteme siehe Table 5.2 in Kapitel 5.2.1.

Zu den dazu notwendigen Daten zur Verdaulichkeit von organischer Substanz und dem Aschegehalt im Futter siehe Kapitel 5.6.3; bundesweit werden danach die Verdaulichkeit mit $0,81 \text{ kg kg}^{-1}$ und der Aschegehalt mit $0,056 \text{ kg kg}^{-1}$ (bezogen auf die Futtertrockenmasse) angesetzt.

Die Häufigkeitsverteilung der Lagerverfahren wird durch RAUMIS bereitgestellt bzw. aus offiziellen Erhebungen abgeleitet, siehe Kapitel 3.4.3.

Deutsche Zahlen zur Unsicherheit der CH_4 -Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management liegen nicht vor. IPCC(2006)-10.48 schätzt die Unsicherheit bei Anwendung von Tier-2-Verfahren auf 20 %. Dieser Wert wird im Sinne von IPCC (2006a), Kapitel 3, als halbes 95 %-Konfidenzintervall interpretiert. Es wird Normalverteilung angenommen.

5.6.6 NMVOC emissions / NMVOC-Emissionen

The calculation of the NMVOC emissions of all animals except cattle are calculated with a Tier 1 methodology, see Chapters 3.3.4.2.1 and 3.3.4.2.3.

Agricultural NMVOC emissions are reported, but are neglected regarding the NEC emission threshold, see Chapter 3.3.4.2.

Die NMVOC-Emissionen von allen Tieren außer den Rindern werden mit einer Tier-1-Methode berechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.1 und 3.3.4.2.3.

Landwirtschaftliche NMVOC-Emissionen werden zwar berichtet, aber bzgl. der NEC-Emissionsobergrenze nicht angerechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.

5.6.7 Emissions of nitrogen species / Emissionen von Stickstoff-Spezies

The calculation of these emissions presupposes the knowledge of N excretions (their amounts and locations), of the N inputs with straw, the conversion of N_{org} and TAN as well as the frequency distributions of housing types and storage facilities, spreading techniques and times before incorporation.

Die Berechnung der Emissionen beruht auf der Kenntnis der N-Ausscheidungen (Mengen und Orte), der N-Einträge mit Stroh, der Umwandlungen von N_{org} und TAN, der Häufigkeit von Stalltypen, Lagertypen, Ausbringungstechniken und Einarbeitungszeiten.

5.6.7.1 N excretion / N-Ausscheidung

The N excretion calculation is based on the ME requirements (see Chapter 5.6.2) and the ME and N contents of the feed (see Chapter 5.6.3). No N retention is considered. The N excretion calculation yields N excretions of $27.8 \text{ kg pl}^{-1} \text{ a}^{-1}$. TAN is calculated as well and amounts to ca. 83 %.

Die Berechnung der N-Ausscheidung beruht auf dem ME-Bedarf (siehe Kapitel 5.6.2) sowie dem ME- und dem N-Gehalt des Futters (siehe Kapitel 5.6.3). Eine N-Retention wird nicht berücksichtigt. Es ergibt sich eine N-Ausscheidung von $27,8 \text{ kg pl}^{-1} \text{ a}^{-1}$. Der TAN-Gehalt wird ebenfalls berechnet und beläuft sich auf ca. 83 %.

5.6.7.2 N inputs with straw / N-Einträge mit Stroh

For straw based systems N inputs with straw are taken into account. For the properties of straw and the mineralization of organic N to TAN see Chapter 3.3.4.3.2.

The amount of straw fresh matter is $0.5 \text{ kg pl}^{-1} \text{ d}^{-1}$ or $2.5 \cdot 10^{-3} \text{ kg N (pl} \cdot \text{d)}^{-1}$ (or $1.25 \cdot 10^{-3} \text{ kg TAN (pl} \cdot \text{d)}^{-1}$, respectively).

Für Systeme mit Einstreu wird der N-Eintrag mit dem Stroh berücksichtigt. Zu den Eigenschaften von Stroh und der Mineralisierung von organisch gebundenem N zu TAN wird auf Kapitel 3.3.4.3.2 verwiesen.

Die Einstreumenge ist $0,5 \text{ kg pl}^{-1} \text{ d}^{-1}$ Strohfrischmasse bzw. $2,5 \cdot 10^{-3} \text{ kg N (pl} \cdot \text{d)}^{-1}$ oder $1,25 \cdot 10^{-3} \text{ kg TAN (pl} \cdot \text{d)}^{-1}$.

5.6.7.3 Housing and storage types / Stall- und Lager-Typen

For boars, the distributions of housing and manure management systems of sows are adopted.

Für Eber werden die gleichen Haltungsverfahren wie für Sauen angenommen.

5.6.7.4 Emissions from housing / Emissionen aus dem Stall

The NH_3 emission factors for housing can be found in Chapter 5.2.2.1.

Die NH_3 -Emissionsfaktoren für Ställe finden sich im Kapitel 5.2.2.1.

5.6.7.5 Emissions from storage and spreading / Emissionen aus Lager und Ausbringung

The emission factors for NH_3 , N_2O , NO and N_2 are the same for all pig categories, see Chapters 5.2.2 and 3.3.4.3.5.

NO emissions from manure management are reported (as NO_x), but are neglected regarding the NEC emission threshold, see Chapter 3.3.4.2.

Die Emissionsfaktoren für NH_3 , N_2O , NO und N_2 sind für alle Schweinekategorien gleich, siehe Kapitel 5.2.2 und 3.3.4.3.5.

NO aus dem Wirtschaftsdünger-Management wird berichtet (als NO_x), bzgl. der NEC-Emissionsobergrenze aber nicht angerechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.

5.6.7.6 Indirect N_2O from manure management / Indirektes N_2O aus dem Wirtschaftsdünger-Management

Indirect N_2O emissions from manure management (housing, storage; without spreading) are calculated according to Chapter 3.3.4.3.6. See Chapter 3.3.4.3.6 also for

Indirekte N_2O -Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management (Stall, Lager; ohne Ausbringung) werden nach Kapitel 3.3.4.3.6 berechnet. Siehe dort auch wegen der

the uncertainties of activity data and emission factor.

(Indirect N₂O emissions from agricultural soils after spreading of manures or digestated manures are reported in Sector 3.D. For the calculation of these emissions see Chapter 12.)

Unsicherheiten von Aktivitätswert und Emissionsfaktor.

(Indirekte N₂O-Emissionen als Folge der Ausbringung von Wirtschaftsdüngern und Wirtschaftsdünger-Gärresten werden im Sektor 3.D berichtet. Zur Berechnung siehe Kapitel 12.)

5.6.7.7 *Uncertainties of emission factors and activity data / Unsicherheiten von Emissionsfaktoren und Aktivitätsdaten*

For the uncertainties of the emission factors see Chapter 4.2.2.4 and 11.2.2.

The uncertainty of N excretion is discussed in Chapter 14.4.1. For the uncertainty of the amount of N spreaded see Chapter 11.2.1.

(With pigs, uncertainties for grazing are not needed as the inventory does not consider the option of pigs being held in free range.)

Zu den Unsicherheiten der Emissionsfaktoren siehe Kapitel 4.2.2.4 und 11.2.2.

Die Unsicherheit der N-Ausscheidung wird in Kapitel 14.4.1 diskutiert. Zur Unsicherheit der zur Ausbringung kommenden N-Menge siehe Kapitel 11.2.1.

(Unsicherheiten für Weidegang bei Schweinen sind nicht erforderlich, da das Inventar keinen Freiland-aufenthalt für Schweine vorsieht.)

5.6.8 *Emissions of particulate matter / Partikelemissionen*

The method to calculate particle emissions is described in Chapter 3.3.4.5. For boars, no specific emission factors have been reported. As it is assumed that feeding and management of boars and sows are similar, the emission factors for sows are adopted for boars (see Chapter 5.3.8). For the uncertainty see Chapter 3.3.4.5.

Zur Berechnungsmethode für Partikelemissionen wird auf Kapitel 3.3.4.5 verwiesen. Eigene Emissionsfaktoren für Eber existieren nicht. Wegen der angenommenen Vergleichbarkeit von Fütterung und Haltung werden die Emissionsfaktoren der Sauen für die Eber übernommen (s. Kapitel 5.3.8). Zur Unsicherheit s. Kap. 3.3.4.5.

5.6.9 *References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung*

Table 5.29: Boars, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)

			from	to
Emissions	Emissionen	CH ₄ enteric fermentation	EM1004.012	
		CH ₄ manure management	EM1005.012	
		NMVOC	EM1007.012	
		NH ₃	EM1009.034	EM1009.036
		N ₂ O	EM1009.102	
		NO	EM1009.132	
		TSP	EM1010.012	
		PM ₁₀	EM1010.042	
		PM _{2.5}	EM1010.072	
Activity data	Aktivitäten		AC1005.013	
Emission factors	Emissionsfaktoren	CH ₄ enteric fermentation	IEF1004.012	
		CH ₄ manure management	IEF1005.012	
		NMVOC	IEF1007.012	
		NH ₃	IEF1009.031	IEF1009.033
		N ₂ O	IEF1009.095	
		NO	IEF1009.123	
		TSP	IEF1010.011	
		PM ₁₀	IEF1010.039	
		PM _{2.5}	IEF1010.067	
Additional information	zusätzliche Informationen		AI1005PSH.096	AI1005PSH.124
Excretion rates	Ausscheidungen	N	EXCR.056	EXCR.060

5.7 Pigs – collective description / Schweine – zusammenfassende Daten

Emissions have to be reported for pigs as a single category.

In the German inventory, the aggregation of emissions and emission explaining data has to take into account that suckling-pigs do not represent a separate animal subcategory, but are integrated into the calculations for sows (cf. Chapters 5.1 and 5.3).

Hence, with exception of mean animal weight and pregnancy, the data aggregation is to be based on the data of the four separate animal subcategories sows, weaners, fattening pigs and boars.

Total emissions as well as amounts of bedding material are calculated by addition. The aggregation of emission explaining data is described in Chapter 5.7.2

It is combined with the definition of an inventory-specific total number of pigs, which deviates from the total number of pigs reported by the German census, see Chapter 5.7.1.

Schweine sind zusammengefasst als eine Kategorie zu berichten.

Die Aggregation von Emissionen und emissionserklärenden Daten im deutschen Inventar muss berücksichtigen, dass die Saugferkel nicht als separate Kategorie geführt werden, sondern bei den Sauen mitgerechnet werden (siehe dazu Kapitel 5.1 und 5.3).

Daher ist, mit Ausnahme des mittleren Tiergewichtes und der Trächtigkeit, die Aggregation allein auf die Daten der vier Berichtskategorien Sauen, Aufzuchtferkel, Mastschweine und Eber zu stützen.

Gesamtemissionen und Einstreumengen werden dabei durch jeweilige Addition berechnet. Auf die Aggregation von emissionserklärenden Daten geht Kapitel 5.7.2 ein.

Damit verbunden ist eine Definition der im Inventar zu berichtenden Schweinegesamtzahl, die von der offiziellen Schweinegesamtzahl abweicht, siehe Kapitel 5.7.1.

5.7.1 Animal numbers / Tierzahlen

The total number of all pigs reported from the German census is given by:

$$n_{\text{pigs,official}} = n_M + n_N + n_O + n_P + n_Q + n_R + n_S + n_T + n_U + n_V \quad (5.39)$$

n_M etc. number of animals in census subcategory M, etc. (see Table 5.1)

Die Summe aller Schweine aus der amtlichen Statistik ist wie folgt gegeben:

In the German inventory, part of the piglets counted in the official category M is not represented explicitly, but is integrated into the calculations for sows. Hence, the total number of pigs in the German inventory is lower than the total number counted in the German census:

Da im deutschen Inventar ein Teil der in der offiziellen Kategorie M gezählten Ferkel als Saugferkel in der Inventarkategorie Sauen berücksichtigt werden, ist die im Inventar verwendete Gesamtzahl aller Schweine kleiner als die Gesamtzahl nach der amtlichen Tierzählung:

$$n_{\text{pigs,inventory}} = \begin{cases} (n_M - n_{sp}) + n_N + n_O + n_P + n_Q + n_R + n_S + n_T + n_U + n_V \\ n_{so} + n_{we} + n_{fp} + n_{bo} \end{cases} \quad (5.40)$$

n_M etc. number of animals in census subcategory M, etc. (see Table 5.1)
 n_{sp} annually averaged population of suckling-pigs (in piglet), see Chapter 5.3.2
 n_{so} number of sows used in this inventory, see Chapter 5.3.1
 n_{we} number of weaners used in this inventory, see Chapter 5.4.1
 n_{fp} number of fattening pigs used in this inventory, see Chapter 5.5.1
 n_{bo} number of boars used in this inventory, see Chapter 5.6.1

For the uncertainties of the animal numbers see the respective animal subchapters.

Zur Unsicherheiten der Tierzahlen wird auf die Angaben in den Tier-Unterkapiteln verwiesen.

5.7.2 Aggregation of IEF and animal characteristics / Aggregation von IEF und Tiercharakteristika

For the aggregation of the animal category “pigs” the mean values of the following quantities are calculated:

- emission factors (IEF)
- animal weight
- intake of feed dry matter (DM)
- intake of gross energy (GE)

Für die Aggregation der Kategorie „Schweine“ wird jeweils der Mittelwert der folgenden Größen berechnet:

- Emissionsfaktoren (IEF)
- Tiergewicht
- Aufnahme von Futter-Trockenmasse (DM)
- Aufnahme von Futter-Gesamtenergie (GE)

- VS excretions
- N excretions
- relative content of TAN in N excretions
- Methane conversion factor, enteric fermentation ($X_{CH_4, GE}$)
- digestibility of organic matter (X_{DOM})
- digestibility of energy (X_{DE})
- ash content of feed (x_{ash})
- shares of manure management systems
- methane conversion factor, manure management (MCF)
- pregnancy

The calculation follows the principles described for “other cattle” in Chapter 4.9.2. Note, however, that suckling-pigs are considered explicitly only in case of the mean pig weight. For all other quantities it is taken into account that suckling-pigs are implicitly included in the system “sow with suckling-pigs”.

The calculation of the mean weight of pigs is based on the animal numbers (= numbers of animal places) as derived for the inventory calculations from officially counted animal numbers (see the respective pig chapters). For the mean population of suckling pigs n_{sp} see Chapter 5.3.2; this population is the difference between the total number of pigs and the sum of the subcategories “sows”, “weaners”, “fattening pigs” and “boars” that are provided in the official statistics.

The following weights are considered for the weighted averaging:

- sow, boar: the respective mean weights used for the calculation of the inventory (see Chapters 5.3.1.2 and 5.6.1.2)
- suckling-pigs, weaners and fattening pigs: the respective arithmetic mean derived from start and final weights (see Chapters 5.3.1.2, 5.4.1.2 and 5.5.1.2).

As to pregnancy, Germany reports the mean share of pregnant sows which is obtained from the German census. This data was provided for emission reporting on an informative basis. However, it was not used for reporting.

- VS-Ausscheidung
- N-Ausscheidung
- Relativer TAN-Gehalt der N-Ausscheidung
- Methanumwandlungsfaktor, Verdauung ($x_{CH_4, GE}$)
- Verdaulichkeit organischer Substanz (X_{DOM})
- Verdaulichkeit von Energie (X_{DE})
- Aschegehalt des Futters (x_{ash})
- relative Wirtschaftsdüngersysteme-Anteile
- Methanumwandlungsfaktor, Wirtschaftsdünger-Management (MCF)
- Trächtigkeit

Die Berechnung erfolgt sinngemäß wie in Kapitel 4.9.2 für „übrige Rinder“ beschrieben. Allerdings ist zu beachten, dass mit Ausnahme des Tiergewichtes die Saugferkel nicht explizit berücksichtigt werden, da sie hinsichtlich Futteraufnahme und Emissionen Bestandteil des Systems „Sau mit Saugferkeln“ sind.

Für die Berechnung des mittleren Schweinegewichtes werden die Tierzahlen (= Tierplatzzahlen) zugrunde gelegt, wie sie in den entsprechenden Tierkapiteln für die Inventarberechnungen aus den offiziellen Tierzahlen abgeleitet wurden. Zur mittleren Population der Saugferkel n_{sp} siehe Kapitel 5.3.2; sie entspricht der Differenz zwischen der offiziellen Schweine-Gesamtzahl des Statistischen Bundesamtes und der Tierzahlsumme der im Inventar verwendeten Kategorien „Sauen“, „Aufzuchtferkel“, „Mastschweine“ und „Eber“.

Die in die gewichtete Mittelung der Tiergewichte eingehenden Gewichte werden wie folgt angesetzt:

- Sau, Eber: jeweils das für die Inventarberechnung verwendete mittlere Tiergewicht (siehe Kapitel 5.3.1.2 und 5.6.1.2).
- Saugferkel, Aufzuchtferkel und Mastschwein: das arithmetische Mittel aus Anfangs- und Endgewicht (siehe Kapitel 5.3.1.2, 5.4.1.2 und 5.5.1.2).

Im Hinblick auf die Trächtigkeit berichtet Deutschland den mittleren Anteil trächtiger Sauen. Diese Angabe wurde der deutschen Tierzählungsstatistik entnommen. Diese Daten werden informationshalber für die Berichterstattung bereitgestellt, sie gehen aber nicht in die Emissionsberechnung ein.

5.7.3 International comparison / Internationaler Vergleich

Within the framework of quality assurance a comparison of input data and inventory results was made on European level. (For details of the procedure of the comparison see Chapter 4.3.10.)

In Table 5.30 a comparison is made of implied emission factors (IEF) and emission explaining variables.

Only five countries (including Germany) report the animal weight, although the high Danish value is probably not an average for all pigs but the mean final weight of fattening pigs. There are even only three entries for GE reporting (including Germany). In both cases the German values are on a plausible level.

Im Zuge der Qualitätssicherung wurde ein Vergleich von Eingangsdaten und Inventarergebnissen auf mitteleuropäischer Ebene durchgeführt. (Nähere Angaben zur Durchführung: Siehe Kapitel 4.3.10.)

Table 5.30 vergleicht die aggregierten Emissionsfaktoren (IEF) und emissionserklärende Variablen.

Nur fünf Länder (einschließlich Deutschland) berichten das Tiergewicht, wobei der hohe dänische Wert vermutlich kein Mittelwert für alle Schweine ist, sondern das mittlere Endgewicht von Mastschweinen. Zur GE-Aufnahme finden sich sogar nur drei Angaben (Deutschland einschließlich). In beiden Fällen liegen die deutschen Werte auf einem plausiblen Niveau.

Table 5.30: Pigs, 2017, international comparison of emission explaining variables and implied emission factors for enteric fermentation (ent) and manure management (MM)

	mean animal weight kg an ⁻¹	GE intake kg pl ⁻¹ d ⁻¹	VS excretion kg pl ⁻¹ d ⁻¹	N excretion kg pl ⁻¹ a ⁻¹	IEF			
					CH ₄ , ent kg pl ⁻¹ a ⁻¹	CH ₄ , MM kg pl ⁻¹ a ⁻¹	NH ₃ direct N ₂ O (without spreading) kg pl ⁻¹ a ⁻¹	
							kg pl ⁻¹ a ⁻¹	kg pl ⁻¹ a ⁻¹
Austria	NA	NA	0.30	9.35	1.50	1.14	2.06	0.045
Belgium	64.10	NE	0.22	9.34	1.50	4.46	1.79	0.031
Czech Republic	59.00	NA	NA	14.64	1.50	6.00	2.98	0.116
Denmark ^a	113.00	39.15	0.18	7.82	1.09	3.52	1.20	0.062
France	64.43	NE	0.19	9.73	0.75	3.96	3.03	0.005
Germany	63.24	35.49	0.31	13.17	1.15	4.13	4.11	0.072
Netherlands	NE	NA	0.40	14.34	1.50	5.51	1.11	0.024
Poland	NA	n/a	0.32	10.55	1.50	1.99	2.62	0.083
Switzerland	NA	28.78	0.32	9.21	1.13	4.30	3.37	0.022
United Kingdom	NE	NE	0.25	10.29	1.50	5.20	2.67	0.175
Median			0.30	10.01	1.50	4.22	2.64	0.054
IPCC (2006)-10.15, 10.21, 10.28, 10.59, 10.80, 10.81, Western Europe, cool region, 10°C/11°C ^b		Equations 10.3-10.16	breeding swine 0.46 / market swine 0.30	breeding swine 30.35 / market swine 9.31	1.5	breeding swine 9 to 10 / market swine 6		
EMEP (2016)-3B-16, 29				sows 34.5 / fatten- ers 12.1			sows 9 to 15 ^c / fatteners 4 to 5.4	

Sources: Germany: Submission 2020; all other countries: UNFCCC (2019), CRF Tables; CEIP (2019), NFR

n/a, NA, NE: No data available for different reasons

^a Denmark without Greenland and Faroe Island

^b IPCC N excretions: calculated using IPCC default animal weights (50 kg for fatteners and 198 kg for sows)

^c outdoors: 0 (according to EMEP (2016)-3B-16)

The German VS excretions are just below the median. Germany's N excretions, on the other hand, are about a third above the median.

All countries except Denmark, Germany, France and Switzerland use the IPCC default value for the CH₄ IEF for enteric fermentation. Those four countries that calculate their IEF values obtain results that are lower than the IPCC default, the French value, however, being very low. The German IEF is supported by the relatively similar results reported by Denmark and Switzerland.

The German IEF for CH₄ from manure management is relatively close to the median.

Die deutschen VS-Ausscheidungen liegen knapp unter dem Median. Die deutschen N-Ausscheidungen liegen dagegen um rund ein Drittel über dem Median.

Beim IEF für CH₄ aus der Verdauung verwenden alle Länder außer Dänemark, Deutschland, Frankreich und der Schweiz den IPCC-Defaultwert. Die vier Länder, die den IEF berechnen, kommen zu Ergebnissen, die niedriger sind als der IPCC-Defaultwert, wobei Frankreich allerdings einen sehr niedrigen Wert berichtet. Der deutsche Wert wird dadurch gestützt, dass Dänemark und die Schweiz zu relativ ähnlichen Ergebnissen kommen.

Der deutsche IEF für CH₄ aus dem Wirtschaftsdünger-Management liegt relativ nahe am Median.

For the NH₃ IEF (manure management without spreading) Germany reports the highest value (55% above the median). This is essentially a consequence of the comparatively high N excretions (see above).

For direct N₂O from manure management, the reported data scatter widely. The German IEF is 34 % above the median, which is in line with Denmark and Poland.

Table 5.31 shows the IEFs of TSP, PM and NMVOC. For TSP and PM₁₀, the German IEF values are 31 % and 8% higher, respectively, than the median. The German PM_{2.5} IEF is 1 % below the median. As to NMVOC, the German value is 4 % higher than the median.

Beim NH₃-IEF für das Wirtschaftsdünger-Management (ohne Ausbringung) berichtet Deutschland den höchsten Wert (55 % über dem Median). Dies ist im Wesentlichen eine Folge der vergleichsweise hohen N-Ausscheidungen (siehe oben).

Für direktes N₂O aus dem Wirtschaftsdünger-Management zeigt sich eine große Streuung. Der deutsche IEF liegt 34 % über dem Median, größtenordnungsmäßig passend zu Dänemark und Polen.

Table 5.31 zeigt die IEFs von TSP, PM und NMVOC. Für TSP und PM₁₀ liegen die deutschen IEF-Werte um 31 % bzw. 8 % über dem jeweiligen Median. Der deutsche PM_{2.5}-IEF liegt um 1 % unter dem Median. Bei NMVOC liegt Deutschland 4 % über dem Median.

Table 5.31: Pigs, 2017, international comparison of implied emission factors of TSP, PM and NMVOC

	IEF _{TSP} kg pl ⁻¹ a ⁻¹	IEF _{PM10} kg pl ⁻¹ a ⁻¹	IEF _{PM2.5} kg pl ⁻¹ a ⁻¹	IEF _{NMVOC} kg pl ⁻¹ a ⁻¹
Austria	0.094	0.042	0.009	0.38
Belgium	0.639	0.094	0.006	0.62
Czech Republic	0.788	0.117	0.005	NE
Denmark ^a	0.313	0.098	0.004	0.64
France	0.571	0.254	0.048	IE
Germany	0.790	0.115	0.005	0.65
Netherlands	0.072	0.072	0.003	0.29
Poland	1.016	0.142	0.006	0.64
Switzerland	0.426	0.098	0.004	0.55
United Kingdom	0.790	0.118	0.005	0.63
Median	0.605	0.107	0.005	0.62
EMEP (2013)-3B-17, 16	0.27 to 1.05	0.05 to 0.17	0.002 to 0.01	fattening pigs 0.551 / sows 1.704

Source: Germany: Submission 2020; all other countries: CEIP (2019), NFR, calculated from original data
 IE, NE: No data available for different reasons
^a Denmark without Greenland and Faroe Island

5.7.4 References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung

Table 5.32: Pigs, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)

			from	to
Emissions	Emissionen	CH ₄ enteric fermentation	EM1004.013	
		CH ₄ manure management	EM1005.013	
		NMVOC	EM1007.013	
		NH ₃	EM1009.037	EM1009.039
		N ₂ O	EM1009.103	
		NO	EM1009.133	
		TSP	EM1010.013	
		PM ₁₀	EM1010.043	
		PM _{2.5}	EM1010.073	
Activity data	Aktivitäten		AC1005.014	
Emission factors	Emissionsfaktoren	CH ₄ enteric fermentation	IEF1004.013	
		CH ₄ manure management	IEF1005.013	
		NMVOC	IEF1007.013	
		NH ₃	IEF1009.034	IEF1009.036
		N ₂ O	IEF1009.096	
		NO	IEF1009.124	
		TSP	IEF1010.12	
		PM ₁₀	IEF1010.040	
		PM _{2.5}	IEF1010.068	
Additional information	zusätzliche Informationen		AI1005PSH.125	AI1005PSH.156
Excretion rates	Ausscheidungen	N	EXCR.061	EXCR.065

6 Small ruminants / Kleine Wiederkäuer

The term “small ruminants” comprehends sheep and goats. The inventory reports about both species separately. However, calculation procedures are similar.

Die Gruppe der kleinen Wiederkäuer umfasst Schafe und Ziegen. Im Inventar wird über beide Arten getrennt berichtet; die Rechenverfahren sind ähnlich.

6.1 Animal numbers / Tierzahlen

6.1.1 Formation of subcategories / Untergliederung in Subkategorien

The inventory goes along with the recommendation of IPCC(2006)-10.8 to form subcategories, wherever possible and useful. Thus, sheep are subdivided into the categories “adult sheep” (Chapter 6.3) and “lambs” (Chapter 6.4) which reflects different excretion rates. For goats (Chapter 6.6), such a subdivision is not possible because only numbers of the total population are available.

The results of adult sheep and lambs are aggregated into results for the overall “sheep” category to be reported (Chapter 6.5).

Das Inventar folgt der Empfehlung, Subkategorien einzuführen, wo möglich und dienlich (IPCC(2006)-10.8). Für Schafe erfolgt wegen der unterschiedlichen Höhe der Ausscheidungen eine Unterteilung in die Kategorien „erwachsene Schafe“ (Kapitel 6.3) und „Lämmer“ (Kapitel 6.4). Für Ziegen (Kapitel 6.6) ist eine solche Unterteilung nicht möglich, da nur Zahlen zur Gesamtpopulation verfügbar sind.

Die Ergebnisse von erwachsenen Schafen und Lämmern werden zu Ergebnisse für die zu berichtende Gesamtkategorie „Schafe“ aggregiert (Kapitel 6.5).

6.1.1.1 Sheep numbers / Schafzahlen

For sheep and separately for lambs and ewes the Federal Statistical Office provided animal numbers for June in the years 1990 to 1998. From 1999 until 2009 the sheep numbers counted and published by the Federal Statistical Office for May are used for the emission calculations (STATBA FS3 R4.1). For 2010 the sheep numbers published by the Federal Statistical Office were counted at the reference date 1 March, for the subsequent years at the reference date 3 November. At these reference dates the numbers of lambs are much smaller in comparison to the ewes numbers than at the reference dates in May or June. Hence, the lamb numbers have been corrected for the use in the inventory.

The correction method is based on the fact that for the years between 1990 and 2009 the ratios of animal numbers, i. e. lambs/sheep and ewes/sheep, were almost constant with time. Averaged over the years, the national means of the lambs/sheep and ewes/sheep ratios are 37.2 % and 59.6 %, respectively. These ratios are assumed to be constant as of 2010; they are used to calculate corrected numbers of lambs from the known numbers of ewes. The correction procedure is applied separately to each federal state (using the national means of the respective ratios).

Für Schafe insgesamt sowie separat für Lämmer und Mutterschafe stellte das Statistische Bundesamt für die Jahre vor 1999 Juni-Zahlen auf Länderebene bereit. Von 1999 bis 2009 wurden die vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Schafzahlen mit dem Erhebungstermin Mai verwendet (STATBA FS3 R4.1). Für 2010 beruhen die vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Schafzahlen auf dem Erhebungstermin 1. März und in den folgenden Jahren auf dem Erhebungstermin 3. November. Zu diesen Terminen werden im Vergleich zu den Mutterschafen deutlich weniger Lämmer gezählt als zu den Mai- bzw. Juni-Terminen. Daher werden die im Inventar verwendeten Schafzahlen ab 2010 korrigiert.

Die Korrektur beruht darauf, dass zwischen 1990 und 2009 sowohl das Lamm/Schaf-Tierzahlenverhältnis als auch das Mutterschaf/Schaf-Tierzahlenverhältnis nur geringfügig schwanken. Im Mittel betrug auf nationaler Ebene das Lamm/Schaf-Verhältnis 37,2 % und das Mutterschaf/Schaf-Verhältnis 59,6 %. Diese Verhältnisse wurden ab 2010 als konstant angenommen und dazu verwendet, korrigierte Tierzahlen aus der Zahl der erfassten Mutterschafe zu berechnen. Die Korrektur wird für jedes Bundesland mit den genannten mittleren Verhältniszahlen durchgeführt:

$$n_{sh} = n_{ew} / x_{ew/sh} \quad (6.1)$$

$$n_{la} = n_{sh} \cdot x_{la/sh} \quad (6.2)$$

$$n_{as} = n_{sh} - n_{la} \quad (6.3)$$

n_{sh}	total number of sheep considered in the years from 2010 onwards
n_{ew}	number of ewes in the German census in the years from 2010 onwards
$x_{ew/sh}$	ratio of ewes numbers to total sheep numbers (0,596 an an ⁻¹)
n_{la}	number of lambs in the years from 2010 onwards
$x_{la/sh}$	ratio of lambs numbers to total sheep numbers (0,372 an an ⁻¹)
n_{as}	total number of adult sheep in the years from 2010 onwards

6.1.1.2 *Goat numbers / Ziegenzahlen*

Animal numbers for goats were officially counted the first time in 2010. For the years before 2005 the data provided by BMELV (Federal Ministry of Food, Agriculture and Consumer protection) are used, the data for the years from 2005 onwards until 2010 were estimated by the Statistisches Bundesamt. For 2010 the animal numbers are used which were counted during the LZ 2010 (see Chapter 3.4.2). They are about one third lower than the animal numbers estimated for 2009 by the Statistisches Bundesamt. As communicated by the Statistisches Bundesamt (DIETERLE M, 14 July 2011) the estimates for the years before 2010 will not be corrected in order to keep data consistency with the data by Eurostat. For 2013 and 2016 there are official goat numbers (reference day: 1 March). The official goat numbers of 2010, 2013 and 2016 were used to estimate the missing goat numbers of 2011, 2012, 2014 and 2015 by linear interpolation. The 2017 goat number was estimated by extrapolation.

The goat numbers represent the total goat population. A subdivision into adult goats and goat lambs is not possible.

Tierzahlen für Ziegen wurden erstmals 2010 offiziell erfasst. Für die Jahre vor 2005 wird die offizielle Schätzung des Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (BMELV), ab 2005 die des Statistischen Bundesamtes verwendet. Für 2010 stammt die Tierzahl aus der Landwirtschaftszählung 2010 (siehe Kapitel 3.4.2). Sie ist um etwa ein Drittel kleiner als die zuletzt für 2009 durch das Statistische Bundesamt geschätzte Zahl. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte (DIETERLE M, 14.07.2011) werden die Schätzungen für die Jahre vor 2010 zur Wahrung der Konsistenz u.a. mit den Daten von Eurostat nicht revidiert. Für 2013 und 2016 liegen offiziell erhobene Ziegenzahlen des Statistischen Bundesamtes vor (Stichtag 1. März). Die amtlichen Ziegenzahlen für 2010, 2013 und 2016 wurden dazu verwendet, die nicht verfügbaren Zahlen von 2011, 2012, 2014 und 2015 durch lineare Interpolation zu schätzen. Für Ziegenzahl für 2017 wurde durch Extrapolation geschätzt.

Die Ziegenzahlen umfassen die Gesamtpopulation. Eine Aufteilung in erwachsene Ziegen und Ziegenlämmer ist nicht möglich.

6.1.2 *Uncertainties / Unsicherheiten*

According to German official statistics, for some federal states the standard error of the sheep numbers is in the range up to 2 %, for other federal states up to 5 %. It is assumed that the correction of animal numbers does not enhance the error. Hence, the inventory generally assumes a standard error of 5 %. Accordingly, half the 95 % confidence interval amounts to 10 %. A normal distribution is assumed.

The goat numbers are reported as ten thousands of animals, which in itself leads to a standard error of about 7 %. In order to account for possible further uncertainties the inventory assumes a standard error of 10 %. In accordance half the 95 % confidence interval is fixed to 20 % (normal distribution).

Für einige Bundesländer wird der Standardfehler der Schafzahlen durch das Statistische Bundesamt mit „bis unter 2 %“ beziffert, für andere Bundesländer mit „bis unter 5 %“. Das Inventar nimmt einheitlich einen Standardfehler von 5 % an. Es wird angenommen, dass sich der Fehler durch die Korrektur der Tierzahlen nicht vergrößert. Dementsprechend wird das halbe 95 %-Konfidenzintervall mit 10 % angesetzt. Es wird Normalverteilung der Unsicherheit angenommen.

Die Angaben zu den Ziegenzahlen erfolgen in zehntausenden Tieren. Hieraus folgt bereits ein Standardfehler von ca. 7 %. Wegen möglicher weiterer Unsicherheiten nimmt das Inventar von 10 % an. Dementsprechend wird das halbe 95 %-Konfidenzintervall mit 20 % angesetzt (bei normaler Verteilung).

6.2 *Parameters common to all small ruminants / Gemeinsame Parameter für alle kleinen Wiederkäuer*

6.2.1 *Methane from manure management / Methan aus dem Wirtschaftsdünger-Management*

In the emission inventory, the formation of methane from manure storage is characterized by two parameters (see Chapter 3.3.4.1): The animal-specific maximum methane formation capacity B_0 and the storage-specific methane conversion factor MCF where MCF gives the fraction of B_0 that is typically produced in the various storage systems.

For the values of B_0 and MCF see Table 6.1. Note the different B_0 values for sheep and goats.

Die Entstehung von Methan aus der Wirtschaftsdüngerlagerung wird im Emissionsinventar durch zwei Parameter charakterisiert (siehe Kapitel 3.3.4.1): Die tier-spezifische maximale Methan-Bildungsrate B_0 und den lagerspezifischen Methanumwandlungsfaktor MCF , der angibt, welcher Anteil von B_0 in den verschiedenen Lagerungssystemen tatsächlich produziert wird.

Zu den Werten siehe Table 6.1. Zu beachten ist, dass für Schafe und Ziegen unterschiedliche B_0 -Werte gelten.

Table 6.1: Sheep and goats, maximum methane producing capacity (B_o) and methane conversion factors (MCF) for German temperature conditions

B_o of sheep	B_o von Schafen	0.19 ^b	m ³ CH ₄ (kg VS) ⁻¹
B_o of goats	B_o von Ziegen	0.18 ^b	m ³ CH ₄ (kg VS) ⁻¹
MCF storage type solid manure (heap)	MCF Lagerungsart Festmist (Misthaufen)	0.02 ^a	m ³ m ⁻³
MCF pasture	MCF Weide	0.01 ^a	m ³ m ⁻³

^a IPCC(2006)-10.44 ff; ^b IPCC(2006)-10.82

German data on the uncertainty of CH₄ emissions from manure management of sheep and goats do not exist. With respect to the uncertainty of the emission factor calculated it has to be considered that the calculation procedure relies on default VS excretion, which is assumed to be a Tier 1 approach rather than a Tier 2 approach. IPCC(2006)-10.48 estimates the uncertainty of Tier 1 approaches to be 30 %. This value is, according to the definition of uncertainty used in Chapter 3 in IPCC (2006a), interpreted as half the 95 % confidence interval. A normal distribution is assumed.

Deutsche Zahlen zur Unsicherheit der CH₄-Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management von Schafen und Ziegen liegen nicht vor. Hinsichtlich der Unsicherheit des berechneten Emissionsfaktors ist zu berücksichtigen, dass das Rechenverfahren Default-VS-Ausscheidungen verwendet. Es ist also eher ein Tier-1- als ein Tier-2-Verfahren. IPCC(2006)-10.48 schätzt die Unsicherheit bei Anwendung von Tier-1-Verfahren auf 30 %. Dieser Wert wird im Sinne von IPCC (2006a), Kapitel 3, als halbes 95 %-Konfidenzintervall interpretiert. Es wird Normalverteilung angenommen.

6.2.2 Emissions of nitrogen species / Emissionen von Stickstoff-Spezies

The emission calculations are carried out separately for adult sheep, lambs and goats (see Chapters 6.3, 6.4 and 6.6). However, the same emission factors are used.

According to EMEP (2016)-3B-29, Table 3.9, the NH₃ emission factors for housing and storage are 0.22 kg kg⁻¹ and 0.28 kg kg⁻¹, respectively. They are to be multiplied with the amount of TAN present. The N₂O-N emission factor for “housing + storage” is 0.005 kg kg⁻¹ (IPCC (2006)-10.62). According to Chapter 3.3.4.3.5, the emission factors for NO-N and N₂ are calculated as 0.0005 and 0.015 kg kg⁻¹, respectively. The emission factors for N₂O-N, NO-N and N₂ are multiplied with the sum of nitrogen excreted and N input with bedding material.

For the origin of the data on the frequencies of the different techniques of solid manure spreading see Chapter 3.4.3. The associated emission factors are those used for cattle and pigs, see Chapters 4.2.2.3 and 5.2.2.3.

For grazing the NH₃ emission factor is 0.09 kg kg⁻¹, related to TAN excreted (EMEP (2016)-3B-29, Table 3.9). For N₂O and NO emissions from animal excreta dropped during grazing see Chapter 11.5.

For the uncertainties of the emission factors see Chapter 4.2.2.4 and 11.2.2.

The uncertainty of N excretion is discussed in Chapter 14.4.1. For the uncertainty of the amount of N spreaded see Chapter 11.2.1.

Indirect N₂O emissions from manure management (housing/storage without spreading) are calculated according to Chapter 3.3.4.3.6. See Chapter 3.3.4.3.6 also for the uncertainties of activity data and emission factor.

(Indirect N₂O emissions from agricultural soils after spreading of manures or digestated manures are reported in Sector 3.D. For the calculation of these emissions see Chapter 12.)

Die Emissionsberechnungen erfolgen für erwachsene Schafe, Lämmer und Ziegen getrennt (siehe Kapitel 6.3, 6.4 und 6.6), aber mit den gleichen Emissionsfaktoren.

Nach EMEP (2016)-3B-29, Table 3.9, betragen die auf TAN bezogenen NH₃-Emissionsfaktoren 0,22 kg kg⁻¹ für den Stall und 0,28 kg kg⁻¹ für das Lager. Der N₂O-N Emissionsfaktor für Stall und Lager zusammen beträgt 0,005 kg kg⁻¹ (IPCC (2006)-10.62). Nach Kapitel 3.3.4.3.5 berechnen sich die Emissionsfaktoren für NO-N und N₂ zu 0,0005 bzw. 0,015 kg kg⁻¹. Die Emissionsfaktoren für N₂O-N, NO-N und N₂ werden mit der Summe aus ausgeschiedenem und durch Einstreu eingebrachtem N multipliziert.

Zur Herkunft der Daten über die Häufigkeiten den verschiedenen Festmist-Ausbringungstechniken siehe Kapitel 3.4.3. Als Emissionsfaktoren werden die gleichen Werte wie für Rinder und Schweine verwendet, siehe Kapitel 4.2.2.3 und 5.2.2.3.

Für Weidegang beträgt der NH₃-Emissionsfaktor 0,09 kg kg⁻¹ bezogen auf TAN (EMEP (2016)-3B-29, Table 3.9). Zur Berechnung der N₂O- und NO-Emissionen infolge von Weidegang siehe Kapitel 11.5.

Zu den Unsicherheiten der Emissionsfaktoren siehe Kapitel 4.2.2.4 und 11.2.2.

Die Unsicherheit der N-Ausscheidung wird in Kapitel 14.4.1 diskutiert. Zur Unsicherheit der zur Ausbringung kommenden N-Menge siehe Kapitel 11.2.1.

Indirekte N₂O-Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management (Stall/Lager ohne Ausbringung) werden nach Kapitel 3.3.4.3.6 berechnet. Siehe dort auch wegen der Unsicherheiten von Aktivitätswert und Emissionsfaktor.

(Indirekte N₂O-Emissionen als Folge der Ausbringung von Wirtschaftsdüngern und Wirtschaftsdünger-Gärresten werden im Sektor 3.D berichtet. Zur Berechnung siehe Kapitel 12.)

6.3 Adult sheep / Erwachsene Schafe

The inventory category of adult sheep comprises all sheep older than one year.

The emissions are calculated according to the methods compiled in Table 6.2.

For the definition of the methods see Chapter 3.2.3.

Im Inventar gelten alle Schafe ab einem Alter von einem Jahr als erwachsene Schafe.

Die Berechnung der Emissionen erfolgt nach den in Table 6.2 zusammengestellten Methoden.

Zur Methodendefinition siehe Kapitel 3.2.3.

Table 6.2: Adult sheep, calculation methods applied

Species	Origin	Tier	Method applied
CH ₄	enteric fermentation	1	IPCC / national
CH ₄	manure management	2	IPCC / national
NM VOC	manure management	1	EMEP
NH ₃	manure management	2	EMEP / national
N ₂ O, NO, N ₂	manure management	2	IPCC / national
TSP, PM ₁₀ , PM _{2.5}	manure management	2	EMEP

6.3.1 Animal weights / Tiergewichte

Due to the simple methodology used, sheep weights are not needed for emission calculations. However, information on weights of lambs and adult sheep is needed for the estimation of the CH₄ emission factor for the enteric fermentation of lambs. In addition, the CRF tables require a mean sheep weight to be reported. This mean sheep weight is calculated from the weights of lambs and adult sheep, see Chapter 6.5.1.

Weights for adult sheep are given in the German agricultural literature, e. g. 40 – 70 kg for sheep used for breeding (KTBL, 2004, pg. 423), and 70 kg for ewes (KTBL, 2004, pg. 425). Given these values, the IPCC (2006)-10.28 default sheep weight of 65 kg for developed countries is adopted for adult German sheep.

Schafgewichte werden in der verwendeten einfachen Emissionsberechnungsmethodik nicht benötigt. Allerdings werden für die Festlegung des Emissionsfaktors für CH₄ aus der Verdauung Informationen über das Gewicht von erwachsenen Schafen und Lämmern benötigt. Überdies erfordern die CRF-Tabellen die Angabe eines mittleren Schafgewichtes, das aus der Mittelung der Gewichte von erwachsenen Schafen und Lämmern berechnet wird, siehe Kapitel 6.5.1.

Gewichte erwachsener Schafe finden sich in der landwirtschaftlichen Literatur, z. B. 40 – 70 kg für Schafe für die Zucht (KTBL, 2004, S. 423), und 70 kg für Mutterschafe (KTBL, 2004, S. 425). In Anbetracht dieser Werte wird das in IPCC (2006)-10.28 angegebene Schafgewicht von 65 kg für erwachsene Schafe übernommen.

6.3.2 Methane from enteric fermentation / Methan aus der Verdauung

Methane emissions from enteric fermentation are calculated according to the Tier 1 approach (Chapter 3.3.2).

There is no national emission factor. The IPCC Tier 1 default emission factor of 8 kg CH₄ per place and year is given along with an animal weight of 65 kg. This animal weight corresponds to animal weights given in the German agricultural literature for adult sheep, see Chapter 6.3.1. Hence the German inventory takes the emission factor of 8 kg CH₄ per place and year to be valid for adult German sheep.

According to IPCC(2006)-10.33, the uncertainty of emission factors based on Tier 1 methodology is unlikely to be more accurate than ± 30 % and may be uncertain to ± 50 %. The inventory assumes an uncertainty of 30 %. This value is, according to the definition of uncertainty used in Chapter 3 in IPCC (2006a), interpreted as half the 95 % confidence interval. A normal distribution is assumed.

Die Methanemissionen aus der Verdauung werden nach dem Tier-1-Verfahren (siehe Kapitel 3.3.2) berechnet.

Es gibt keinen nationalen Emissionsfaktor. Der IPCC-Tier-1 Default-Emissionsfaktor von 8 kg CH₄ pro Platz und Jahr ist zusammen mit einem Tiergewicht von 65 kg gegeben. Dieses Tiergewicht entspricht vom Niveau her den in der deutschen landwirtschaftlichen Literatur gegebenen Gewichtsbereich erwachsener Tiere, siehe Kapitel 6.3.1. Daher wird dieser Emissionsfaktor im deutschen Inventar für erwachsene Schafe angewendet.

Nach IPCC(2006)-10.33 ist die Unsicherheit von Emissionsfaktoren, die auf Tier-1-Verfahren beruhen, wahrscheinlich nicht kleiner als 30 %, wobei auch Werte bis 50 % für denkbar gehalten werden. Für das Inventar wird von 30 % ausgegangen. Dieser Wert wird im Sinne von IPCC (2006a), Kapitel 3, als halbes 95 %-Konfidenzintervall interpretiert. Es wird Normalverteilung angenommen.

6.3.3 Methane from manure management / Methan aus Wirtschaftsdünger-Management

CH₄ emissions from manure management are quantified using the Tier 2 methodology, see Chapter 3.3.4.1.

The VS excretion of adult sheep is, according to German data, 0.53 kg VS per place and day (HAENEL und RÖSEMANN, 2018).

Methane producing capacity B_0 and the Methane conversion factors MCF for the relevant storage systems are provided in Chapter 6.2.1. See also Chapter 6.2.1 for the uncertainty of CH₄ emissions from manure management.

CH₄ aus dem Wirtschaftsdünger-Management wird mit einem Tier-2-Verfahren berechnet, siehe Kapitel 3.3.4.1.

Die VS-Ausscheidung erwachsener Schafe wird nach deutschen Daten mit 0,53 kg VS pro Platz und Tag angesetzt (HAENEL und RÖSEMANN, 2018).

Zur maximalen Methan-Freisetzungskapazität B_0 und den Methanumwandlungsfaktoren MCF für die relevanten Lagerverfahren sowie die Unsicherheit der der CH₄-Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management siehe Kapitel 6.2.1.

6.3.4 NMVOC emissions / NMVOC-Emissionen

The calculation of the NMVOC emissions of all animals except cattle are calculated with a Tier 1 methodology, see Chapters 3.3.4.2.1 and 3.3.4.2.3.

Agricultural NMVOC emissions are reported, but are neglected regarding the NEC emission threshold, see Chapter 3.3.4.2.

Die NMVOC-Emissionen von allen Tieren außer den Rindern werden mit einer Tier-1-Methode berechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.1 und 3.3.4.2.3.

Landwirtschaftliche NMVOC-Emissionen werden zwar berichtet, aber bzgl. der NEC-Emissionsobergrenze nicht angerechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.

6.3.5 Emissions of nitrogen species / Emissionen von Stickstoff-Spezies

In Germany, an N excretion of 10 kg pl⁻¹ a⁻¹ is assumed for a ewe without lambs (KTBL, 2004, pg. 427). This value is also used for the other adult sheep.

A fraction of 50 % of the nitrogen excreted is assumed to be TAN (EMEP (2016)-3B-29, Table 3.9).

For adult sheep, an amount of straw fresh matter of 0.4 kg pl⁻¹ d⁻¹ is used (VEREINIGUNG DEUTSCHER LANDESSCHAFZUCHTVERBÄNDE, VDL, Landesverband Hessen, private communication Rolf Lückhof). This corresponds to $2,0 \cdot 10^{-3}$ kg N (pl · a)⁻¹ and $1,0 \cdot 10^{-3}$ kg TAN (pl · a)⁻¹. As no bedding is taken into account during the grazing period, the annual amount of bedding actually used depends on the duration of the grazing period.

For the properties of straw and the mineralization of organic N to TAN see Chapter 3.3.4.3.2.

For the emission factors for NH₃, N₂O, NO and N₂ including the indirect N₂O emissions from Manure Management see Chapter 6.2.2.

NO emissions from manure management are reported (as NO_x), but are neglected regarding the NEC emission threshold, see Chapter 3.3.4.2.

Für ein Mutterschaf ohne Lämmer wird in Deutschland eine N-Ausscheidung von 10 kg pl⁻¹ a⁻¹ angesetzt (KTBL, 2004, S. 427). Dieser Wert wird auch für alle anderen erwachsenen Schafe verwendet.

Der TAN-Gehalt wird mit 50 % angenommen (EMEP (2016)-3B-29, Table 3.9).

Die tägliche Einstreuemenge wird für erwachsene Schafe mit 0,4 kg pl⁻¹ d⁻¹ Strohfrischmasse angesetzt (VEREINIGUNG DEUTSCHER LANDESSCHAFZUCHTVERBÄNDE, VDL, Landesverband Hessen, Mitteilung Rolf Lückhof). Dies entspricht $2,0 \cdot 10^{-3}$ kg N (pl · a)⁻¹ und $1,0 \cdot 10^{-3}$ kg TAN (pl · a)⁻¹. Da für Weidezeiten keine Einstreu berücksichtigt wird, hängt die im Inventar für das gesamte Jahr verwendete Einstreuemenge von der Weidedauer ab.

Zu den Eigenschaften von Stroh und der Mineralisierung von organisch gebundenem N zu TAN wird auf Kapitel 3.3.4.3.2 verwiesen.

Zu den Emissionsfaktoren für NH₃, N₂O, NO und N₂ einschließlich der indirekten N₂O-Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management siehe Kapitel 6.2.2.

NO aus dem Wirtschaftsdünger-Management wird berichtet (als NO_x), bzgl. der NEC-Emissionsobergrenze aber nicht angerechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.

6.3.6 Emissions of particulate matter / Partikelemissionen

The method to calculate particle emissions is described in Chapter 3.3.4.5.

The emission factors provided by von EMEP (2016)-3B-19, Table 3.5, are different from the emission factors given in EMEP(2013)-3B-53, Table A3-4, only by rounding to two decimals. In order to avoid an apparent change in emissions from one emission reporting submission to the next, the original emission factors provided by EMEP(2013)-3B-53, Table A3-4, were kept, see Table 6.3.

Zur Berechnungsmethode für Partikelemissionen wird auf Kapitel 3.3.4.5 verwiesen.

Die von EMEP (2016)-3B-19, Table 3.5, angegebenen Emissionsfaktoren unterscheiden sich von den Emissionsfaktoren aus EMEP(2013)-3B-53, Table A3-4, nur durch Rundung auf zwei Dezimalstellen. Um aber eine scheinbare Emissionsänderung von einer Berichterstattung zur nächsten nur wegen Rundung der Emissionsfaktoren zu vermeiden, werden die ursprünglichen Emissionsfaktoren aus EMEP(2013)-3B-53, Table A3-4, beibehalten, s. Table 6.3.

For the uncertainty of the emission factors see Chapter 3.3.4.5.

Zur Unsicherheit der Emissionsfaktoren siehe Kapitel 3.3.4.5.

Table 6.3: Adult sheep, emission factors for particle emissions from housing

Housing type	Haltungssystem	Emission factor for TSP kg pl ⁻¹ a ⁻¹	Emission factor for PM ₁₀ kg pl ⁻¹ a ⁻¹	Emission factor for PM _{2.5} kg pl ⁻¹ a ⁻¹
straw based	strohbasierend	0.139	0.056	0.017

Source: see text

6.3.7 References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung

Table 6.4: Adult sheep, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)

			from	To
Emissions	Emissionen	CH ₄ enteric fermentation	EM1004.014	
		CH ₄ manure management	EM1005.014	
		NM VOC	EM1007.014	
		NH ₃	EM1009.040	EM1009.042
		N ₂ O	EM1009.104	
		NO	EM1009.134	
		TSP	EM1010.014	
		PM ₁₀	EM1010.044	
		PM _{2.5}	EM1010.074	
Activity data	Aktivitäten		AC1005.017	
Emission factors	Emissionsfaktoren	CH ₄ enteric fermentation	IEF1004.014	
		CH ₄ manure management	IEF1005.014	
		NM VOC	IEF1007.014	
		NH ₃	IEF1009.037	IEF1009.039
		N ₂ O	IEF1009.097	
		NO	IEF1009.125	
		TSP	IEF1010.013	
		PM ₁₀	IEF1010.041	
		PM _{2.5}	IEF1010.069	
Additional information	zusätzliche Informationen		AI1005PSH.157	AI1005PSH.168
Excretion rates	Ausscheidungen	N	EXCR.066	EXCR.068

6.4 Lambs / Lämmer

The inventory category of lambs comprises all sheep younger than one year.

The emissions are calculated according to the methods compiled in Table 6.5.

For the definition of the methods see Chapter 3.2.3.

Im Inventar gelten alle Schafe bis zu einem Alter von einem Jahr als Lämmer.

Die Berechnung der Emissionen erfolgt nach den in Table 6.5 zusammengestellten Methoden.

Zur Methodendefinition siehe Kapitel 3.2.3.

Table 6.5: Lambs, calculation methods applied

Species	Origin	Tier	Method applied
CH ₄	enteric fermentation	1	IPCC / national
CH ₄	manure management	2	IPCC / national
NM VOC	manure management	1	EMEP
NH ₃	manure management	2	EMEP / national
N ₂ O, NO, N ₂	manure management	2	IPCC / national
TSP, PM ₁₀ , PM _{2.5}	manure management	2	EMEP

6.4.1 Animal weights / Tiergewichte

Due to the simple methodology used, sheep weights are not needed for emission calculations. However, information on weights of lambs and adult sheep is needed for the estimation of the CH₄ emission factor for the enteric fermentation of lambs. In addition, the CRF tables require a mean sheep weight to be reported. This mean sheep weight is calculated from the weights of lambs and adult sheep, see Chapter 6.5.1.

The inventory assumes a birthweight of 5 kg (4.5 to 5.5 kg according to KOCH & LANDFRIED, 2009, and KIRCHGESSNER et al., 2008, pg. 516).

Fast fattening of lambs takes 3 to 4 months (KIRCHGESSNER et al., 2008, pg. 527), while KOCH & LANDFRIED (2009) state 4 to 5 months. However, there is also the possibility of a prolonged fattening of up to 7 months (KIRCHGESSNER et al., 2008, pg. 527, and KTBL 2004, pg. 420). The emission calculations are based on a time span of 6 months.

According to KTBL (2004), pg. 420, the final weight of lambs varies between 40 and 45 kg (see also JILG, 2009) with 45 kg being the final weight in the less frequently used extensive pasturing and 42 kg being the final weight in most of the other husbandry systems. Hence the adoption of a final weight of 42 kg seems appropriate.

In order to enable the estimation of an emission factor for methane from enteric fermentation (see Chapter 6.4.2) additional information is needed: KTBL (2004), pg. 420, states that the daily growth varies between 200 g d⁻¹ for extensive pasturing and 400 g d⁻¹ during fattening in the house. These growth rates apply to the first weeks after birth and then decrease. This can be inferred from KOCH & LANDFRIED (2009) who state that lambs after five weeks reach thrice their birth weight, which means, based on a birth weight of 5 kg, a growth of 2 kg/week in the first weeks or 286 g/d.

Schafgewichte werden in der verwendeten einfachen Emissionsberechnungsmethodik nicht benötigt. Allerdings werden für die Festlegung des Emissionsfaktors für CH₄ aus der Verdauung Informationen über das Gewicht von erwachsenen Schafen und Lämmern benötigt. Überdies erfordern die CRF-Tabellen die Angabe eines mittleren Schafgewichtes, das aus der Mittelung der Gewichte von erwachsenen Schafen und Lämmern berechnet wird, siehe Kapitel 6.5.1.

Das Inventar geht von einem Geburtsgewicht von 5 kg aus (4,5 bis 5,5 kg laut KOCH & LANDFRIED, 2009, und KIRCHGESSNER et al., 2008, S. 516).

Die schnelle Lämmermast dauert 3 bis 4 Monate (KIRCHGESSNER et al., 2008, S. 527), während KOCH & LANDFRIED (2009) 4 bis 5 Monate angeben. Zudem gibt es noch die Möglichkeit der Langmast von bis zu 7 Monaten (KIRCHGESSNER et al., 2008, S. 527, und KTBL 2004, S. 420). Die Emissionsberechnungen beruhen auf einer Zeitspanne von 6 Monaten.

Nach KTBL (2004), S. 420, variiert das Endgewicht von Lämmern zwischen 40 und 45 kg (siehe auch JILG, 2009), wobei 45 kg das Endgewicht für die weniger genutzte extensive Weidehaltung und 42 kg das Endgewicht in den meisten anderen Haltungsverfahren sind. Die Annahme eines Endgewichtes von 42 kg scheint daher angemessen.

Für die Ableitung eines Emissionsfaktors für Methan aus der Verdauung (siehe Kapitel 6.4.2) werden weitere Angaben benötigt: laut KTBL (2004), S. 420, liegt die tägliche Zuwachsrate zwischen 200 g d⁻¹ für extensive Weidehaltung und 400 g d⁻¹ während der Mast im Stall. Diese Zuwachsraten gelten für die ersten Lebenswochen; danach nehmen sie ab. Dies geht aus KOCH & LANDFRIED (2009) hervor. Diese Autoren stellen fest, dass Lämmer nach fünf Lebenswochen das Dreifache des Geburtsgewichtes erreichen. Dies bedeutet bei einem Geburtsgewicht von 5 kg einen Zuwachs von 2 kg in den ersten Wochen (oder 286 g pro Tag).

6.4.2 Methane from enteric fermentation / Methan aus der Verdauung

Methane emissions from enteric fermentation are calculated according to the Tier 1 approach (Chapter 3.3.2). According to RÖSEMANN et al. (2017), Chapter 6.4.2, the emission factor is $3.6 \text{ kg CH}_4 (\text{pl} \cdot \text{a})^{-1}$.

According to IPCC(2006)-10.33, the uncertainty of emission factors based on Tier 1 methodology is unlikely to be more accurate than $\pm 30 \%$ and may be uncertain to $\pm 50 \%$. The inventory assumes an uncertainty of 30% . This value is, according to the definition of uncertainty used in Chapter 3 in IPCC (2006a), interpreted as half the 95% confidence interval. A normal distribution is assumed.

Die Methanemissionen aus der Verdauung werden nach dem Tier-1-Verfahren (siehe Kapitel 3.3.2) berechnet. Der Emissionsfaktor wird nach RÖSEMANN et al. (2017), Kapitel 6.4.2, mit $3,6 \text{ kg CH}_4 (\text{pl} \cdot \text{a})^{-1}$ angesetzt.

Nach IPCC(2006)-10.33 ist die Unsicherheit von Emissionsfaktoren, die auf Tier-1-Verfahren beruhen, wahrscheinlich nicht kleiner als 30% , wobei auch Werte bis 50% für denkbar gehalten werden. Für das Inventar wird von 30% ausgegangen. Dieser Wert wird im Sinne von IPCC (2006a), Kapitel 3, als halbes 95% -Konfidenzintervall interpretiert. Es wird Normalverteilung angenommen.

6.4.3 Methane from manure management / Methan aus Wirtschaftsdünger-Management

CH_4 emissions from manure management are quantified using the Tier 2 methodology, see Chapter 3.3.4.1.

The VS excretion of lambs is, according to German data, 0.21 kg VS per place and day (HAENEL and RÖSEMANN, 2018).

Methane producing capacity B_0 and the Methane conversion factors MCF for the relevant storage systems are provided in Chapter 6.2.1. See also Chapter 6.2.1 for the uncertainty of CH_4 emissions from manure management.

Zur Berechnung der CH_4 -Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management wird das Tier-2-Verfahren verwendet, siehe Kapitel 3.3.4.1.

Die VS-Ausscheidung von Lämmern wird nach deutschen Daten mit $0,21 \text{ kg VS}$ pro Platz und Tag angesetzt (HAENEL und RÖSEMANN, 2018).

Zur maximalen Methan-Freisetzungskapazität B_0 und den Methanumwandlungsfaktoren MCF für die relevanten Lagerverfahren sowie die Unsicherheit der CH_4 -Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management siehe Kapitel 6.2.1.

6.4.4 NMVOC emissions / NMVOC-Emissionen

The calculation of the NMVOC emissions of all animals except cattle are calculated with a Tier 1 methodology, see Chapters 3.3.4.2.1 and 3.3.4.2.3.

Agricultural NMVOC emissions are reported, but are neglected regarding the NEC emission threshold, see Chapter 3.3.4.2.

Die NMVOC-Emissionen von allen Tieren außer den Rindern werden mit einer Tier-1-Methode berechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.1 und 3.3.4.2.3.

Landwirtschaftliche NMVOC-Emissionen werden zwar berichtet, aber bzgl. der NEC-Emissionsobergrenze nicht angerechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.

6.4.5 Emissions of nitrogen species / Emissionen von Stickstoff-Spezies

According to KTBL (2004, pg. 227) lambs fattened in the house excrete $3 \text{ kg N} (\text{pl} \cdot \text{a})^{-1}$, while grazing lambs excrete $5 \text{ kg N} (\text{pl} \cdot \text{a})^{-1}$. The inventory uses the mean of these data ($4 \text{ kg N} (\text{pl} \cdot \text{a})^{-1}$).

50% of the N excreted is assumed to be TAN (EMEP (2016)-3B-29, Table 3.9).

For lambs, an amount of straw fresh matter of $0.16 \text{ kg pl}^{-1} \text{ d}^{-1}$ is used (Vereinigung deutscher Landesschafzuchtverbände, VDL, Landesverband Hessen, private communication Rolf Lückhof). This corresponds to $0.8 \cdot 10^{-3} \text{ kg N} (\text{pl} \cdot \text{a})^{-1}$ and $0.4 \cdot 10^{-3} \text{ kg TAN} (\text{pl} \cdot \text{a})^{-1}$.

For the properties of straw and the mineralization of organic N to TAN see Chapter 3.3.4.3.2.

For the emission factors for NH_3 , N_2O , NO and N_2 including the indirect N_2O emissions from Manure Management see Chapter 6.2.2.

NO emissions from manure management are reported (as NO_x), but are neglected regarding the NEC emission threshold, see Chapter 3.3.4.2.

Nach KTBL (2004), S. 427, scheiden Lämmer in Intensivmast $3 \text{ kg N} (\text{pl} \cdot \text{a})^{-1}$ aus, Lämmer mit Weidemast $5 \text{ kg N} (\text{pl} \cdot \text{a})^{-1}$. Das Inventar rechnet mit einer mittleren Ausscheidungsrate von $4 \text{ kg N} (\text{pl} \cdot \text{a})^{-1}$.

50% der N -Ausscheidungen werden als TAN angesehen (EMEP (2016)-3B-29, Table 3.9).

Die tägliche Einstreuemenge wird für Lämmer mit $0,16 \text{ kg pl}^{-1} \text{ d}^{-1}$ Strohfrischmasse angesetzt (Vereinigung deutscher Landesschafzuchtverbände, VDL, Landesverband Hessen, Privatmitteilung Rolf Lückhof). Dies entspricht $0,8 \cdot 10^{-3} \text{ kg N} (\text{pl} \cdot \text{a})^{-1}$ und $0,4 \cdot 10^{-3} \text{ kg TAN} (\text{pl} \cdot \text{a})^{-1}$.

Zu den Eigenschaften von Stroh und der Mineralisierung von organisch gebundenem N zu TAN wird auf Kapitel 3.3.4.3.2 verwiesen.

Zu den Emissionsfaktoren für NH_3 , N_2O , NO und N_2 einschließlich der indirekten N_2O -Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management siehe Kapitel 6.2.2.

NO aus dem Wirtschaftsdünger-Management wird berichtet (als NO_x), bzgl. der NEC-Emissionsobergrenze aber nicht angerechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.

6.4.6 Emissions of particulate matter / Partikelemissionen

The method to calculate particle emissions is described in Chapter 3.3.4.5.

Emissions of particulate matter mainly originate from feeding (EMEP (2016)-3B-6). Feed intake rates of lambs are lower than those of adult sheep. Hence the German inventory reduces for lambs the emission factors of TSP and PM given for adult sheep. Due to lack of detailed information on sheep feeding the grade of the reduction is based on the ratio of the excretions of both sheep categories (see Chapter 6.4.3). This leads for lambs to emission factors that are 40 % of the emission factors of adult sheep, see Table 6.6.

For the uncertainty of the emission factors see Chapter 3.3.4.5.

Zur Berechnungsmethode für Partikelemissionen wird auf Kapitel 3.3.4.5 verwiesen.

Partikelemissionen stammen hauptsächlich aus der Fütterung (EMEP (2016)-3B-6). Lämmer nehmen in gleicher Zeit weniger Futter auf als erwachsene Schafe. Deshalb sind im deutschen Inventar die Emissionsfaktoren für TSP und PM für Lämmer niedriger als für erwachsene Schafe. Der Reduktionsgrad gründet sich mangels detaillierter Fütterungsinformationen auf das Verhältnis der Ausscheidungen der beiden Schafkategorien (siehe Kapitel 6.4.3). Dementsprechend werden die Emissionsfaktoren für Lämmer mit 40 % der Emissionsfaktoren der erwachsenen Schafe angesetzt, siehe Table 6.6.

Zur Unsicherheit der Emissionsfaktoren siehe Kapitel 3.3.4.5.

Table 6.6: Lambs, emission factors for particle emissions from housing

Housing type	Haltungssystem	Emission factor for TSP kg pl ⁻¹ a ⁻¹	Emission factor for PM ₁₀ kg pl ⁻¹ a ⁻¹	Emission factor for PM _{2.5} kg pl ⁻¹ a ⁻¹
straw based	strohbasierend	0.056	0.022	0.007

Source: see text

6.4.7 References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung

Table 6.7: Lambs, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)

			from	To
Emissions	Emissionen	CH ₄ enteric fermentation	EM1004.015	
		CH ₄ manure management	EM1005.015	
		NM VOC	EM1007.015	
		NH ₃	EM1009.043	EM1009.045
		N ₂ O	EM1009.105	
		NO	EM1009.135	
		TSP	EM1010.015	
		PM ₁₀	EM1010.045	
		PM _{2.5}	EM1010.075	
Activity data	Aktivitäten		AC1005.018	
Emission factors	Emissionsfaktoren	CH ₄ enteric fermentation	IEF1004.015	
		CH ₄ manure management	IEF1005.015	
		NM VOC	IEF1007.015	
		NH ₃	IEF1009.040	IEF1009.042
		N ₂ O	IEF1009.098	
		NO	IEF1009.126	
		TSP	IEF1010.014	
		PM ₁₀	IEF1010.042	
		PM _{2.5}	IEF1010.070	
Additional information	zusätzliche Informationen		AI1005PSH.169	AI1005PSH.180
Excretion rates	Ausscheidungen	N	EXCR.069	EXCR.071

6.5 Sheep – collective description / Schafe - zusammenfassende Daten

6.5.1 Mean animal weight / Mittleres Tiergewicht

Due to the simple methodology used, sheep weights are not needed for emission calculations in the inventory. However, the CRF tables require a mean sheep weight to be reported. The IPCC (2006) guidelines provide two different values for the live weight of sheep: 65 kg in IPCC (2006)-10.28 (developed countries), 48.5 kg in IPCC (2006)-10.82. The value of 65 kg is assumed to be applicable to adult German sheep, see Chapter 6.3.1. In Germany the final live weight of lambs after fattening is 40 to 45 kg, see Chapter 6.4.1. Hence, the value of 48.5 kg according to IPCC (2006)-10.82 seems to be in the order of magnitude to be expected for the mean weight of all sheep. This value has been rounded to 50 kg and is reported in the CRF tables.

Schafgewichte werden wegen der verwendeten einfachen Emissionsberechnungsmethodik nicht benötigt. Die CRF-Tabellen erfordern allerdings die Angabe eines mittleren Schafgewichtes. IPCC (2006) gibt für Schafe unterschiedliche Gewichte an: 65 kg in IPCC (2006)-10.28 (developed countries), 48,5 kg in IPCC (2006)-10.82. Der Wert von 65 kg wird dabei für Deutschland als zutreffend für erwachsene Schafe angesehen, siehe Kapitel 6.3.1. Mastlämmer erreichen in Deutschland ein Lebendendgewicht von 40 bis 45 kg, siehe Kapitel 6.4.1. Der Wert von 48,5 kg in IPCC (2006)-10.82 erscheint damit in der Größenordnung, die für das mittlere Schafgewicht zu erwarten ist. Gerundet ergibt sich daraus das von Deutschland in den CRF-Tabellen angegebene mittlere Schafgewicht von 50 kg.

6.5.2 Mean excretion rates / Mittlere Ausscheidungen

The N excretions of adult sheep and lambs without lambs are calculated as a weighted mean:

$$m_{\text{excr, mean, sh}} = \frac{n_{\text{as}} \cdot m_{\text{excr, mean, as}} + n_{\text{la}} \cdot m_{\text{excr, mean, la}}}{n_{\text{as}} + n_{\text{la}}} \quad (6.4)$$

$m_{\text{excr, mean, sh}}$	amount of N excreted by sheep (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹ N)
$m_{\text{excr, mean, as}}$	amount of N excreted by adult sheep (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹ N)
n_{as}	number of adult sheep (in pl)
$m_{\text{excr, mean, la}}$	amount of N excreted by lambs (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹ N)
n_{la}	number of lambs (in pl)

Die N-Ausscheidungen von erwachsenen Schafen und Lämmern werden gewichtet gemittelt:

VS excretions are calculated by analogy.

Die VS- Ausscheidungen werden analog berechnet.

6.5.3 International comparison / Internationaler Vergleich

Within the framework of quality assurance a comparison of input data and inventory results was made on European level. (For details of the procedure of the comparison see Chapter 4.3.10.)

Table 6.8 shows a comparison of the reported data.

Not all countries report the mean weight of sheep. The German sheep weight is on the level of Belgium, the Czech Republic and the United Kingdom. The IPCC default animal weights for Tier 1 and Tier 2 methodologies are inconsistent.

With the VS excretions, likewise, only a few data are available. Germany is about the same level as Austria and Switzerland.

The N excretions show a large range. Germany is 14% below the median.

As to CH₄ from enteric fermentation some countries use the IPCC default emission factor of 8 kg pl⁻¹ a⁻¹. This Tier 1 emission factor is used by Germany as well, but only for adult sheep. For lambs the German emission factor is 3.6 kg pl⁻¹ a⁻¹. Weighted averaging over all German sheep including lambs yields an overall emission

Im Zuge der Qualitätssicherung wurde ein Vergleich von Eingangsdaten und Inventarergebnissen auf mitteleuropäischer Ebene durchgeführt. (Nähere Angaben zur Durchführung: Siehe Kapitel 4.3.10.)

Table 6.8 zeigt die Vergleichsdaten.

Nicht alle Länder berichten das mittlere Schafsgewicht. Das deutsche Schafsgewicht liegt ungefähr auf dem Niveau von Belgien, Tschechien und Vereinigtem Königreich. Die IPCC-Default-Tiergewichte für Tier-1- und Tier-2-Methodik sind inkonsistent.

Auch bei den VS-Ausscheidungen liegen nur wenige Daten vor. Deutschland liegt hier ungefähr auf dem Niveau von Österreich und der Schweiz.

Die N-Ausscheidungen streuen breit. Deutschland liegt hier 14 % unter dem Median.

Beim CH₄ aus der Verdauung verwenden einige Länder den IPCC-Default-Emissionsfaktor von 8 kg pl⁻¹ a⁻¹. Dieser Tier-1-EF wird von Deutschland ebenfalls verwendet, allerdings nur für erwachsene Schafe. Für Lämmer beträgt der deutsche EF 3,6 kg pl⁻¹ a⁻¹. Daher gehört der über Lämmer und erwachsene Schafe gemittelte

factor that is located in the lower range of the values presented in Table 6.8.

The range of the IEF values for CH₄ from manure management extends over an order of magnitude. Germany is 43% above the median.

The NH₃ emission factors provided by the Netherlands and the United Kingdom are so low that it is assumed that these values are incorrectly calculated or have erroneously been transferred into the NFR table. For the high values of Austria, France, Poland and Switzerland, the reason could be the continued inclusion of NH₃ emissions from manure spreading. There is thus no basis for a meaningful Central European comparison. The German value is higher by about 12 % than the values of Belgium and France.

The IEF for direct N₂O from manure management even extends over two orders of magnitude. There is no basis here for a meaningful Central European comparison. Germany reports the same IEF as Denmark.

deutsche EF zu den niedrigeren EFs im Bereich der Vergleichswerte.

Die IEF-Werte für CH₄ aus dem Wirtschaftsdünger-Management erstrecken sich über eine Größenordnung. Deutschland liegt 43 % über dem Median.

Beim NH₃-Emissionsfaktor geben die Niederlande und das Vereinigte Königreichs so niedrige Werte an, dass ein Fehler bei den Berechnungen oder in der Übertragung in die NFR-Tabelle vermutet werden muss. Bei den hohen Werten von Österreich, Polen und der Schweiz könnte der Grund in der fortgesetzten Einbeziehung der NH₃-Emissionen der Ausbringung liegen. Damit gibt es keine Basis für einen sinnvollen mitteleuropäischen Vergleich. Der deutsche Wert liegt etwa 12 % höher als die Werte von Belgien und Frankreich.

Der IEF für direktes N₂O aus dem Wirtschaftsdünger-Management erstreckt sich sogar über zwei Größenordnungen. Damit gibt es auch hier keine Basis für einen sinnvollen mitteleuropäischen Vergleich. Deutschland berichtet den gleichen IEF wie Dänemark.

Table 6.8: Sheep, 2017, international comparison of emission explaining variables and implied emission factors for regarding enteric fermentation (ent) and manure management (MM)

	mean animal weight kg an ⁻¹	VS excretion kg pl ⁻¹ d ⁻¹	N excretion kg pl ⁻¹ a ⁻¹	IEF			
				CH _{4, ent} kg pl ⁻¹ a ⁻¹	CH _{4, MM} kg pl ⁻¹ a ⁻¹	NH ₃ direct N ₂ O (without spreading)	
						kg pl ⁻¹ a ⁻¹	kg pl ⁻¹ a ⁻¹
Austria	NA	0.40	13.10	8.00	0.31	2.42	0.067
Belgium	50.00	NE	7.60	8.00	0.19	0.69	0.018
Czech Republic	49.00	NA	15.20	8.00	0.19	0.33	0.237
Denmark ^a	70.00	0.47	6.64	6.71	0.20	0.40	0.029
France	54.59	0.59	11.17	12.97	0.32	0.70	0.023
Germany	50.00	0.41	7.77	6.36	0.28	0.78	0.029
Netherlands	NE	NE	13.70	8.00	0.19	0.12	0.006
Poland	NA	NA	9.50	8.00	0.19	1.02	0.044
Switzerland	NA	0.40	8.48	8.65	1.24	1.29	0.084
United Kingdom	49.89	0.25	5.01	4.55	0.12	0.05	0.002
Median			8.99	8.00	0.19	0.70	0.029
IPCC (2006)-10.28, 10.40, 10.59, 10.82, Western Europe, cool region, developed countries ^b	Tier 1: 65 Tier 2: 48.5	0.40	20.17 ^c	8.00	0.19		
EMEP (2016)-3B-16, 29			15.5			0.40	

Sources: Germany: Submission 2020; all other countries: UNFCCC (2019), CRF Tables; CEIP (2019), NFR
 NA, NE: No data available for different reasons
^a Denmark without Greenland and Faroe Island
^b IPCC N excretions: calculated using the IPCC Tier 1 default animal weight (65 kg)
^c calculated for the IPCC Tier 1 animal weight of 65 kg

6.5.4 References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung

The subsequent table lists the references to information provided in the data collection (see Chapter 2.4).

Die nachfolgende Tabelle enthält Verweise auf die Informationen in der Datensammlung (siehe Kapitel 2.4).

Table 6.9: Sheep, collective description, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)

			from	to
Emissions	Emissionen	CH ₄ enteric fermentation	EM1004.016	
		CH ₄ manure management	EM1005.016	
		NMVOC	EM1007.016	
		NH ₃	EM1009.046	EM1009.048
		N ₂ O	EM1009.106	
		NO	EM1009.136	
		TSP	EM1010.016	
		PM ₁₀	EM1010.046	
		PM _{2.5}	EM1010.076	
Activity data	Aktivitäten		AC1005.019	
Emission factors	Emissionsfaktoren	CH ₄ enteric fermentation	IEF1004.016	
		CH ₄ manure management	IEF1005.016	
		NMVOC	IEF1007.016	
		NH ₃	IEF1009.043	IEF1009.045
		N ₂ O	IEF1009.099	
		NO	IEF1009.127	
		TSP	IEF1010.015	
		PM ₁₀	IEF1010.043	
		PM _{2.5}	IEF1010.071	
Additional information	zusätzliche Informationen		AI1005PSH.181	AI1005PSH.196
Excretion rates	Ausscheidungen	N	EXCR.072	EXCR.074

6.6 Goats / Ziegen

The emissions are calculated according to the methods compiled in Table 6.10.

The limited data availability in Germany (no performance and no husbandry data available) allows only for the calculation of national total emissions. A regional differentiation is not possible, nor a subdivision into adult goats and goat lambs.

For the definition of the methods see Chapter 3.2.3.

Die Berechnung der Emissionen erfolgt nach den in Table 6.10 zusammengestellten Methoden.

Die begrenzte Datenlage (weder Leistungs- noch Haltingsdaten verfügbar) lässt nur die Berechnung von nationalen Gesamtemissionen zu. Eine regionale Differenzierung ist nicht möglich, auch keine Unterteilung in erwachsene Ziegen und Ziegenlämmer.

Zur Methodendefinition siehe Kapitel 3.2.3.

Table 6.10: Goats, calculation methods applied

Species	Origin	Tier	Method applied
CH ₄	enteric fermentation	1	IPCC
CH ₄	manure management	2	IPCC
NM VOC	manure management	1	EMEP
NH ₃	manure management	1	EMEP
N ₂ O, NO, N ₂	manure management	2	IPCC
TSP, PM ₁₀ , PM _{2.5}	manure management	2	EMEP

6.6.1 Animal weights and management details / Tiergewichte und Haltungsdetails

IPCC (2006) reports contradictory weights for goats, 40 kg an⁻¹ in IPCC (2006)-10.28 and 38.5 kg an⁻¹ in IPCC (2006)-10.82. In the absence of data describing the German goat population, the German inventory assumes a mean weight of 40 kg. However, due to the use of a Tier 1 approach, the animal weight is not used to perform emission calculations at present.

As no data is available it is assumed that 50 % of the animals are housed permanently, whereas 50 % are grazing all day (grazing period: 250 d a⁻¹). (Source: VEREINIGUNG DEUTSCHER LANDESSCHAFZUCHTVERBÄNDE, VDL, Landesverband Hessen, private communication Rolf Lückhof).

Due to lack of appropriate data the inventory assumes the same amount like for adult sheep: 0.4 kg pl⁻¹ d⁻¹ straw fresh matter.

IPCC (2006) gibt für Ziegen unterschiedliche Gewichte an: 40 kg an⁻¹ in IPCC (2006)-10.28, 38,5 kg an⁻¹ in IPCC (2006)-10.82. In Ermangelung von Daten zur Beschreibung der deutschen Ziegenpopulation nimmt das deutsche Inventar ein mittleres Gewicht von 40 kg an. Das Ziegengewicht geht allerdings nicht in die deutschen Emissionsberechnungen ein, da ein Tier-1-Verfahren verwendet wird.

Da keine Daten verfügbar sind, wird angenommen, dass 50 % der Ziegen nur im Stall sind, 50 % ganztägig auf der Weide. Die Weideperiode beträgt 250 d a⁻¹. (Quelle: VEREINIGUNG DEUTSCHER LANDESSCHAFZUCHTVERBÄNDE, VDL, Landesverband Hessen, Privatmitteilung Rolf Lückhof).

In Ermangelung ziegenspezifischer Daten wird die tägliche Einstreuemenge wie für erwachsene Schafe mit 0,4 kg pl⁻¹ d⁻¹ Strohfrischmasse angesetzt.

6.6.2 Methane from enteric fermentation / Methan aus der Verdauung

Methane emissions from enteric fermentation are calculated according to the Tier 1 approach (Chapter 3.3.2). The default emission factor $EF_{CH_4, \text{ent, sh}}$ is 5 kg CH₄ (pl · a)⁻¹, see IPCC(2006)-10.28.

According to IPCC(2006)-10.33, the uncertainty of emission factors based on Tier 1 methodology is unlikely to be more accurate than ± 30 % and may be uncertain to ± 50 %. The inventory assumes an uncertainty of 30 %. This value is, according to the definition of uncertainty used in Chapter 3 in IPCC (2006a), interpreted as half the 95 % confidence interval. A normal distribution is assumed.

Die Methanemissionen aus der Verdauung werden nach dem Tier-1-Verfahren (siehe Kapitel 3.3.2) berechnet. Der default-Emissionsfaktor $EF_{CH_4, \text{ent, sh}}$ ist 5 kg CH₄ (pl · a)⁻¹, siehe IPCC(2006)-10.28.

Nach IPCC(2006)-10.33 ist die Unsicherheit von Emissionsfaktoren, die auf Tier-1-Verfahren beruhen, wahrscheinlich nicht kleiner als 30 %, wobei auch Werte bis 50 % für denkbar gehalten werden. Für das Inventar wird von 30 % ausgegangen. Dieser Wert wird im Sinne von IPCC (2006a), Kapitel 3, als halbes 95 %-Konfidenzintervall interpretiert. Es wird Normalverteilung angenommen.

6.6.3 Methane from manure management / Methan aus dem Wirtschaftsdünger-Management

CH₄ emissions from manure management are quantified using the equation of the Tier 2 methodology, see Chapter 3.3.4.1.

Die Berechnung der CH₄-Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management erfolgt mit der Gleichung des Tier-2-Verfahrens (siehe Kapitel 3.3.4.1).

According to Table 10A-9 in IPCC (2006) the default VS excretion is taken to be $0.30 \text{ kg pl}^{-1} \text{ d}^{-1}$.

Methane producing capacity B_0 and the Methane conversion factors MCF for the relevant storage systems are provided in Chapter 6.2.1. See also Chapter 6.2.1 for the uncertainty of CH_4 emissions from manure management.

6.6.4 NMVOC emissions / NMVOC-Emissionen

The calculation of the NMVOC emissions of all animals except cattle are calculated with a Tier 1 methodology, see Chapters 3.3.4.2.1 and 3.3.4.2.3.

Agricultural NMVOC emissions are reported, but are neglected regarding the NEC emission threshold, see Chapter 3.3.4.2.

Für die VS-Ausscheidung wird nach IPCC (2006), Tabelle 10A-9, ein Wert von $0,30 \text{ kg pl}^{-1} \text{ d}^{-1}$ angesetzt.

Zur maximalen Methan-Freisetzungskapazität B_0 und den Methanumwandlungsfaktoren MCF für die relevanten Lagerverfahren sowie die Unsicherheit der CH_4 -Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management siehe Kapitel 6.2.1.

Die NMVOC-Emissionen von allen Tieren außer den Rindern werden mit einer Tier-1-Methode berechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.1 und 3.3.4.2.3.

Landwirtschaftliche NMVOC-Emissionen werden zwar berichtet, aber bzgl. der NEC-Emissionsobergrenze nicht angerechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.

6.6.5 Emissions of nitrogen species / Emissionen von Stickstoff-Spezies

The data on N excretion available for Germany is $11 \text{ kg N (pl} \cdot \text{a)}^{-1}$ for all goats (LFL, 2003). All calculations are based on this figure. A fraction of 50 % of the nitrogen excreted is assumed to be TAN (EMEP(2013)-3B-27, Table 3.7).

For the amount of bedding material see Chapter 6.6.1. This amount corresponds to $2.0 \cdot 10^{-3} \text{ kg N (pl} \cdot \text{a)}^{-1}$ and $1.0 \cdot 10^{-3} \text{ kg TAN (pl} \cdot \text{a)}^{-1}$. As no bedding is taken into account during the grazing period, the annual amount of bedding actually used depends on the duration of the grazing period.

For the properties of straw and the mineralization of organic N to TAN see Chapter 3.3.4.3.2.

For the emission factors for NH_3 , N_2O , NO and N_2 including the indirect N_2O emissions from Manure Management see Chapter 6.2.2.

NO emissions from manure management are reported (as NO_x), but are neglected regarding the NEC emission threshold, see Chapter 3.3.4.2.

Offiziell verfügbare deutsche Zahlen (LFL, 2003) sehen für alle Ziegen eine einheitliche Ausscheidung von $11 \text{ kg N (pl} \cdot \text{a)}^{-1}$ vor. Dieser Wert wird in den Rechnungen verwendet. Der TAN-Gehalt wird mit 50 % angesetzt (EMEP(2013)-3B-27, Table 3.7).

Zur Einstreumenge siehe Kapitel 6.6.1. Sie entspricht $2,0 \cdot 10^{-3} \text{ kg N (pl} \cdot \text{a)}^{-1}$ und $1,0 \cdot 10^{-3} \text{ kg TAN (pl} \cdot \text{a)}^{-1}$. Da für Weidezeiten keine Einstreu berücksichtigt wird, hängt die im Inventar für das gesamte Jahr verwendete Einstreumenge von der Weidedauer ab.

Für die Eigenschaften von Stroh und der Mineralisierung von organisch gebundenem N zu TAN wird auf Kapitel 3.3.4.3.2 verwiesen.

Zu den Emissionsfaktoren für NH_3 , N_2O , NO und N_2 einschließlich der indirekten N_2O -Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management siehe Kapitel 6.2.2.

NO aus dem Wirtschaftsdünger-Management wird berichtet (als NO_x), bzgl. der NEC-Emissionsobergrenze aber nicht angerechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.

6.6.6 Emissions of particulate matter / Partikelemissionen

The method to calculate particle emissions is described in Chapter 3.3.4.5.

The emission factors provided by von EMEP (2016)-3B-19, Table 3.5, are different from the emission factors given in EMEP(2013)-3B-53, Table A3-4, only by rounding to two decimals. In order to avoid an apparent change in emissions from one emission reporting submission to the next, the original emission factors provided by EMEP(2013)-3B-53, Table A3-4, were kept, see Table 6.3.

For the uncertainty of the emission factors see Chapter 3.3.4.5.

Zur Berechnungsmethode für Partikelemissionen wird auf Kapitel 3.3.4.5 verwiesen.

Die von EMEP (2016)-3B-19, Table 3.5, angegebenen Emissionsfaktoren unterscheiden sich von den Emissionsfaktoren aus EMEP(2013)-3B-53, Table A3-4, nur durch Rundung auf zwei Dezimalstellen. Um aber eine scheinbare Emissionsänderung von einer Berichterstattung zur nächsten nur wegen Rundung der Emissionsfaktoren zu vermeiden, werden die ursprünglichen Emissionsfaktoren aus EMEP(2013)-3B-53, Table A3-4, beibehalten, siehe Table 6.3. Zur Unsicherheit der Emissionsfaktoren siehe Kapitel 3.3.4.5.

Table 6.11: Goats, emission factors for particle emissions from housing

Housing type	Haltungssystem	Emission factor for TSP $\text{kg pl}^{-1} \text{ a}^{-1}$	Emission factor for PM_{10} $\text{kg pl}^{-1} \text{ a}^{-1}$	Emission factor for $\text{PM}_{2.5}$ $\text{kg pl}^{-1} \text{ a}^{-1}$
straw based	stroh basiert	0.139	0.056	0.017

Source: see text

6.6.7 International comparison / Internationaler Vergleich

Within the framework of quality assurance a comparison of input data and inventory results was made on European level. (For details of the procedure of the comparison see Chapter 4.3.10.)

Im Zuge der Qualitätssicherung wurde ein Vergleich von Eingangsdaten und Inventarergebnissen auf mitteleuropäischer Ebene durchgeführt. (Nähere Angaben zur Durchführung: Siehe Kapitel 4.3.10.)

Table 6.12: Goats, 2017, international comparison of emission explaining variables and implied emission factors for enteric fermentation (ent) and manure management (MM)

	mean animal weight kg an ⁻¹	VS excretion kg pl ⁻¹ d ⁻¹	N excretion kg pl ⁻¹ a ⁻¹	IEF			
				CH _{4, ent} kg pl ⁻¹ a ⁻¹	CH _{4, MM} kg pl ⁻¹ a ⁻¹	NH ₃ direct N ₂ O (without spreading)	
						kg pl ⁻¹ a ⁻¹	kg pl ⁻¹ a ⁻¹
Austria	NA	0.30	12.30	5.00	0.26	3.30	0.091
Belgium	50.00	NE	8.61	5.00	0.13	1.24	0.059
Czech Republic	19.10	NA	8.92	5.00	0.13	0.33	0.140
Denmark ^a	60.00	1.03	16.59	13.10	0.45	0.99	0.071
France	51.66	0.92	14.32	14.92	0.75	2.67	0.097
Germany	40.00	0.30	11.00	5.00	0.22	1.62	0.061
Netherlands	NE	NE	n/a	5.00	0.13	1.28	n/a
Poland	NA	NA	8.00	5.00	0.13	0.82	0.035
Switzerland	NA	0.30	11.39	9.41	1.18	2.30	0.158
United Kingdom	NE	0.30	20.60	5.00	0.13	0.30	0.056
Median			11.39	5.00	0.17	1.26	0.071
IPCC (2006)-10.28, 10.40, 10.59, 10.82, Western Europe, cool region, devel- oped countries ^b	40 (Tier 1) 38.5 (Tier 2)	0.30	18.69	5	0.13		
EMEP (2016)-3B-16, 29			15.5			0.40	

Sources: Germany: Submission 2020; all other countries: UNFCCC (2019), CRF Tables; CEIP (2019), NFR
n/a, NA, NE: No data available for different reasons
^a Denmark without Greenland and Faroe Island
^b IPCC N excretions: calculated using the IPCC Tier 1 default animal weight (40 kg)

Half the countries do not provide animal weights, probably because emissions have been calculated with the Tier 1 methodology that does need animal weight as input. The Czech goat weight appear quite low. Germany uses the IPCC default value provided for Tier 1 methodology. Like for sheep the IPCC default values for the Tier 1 and the Tier 2 methodology are inconsistent, even if the difference is not as high as with sheep.

VS excretions are reported by only six countries, too. The Danish and French VS excretions appear very high. Germany, like Switzerland and the United Kingdom, uses the IPCC default value for VS excretions.

The comparison of N excretions show a very wide variation, which cannot be explained by the data available. The German N excretion is similar to the median.

Germany and most of the other countries calculate CH₄ emissions from enteric fermentation using the IPCC default emission factor, which is markedly lower than the values of Denmark, France and Switzerland.

Half of the countries use the IPCC default value for CH₄ from manure management. The Swiss value is strikingly high. The German value is 25 % higher than the median.

Die Hälfte der Länder geben kein Tiergewicht an, vermutlich, weil mit der Tier-1-Methodik gerechnet wurde, in der das Tiergewicht ohne Bedeutung ist. Das tschechische Ziegengewicht erscheint sehr niedrig. Deutschland verwendet den IPCC-Defaultwert der Tier-1-Methodik. Wie bei den Schafen sind die IPCC-Defaultgewichtswerte für das Tier-1- und das Tier-2-Verfahren inkonsistent, auch wenn der Unterschied nicht so erheblich wie bei den Schafen ist.

Bei den VS-Ausscheidungen berichten nur sechs Länder. Die dänischen und französischen VS-Ausscheidungen erscheinen sehr hoch. Deutschland verwendet wie die Schweiz und das Vereinigte Königreich den IPCC-Defaultwert für VS-Ausscheidungen.

Der Vergleich der N-Ausscheidungen zeigt deutliche Unterschiede, die anhand der verfügbaren Daten nicht erklärbar sind. Deutschland liegt im Bereich des Medians.

Deutschland und die meisten anderen Länder berechnen CH₄ aus der Verdauung mit dem IPCC-Default-Emissionsfaktor. Dieser ist deutlich niedriger als die Werte von Dänemark, Frankreich und der Schweiz.

Für CH₄ aus dem Wirtschaftsdünger-Management verwendet die Hälfte der Länder den IPCC-Defaultwert. Der schweizerische Wert ist auffallend hoch. Der deutsche Wert liegt 25 % über dem Median.

The NH₃ emission factors cannot easily be compared. Hence, for all countries the ratios of NH₃ emission factor to N excretion have been calculated (not shown in Table 6.12) in order to obtain an indicator for the emissivity of goat husbandry. These indicators range between 0.015 kg kg⁻¹ (United Kingdom) and 0.268 kg kg⁻¹ (Austria). The German ratio is about 0.148 kg kg⁻¹, which is somewhat higher than the median (0.144 kg kg⁻¹).

There is also a great deal of variation in the N₂O emission factors for manure management. The German is 15 % lower than the median.

Die NH₃-Emissionsfaktoren sind nur schwer direkt vergleichbar. Berechnet man den Quotienten NH₃-IEF/N-Ausscheidung (in Table 6.12 nicht gezeigt) als Indikator für die Emissionsanfälligkeit der Ziegenhaltung, so bewegt sich dieser Indikatorwert zwischen 0,015 kg kg⁻¹ (Vereinigtes Königreich) und 0,268 kg kg⁻¹ (Österreich). Der deutsche Quotient liegt bei 0,148 kg kg⁻¹ und damit etwas über dem Medianwert von 0,144 kg kg⁻¹.

Auch bei den N₂O-Emissionsfaktoren für das Wirtschaftsdünger-Management gibt es eine große Streuung. Der deutsche Wert liegt 15 % unter dem Median.

6.6.8 References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung

Table 6.13: Goats, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)

			from	to
Emissions	Emissionen	CH ₄ enteric fermentation	EM1004.017	
		CH ₄ manure management	EM1005.017	
		NM VOC	EM1007.017	
		NH ₃	EM1009.049	EM1009.051
		N ₂ O	EM1009.107	
		NO	EM1009.137	
		TSP	EM1010.017	
		PM ₁₀	EM1010.047	
		PM _{2.5}	EM1010.077	
Activity data	Aktivitäten		AC1005.020	
Emission factors	Emissionsfaktoren	CH ₄ enteric fermentation	IEF1004.017	
		CH ₄ manure management	IEF1005.017	
		NM VOC	IEF1007.017	
		NH ₃	IEF1009.046	IEF1009.048
		N ₂ O	IEF1009.100	
		NO	IEF1009.128	
		TSP	IEF1010.016	
		PM ₁₀	IEF1010.044	
		PM _{2.5}	IEF1010.072	
Additional information	zusätzliche Informationen		AI1005PSH.197	AI1005PSH.202
Excretion rates	Ausscheidungen	N	EXCR.075	EXCR.077

7 Horses, asses and mules / Pferde, Esel und Maultiere

7.1 Animal numbers / Tierzahlen

7.1.1 *Formation of subcategories and consideration of mules and asses / Untergliederung in Subkategorien und Berücksichtigung von Maultieren und Eseln*

In CRF/NFR emissions are reported for horses altogether.

The category „horses“ is subdivided into the subcategories „heavy horses“ (see Chapter 7.3) and „light horses and ponies“ (see Chapter 7.4). As the emission of those two subcategories are different, they are calculated separately.

As of the 2010 agricultural census, it is no longer horses but equidae that are counted in official surveys. The category „Equidae“ includes horses, asses and mules in a non-separable manner.

In keeping with data of the INTERESSEN-GEMEINSCHAFT FÜR ESEL UND MAULTIERE (Interest association for mules and asses – IGEM), the annual average population of mules and asses before 2010 has been estimated at 8,500 animals.

From this follows that mules and asses in Germany have only a very small importance. Hence, the German inventory does not have a separate category for mules and asses. Their emissions are automatically included in the emissions of horses as of the time series year 2010. To maintain consistency, for the years before 2010 the numbers of mules and asses were added to the horse numbers, namely to the category of small horses and ponies, as mules and asses correspond, in size and weight, to the small horses and ponies rather than the big horses.

For the inventory calculations only those horses are relevant that are reported in agricultural statistics (STATLA C III 1 – vj 4, , see also Chapter 3.4.2.1).

Data gaps within the time series of the animal numbers were closed by linear interpolation. Missing data at the end of the time series were estimated by extrapolation.

Chapter 7.5 describes the aggregation of the resulting data of the two sub-categories. This aggregation is needed to enable emission reporting for the overall category „horses“.

In CRF/NFR werden die Emissionen für Pferde insgesamt berichtet.

Wegen der unterschiedlich hohen Emissionen von Großpferden einerseits und Kleinpferden und Ponys andererseits werden die Emissionen separat berechnet: Siehe Kapitel 7.3 für Großpferde und Kapitel 7.4 für Kleinpferde/Ponys.

Ab der Landwirtschaftszählung 2010 werden in offiziellen Erhebungen nicht mehr Pferde, sondern Equiden gezählt, die neben den Pferden in nicht separierbarer Weise auch Esel und Maultiere umfassen.

Die Zahl der Esel und Maultiere vor 2010 wurde nach Daten der INTERESSENGEMEINSCHAFT FÜR ESEL UND MAULTIERE (IGEM) auf 8.500 Esel und Maultiere pro Jahr geschätzt.

Daraus lässt sich ablesen, dass Maultieren und Eseln in Deutschland nur eine sehr geringe Bedeutung haben. Daher verzichtet das deutsche Inventar auf eine separate Kategorie für Esel/Maultiere. Ihre Emissionen werden ab dem Zeitreihenjahr 2010 zwangsläufig bei den Pferden mitberechnet. Zur Wahrung der Konsistenz wurden die Zahlen von Maultieren und Eseln für die Zeitreihenjahre vor 2010 ebenfalls den Pferden zugeschlagen, und zwar der Kategorie der Kleinpferde und Ponys, da Esel und Maultiere in Größe und Gewicht eher den Kleinpferden und Ponys als den Großpferden entsprechen.

Das Inventar berechnet Emissionen nur für diejenigen Pferde, die in den landwirtschaftlichen Statistiken (STATLA C III 1 – vj 4, , siehe auch Kapitel 3.4.2.1) ausgewiesen werden.

Datenlücken innerhalb der Zeitreihen der Tierzahlen wurden durch lineare Interpolation, Datenlücken am Ende der Zeitreihe durch Extrapolation geschlossen.

Kapitel 7.5 beschreibt die für die Emissionsberichterstattung erforderliche Aggregation der Teilergebnisse aus den beiden Unterkategorien zum Gesamtergebnis für „Pferde“.

7.1.2 *Uncertainties / Unsicherheiten*

The uncertainty of the animal numbers is assumed to be 5 % (standard error), and hence 10 % for half the 95 % confidence interval, with normal distribution.

Die Unsicherheit der Tierzahlen wird mit 5 % (Standardfehler) bzw. 10 % (halbes 95 %-Konfidenzintervall) bei normaler Verteilung geschätzt.

7.2 Parameters common to all horses / Gemeinsame Parameter für alle Pferde

7.2.1 *Methane from manure management / Methan aus dem Wirtschaftsdünger-Management*

CH₄ emissions from manure management are quantified using the Tier 2 equation, see Chapter 3.3.4.1.

CH₄ aus dem Wirtschaftsdünger-Management wird mit der Tier-2-Gleichung berechnet (s. Kapitel 3.3.4.1).

For the maximum methane producing capacity B_0 and the MCF values see the subsequent table. For the VS excretion see the respective subchapters for heavy horses and light horses/ponies.

For all horses the duration of the grazing period is assumed to be 180 d a⁻¹, with 10 h d⁻¹.

Zur maximalen Methan-Produktionskapazität B_0 und den MCF -Werten siehe nachfolgende Tabelle. Zur VS-Ausscheidung siehe entsprechendes Unterkapitel bei Großpferden und Kleinpferden/ Ponys.

Für alle Pferde wird von einer Weideperiode von 180 d a⁻¹ mit 10 h d⁻¹ ausgegangen.

Table 7.1: Horses, Maximum methane producing capacity (B_0) and methane conversion factors (MCF)

maximum methane producing capacity B_0	maximale Methanbildungs-Kapazität B_0	0.3 ^b	m ³ CH ₄ (kg VS) ⁻¹
MCF storage type solid manure (heap)	MCF Lagerungsart Festmist (Misthaufen)	0.02 ^a	m ³ m ⁻³
MCF pasture	MCF Weide	0.01 ^a	m ³ m ⁻³

^a IPCC(2006)-10.44 ff; ^b IPCC(2006)-10.82

7.2.2 Emissions of nitrogen species / Emissionen von Stickstoff-Spezies

The emission calculations are carried out separately for heavy horses on the one hand and light horses/ponies on the other hand (see Chapters 7.3 and 7.4). However, the same emission factors are used.

The NH₃-N emission factors for housing (0.22 kg kg⁻¹), storage (0.35 kg kg⁻¹) and grazing (0.35 kg kg⁻¹) are taken from EMEP(2013)-3B-27, Table 3.7. The emission factors are related to TAN.

The N₂O-N emission factor for housing and storage is 0,005 kg kg⁻¹ (IPCC (2006)-10.62). According to Chapter 3.3.4.3.5, the emission factors for NO-N and N₂ are calculated as 0.0005 and 0.015 kg kg⁻¹, respectively. The emission factors for N₂O-N, NO-N and N₂ are applied to the sum of nitrogen excreted and N input with bedding material.

Frequencies for the different techniques of solid manure spreading are known from ASE 2016 and RAUMIS data, see Chapter 3.4.3. The associated emission factors are those used for cattle and pigs, see Chapters 4.2.2.3 and 5.2.2.3.

N₂O and NO emissions resulting from animal excreta dropped during grazing are calculated according to Chapter 11.5. For the duration of grazing see Chapter 7.2.1. For further details see Chapter 4.3.8.5.3.

For the uncertainties of the emission factors see Chapter 4.2.2.4 and 11.2.2.

The uncertainty of N excretion is discussed in Chapter 14.4.1. For the uncertainty of the amount of N spreaded see Chapter 11.2.1.

Indirect N₂O emissions from manure management (housing/storage without spreading) are calculated according to Chapter 3.3.4.3.6. See Chapter 3.3.4.3.6 also for the uncertainties of activity data and emission factor.

(Indirect N₂O emissions from agricultural soils after spreading of manures or digested manures are reported in Sector 3.D. For the calculation of these emissions see Chapter 12.)

Die Emissionsberechnungen erfolgen für Großpferde einerseits und Kleinpferde/Ponys andererseits getrennt (siehe Kapitel 7.3 und 7.4), aber mit den gleichen Emissionsfaktoren.

Die NH₃-N-Emissionsfaktoren für Stall (0,22 kg kg⁻¹), Lager (0,35 kg kg⁻¹) und Weide (0,35 kg kg⁻¹), jeweils bezogen auf vorhandenes TAN, werden EMEP(2013)-3B-27, Table 3.7, entnommen.

Der N₂O-N-Emissionsfaktor für Stall und Lager beträgt 0,005 kg kg⁻¹ (IPCC (2006)-10.62). Nach Kapitel 3.3.4.3.5 berechnen sich die Emissionsfaktoren für NO-N und N₂ zu 0,0005 bzw. 0,015 kg kg⁻¹. Die Emissionsfaktoren für N₂O-N, NO-N und N₂ beziehen sich auf die Summe aus ausgeschiedenem und durch Einstreu eingebrachtem N.

Aus ASE 2016 und RAUMIS-Daten sind Häufigkeiten zu den verschiedenen Festmist-Ausbringungstechniken bekannt, siehe Kapitel 3.4.3. Als Emissionsfaktoren werden die gleichen wie für Rinder und Schweine verwendet, siehe Kapitel 4.2.2.3 und 5.2.2.3.

Die aus dem Weidegang resultierenden Emissionen von N₂O und NO werden nach Kapitel 11.5 berechnet. Zur Weidegangsdauer siehe Kapitel 7.2.1. Zu weiteren Einzelheiten siehe Kapitel 4.3.8.5.3.

Zu den Unsicherheiten der Emissionsfaktoren siehe Kapitel 4.2.2.4 und 11.2.2.

Die Unsicherheit der N-Ausscheidung wird in Kapitel 14.4.1 diskutiert. Zur Unsicherheit der zur Ausbringung kommenden N-Menge siehe Kapitel 11.2.1.

Indirekte N₂O-Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management (Stall/Lager ohne Ausbringung) werden nach Kapitel 3.3.4.3.6 berechnet. Siehe dort auch wegen der Unsicherheiten von Aktivitätswert und Emissionsfaktor.

(Indirekte N₂O-Emissionen als Folge der Ausbringung von Wirtschaftsdüngern und Wirtschaftsdünger-Gärresten werden im Sektor 3.D berichtet. Zur Berechnung siehe Kapitel 12.)

7.3 Heavy horses / Großpferde

All horses whose size as measured from the top of the withers to the ground exceeds 14 hands or 148 cm are called heavy horses.

The emissions are calculated according to the methods procedures compiled in Table 7.2.

For the definition of the methods see Chapter 3.2.3.

Großpferde sind alle Pferde mit einem Stockmaß von 148 cm und mehr.

Die Berechnung der Emissionen erfolgt nach den in Table 7.2 zusammengestellten Methoden.

Zur Methodendefinition siehe Kapitel 3.2.3.

Table 7.2: Heavy horses, calculation methods applied

Species	Origin	Tier	Method applied
CH ₄	enteric fermentation	1	IPCC / national
CH ₄	manure management	2	IPCC / national
NM VOC	manure management	1	EMEP
NH ₃	manure management	2	EMEP / national
N ₂ O, NO, N ₂	manure management	2	IPCC / national
TSP, PM ₁₀ , PM _{2.5}	manure management	2	EMEP

7.3.1 Animal weight and energy intake / Tiergewicht und Energieaufnahme

Due to the simple methodology used, horse weights are not needed for emission calculations. However, the CRF tables require a mean horse weight to be reported. This mean weight is calculated from the weights of heavy horses and light horses/ponies, see Chapter 7.5.1.

The weight of a German heavy horse is assumed to be 550 kg (mean value for riding horses, see DLG, 2005, pg. 54). Hence, the animal category of German heavy horses corresponds to the category of horses described in IPCC (2006)-10.28.

Like horse weight the intake of gross energy (GE) isn't needed as input parameter for the emission calculations, but is to be reported in the CRF tables. IPCC (2006)-10.28 provides a daily GE intake of 110 MJ pl⁻¹ d⁻¹ for the IPCC category "horses", which corresponds to the German category "heavy horses". This IPCC default GE intake corresponds to data given in BLUM (2002).

A German value for the annual intake of digestible energy (DE) is given in DLG (2005), pg. 54. It is 32.5 GJ per place and year (or 89 MJ per place and day). The DE intake isn't used in the emission calculations, but is serves as a basis for the estimation of the CH₄ emission factor for enteric fermentation of light horses/ponies, see Chapter 7.4.1.

Pferdegewichte werden in der verwendeten einfachen Emissionsberechnungsmethodik nicht benötigt. Allerdings erfordern die CRF-Tabellen die Angabe eines mittleren Pferdegewichtes, das aus der Mittelung der Gewichte von Großpferden und Kleinpferden/Ponys berechnet wird, siehe Kapitel 7.5.1.

Das Gewicht eines deutschen Großpferdes wird mit 550 kg angesetzt (Mittelwert für Reitpferde nach DLG, 2005, S. 54). Damit entsprechen die deutschen Großpferde der in IPCC (2006)-10.28 beschriebenen Kategorie „Pferde“.

Die Gesamtenergieaufnahme (GE) geht genauso wie das Tiergewicht nicht in die einfache Emissionsberechnungsmethodik ein, ist aber ebenfalls in den CRF-Tabellen zu berichten. IPCC (2006)-10.28 gibt für die oben erwähnte Kategorie „Pferde“, die der deutschen Inventarkategorie „Großpferde“ entspricht, eine tägliche GE-Aufnahme von 110 MJ pl⁻¹ d⁻¹ an, was mit Angaben in BLUM (2002) korrespondiert.

Die jährliche Aufnahme von verdaulicher Energie (DE) beträgt nach DLG (2005), S. 54, pro Platz jährlich 32,5 GJ bzw. täglich 89 MJ. Diese Angabe geht nicht in die Emissionsberechnung ein, wird aber für die Schätzung des Emissionsfaktors für CH₄ aus der Verdauung von Kleinpferden/Ponys benötigt, siehe Kapitel 7.4.1.

7.3.2 Methane from enteric fermentation / Methan aus der Verdauung

CH₄ emissions from enteric fermentation are calculated according to the Tier 1 approach (Chapter 3.3.2).

There is no national emission factor. The IPCC Tier 1 default emission factor of 18 kg CH₄ per place and year is given along with an animal weight of 550 kg, see IPCC (2006)-10.28. This animal weight corresponds to animal weights given in the German agricultural literature for riding horses, see Chapter 7.3.1. Hence the German inventory adopts the IPCC Tier 1 default emission factor of 18 kg CH₄ per place and year for German heavy horses.

Die CH₄-Emissionen aus der Verdauung werden nach dem Tier-1-Verfahren (siehe Kapitel 3.3.2) berechnet.

Es gibt keinen nationalen Emissionsfaktor. Der IPCC-Tier-1-Defaultwert von 18 kg CH₄ pro Platz und Jahr wird zusammen mit einem Tiergewicht von 550 kg angegeben, siehe IPCC (2006)-10.28. Dieses Gewicht korrespondiert mit Gewichten, die in der deutschen landwirtschaftlichen Literatur für Reitpferde angegeben werden, siehe Kapitel 7.3.1. Daher übernimmt das deutsche Inventar den IPCC-Emissionsfaktor 18 kg pl⁻¹ a⁻¹ für die deutsche Kategorie „Großpferde“.

According to IPCC(2006)-10.33, the uncertainty of emission factors based on Tier 1 methodology is unlikely to be more accurate than $\pm 30\%$ and may be uncertain to $\pm 50\%$. The inventory assumes an uncertainty of 30% . This value is, according to the definition of uncertainty used in Chapter 3 in IPCC (2006a), interpreted as half the 95% confidence interval. A normal distribution is assumed.

Nach IPCC(2006)-10.33 ist die Unsicherheit von Emissionsfaktoren, die auf Tier-1-Verfahren beruhen, wahrscheinlich nicht kleiner als 30% , wobei auch Werte bis 50% für denkbar gehalten werden. Für das Inventar wird von 30% ausgegangen. Dieser Wert wird im Sinne von IPCC (2006a), Kapitel 3, als halbes 95% -Konfidenzintervall interpretiert. Es wird Normalverteilung angenommen.

7.3.3 Methane from manure management / Methan aus Wirtschaftsdünger-Management

CH₄ emissions from manure management are quantified using the Tier 2 procedure, see Chapter 3.3.4.1.

The VS excretion of heavy horses is, according to German data, 2.59 kg VS per place and day (HAENEL and RÖSEMANN, 2018).

Methane producing capacity B_0 and the Methane conversion factors MCF are listed in

Table 7.1 (Chapter 7.2.1).

German data on the uncertainty of CH₄ emissions from manure management do not exist. With respect to the uncertainty of the emission factor calculated it has to be considered that the calculation procedure relies on default VS excretion, which is assumed to be a Tier 1 approach rather than a Tier 2 approach. IPCC(2006)-10.48 estimates the uncertainty of Tier 1 approaches to be 30% . This value is, according to the definition of uncertainty used in Chapter 3 in IPCC (2006a), interpreted as half the 95% confidence interval. A normal distribution is assumed.

CH₄ aus dem Wirtschaftsdünger-Management wird mit einem Tier-2-Verfahren (Kapitel 3.3.4.1) berechnet.

Die VS-Ausscheidung großer Pferde wird nach deutschen Daten mit 2,59 kg VS pro Platz und Tag angesetzt (HAENEL und RÖSEMANN, 2018).

Die maximale Methan-Freisetzungskapazität B_0 und die Methanumwandlungsfaktoren MCF sind in

Table 7.1 (Kapitel 7.2.1) aufgelistet.

Deutsche Zahlen zur Unsicherheit der CH₄-Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management liegen nicht vor. Hinsichtlich der Unsicherheit des berechneten Emissionsfaktors ist zu berücksichtigen, dass das Rechenverfahren Default-VS-Ausscheidungen verwendet. Es ist also eher ein Tier-1- als ein Tier-2-Verfahren. IPCC(2006)-10.48 schätzt die Unsicherheit bei Anwendung von Tier-1-Verfahren auf 30% . Dieser Wert wird im Sinne von IPCC (2006a), Kapitel 3, als halbes 95% -Konfidenzintervall interpretiert. Es wird Normalverteilung angenommen.

7.3.4 NMVOC emissions / NMVOC-Emissionen

The calculation of the NMVOC emissions of all animals except cattle are calculated with a Tier 1 methodology, see Chapters 3.3.4.2.1 and 3.3.4.2.3.

Agricultural NMVOC emissions are reported, but are neglected regarding the NEC emission threshold, see Chapter 3.3.4.2.

Die NMVOC-Emissionen von allen Tieren außer den Rindern werden mit einer Tier-1-Methode berechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.1 und 3.3.4.2.3.

Landwirtschaftliche NMVOC-Emissionen werden zwar berichtet, aber bzgl. der NEC-Emissionsobergrenze nicht angerechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.

7.3.5 Emissions of nitrogen species / Emissionen von Stickstoff-Spezies

According to DLG (2005), pg 55, saddle-horses with a weight of 500 to 600 kg a^{-1} with mixed stabling and grazing and occasional work excrete 53.6 kg N ($\text{pl} \cdot \text{a}^{-1}$). A fraction of 0.6 kg kg^{-1} is assumed to be TAN (EMEP(2013)-3B-27, Table 3.7)..

For straw based systems N inputs with straw are taken into account. For the properties of straw and the mineralization of organic N to TAN see Chapter 3.3.4.3.2.

In the Inventory, the amount of straw fresh matter is 8 kg $\text{pl}^{-1} \text{d}^{-1}$ (KTBL, 2006b, pg. 640) or $39.9 \cdot 10^{-3}$ kg N ($\text{pl} \cdot \text{a}^{-1}$) ($20.0 \cdot 10^{-3}$ kg TAN ($\text{pl} \cdot \text{a}^{-1}$), respectively).

For the emission factors see Chapter 7.2.2.

For indirect N₂O emissions from manure management see Chapter 7.2.2.

NO emissions from manure management are reported (as NO_x), but are neglected regarding the NEC emission threshold, see Chapter 3.3.4.2.

Nach DLG (2005), S. 55, werden von Reitpferden bei gemischter Stall-/Weidehaltung (Gewicht 500 bis 600 kg a^{-1}) und leichter Arbeit 53,6 kg N ($\text{pl} \cdot \text{a}^{-1}$) ausgeschieden. Der relative TAN-Anteil wird mit 0,6 kg kg^{-1} (EMEP(2013)-3B-27, Table 3.7) angesetzt.

Für Systeme mit Einstreu wird der N-Eintrag mit dem Stroh berücksichtigt. Zu den Eigenschaften von Stroh und der Mineralisierung von organisch gebundenem N zu TAN wird auf Kapitel 3.3.4.3.2 verwiesen.

Die Menge der Einstreu beträgt im Inventar 8 kg $\text{pl}^{-1} \text{d}^{-1}$ Strohfrischmasse (KTBL, 2006b, S. 640) bzw. $39,9 \cdot 10^{-3}$ kg N ($\text{pl} \cdot \text{a}^{-1}$), entsprechend $20,0 \cdot 10^{-3}$ kg TAN ($\text{pl} \cdot \text{a}^{-1}$).

Zu den Emissionsfaktoren siehe Kapitel 7.2.2.

Zu indirekten N₂O-Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management siehe Kapitel 7.2.2.

NO aus dem Wirtschaftsdünger-Management wird berichtet (als NO_x), bzgl. der NEC-Emissionsobergrenze aber nicht angerechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.

For the uncertainties of the emission factors see Chapter 4.2.2.4.

Zu den Unsicherheiten der Emissionsfaktoren siehe Kapitel 4.2.2.4.

7.3.6 Emissions of particulate matter / Partikelemissionen

The method to calculate particle emissions is described in Chapter 3.3.4.5. The emission factors are listed in Table 7.3. For the uncertainty of the emission factors see Chapter 3.3.4.5.

Zur Berechnungsmethode für Partikelemissionen wird auf Kapitel 3.3.4.5 verwiesen. Die Emissionsfaktoren sind in Table 7.3 angegeben. Zur Unsicherheit der Emissionsfaktoren siehe Kapitel 3.3.4.5.

Table 7.3: Heavy horses, emission factors for particle emissions from housing

Housing type	Haltungssystem	Emission factor for TSP kg pl ⁻¹ a ⁻¹	Emission factor for PM ₁₀ kg pl ⁻¹ a ⁻¹	Emission factor for PM _{2.5} kg pl ⁻¹ a ⁻¹
straw based	strohbasierend	0.48	0.22	0.14

Source: EMEP(2016)-3B-53, Table 3.5

7.3.7 References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung

Table 7.4: Heavy horses, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)

			from	to
Emissions	Emissionen	CH ₄ enteric fermentation	EM1004.018	
		CH ₄ manure management	EM1005.018	
		NM VOC	EM1007.018	
		NH ₃	EM1009.052	EM1009.054
		N ₂ O	EM1009.108	
		NO	EM1009.138	
		TSP	EM1010.018	
		PM ₁₀	EM1010.048	
		PM _{2.5}	EM1010.078	
Activity data	Aktivitäten		AC1005.021	
Emission factors	Emissionsfaktoren	CH ₄ enteric fermentation	IEF1004.018	
		CH ₄ manure management	IEF1005.018	
		NM VOC	IEF1007.018	
		NH ₃	IEF1009.049	IEF1009.051
		N ₂ O	IEF1009.101	
		NO	IEF1009.129	
		TSP	IEF1010.017	
		PM ₁₀	IEF1010.045	
		PM _{2.5}	IEF1010.073	
Additional information	zusätzliche Informationen		AI1005PSH.203	AI1005PSH.213

7.4 Light horses and ponies / Kleinpferde und Ponys

Light horses and ponies are horses whose size measured from the top of the withers to the ground falls below 148 cm. As described in Chapter 7.1.1, the category "small horses / ponies" for the period before 2010 explicitly includes the numbers of mules and asses known for that time, thereafter only implicitly. For sake of simplicity, this animal category is referred to as "small horses / ponies" without mentioning mules and asses.

IPCC (2006) does not provide an adequate description of light horses. The definitions used in IPCC (2006) (weight, energy requirements) are only applicable to the category "heavy horses" in the German inventory, see Chapter 7.3.1. The calculation methods are therefore modified for small horses.

The emissions are calculated according to the methods compiled in Table 7.5.

For the definition of the methods see Chapter 3.2.3.

Kleinpferde und Ponys sind alle Pferde mit einem Stockmaß von weniger als 148 cm. Wie in Kapitel 7.1.1 beschrieben, umfasst die Kategorie „Kleinpferde/Ponys“ für die Zeit vor 2010 explizit auch die für diese Zeit bekannten Esel- und Maultierzahlen, danach nur noch implizit. Im Folgenden ist vereinfachend insgesamt von „Kleinpferden/Ponys“ die Rede.

IPCC (2006) bietet keine adäquate Beschreibung von Kleinpferden an. Die in IPCC (2006) verwendeten Definitionen (Gewicht, Energiebedarf) sind lediglich auf die Kategorie „Großpferde“ im deutschen Inventar anwendbar, siehe Kapitel 7.3.1. Die Berechnungsmethoden werden daher für Kleinpferde angepasst.

Die Berechnung der Emissionen erfolgt nach den in Table 7.5 zusammengestellten Methoden.

Zur Methodendefinition siehe Kapitel 3.2.3.

Table 7.5: Light horses and ponies, calculation methods applied

Species	Origin	Tier	Method applied
CH ₄	enteric fermentation	1	IPCC / national
CH ₄	manure management	2	IPCC / national
NM VOC	manure management	1	EMEP
NH ₃	manure management	2	EMEP / national
N ₂ O, NO, N ₂	manure management	2	IPCC / national
PM ₁₀ , PM _{2.5}	manure management	2	EMEP

7.4.1 Animal weight and energy intake / Tiergewicht und Energieaufnahme

Due to the simple methodology used, horse weights are not needed for emission calculations. However, the CRF tables require a mean horse weight to be reported. This mean weight is calculated from the weights of heavy horses and light horses/ponies, see Chapter 7.5.1.

The weight of German riding ponies is adopted as weight of the inventory category „light horses/ponies“: 300 kg, see DLG (2005), pg. 54.

A German value for the annual intake of digestible energy (DE) is given in DLG (2005), pg. 54. It is 21.0 GJ per place and year (or 58 MJ per place and day). The DE intake isn't used in the emission calculations, but it serves as a basis for the estimation of the CH₄ emission factor for enteric fermentation of light horses/ponies:

According to the (rounded) difference of the DE intakes between heavy horses and light horses/ponies, the GE intake of light horses/ponies is estimated to be two thirds of the GE intake of heavy horses (which is given in Chapter 7.3.1): 73 MJ pl⁻¹ d⁻¹.

The estimation of the emission factor for CH₄ from enteric fermentation of light horses/ponies is described in the subsequent chapter.

Pferdegewichte werden in der verwendeten einfachen Emissionsberechnungsmethodik nicht benötigt. Allerdings erfordern die CRF-Tabellen die Angabe eines mittleren Pferdegewichtes, das aus der Mittelung der Gewichte von Großpferden und Kleinpferden/Ponys berechnet wird, siehe Kapitel 7.5.1.

Als Gewicht für Kleinpferde/Ponys wird das Gewicht von deutschen Reitponys angesetzt: 300 kg nach DLG (2005), S. 54.

Die jährliche Aufnahme von verdaulicher Energie (DE) beträgt nach DLG (2005), S. 54, pro Platz jährlich 21,0 GJ bzw. täglich 58 MJ. Auch diese Angabe geht nicht in die Emissionsberechnung ein, wird aber für die Schätzung der Gesamtenergieaufnahme (GE) und des Emissionsfaktors für CH₄ aus der Verdauung von Kleinpferden/Ponys benötigt:

Entsprechend dem Unterschied in der Aufnahme von verdaulicher Energie wird für Kleinpferde und Ponys eine gegenüber Großpferden (siehe Kapitel 7.3.1) um -gerundet - ein Drittel geringere Aufnahme an Gesamtenergie (GE) angenommen: 73 MJ pl⁻¹ d⁻¹.

Auf die Schätzung des Emissionsfaktors für CH₄ aus der Verdauung von Kleinpferden/Ponys geht das nachfolgende Kapitel ein.

7.4.2 Methane from enteric fermentation / Methane aus der Verdauung

CH₄ emissions from enteric fermentation are calculated according to the Tier 1 approach (Chapter 3.3.2).

While for heavy horses the emission factor is 18 kg pl⁻¹ a⁻¹ (see Chapter 7.3.2), the inventory uses an emission factor for light horses/ponies that is lower by one third, resulting in 12 kg pl⁻¹ a⁻¹. This lower EF is estimated on the basis of the ratio of the energy intake rates of heavy horses and light horses/ponies. (This result agrees reasonably well with 11.4 kg pl⁻¹ a⁻¹ which is obtained by application of the IPCC scaling approach in the footnote of Table 10.10 in IPCC (2006)-10.28.)

According to IPCC(2006)-10.33, the uncertainty of emission factors based on Tier 1 methodology is unlikely to be more accurate than $\pm 30\%$ and may be uncertain to $\pm 50\%$. The inventory assumes an uncertainty of 30 %. This value is, according to the definition of uncertainty used in Chapter 3 in IPCC (2006a), interpreted as half the 95 % confidence interval (normal distribution).

CH₄ aus der Verdauung wird nach dem Tier-1-Verfahren (siehe Kapitel 3.3.2) berechnet.

Während für Großpferde der Emissionsfaktor bei 18 kg pl⁻¹ a⁻¹ liegt (siehe Kapitel 7.3.2), wird im Inventar für Kleinpferde entsprechend dem geringeren Energiebedarf (siehe Kapitel 7.4.1) ein proportional zum Energiebedarf um ein Drittel geringerer CH₄-Emissionsfaktor von 12 kg pl⁻¹ a⁻¹ angesetzt. (Dieses Ergebnis steht in guter Übereinstimmung mit dem Ergebnis von 11,4 kg pl⁻¹ a⁻¹ des IPCC-Skalierungsansatzes, der in Fußnote zu Table 10.10 in IPCC (2006)-10.28 beschrieben ist).

Nach IPCC(2006)-10.33 ist die Unsicherheit von Emissionsfaktoren, die auf Tier-1-Verfahren beruhen, wahrscheinlich nicht kleiner als 30 %, wobei auch Werte bis 50 % für denkbar gehalten werden. Für das Inventar wird von 30 % ausgegangen. Dieser Wert wird im Sinne von IPCC (2006a), Kapitel 3, als halbes 95 %-Konfidenzintervall interpretiert (Normalverteilung).

7.4.3 Methane from manure management / Methan aus Wirtschaftsdünger-Management

CH₄ emissions from manure management are quantified using the Tier 2 procedure, see Chapter 3.3.4.1.

The VS excretion of light horses and ponies is, according to German data, 1.73 kg VS per place and day (HAENEL and RÖSEMANN, 2018).

Methane producing capacity B_0 and the Methane conversion factors MCF are listed in Table 7.1 (Chapter 7.2.1).

German data on the uncertainty of CH₄ emissions from manure management do not exist. With respect to the uncertainty of the emission factor calculated it has to be considered that the calculation procedure relies on default VS excretion, which is assumed to be a Tier 1 approach rather than a Tier 2 approach. IPCC(2006)-10.48 estimates the uncertainty of Tier 1 approaches to be 30 %. This value is, according to the definition of uncertainty used in Chapter 3 in IPCC (2006a), interpreted as half the 95 % confidence interval. A normal distribution is assumed.

Zur Bestimmung der CH₄-Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management wird das Tier-2-Verfahren (siehe Kapitel 3.3.4.1) angewandt.

Die VS-Ausscheidung kleiner Pferde und Ponys wird nach deutschen Daten mit 1,73 kg VS pro Platz und Tag angesetzt (HAENEL und RÖSEMANN, 2018).

Die maximale Methan-Freisetzungskapazität B_0 und die Methanumwandlungsfaktoren MCF sind in Table 7.1 (Kapitel 7.2.1) aufgelistet.

Deutsche Zahlen zur Unsicherheit der CH₄-Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management liegen nicht vor. Hinsichtlich der Unsicherheit des berechneten Emissionsfaktors ist zu berücksichtigen, dass das Rechenverfahren Default-VS-Ausscheidungen verwendet. Es ist also eher ein Tier-1- als ein Tier-2-Verfahren. IPCC(2006)-10.48 schätzt die Unsicherheit bei Anwendung von Tier-1-Verfahren auf 30 %. Dieser Wert wird im Sinne von IPCC (2006a), Kapitel 3, als halbes 95 %-Konfidenzintervall interpretiert. Es wird Normalverteilung angenommen.

7.4.4 NMVOC emissions / NMVOC-Emissionen

The calculation of the NMVOC emissions of all animals except cattle are calculated with a Tier 1 methodology, see Chapters 3.3.4.2.1 and 3.3.4.2.3.

Agricultural NMVOC emissions are reported, but are neglected regarding the NEC emission threshold, see Chapter 3.3.4.2.

Die NMVOC-Emissionen von allen Tieren außer den Rindern werden mit einer Tier-1-Methode berechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.1 und 3.3.4.2.3.

Landwirtschaftliche NMVOC-Emissionen werden zwar berichtet, aber bzgl. der NEC-Emissionsobergrenze nicht angerechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.

7.4.5 Emissions of nitrogen species / Emissionen von Stickstoff-Spezies

According to DLG (2005), pg. 55, light horses with a weight of 300 kg an⁻¹ with mixed stabling and grazing and occasional work excrete 33.4 kg N (pl · a)⁻¹. A fraction of 0.6 kg kg⁻¹ is assumed to be TAN (EMEP (2016)-3B-29, Table 3.9).

Nach DLG (2005), S. 55, werden von Reitponys bei gemischter Stall-/Weidehaltung (Gewicht 300 kg an⁻¹) und leichter Arbeit 33,4 kg N (pl · a)⁻¹ ausgeschieden. Der relative TAN-Anteil wird mit 0,6 kg kg⁻¹ (EMEP (2016)-3B-29, Table 3.9) angesetzt.

For straw based systems N inputs with straw are taken into account. For the properties of straw and the mineralization of organic N to TAN see Chapter 3.3.4.3.2. Due to lack of data $5 \text{ kg pl}^{-1} \text{ d}^{-1}$ of straw fresh matter containing $24.9 \cdot 10^{-3} \text{ kg N (pl} \cdot \text{a)}^{-1}$ or $12.5 \cdot 10^{-3} \text{ kg TAN (pl} \cdot \text{a)}^{-1}$ are used in relation to the amount used with heavy horses.

For the emission factors see Chapter 7.2.2.

For indirect N_2O emissions from manure management see Chapter 7.2.2.

NO emissions from manure management are reported (as NO_x), but are neglected regarding the NEC emission threshold, see Chapter 3.3.4.2.

For the uncertainties of the emission factors see Chapter 4.2.2.4.

Für Systeme mit Einstreu wird der N-Eintrag mit dem Stroh berücksichtigt. Zu den Eigenschaften von Stroh und der Mineralisierung von organisch gebundenem N zu TAN wird auf Kapitel 3.3.4.3.2 verwiesen. In Ermangelung von Daten werden in Relation zu den Großpferden $5 \text{ kg pl}^{-1} \text{ d}^{-1}$ Strohfrischmasse bzw. $24,9 \cdot 10^{-3} \text{ kg N (pl} \cdot \text{a)}^{-1}$ angenommen (entsprechend $12,5 \cdot 10^{-3} \text{ kg TAN (pl} \cdot \text{a)}^{-1}$).

Zu den Emissionsfaktoren siehe Kapitel 7.2.2.

Zu indirekten N_2O -Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management siehe Kapitel 7.2.2.

NO aus dem Wirtschaftsdünger-Management wird berichtet (als NO_x), bzgl. der NEC-Emissionsobergrenze aber nicht angerechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.

Zu den Unsicherheiten der Emissionsfaktoren siehe Kapitel 4.2.2.4.

7.4.6 Emissions of particulate matter / Partikelemissionen

For the calculation method for particle emissions see Chapter 3.3.4.5. Due to the lower weight compared to larger horses, the emission factors for mules and asses are used as provided in EMEP(2016)-3B-53, Table 3.5. They are shown in Table 7.6. For the uncertainty of the emission factors see Chapter 3.3.4.5.

Zur Berechnungsmethode für Partikelemissionen wird auf Kapitel 3.3.4.5 verwiesen. Aufgrund des verglichen mit Großpferden geringeren Gewichts werden die Emissionsfaktoren für Esel und Maultiere nach EMEP(2016)-3B-53, Table 3.5, verwendet. Sie sind in Table 7.6 dargestellt. Zur Unsicherheit der Emissionsfaktoren siehe Kapitel 3.3.4.5.

Table 7.6: Light horses and ponies, emission factors for particle emissions from housing

Housing type	Haltungssystem	Emission factor for TSP $\text{kg pl}^{-1} \text{ a}^{-1}$	Emission factor for PM_{10} $\text{kg pl}^{-1} \text{ a}^{-1}$	Emission factor for $\text{PM}_{2.5}$ $\text{kg pl}^{-1} \text{ a}^{-1}$
straw based	strohbasierend	0.34	0.16	0.10

Source: see text

7.4.7 References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung

Table 7.7: Light horses and ponies, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)

			from	to
Emissions	Emissionen	CH_4 enteric fermentation	EM1004.019	
		CH_4 manure management	EM1005.019	
		NMVOC	EM1007.019	
		NH_3	EM1009.055	EM1009.057
		N_2O	EM1009.109	
		NO	EM1009.139	
		TSP	EM1010.019	
		PM_{10}	EM1010.049	
		$\text{PM}_{2.5}$	EM1010.079	
Activity data	Aktivitäten		AC1005.022	
Emission factors	Emissionsfaktoren	CH_4 enteric fermentation	IEF1004.019	
		CH_4 manure management	IEF1005.019	
		NMVOC	IEF1007.019	
		NH_3	IEF1009.052	IEF1009.054
		N_2O	IEF1009.102	
		NO	IEF1009.130	
		TSP	IEF1010.018	
		PM_{10}	IEF1010.046	
		$\text{PM}_{2.5}$	IEF1010.074	
Additional information	zusätzliche Informationen		AI1005PSH.214	AI1005PSH.224

7.5 Horses– collective description / Pferde - zusammenfassende Daten

7.5.1 Animal weight and energy intake / Tiergewicht und Energieaufnahme

The mean weight of all equids is derived from the weights of the two subcategories “heavy horses” and “light horses/ponies” weighted with the respective animal numbers. Asses and mules are included, see Chapter 7.1. The mean weight varies only slightly from year to year. Averaging over the time series yields ca. 490 kg an⁻¹.

The mean gross energy (GE) intake of all equidae is calculated in analogy to the above described approach. The result is a value of 101 MJ pl⁻¹ d⁻¹.

These mean values do, due to the simple calculation methods used, not affect the emission results.

Das mittlere Gewicht aller Equiden ergibt sich aus der tierzahlgewichteten Mittelung über die beiden Unterkategorien „Großpferde“ und „Kleinpferde/Ponys“. Esel und Maultiere sind darin enthalten, siehe Kapitel 7.1. Die Variation des mittleren Gewichtes von Jahr zu Jahr ist sehr gering. Der Mittelwert seit 1990 beträgt ca. 490 kg an⁻¹.

In analoger Weise erhält man als mittlere Aufnahme an Gesamtenergie (GE) aller Equiden von 101 MJ pl⁻¹ d⁻¹.

Diese Mittelwerte sind wegen der Einfachheit der verwendeten Methoden ohne Einfluss auf die Emissionsberechnung.

7.5.2 Mean VS and N excretion rates / Mittlere VS- und N-Ausscheidungen

The mean excretions of VS and N are calculated as follows (weighted mean):

$$VS_{\text{mean, horses}} = \frac{n_{\text{ho}} \cdot VS_{\text{mean, ho}} + n_{\text{po}} \cdot VS_{\text{mean, po}}}{n_{\text{ho}} + n_{\text{po}}} \quad (7.1)$$

$$m_{\text{excr, mean, horses}} = \frac{n_{\text{ho}} \cdot m_{\text{excr, mean, ho}} + n_{\text{po}} \cdot m_{\text{excr, mean, po}}}{n_{\text{ho}} + n_{\text{po}}} \quad (7.2)$$

$VS_{\text{mean, horses}}$	mean amount of VS excreted by horses (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
n_{ho}	number of heavy horses (in pl)
$VS_{\text{mean, ho}}$	mean amount of VS excreted by heavy horses (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
$VS_{\text{mean, po}}$	mean amount of VS excreted by light horses, ponies, asses and mules (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
n_{po}	number of light horses, ponies, asses and mules (in pl)
$m_{\text{excr, mean, horses}}$	mean amount of N excreted by horses (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
$m_{\text{excr, mean, ho}}$	mean amount of N excreted by heavy horses (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
$m_{\text{excr, mean, po}}$	mean amount of N excreted by light horses, ponies, asses and mules (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)

7.5.3 International comparison / Internationaler Vergleich

Within the framework of quality assurance a comparison of input data and inventory results was made on European level. (For details of the procedure of the comparison see Chapter 4.3.10.)

The comparison is intended for horses including mules and asses, because Germany is reporting its emission results for the single animal category “horses, mules and asses”. However, Czech Republic, Denmark and Poland report data for horses only. The United Kingdom takes mules and asses explicitly into account for air pollutants, while it is not mentioned whether mules and asses are included in GHG results. Nevertheless, as mules and asses have only very small populations in Central Europe, their impact on total emission of the category “horses, mules and asses” emission results is small as well. Hence, the data provided by the ten countries are compared without further considerations regarding mules and asses.

Table 7.8 provides the implied emission factors (IEF) and emission explaining variables.

Im Zuge der Qualitätssicherung wurde ein Vergleich von Eingangsdaten und Inventarergebnissen auf mitteleuropäischer Ebene durchgeführt. (Nähere Angaben zur Durchführung: Siehe Kapitel 4.3.10.)

Der Vergleich ist für Pferde einschließlich Esel und Maultiere gedacht, weil Deutschland diese Tiere als Sammelkategorie berichtet. Tschechien, Dänemark und Polen berichten aber nur Daten für Pferde. Das Vereinigte Königreich berücksichtigt nur bei den Luftschadstoffen explizit Esel und Maultiere, und macht bei den Treibhausgasen keine Angaben dazu, ob Esel und Maultiere einbezogen wurden. Da Esel und Maultiere in Mitteleuropa nur sehr geringe Populationsgrößen erreichen, ist ihr Einfluss auf das Gesamtergebnis der Sammelkategorie „Pferde, Esel und Maultiere“ nur sehr gering. Daher werden im Folgenden die Daten aller zehn Vergleichsländer ohne weitere Differenzierung miteinander verglichen.

Table 7.8 zeigt die aggregierten Emissionsfaktoren (IEF) und emissionserklärenden Variablen.

Table 7.8: Horses, 2017, international comparison of emission explaining variables and implied emission factors for enteric fermentation (ent) and manure management (MM)

	mean animal weight	VS excretion	N excretion	IEF			
				CH ₄ , ent	CH ₄ , MM	NH ₃	direct N ₂ O
						(without spreading)	
	kg an ⁻¹	kg pl ⁻¹ d ⁻¹	kg pl ⁻¹ a ⁻¹	kg pl ⁻¹ a ⁻¹	kg pl ⁻¹ a ⁻¹	kg pl ⁻¹ a ⁻¹	kg pl ⁻¹ a ⁻¹
Austria	NA	2.13	47.90	18.00	2.81	14.57	0.301
Belgium	462	NE	56.31	16.98	1.46	5.63	0.247
Czech Republic	498	NA	47.22	18.00	1.56	3.80	0.742
Denmark ^a	600	3.70	39.56	21.81	2.72	4.34	0.311
France	542	2.05	50.09	20.77	1.59	6.37	0.164
Germany	490	2.39	48.81	16.58	3.14	13.66	0.409
Netherlands	NE	NE	n/a	17.98	1.56	4.04	n/a
Poland	NA	NA	55.00	18.00	1.56	1.99	0.027
Switzerland	NA	1.64	36.30	14.42	2.37	7.11	0.224
United Kingdom	NE	2.13	57.22	18.00	1.56	2.17	0.616
Median			48.81	18.00	1.58	4.98	0.301
IPCC (2006)-10.28, 10.40, 10.59, 10.82, Western Europe, cool region, devel- oped countries ^b	Tier 1: 550 Tier 2: 377	2.13	52.20	18	1.56		
EMEP (2016)-3B-16, 29			47.5			7.0	

Sources: Germany: Submission 2020; all other countries: UNFCCC (2019), CRF Tables; CEIP (2019), NFR
n/a, NA, NE: No data available for different reasons
^a Denmark without Greenland and Faroe Island
^b IPCC N excretions: calculated using the IPCC Tier 1 default animal weight (550 kg)

Half the countries do not provide animal weights, probably because emissions have been calculated with the Tier 1 methodology that does need animal weight as input. The Czech and German weights are on a similar level. The Belgian value is somewhat lower, while the Danish value is considerably higher. Like for sheep and goats the IPCC default values for Tier 1 and Tier 2 methodology are inconsistent.

As to the VS excretions, four countries do not provide data. The United Kingdom uses the IPCC default value. The German value is 12 % above the IPCC default.

The N excretions range from 36.3 kg pl⁻¹ a⁻¹ (Switzerland) to 57.2 kg pl⁻¹ a⁻¹ (United Kingdom). The German value represents the median, which is comparable to the EMEP default value. The IPCC value of 52.2 kg pl⁻¹ a⁻¹ is 7 % above the median.

As to the IEF for CH₄ from enteric fermentation some countries use the IPCC default emission factor 18 kg pl⁻¹ a⁻¹. The German IEF, which is about the level of the Belgian value, is lower than the IPCC default emission factor, because Germany applies different emission factors for heavy horses and light horses/ponies. This differentiation and the underlying emission factors (and hence the resulting overall emission factor as well) have been accepted by the ERT of the In Country Review in September 2016.

The IEF values for CH₄, NH₃ and N₂O from manure management range over large ranges, for NH₃ and N₂O about an order of magnitude. These international differences cannot be explained by the available information.

Die Hälfte der Länder geben kein Tiergewicht an, vermutlich, weil das Tiergewicht in der Tier-1-Methodik ohne Bedeutung ist. Der deutsche und der tschechische Wert liegen auf vergleichbarem Niveau. Belgien liegt etwas darunter, Dänemark aber deutlich darüber. Wie bei den Schafen und den Ziegen sind die IPCC-Defaultwerte für Tier-1- und Tier-2-Verfahren inkonsistent.

Bei den VS-Ausscheidungen machen vier Länder keine Angaben. Österreich und das Vereinigte Königreich verwenden den IPCC-Defaultwert. Deutschland liegt 12 % über dem IPCC-Defaultwert.

Die N-Ausscheidungen bewegen sich in einem Bereich von 36,3 kg pl⁻¹ a⁻¹ (Schweiz) bis 57,2 kg pl⁻¹ a⁻¹ (Vereinigtes Königreich). Der deutsche Werte repräsentiert den Median, der dem EMEP-Defaultwert vergleichbar ist. Der nach IPCC-Rechenregeln berechnete IPCC-Wert von 52,2 kg pl⁻¹ a⁻¹ liegt 7 % über dem Median.

Beim IEF für CH₄ aus der Verdauung greifen einige Länder auf den IPCC-Defaultwert von 18 kg pl⁻¹ a⁻¹ zurück. Der deutsche IEF, der ungefähr auf dem Niveau des belgischen Wertes liegt, ist niedriger als der IPCC-Defaultwert, da unterschiedliche Emissionsfaktoren für Groß- und Kleinpferden zugrunde gelegt werden. Diese Differenzierung und die zugehörigen tierkategorie-spezifischen Emissionsfaktoren (und damit implizit auch der resultierende IEF) wurden durch das ERT des In-Country-Review im September 2016 akzeptiert.

Die IEF-Werte für CH₄, NH₃ und N₂O aus dem Wirtschaftsdünger-Management erstrecken sich über große Spannbreiten, bei NH₃ und N₂O ca. eine Größenordnung. Diese internationalen Unterschiede können mit den verfügbaren Informationen nicht erklärt werden.

7.5.4 References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung

Table 7.9: Horses, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)

			from	to
Emissions	Emissionen	CH ₄ enteric fermentation	EM1004.020	
		CH ₄ manure management	EM1005.020	
		NMVOC	EM1007.020	
		NH ₃	EM1009.058	EM1009.060
		N ₂ O	EM1009.110	
		NO	EM1009.140	
		TSP	EM1010.020	
		PM ₁₀	EM1010.050	
		PM _{2.5}	EM1010.080	
Activity data	Aktivitäten		AC1005.023	
Emission factors	Emissionsfaktoren	CH ₄ enteric fermentation	IEF1004.020	
		CH ₄ manure management	IEF1005.020	
		NMVOC	IEF1007.020	
		NH ₃	IEF1009.055	IEF1009.057
		N ₂ O	IEF1009.103	
		NO	IEF1009.131	
		TSP	IEF1010.019	
		PM ₁₀	IEF1010.047	
		PM _{2.5}	IEF1010.075	
Additional information	zusätzliche Informationen		AI1005PSH.225	AI1005PSH.243
Excretion rates	Ausscheidungen	N	EXCR.078	EXCR.080

8 Poultry / Geflügel

8.1 Animal numbers / Tierzahlen

8.1.1 Formation of subcategories / Untergliederung in Subkategorien

For greenhouse gases, emissions have to be reported for poultry as a single category. For air pollutants, a differentiation has to be made between laying hens, broilers, turkeys and “other poultry”.

Differences in housing and feeding of the subcategories result in considerable differences in the respective emission generating processes within poultry production. Therefore, emissions are calculated separately for each subcategory. In addition, for turkeys, male and female animals are considered.

The animal numbers used and their derivation are explained in the respective subchapters of the subsequent poultry category chapters.

The results obtained for the subcategories are finally aggregated to serve the reporting obligations (see Chapter 8.9).

Treibhausgasemissionen sind für Geflügel insgesamt zu berichten. Bei den luftverschmutzenden Gasen und Stoffen ist nach Legehennen, Masthähnchen und –hähnchen, Puten sowie „anderes Geflügel“ zu unterscheiden.

Bedingt durch unterschiedliche Haltung und Fütterung weisen alle Geflügel-Unterkategorien ein unterschiedliches Emissionsverhalten auf. Um diesem Umstand gerecht zu werden, erfolgt die Emissionsberechnung zunächst getrennt nach Unterkategorien, wobei zusätzlich noch zwischen männlichen und weiblichen Puten unterschieden wird.

Die verwendeten Tierzahlen bzw. ihre Berechnung werden in den entsprechenden Unterkapiteln der einzelnen Geflügelkategorien erläutert.

Die Ergebnisse der Unterkategorien werden anschließend den Berichtspflichten entsprechend aggregiert, siehe Kapitel 8.9.

Table 8.1: Poultry, categorisation and characterisation

Animal category according to German census			Animal categories used in this inventory			
type	category		type	category	weight 1 ^a	weight 2 ^a
AA ^b	Legehennen	laying hens	lh	laying hens	$w_{\text{start, lh}}$	$w_{\text{fin, lh}}$
AB ^b	Junghennen	pullets	pu	pullets	45 g an^{-1}	$w_{\text{start, lh}}$
AC	Schlacht- und Masthähne und –hühner sowie sonstige Hähne einschl. der hierfür bestimmten Küken	hens and cocks produced for slaughtering	br	broilers	---	---
AD	Gänse	geese	ge	geese	7 kg an^{-1}	
AE	Enten	ducks	du	ducks	3 kg an^{-1}	
AF	Truthühner	turkeys	tm	turkeys, males	60 g an^{-1}	$w_{\text{fin, tm}}$
			tf	turkeys, females		$w_{\text{fin, tf}}$

^a weight 1: weight at the beginning of the respective period, weight 2: weight at the end of the respective period; w_{start} : variable start weight, weight w_{fin} : variable final weight
^b For the distinction between pullets and laying hens in German censuses see Chapters 8.3 and 8.5.

8.1.2 Uncertainties / Unsicherheiten

For poultry numbers a standard error of 5 % is assumed (normal distribution). Then half the 95 % confidence interval is 10 %.

Für Geflügelzahlen wird ein Standardfehler von 5 % angenommen (Normalverteilung). Das halbe 95 %-Konfidenzintervall beträgt 10 %.

8.2 Emission factors for nitrogen emissions / Emissionsfaktoren für Stickstoffemissionen

Due to lack of data, the inventory does not distinguish between dried excretions and poultry farmyard manure: als poultry manure is considered to be farmyard manure. While this simplification is of no significance for the N₂O emissions (because of the undifferentiated emission factors), the NH₃ emissions from poultry farmyard manure are higher than from dried excretions. Hence the inventory is likely to overestimate NH₃ emissions to some extent.

Aufgrund fehlender Daten wird nicht zwischen Trockenkot und Geflügelmist unterschieden: Der gesamte Geflügel-Wirtschaftsdünger wird als Geflügelmist angesehen. Für die N₂O-Emissionen ist diese Unterscheidung mangels differenzierter Emissionsfaktoren zwar ohne Bedeutung; für NH₃ wird dagegen der gesamte Wirtschaftsdünger aus der Geflügelhaltung in konservativer Weise als der emissionsreichere Geflügelmist angesehen.

8.2.1 N₂O, NO and N₂ from housing, storage and spreading / N₂O, NO und N₂ aus Stall, Lager und Ausbringung

According to IPCC (2006) there are two different categories of N₂O emissions from animal husbandry: Direct emissions from the compartments housing and storage, and indirect emissions. The German inventory considers only the indirect emissions due to deposition of reactive nitrogen that is a consequence of emissions of NH₃ and NO from the compartments housing and storage, see Chapter 3.3.4.3.6.

Nach IPCC (2006) werden der Tierhaltung neben direkten N₂O-Emissionen aus dem Bereich Stall/Lager auch indirekte N₂O-Emissionen zugeordnet. Im deutschen Inventar werden dabei lediglich die indirekten Emissionen aufgrund der Deposition von reaktivem Stickstoff berücksichtigt, die auf die Emissionen von NH₃ und NO aus dem Bereich Stall/Lager zurückgeht. Siehe dazu auch Kapitel 3.3.4.3.6.

The emission factor for direct N₂O is a combined factor for house and storage. The data used are taken from IPCC(2006)-10.63. The emission factors for NO and N₂ are derived from the N₂O emission factor, see Chapter 3.3.4.3.5.

Der Emissionsfaktor für direktes N₂O fasst die Emissionen aus Stall und Lager zusammen und wurde IPCC(2006)-10.63 entnommen. Die Emissionsfaktoren für NO und N₂ werden aus dem N₂O-Emissionsfaktor abgeleitet, siehe Kapitel 3.3.4.3.5.

The emission factors are related to the sum of nitrogen excreted and N input with bedding material.

Die Emissionsfaktoren beziehen sich auf die Summe aus ausgeschiedenem und durch Einstreu eingebrachtem N.

The resulting partial emission factors for N₂O, NO and N₂ from storage, which are used for all poultry categories in the inventory, are listed in Table 8.2.

Die resultierenden, für alle Geflügelkategorien einheitlichen partiellen Emissionsfaktoren für N₂O, NO und N₂ sind in Table 8.2 angegeben.

According to IPCC (2006), the anaerobic digestion of manure represents a separate type of manure storage. This storage type, however, in the German methodology, consists of three compartments: pre-storage, digester, storage of digestate. The effective emission factor of this combination is not a constant and must be calculated (see Chapter 3.3.4.4).

Die Vergärung von Wirtschaftsdünger wird nach IPCC (2006) als eigenständiger Lagertyp aufgefasst. Dieser umfasst im deutschen Inventar prinzipiell die drei Komponenten Vorlager, Fermenter und Gärrestelager. Der effektive Emissionsfaktor für diese Kombination ist nicht konstant und muss berechnet werden (siehe Kapitel 3.3.4.4).

Indirect N₂O emissions from manure management (housing, storage; without spreading) are calculated according to Chapter 3.3.4.3.6.

Indirekte N₂O-Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management (Stall, Lager; ohne Ausbringung) werden nach Kapitel 3.3.4.3.6 berechnet.

Table 8.2: Poultry, partial emission factors for N₂O-N, NO-N, and N₂-N from housing and storage (applied to Nexcr + Nstraw)

N ₂ O	poultry manure	Geflügelkot	0.001	kg kg ⁻¹
NO	poultry manure	Geflügelkot	0.0001	kg kg ⁻¹
N ₂	poultry manure	Geflügelkot	0.003	kg kg ⁻¹

Source: see text

As a result of the application of manure and of digestates from the anaerobic digestion of animal manures, direct and indirect N₂O and NO emissions result, see Chapters 11.2 and 12.

Als Folge der Ausbringung von Wirtschaftsdünger und Wirtschaftsdünger-Gärresten ergeben sich direkte und indirekte N₂O- sowie NO-Emissionen, siehe Kapitel 11.2 und 12.

8.2.2 *NH₃ emission factors / NH₃-Emissionsfaktoren*

The NH₃ emission factors for housing and storage are different for the different poultry categories. Hence, these emission factors are dealt with separately in the respective sub-chapters of the poultry chapters.

The partial NH₃-N emission factors used for spreading are identical for each of the various poultry categories (see Table 8.3). They refer to UAN which is in the inventory equated with TAN (see Chapter 3.3.3.2).

Die NH₃-Emissionsfaktoren für Stall und Lager unterscheiden sich für die verschiedenen Geflügelkategorien. Sie werden daher in den nachfolgenden Geflügel-Kapiteln gesondert behandelt.

Die partiellen NH₃-N-Emissionsfaktoren für die Ausbringung sind für die verschiedenen Geflügelkategorien gleich, siehe Table 8.3. Sie beziehen sich auf UAN, welches mit TAN gleich gesetzt wird, siehe Kapitel 3.3.3.2.

Table 8.3: Poultry, emission factors for NH₃-N from application of poultry manure (related to UAN)

Application type	Ausbringungstechnik	Emission factor (kg kg ⁻¹)
broadcast, without incorporation	Breitverteiler, ohne Einarbeitung	0.90
broadcast, incorporation ≤ 1 h	Breitverteiler, Einarbeitung ≤ 1 h	0
broadcast, incorporation ≤ 4 h	Breitverteiler, Einarbeitung ≤ 4 h	0.18
broadcast, incorporation ≤ 12 h	Breitverteiler, Einarbeitung ≤ 12 h	0.396
broadcast, incorporation ≤ 24 h	Breitverteiler, Einarbeitung ≤ 24 h	0.45
calculated according to Döhler et al. (2002), S. 78, completed (expert judgement KTBL)		

No NH₃-N emission factors are available for the application of poultry manures after anaerobic digestion. Hence, according to Chapter 3.3.4.4.3, the emission factors of untreated *cattle slurry* were used (see Table 4.8).

Für die Ausbringung von Gärresten aus der Vergärung von Geflügelkot sind keine NH₃-N-Emissionsfaktoren verfügbar. Nach Kapitel 3.3.4.4.3 wurden daher die Emissionsfaktoren für die Ausbringung von unbehandelter *Rindergülle* übernommen, siehe Table 4.8.

8.2.3 *Uncertainties of emission factors and activity data / Unsicherheiten von Emissionsfaktoren und Aktivitätsdaten*

For the uncertainties of the emission factors see Chapter 4.2.2.4 and 11.2.2.

The uncertainty of N excretion is discussed in Chapter 14.4.1. For the uncertainty of the amount of N spreaded see Chapter 11.2.1.

Zu den Unsicherheiten der Emissionsfaktoren siehe Kapitel 4.2.2.4 und 11.2.2.

Die Unsicherheit der N-Ausscheidung wird in Kapitel 14.4.1 diskutiert. Zur Unsicherheit der zur Ausbringung kommenden N-Menge siehe Kapitel 11.2.1.

8.3 Laying hens / Legehennen

Female chickens in their reproductive phase are called laying hens. The laying period of hens begins when they are about 18 weeks old. The lifespan before is dealt with in Chapter 8.5 (pullets).

The emissions are calculated according to the methods compiled in Table 8.4.

For the definition of the methods see Chapter 3.2.3.

Weibliche Hühner in der reproduktiven Phase werden als Legehennen bezeichnet. Die Legeperiode beginnt, wenn sie etwa 18 Wochen alt sind. Zuvor werden die Tiere als Junghennen bezeichnet (siehe Kapitel 8.5)

Die Berechnung der Emissionen erfolgt nach den in Table 8.4 zusammengestellten Methoden.

Zur Methodendefinition siehe Kapitel 3.2.3.

Table 8.4: Laying hens, calculation methods applied

Species	Origin	Tier	Method applied
CH ₄	enteric fermentation		no method
CH ₄	manure management	2	IPCC / national
NMVOC	manure management	1	EMEP
NH ₃	manure management	2	EMEP / national
N ₂ O, NO, N ₂	manure management	2	IPCC / national
TSP, PM ₁₀ , PM _{2.5}	manure management	2	EMEP

8.3.1 Animal numbers / Tierzahlen

Poultry numbers have been surveyed in each agricultural-structure surveys, i.e. until 1996 in each even year, from 1999 to 1997 in each odd year, 2010 in the LZ 2010 census (STATLA C III 1 – vj 4, see also Chapter 3.4.2.1), and 2013 and 2016 in agricultural structure surveys. For the years between the surveys the poultry numbers were estimated by linear interpolation. The striking increase of animal numbers between 2010 and 2013 is, for the most part, due to the fact that the number of farms questioned in 2013 was higher than in 2010 (see Chapter 3.4.2.1). The missing numbers of laying hens for 2017 and 2018 were estimated by extrapolation, see Chapter 3.4.2.2.

The German censuses up to and including 2007 differentiated hens according to animal age: Hens younger than half a year and hens older than half a year. This means: In official surveys including 2007, pullets up to the age of six months were counted, although in common husbandry practice pullets are considered laying hens when they complete their 18th week of life. For the inventory, therefore, a fraction of the pullets was shifted into the laying-hen category up to and including 2007. This correction assumed that the number of pullets produced be equal to the number of hens slaughtered. In addition, the sum of the recalculated numbers of pullets and laying hens had to be equal to the total of animal numbers in both poultry categories. The subsequent equation describes the resulting modification of the laying hen numbers:

Geflügelzahlen wurden in jeder Agrarstrukturerhebung erhoben, d.h. bis 1996 in allen geraden Jahren, 1999 bis 2007 in allen ungeraden Jahren, 2010 in der LZ 2010 (STATLA C III 1 – vj 4, siehe auch Kapitel 3.4.2.1) und 2013 sowie 2016 in einer Agrarstrukturerhebung. In den Zwischenjahren wurden die Geflügelzahlen durch lineare Interpolation geschätzt. Der auffällig starke Anstieg zwischen 2010 und 2013 ist dabei im Wesentlichen auf die der Zählung 2013 zugrunde liegende Berichtskreisrevison (siehe Kapitel 3.4.2.1) zurückzuführen ist. Die für 2017 und 2018 fehlenden Legehennenzenzahlen wurden durch Extrapolation geschätzt, siehe Kapitel 3.4.2.2.

Bei den Zählungen bis 2007 einschließlich wurde bei der Erfassung von Hennen in Deutschland danach unterschieden, ob die Tiere jünger oder älter als ein halbes Jahr sind. Das bedeutet: Junghennen wurden bis einschließlich der Erhebung 2007 entgegen der Haltungspraxis (Aufstallung als Legehennen bereits nach der 18. Woche, wie es im Inventar auch berücksichtigt ist) offiziell bis zu einem Alter von 6 Monaten gezählt. Daher wurde für das Inventar bis einschließlich 2007 ein Teil der Junghennen in die Legehennen-Kategorie verschoben, wobei die Gesamtsumme aus Jung- und Legehennen nicht verändert wurde. Für diese Modifizierung der Tierzahlen wurde angenommen, dass genau so viele Junghennen aufgezogen werden, dass frei werdende Legehennenplätze wieder besetzt werden können. Die nachstehende Gleichung beschreibt diese Berechnung:

$$n_{lh} = (n_{AA} + n_{AB}) \cdot \frac{\tau_{round, lh}}{\tau_{round, lh} + \tau_{round, pu}} \quad (8.1)$$

n_{lh}	modified number of laying hen places, used in the inventory for the years 1990 - 2007
n_{AA}	animal place numbers of type AA (i. e. laying hens) in the German census until 2007, see Table 8.1
n_{AB}	animal place numbers of type AB (i. e. laying pullets) in the German census until 2007, see Table 8.1
$\tau_{round, pu}$	duration of round for pullets ($\tau_{round, pu} = 142$ d), see Chapter 8.5.2
$\tau_{round, lh}$	duration of round for laying hens ($\tau_{round, lh} = 441$ d), see Chapter 8.3.2

The next official survey after 2007 took place in 2010. As of this survey the numbers of pullets and laying hens were counted according to the above mentioned husbandry practice. Hence no animal number shifting is applied as of the 2010 survey and the laying hen numbers are $n_{lh} = n_{AA..}$.

For the uncertainty of the animal numbers see Chapter 8.1.2.

8.3.2 Data on laying hen husbandry and egg production / Haltungs- und Legeleistungsdaten

Data on the frequencies of housing systems are available for each year as of 1993. The data are provided, on request and annually, by the Federal Statistical Office. The data gap 1990 - 1992 was closed by adopting the data of 1993.

Regarding laying hens, only laying performance data (average number of eggs per hen and year) are being surveyed and reported by the Federal Statistical Office. Lifespan as laying hen (or duration of production), animal weights at the beginning and the end of the production cycle (start weight, final weight) and egg weights are not surveyed officially. Hence other data sources are needed for the emission inventory calculations.

For lifespan ($\tau_{lifespan, lh}$), KTBL (2004), pg. 481, provides a value of 434 days and for the duration of the production cycle ($\tau_{round, lh}$) a value of 441 days. According to KTBL (2014), pg. 720, the duration of production cycle of 441 days marks the upper threshold, along with lifespans between 315 and 420 days. While this means a shortening of the duration of production cycle in comparison to KTBL (2004), there are reports on a considerable lengthening for up to 9 % of the entire laying hens population (see e. g. URSELMANS UND DAMME, 2015; POTTGÜTER, 2016; MMB, 2016). As already mentioned above there is no statistical survey on lifespans and/or durations of production cycles. Hence the emission calculations continue to use the model approach described by HAENEL UND DÄMMGEN (2007b), which is based on a lifespan of 434 days and duration of production cycle of 441 days, see Chapter 8.3.3.

Data on start weights, final weights and egg weights is recorded in performance contests, breed comparisons and feeding tests and are reported in the DGS-Magazin, the official journal of the Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft (German Poultry Association): HARTMANN and HEIL (1992), HEIL and HARTMANN (1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000), ANONYMUS (2001a, 2003, 2005, 2007a, 2007b, 2007c), WIEDMANN and DAMME (2008), DAMME (2009), URSELMANS and DAMME (2011), URSELMANS and DAMME (2012). The frequency of those investigations decreased more and more with the years. Hence the most recent data are available for the situation in 2011.

Table 8.5 shows the data available. Data on starting weights, final live weights and egg weights are listed for the years when the respective investigations were performed. Due to limited space in Table 8.5, every other year is omitted in the years before 2010.

Die nächste Geflügelzählung nach 2007 fand 2010 statt. Ab dieser Zählung wurden die Tierzahlen von Junghennen und Legehennen entsprechend der oben erwähnten Haltungspraxis erhoben. Daher entfällt ab 2010 eine Umrechnung nach Gleichung (8.1) und es gilt $n_{lh} = n_{AA..}$.

Zur Unsicherheit der Tierzahlen siehe Kapitel 8.1.2.

Ab 1993 liegen für jedes Jahr Angaben zur Verteilung der Haltungsformen vor. Die Daten werden auf Anfrage jährlich durch das Statistische Bundesamt bereitgestellt. Die Datenlücke 1990 bis 1992 wurde durch Übernahme des Wertes von 1993 geschlossen.

Das Statistische Bundesamt erhebt und berichtet bzgl. Legehennen lediglich die Legeleistung (mittlere Anzahl der pro Henne und Jahr gelegten Eier). Lebensdauer als Legehenne (oder: Legedauer, Produktionsdauer), Tiergewichte zu Beginn und Ende der Produktionsdauer (Anfangs- und Endgewicht) sowie Eigewicht werden nicht offiziell erfasst, so dass für das Emissionsinventar andere Datenquellen benötigt werden.

KTBL (2004), S. 481, gibt die Lebensdauer bzw. Legedauer ($\tau_{lifespan, lh}$) mit 434 Tagen und die Durchgangsdauer ($\tau_{round, lh}$) mit 441 Tagen an. Nach KTBL (2014), S. 720, stellt eine Durchgangsdauer von 441 Tagen die Obergrenze dar, verbunden mit Lebensdauern bzw. Legedauern zwischen 315 und 420 Tagen. Dieser Verkürzung der Legedauern gegenüber KTBL (2004) stehen allerdings Berichte zu einer merklichen Verlängerung bei bis zu 9 % des Legehennenbestandes gegenüber (siehe z.B. URSELMANS UND DAMME, 2015; POTTGÜTER, 2016; MMB, 2016). Da es, wie weiter oben bereits erwähnt, keine statistische Erhebung zur Lebensdauer bzw. Legedauer gibt, beruht die Emissionsberechnung weiterhin auf dem von HAENEL UND DÄMMGEN (2007b) beschriebenen Modellsatz, der von 434 Tagen für die Legedauer und 441 Tagen für die Durchgangsdauer ausgeht, siehe Kapitel 8.3.3.

Für Daten zu Anfangs- und Endgewicht sowie Eigewicht wurde auf Ergebnisse von Leistungsprüfungen, Herkunftsvergleichen und Futtertests zurückgegriffen, die im DGS-Magazin, dem offiziellen Organ des Zentralverbandes der Deutschen Geflügelwirtschaft, veröffentlicht wurden: HARTMANN and HEIL (1992), HEIL and HARTMANN (1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000), ANONYMUS (2001a, 2003, 2005, 2007a, 2007b, 2007c), WIEDMANN and DAMME (2008), DAMME (2009), URSELMANS und DAMME (2011), URSELMANS und DAMME (2012). Die Häufigkeit solcher Untersuchungen ist immer weiter zurückgegangen, so dass die neuesten verfügbaren Daten sich auf das Jahr 2011 beziehen.

Table 8.5 zeigt die verfügbaren Daten. Die Daten zu Anfangs- und Endgewicht sowie Eigewicht wurden den Jahren zugeordnet, in denen die o. g. Untersuchungen stattfanden. Aus Platzgründen wurde in Table 8.5 vor 2010 jedes zweite Jahr weggelassen.

Table 8.5: Laying hens, performance data

quantity ^a	1990	1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
w_{start}	1.550	1.520	1.370	1.360		1.276	1.245	1.303			1.293	1.293							
w_{fin}	2.070	2.070	1.960	1.860		1.799	1.733	2.026	1.927	1.887	1.850	1.850							
eggs produced	269.9	273.9	275.9	282.5	286.2	289.4	288.1	291.4	291.6	298.7	294.4	297.5	298.2	294.3	292.5	294.0	296.5	297.9	280.0
egg weight	64.6	65.4	64.4	63.1		62.6	63.8	65.3	64.0	62.8	64.4	64.4							

^a Units: (live weights in kg a⁻¹; average number of eggs produced per hen in eg pl⁻¹ a⁻¹; mean egg weight in g eg⁻¹)

Sources: see text

The data on start weights, final weights and egg weights is subject to numerous factors like the choice of feed in performance tests and breed comparisons, the ratio of brown layers to white layers or the choice of breed in feed contests. However, the impacts of these factors cannot be statistically analyzed as there is not enough data. In addition, it is unclear how to close data gaps properly.


Hence the method of the least squares was applied to the data in order to derive the relevant temporal trends, see Figure 8.1. They allow for a straightforward method of data gap closure. The data corresponding to the solid lines in Figure 8.1 are used as input data for the emission calculation (in kg, rounded to two decimals): Initial weight 1990 1.57 kg, from 1998 onwards 1.29 kg; Final weight 1990 2.10 kg, from 1998 onwards 1.89 kg. These values are, due to lack of regional differentiation of the underlying input data, assumed to be valid for entire Germany.

Based on the trends the animal weights are assumed to constant as of 1998. They are maintained for the years after 2011 until more recent data will be available.

Die Daten zu Anfangs- und Endgewicht sowie Eigewicht unterliegen zahlreichen Einflüssen (u. a. Wahl des Futters bei Leistungs- und Herkunftsversuchen, Verhältnis Braunleger/Weißleger, Wahl der Rasse bei Fütterungsversuchen), die wegen des geringen Datenumfangs statistisch nicht isoliert werden können. Überdies stellt sich die Frage nach einer geeigneten Schließung von Datenlücken.

Es wurden daher aus dem Datenmaterial mithilfe der Methode der kleinsten Fehlerquadrate die relevanten zeitlichen Trends abgeleitet, siehe Figure 8.1. Mit ihrer Hilfe ist auch eine einfache Schließung der Datenlücken möglich. Die den durchgezogenen Linien in Figure 8.1 entsprechenden Daten werden als Eingangsdaten für die Emissionsberechnung verwendet (in kg, gerundet auf zwei Dezimalstellen): Anfangsgewicht 1990 1,57 kg, ab 1998 einschließlich 1,29 kg; Endgewicht 1990 2,10 kg, ab 1998 einschließlich 1,89 kg. Diese Werte werden mangels räumlicher Differenzierung der zugrunde liegenden Eingangsdaten als für ganz Deutschland gültig angenommen.

Die ab 1998 gleichbleibenden Gewichtsdaten werden auch für die Jahre nach 2011 beibehalten bis neue Daten verfügbar sind.

Figure 8.1: Laying hens, animal live weight data and related trends

The egg weight data shows no significant trend. Hence the inventory calculations use the temporal mean

Die Eigewichte zeigen keinen signifikanten Trend und werden in den Emissionsberechnungen für alle Jahre

egg weight (64.3 g per egg) for all years of the time series. This value is used for entire Germany.

durch den zeitlichen Mittelwert (64,3 g pro Ei) ersetzt. Dieser Wert wird für ganz Deutschland verwendet.

8.3.3 Energy requirements / Energiebedarf

8.3.3.1 Metabolisable energy / Umsetzbare Energie

The overall requirements of daily metabolisable energy per place (averaged over the lifespan as laying hen) are given by the following relation:

Für den über die Lebensdauer als Legehenne gemittelten Tagesbedarf an metabolisierbarer Energie pro Tierplatz gilt:

$$ME_{lh} = ME_m + ME_f + ME_{egg} + ME_g \quad (8.2)$$

ME_{lh}	daily requirements of metabolisable energy (in MJ pl ⁻¹ d ⁻¹)
ME_m	daily metabolisable energy required for maintenance (in MJ pl ⁻¹ d ⁻¹)
ME_f	daily metabolisable energy needed to obtain food (in MJ pl ⁻¹ d ⁻¹)
ME_{egg}	daily metabolisable energy for egg production (in MJ pl ⁻¹ d ⁻¹)
ME_g	daily metabolisable energy consumed for growth (in MJ pl ⁻¹ d ⁻¹)

The subsequent detailed calculations of ME_m , ME_f , ME_{egg} , and ME_g are based on information provided in GfE (2000, in particular equation 1.2.4.1 and context). As there is no more recent information on this issue, GfE (2000) is kept as basis for the calculation of energy requirements.

Die nachstehend beschriebene Berechnung der Teilenergien ME_m , ME_f , ME_{egg} und ME_g beruht auf Angaben in GfE (2000, s. Gl. 1.2.4.1 und Kontext). Da es keine vergleichbaren neueren Informationen gibt, wird GfE (2000) als Grundlage für die Energiebedarfsberechnung beibehalten.

8.3.3.2 Metabolisable energy required for maintenance / Erhaltungenergie

The calculation of ME_m takes ambient temperatures into account. ME_m is calculated as follows:

Die Berechnung von ME_m erfolgt in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur gemäß

$$ME_m = (\eta_{ME,m} + \eta_{ME,mt}) \cdot \frac{1}{\tau_{lifespan,lh}} \cdot \Sigma W \quad (8.3)$$

ME_m	daily metabolisable energy required for maintenance (in MJ pl ⁻¹ d ⁻¹)
$\eta_{ME,m}$	specific metabolisable energy required for daily maintenance ($\eta_{ME,m} = 0,48 \text{ MJ kg}^{-1} \text{ d}^{-1}$, cf. GfE, 2000, eq. 1.2.4.1)
$\eta_{ME,mt}$	specific metabolisable energy required for daily maintenance under low temperature conditions (in MJ kg d ⁻¹), see below
$\tau_{lifespan,lh}$	lifespan of laying hens (in d), see Chapter 8.3.2
ΣW	cumulative metabolic weight (in kg d pl ⁻¹)

With $\eta_{ME,mt} > 0$ it is possible to account for an increased energy requirement due to low ambient temperatures (GfE, 2000, p. 28; HAENEL et al., 2010, p. 275). However, as laying hens in Germany are predominantly kept in insulated houses with forced ventilation, the inventory uses $\eta_{ME,mt} = 0$.

Mit $\eta_{ME,mt} > 0$ kann ein Mehrbedarf an Energie bei niedrigen Umgebungstemperaturen berücksichtigt werden (GfE, 2000, p. 28; HAENEL et al., 2010, p. 275). Da der bei weitem überwiegende Teil der Legehennen in Deutschland in wärmeisolierten und zwangsbelüfteten Ställen lebt, wird im Inventar mit $\eta_{ME,mt} = 0$ gerechnet.

According to HAENEL and DÄMMGEN (2007b), ΣW is a function of $w_{start,lh}$ and $w_{fin,lh}$, combined with a characteristic time parameter $\tau_{char,g,lh}$ ($\tau_{char,g,lh} = 56 \text{ d}$). $\tau_{char,g,lh}$ is based on a lifespan of $\tau_{lifespan,lh} = 434 \text{ d}$. For the choice of $\tau_{lifespan,lh}$ see also Chapter 8.3.2.

Nach HAENEL und DÄMMGEN (2007b) wird ΣW als Funktion von Start- und Endgewicht mithilfe eines charakteristischen Zeitparameters ($\tau_{char,g,lh} = 56 \text{ d}$) berechnet, der auf der Lebensdauer $\tau_{lifespan,lh} = 434 \text{ d}$ beruht. Zur Wahl von $\tau_{lifespan,lh}$ siehe auch Kapitel 8.3.2.

$$\Sigma W = w_{m,ref} \cdot \left[\tau_{char,g,lh} \cdot \left(\frac{w_{start}}{w_{m,ref}} \right)^{0.75} + (\tau_{lifespan} - \tau_{char,g,lh}) \cdot \left(\frac{w_{fin}}{w_{m,ref}} \right)^{0.75} \right] \quad (8.4)$$

ΣW	cumulative metabolic weight (in kg d an ⁻¹)
$w_{m,ref}$	reference weight ($w_{m,ref} = 1 \text{ kg an}^{-1}$)
$\tau_{char,g,lh}$	characteristic time scale of growth (in d)

w_{start}	animal weight at the beginning of egg production (in kg a ⁻¹)
$\tau_{\text{lifespan, lh}}$	lifespan of laying hens (in d), see Chapter 8.3.2
w_{fin}	animal weight at the end of egg production (in kg a ⁻¹)

8.3.3.3 Metabolisable energy needed to obtain food / Energiebedarf für Nahrungsaufnahme

The mean daily energy requirements ME_f to obtain food depends on the housing system. ME_f is calculated according to GfE (2000, pg. 29) as follows:

Der mittlere tägliche Energiebedarf ME_f für die Nahrungsaufnahme hängt vom Haltungssystem ab. Er wird nach GfE (2000, S. 29) wie folgt berechnet:

$$ME_f = c_{\text{aer}} \cdot (ME_m + ME_{\text{egg}} + ME_g) \quad (8.5)$$

ME_f	metabolisable energy needed to obtain food (in MJ pl ⁻¹ d ⁻¹)
c_{aer}	coefficient for additional energy requirements needed to obtain food (in MJ MJ ⁻¹)
ME_m	metabolisable energy required for maintenance (in MJ pl ⁻¹ d ⁻¹)
ME_{egg}	metabolisable energy for egg production (in MJ pl ⁻¹ d ⁻¹)
ME_g	metabolisable energy consumed for growth (in MJ pl ⁻¹ d ⁻¹)

The coefficient c_{aer} is 0.10 MJ MJ⁻¹ for a deep bedding house, and 0.15 MJ MJ⁻¹ for free range hens. For aviaries no value is known. However, it should be similar to the one used for deep bedding houses; thus, a coefficient factor $c_{\text{aer}} = 0.10$ MJ MJ⁻¹ is used. For tempered cages or small group housing systems there is no energy requirements ME_f ($c_{\text{aer}} = 0$).

Der Koeffizient c_{aer} beträgt 0,10 MJ MJ⁻¹ für Bodenhaltung und 0,15 MJ MJ⁻¹ für Freilandhaltung. Für Volierenhaltung ist kein Wert bekannt; er dürfte dem der Bodenhaltung am nächsten kommen und wird deshalb mit 0,10 MJ MJ⁻¹ angesetzt. Für temperierte Käfighaltung bzw. Kleingruppenhaltung fällt kein Energiebedarf ME_f an ($c_{\text{aer}} = 0$).

8.3.3.4 Metabolisable energy needed for egg production / Energiebedarf für Eiproduktion

The mean daily requirements is calculated from the mean weight per egg, the mean number of eggs laid per day and the specific energy requirement η_{egg} :

Der mittlere tägliche Bedarf berechnet sich aus der mittleren Masse eines Eies, der mittleren Eizahl pro Tag und einem spezifischen Energiebedarf η_{egg} nach:

$$ME_{\text{egg}} = \eta_{\text{ME, egg}} \cdot \frac{n_{\text{eggs}}}{\alpha} \cdot \mu_{\text{egg}} \quad (8.6)$$

ME_{egg}	metabolisable energy required for egg production (in MJ pl ⁻¹ d ⁻¹)
$\eta_{\text{ME, egg}}$	specific metabolisable energy required for egg production ($\eta_{\text{ME, egg}} = 9.6$ MJ kg ⁻¹ , cf. GfE, 2000, eq. 1.2.4.1)
n_{eggs}	number of eggs per place and year (in eg pl ⁻¹ a ⁻¹), see Chapter 8.3.2
α	time units conversion factor ($\alpha = 365$ d a ⁻¹)
μ_{egg}	mean egg weight (in kg eg ⁻¹), see Chapter 8.3.2

8.3.3.5 Metabolisable energy for growth / Energiebedarf für Wachstum

The mean daily requirements result from mean weight gain and the specific energy consumption for growth:

Der mittlere tägliche Bedarf ergibt sich aus der mittleren Gewichtszunahme und dem spezifischen Energiebedarf:

$$ME_g = \eta_{\text{ME, g}} \cdot \frac{\Delta w_{\text{lh}}}{\tau_{\text{lifespan, lh}}} \quad (8.7)$$

ME_g	metabolisable energy consumed for growth (in MJ pl ⁻¹ d ⁻¹)
$\eta_{\text{ME, g}}$	specific metabolisable energy required for growth ($\eta_{\text{ME, g}} = 23$ MJ kg ⁻¹ , cf. GfE, 2000, eq. 1.2.4.1)
Δw_{lh}	weight gain during lifespan as laying hen, according to Chapter 3.1.2.5 (in kg a ⁻¹)
$\tau_{\text{lifespan, lh}}$	lifespan of laying hens (in d), see Chapter 8.3.2

8.3.4 Feed and energy intake / Futter- und Energieaufnahme

Feed requirements are derived from the postulation that the energy intake with feed meet the energy re-

Der Futterbedarf ergibt sich aus der Forderung, dass die mit dem Futter aufgenommene Energie dem tierischen

quirements of the animal. The feed characteristics used in this inventory are collated in Table 8.6 (adopted from HAENEL and DÄMMGEN, 2007b). These data represent a typical single-phase diet composition (except for NP reduced feed). Due to the lack of frequency distribution data, multi-phase feeding cannot be accounted for in the inventory. The same holds for the use of NP reduced feed.

In the absence of statistical surveys on the composition of the diets, the values given in Table 8.6 are assumed to be valid for all years from 1990 and all regions in Germany.

From the data in Table 8.6 follows a digestibility of energy XDE, lh = 0.791 MJ MJ⁻¹ and a metabolisability of energy XME, lh = 0.733 MJ MJ⁻¹.

Energiebedarf entsprechen soll. Zu den im Inventar verwendeten Futterkennwerten siehe Table 8.6 (aus HAENEL und DÄMMGEN, 2007b). Es handelt sich, mit Ausnahme des Rohproteingehaltes bei NP-reduzierter Fütterung, um Kennwerte eines typischen Einphasen-Futters. Mehrphasenfütterung kann im Inventar mangels Daten zur Verbreitung nicht berücksichtigt werden. Das Gleiche gilt für die NP-reduzierte Fütterung.

Mangels statistischer Erhebungen zur Rationsgestaltung werden die in Table 8.6 angegebenen Werte für alle Jahre ab 1990 und alle Regionen in Deutschland als gültig angenommen.

Mit den Daten in Table 8.6 ergibt sich für die Energie-Verdaulichkeit XDE, lh = 0,791 MJ MJ⁻¹ und die Energie-Umsetzbarkeit XME, lh = 0,733 MJ MJ⁻¹.

Table 8.6: Laying hens, diets used in laying hen feeding, related energies and crude protein content

The specific energies η_{GE} (gross energy), η_{DE} (digestible energy) and η_{ME} (metabolizable energy) as well as the contents of crude protein (X_{XP}) and ash (x_{ash}) are related to dry matter. X_{DOM} is the digestibility of organic matter.

Major components	η_{GE} in MJ kg ⁻¹	η_{DE} in MJ kg ⁻¹	η_{ME} in MJ kg ⁻¹	X_{XP} in kg kg ⁻¹	X_{DOM} in kg kg ⁻¹	x_{ash} in kg kg ⁻¹
wheat, soybean meal, maize, wheat bran, vegetable fat	15.37	12.15	11.26	0.172	0.713	0.145

Sources:

- Feed composition and overall ash content: DEUKA DEUTSCHE TIERNÄHRUNG GMBH & CO. KG (Kleine-Klausing, private communication)
- Energy content, XP content, ash content and digestibility of organic matter in normal feed components: BEYER et al. (2004)
- XP content of N reduced feed: KTBL (2004), cf. discussion in HAENEL and DÄMMGEN (2007b)

The specific N content of the feed is obtained by dividing the XP content by 6.25.

The daily feed intake (dry matter) as a mean over the entire lifespan as a laying hen is calculated as follows:

$$m_{F, DM} = \frac{ME_{lh}}{\eta_{ME, feed}} \quad (8.8)$$

$m_{F, DM}$	daily feed intake, dry matter (in kg pl ⁻¹ d ⁻¹)
ME_{lh}	daily requirements of metabolisable energy (in MJ pl ⁻¹ d ⁻¹)
$\eta_{ME, feed}$	content of metabolisable energy in feed, related to dry matter (MJ kg ⁻¹), see Table 8.6

Der spezifische N-Gehalt des Futters ergibt sich aus dem XP-Gehalt (Division durch 6.25).

Die über die Lebensdauer gemittelte tägliche Futterraufnahme (Trockenmasse) wird wie folgt berechnet:

The inventory does not calculate the amount of gross energy GE as is not needed for the VS calculation method used in the present inventory.

Die GE-Aufnahme mit dem Futter wird im Inventar nicht berechnet, da sie für die aktuell verwendete VS-Berechnungsmethode nicht benötigt wird.

8.3.5 Methane from enteric fermentation / Methan aus der Verdauung

For poultry, emissions from enteric fermentation are not calculated (IPCC(2006)-10.27).

Für Geflügel werden Emissionen aus der Verdauung nicht berechnet (IPCC(2006)-10.27).

8.3.6 Methane from manure management / Methan aus Wirtschaftsdünger-Management

CH₄ emissions from manure management are quantified using the Tier 2 methodology, see Chapter 3.3.4.1.

Zur Berechnung der CH₄-Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management wird das Tier-2-Verfahren verwendet, siehe Kapitel 3.3.4.1.

Volatile solids (VS) excretion rates are calculated using the approach described in DÄMMGEN et al. (2011a), see Chapter 3.3.3.1.

Die VS-Ausscheidungen („volatile solids“) werden nach dem Verfahren von DÄMMGEN et al. (2011a) berechnet, siehe Kapitel 3.3.3.1.

For the required data see Chapter 8.3.4.

Für die erforderlichen Daten siehe Kapitel 8.3.4.

According to IPCC(2006)-10.82, the maximum methane producing capacity B_0 is $0.39 \text{ m}^3 \text{ CH}_4 (\text{kg VS})^{-1}$. Due to lack of German data for the methane conversion factor MCF , the default value of IPCC(2006)-10.82 is applied to all laying hen husbandry systems, irrespective of their type: $0.015 \text{ m}^3 \text{ m}^{-3}$.

The MCF for anaerobic digestion of poultry manure including storage of digestate is calculated (see Chapter 3.3.4.4.1).

German data on the uncertainty of CH_4 emissions from manure management do not exist. IPCC(2006)-10.48 estimates the uncertainty of Tier 2 approaches to be 20 %. This value is, according to the definition of uncertainty used in Chapter 3 in IPCC (2006a), interpreted as half the 95 % confidence interval. A normal distribution is assumed.

8.3.7 NMVOC emissions / NMVOC-Emissionen

The calculation of the NMVOC emissions of alle animals except cattle are calculated with a Tier 1 methodology, see Chapters 3.3.4.2.1 and 3.3.4.2.3.

Agricultural NMVOC emissions are reported, but are neglected regarding the NEC emission threshold, see Chapter 3.3.4.2.

8.3.8 Emissions of nitrogen species / Emissionen von Stickstoff-Spezies

The calculation of the emissions of nitrogen species is based on the knowledge of N excretions (their amounts and locations), of the N inputs with straw, the conversion of N_{org} in UAN as well as the frequency distributions of housing types and storage facilities, spreading techniques and times before incorporation.

Anaerobic digestion of poultry manure including storage of digestate is treated as a separate type of storage (see Chapter 3.3.4.4.1).

8.3.8.1 N excretion / N-Ausscheidung

N excretions are calculated as a function of performance and feed properties.

The annual N excretion on an average animal place (for the definition of the average animal place see Chapter 3.1.2.2) results from N mass balance. As input data are constant in space, the calculated N excretion is the same for all federal states.

$$m_{\text{excr}} = m_{\text{feed}} - m_{\text{eggs}} - m_{\text{g}} \quad (8.9)$$

m_{excr}	annual amount of nitrogen excreted (in $\text{kg pl}^{-1} \text{ a}^{-1}$)
m_{feed}	annual amount of nitrogen intake with feed (in $\text{kg pl}^{-1} \text{ a}^{-1}$)
m_{eggs}	annual amount of nitrogen exported with eggs (in $\text{kg pl}^{-1} \text{ a}^{-1}$)
m_{g}	annual amount of nitrogen retained with growth (in $\text{kg pl}^{-1} \text{ a}^{-1}$)

The annual amount of N intake with feed on an average animal place is a function of the amount of feed and the crude protein (XP) content of the feed:

Nach IPCC(2006)-10.82 beträgt die maximale Methan-Freisetzungskapazität B_0 $0,39 \text{ m}^3 \text{ CH}_4 (\text{kg VS})^{-1}$. Mangels deutscher Daten zum MCF wird der Defaultwert aus IPCC(2006)-10.82 für alle in Deutschland vorkommenden Legehennen-Haltungssysteme und Temperaturen verwendet: $0,015 \text{ m}^3 \text{ m}^{-3}$.

Der MCF -Wert für die Vergärung von Geflügelkot incl. Gärrestelagerung wird berechnet (siehe Kapitel 3.3.4.4.1).

Deutsche Zahlen zur Unsicherheit der CH_4 -Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management liegen nicht vor. IPCC(2006)-10.48 schätzt die Unsicherheit bei Anwendung von Tier-2-Verfahren auf 20 %. Dieser Wert wird im Sinne von IPCC (2006a), Kapitel 3, als halbes 95 %-Konfidenzintervall interpretiert. Es wird Normalverteilung angenommen.

Die NMVOC-Emissionen von allen Tieren außer den Rindern werden mit einer Tier-1-Methode berechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.1 und 3.3.4.2.3.

Landwirtschaftliche NMVOC-Emissionen werden zwar berichtet, aber bzgl. der NEC-Emissionsobergrenze nicht angerechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.

Die Berechnung der Emissionen der Stickstoff-Spezies beruht auf der Kenntnis der N-Ausscheidungen (Mengen und Orte), der N-Einträge mit Stroh, der Umwandlungen von N_{org} in UAN, der Häufigkeit von Stalltypen, Lagertypen, Ausbringungstechniken und Einarbeitungszeiten.

Die Vergärung von Geflügelkot incl. Gärrestelagerung stellt einen eigenständigen Lagertyp dar (siehe Kapitel 3.3.4.4.1).

Die Ausscheidungen werden in Abhängigkeit von Leistung und Fütterung berechnet.

Die jährliche N-Ausscheidung auf einem mittleren Tierplatz (zur Tierplatzdefinition siehe Kapitel 3.1.2.2) wird über die N-Bilanz errechnet. Mangels räumlicher Differenzierung der Eingangsdaten ist das Ergebnis für alle Bundesländer gleich.

Die Menge des jährlich auf einem mittleren Tierplatz mit dem Futter aufgenommenen Stickstoffs ist eine Funktion von Futteraufnahme und Rohprotein (XP)-Gehalt im Futter:

$$m_{\text{feed}} = \alpha \cdot x_{\text{N, XP}} \cdot x_{\text{XP, feed}} \cdot m_{\text{F, DM}} \quad (8.10)$$

m_{feed}	annual amount of nitrogen intake with feed (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
α	time units conversion factor ($\alpha = 365 \text{ d a}^{-1}$)
$x_{\text{N, XP}}$	nitrogen content of crude protein ($x_{\text{N}} = 1/6.25 \text{ kg kg}^{-1}$)
$x_{\text{XP, feed}}$	content of crude protein in feed, related to dry matter (in kg kg ⁻¹), see Table 8.6
$m_{\text{F, DM}}$	daily feed intake, dry matter (in kg pl ⁻¹ d ⁻¹), see Chapter 8.3.4

For the XP content of N reduced feed Table 8.6. However, no information is available on the frequencies of N reduced feed usage. Hence, the N excretion calculations for the inventory are based on the assumption of a nationwide used "normal" feed composition.

The amount of N excreted with eggs is assessed from the number of eggs laid per place, the mean egg mass and the mean protein content of the eggs:

$$m_{\text{eggs}} = n_{\text{eggs}} \cdot x_{\text{XP, eggs}} \cdot x_{\text{N}} \cdot \mu_{\text{egg}} \quad (8.11)$$

m_{eggs}	amount of nitrogen exported with eggs (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
n_{eggs}	number of eggs per place and year (in eg pl ⁻¹ a ⁻¹), see Chapter 8.3.2
$x_{\text{XP, eggs}}$	crude protein content of eggs (in kg kg ⁻¹), see below
x_{N}	nitrogen content of crude protein ($x_{\text{N}} = 1/6.25 \text{ kg kg}^{-1}$)
μ_{egg}	average egg mass (in kg eg ⁻¹), see Chapter 8.3.2

The information on $x_{\text{XP, eggs}}$ provided by the literature varies, e.g. 0.112 kg kg⁻¹ XP in GfE (2000, pg. 58) and 0.121 kg kg⁻¹ XP in GEFLÜGELJAHRBUCH (2005, pg. 212). The value used in this inventory (0.119 kg kg⁻¹ XP) is based on the N content of eggs provided in LfL (2006a), Table 8.

The N retention is obtained from the weight gain, the lifespan as laying hen and the mean XP content of the animals:

$$m_{\text{g}} = x_{\text{N, ret, lh}} \cdot \alpha \cdot \frac{\Delta w_{\text{lh}}}{\tau_{\text{lifespan, lh}}} \quad (8.12)$$

m_{g}	annual amount of nitrogen retained with growth (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
$x_{\text{N, ret, lh}}$	N retained per kg live weight of a laying hen ($x_{\text{N, ret, lh}} = 0.035 \text{ kg kg}^{-1}$, see LfL, 2006a, Tabelle 8)
α	time units conversion factor ($\alpha = 365 \text{ d a}^{-1}$)
Δw_{lh}	weight gain during lifespan as laying hen, according to Chapter 3.1.2.5 (in kg an ⁻¹)
$\tau_{\text{lifespan, lh}}$	lifespan of laying hens (in d), see Chapter 8.3.2

The share of UAN in the N excretions is calculated. The results are close to the EMEP standard value of 70 % (EMEP, 2016-3B-29, Table 3.9).

Table 8.6 gibt auch den XP-Gehalt von N-reduziertem Futter an. Informationen zur Verbreitung von N-angepasster Fütterung sind allerdings nicht verfügbar. Daher erfolgen die Ausscheidungsrechnungen für das Inventar durchgängig mit nicht N-reduziertem Futter.

Die mit Eiern ausgeschiedenen N-Mengen berechnen sich aus der Zahl der gelegten Eier pro Platz und Jahr, der durchschnittlichen Ei-Masse und dem mittleren Protein-Gehalt der Eier:

In der Literatur finden sich unterschiedliche Angaben zu $x_{\text{XP, eggs}}$, z. B. 0,112 kg kg⁻¹ in GfE (2000, S. 58) und 0,121 kg kg⁻¹ im GEFLÜGELJAHRBUCH (2005, S. 212). Der für das Inventar verwendete Wert 0,119 kg kg⁻¹ beruht auf Angaben in LfL (2006a), Tabelle 8, zum N-Gehalt von Eiern.

Aus der Gewichtszunahme, der Lebensdauer als Legehennen und dem mittleren N-Gehalt der Tiere folgt für die N-Retention:

Der UAN-Gehalt im ausgeschiedenen N wird berechnet und liegt dicht beim EMEP-Standardwert von 70 % (EMEP, 2016-3B-29, Table 3.9).

8.3.8.2 N inputs with straw / N-Einträge mit Stroh

For all housing systems except cages or small group housing systems, N inputs with straw (bedding material) are taken into account. Based on the data provided in KTBL (2006), pg. 544, 546 and 548, an amount of straw fresh matter input of 0.5 kg per place and year is assumed to be a representative estimate.

For the properties of straw see Chapter 3.3.4.3.2.

Für alle Haltungssysteme außer Käfighaltung bzw. Kleingruppenhaltung wird ein N-Eintrag mit dem als Einstreu eingebrachten Stroh vorgesehen. Unter Berücksichtigung der Angaben in KTBL (2006), S. 544, 546 und 548 wird eine Einstreumenge von 0,5 kg Strohfrischmasse pro Platz und Jahr angenommen.

Zu Stroh-Eigenschaften siehe Kapitel 3.3.4.3.2.

8.3.8.3 *Partial emission factors / Partielle Emissionsfaktoren*

The various housing systems for laying hens are associated with different emission potentials (DÖHLER et al., 2002, S. 60).

Since submission 2011 the inventory takes into account only three housing system categories: cages/small group housing systems, aviary/floor management, and free range. The differentiation between cages/small group housing systems with dung pit, dung belt without drying and dung belt with drying which is relevant for emission calculations is implicitly accounted for by using a weighted mean emission factor (RÖSEMANN et al., 2011, pp 263/264). Due to the ban of traditional cages as of 2010, modified cage types are now used. These new housing systems are called “small group housing systems” in order to facilitate the differentiation between the former cages and the new housing systems (EURICH-MENDEN et al., 2011). The emission factors of cages and small group housing systems are different. As described above, from 2012 onwards housing systems and manure management techniques are not considered in the inventory; instead a weighted mean emission factor is used. Emission factors incorporated in the weighted mean are based on a national consensus (KTBL-Arbeitsgruppe „Emissionsfaktoren Tierhaltung“, siehe EURICH-MENDEN et al., 2011). The weighting reflects the frequencies of housing systems as derived from the agricultural census 2010 (LZ2010) by Statistisches Bundesamt.

The emission factors provided by DÖHLER et al. (2002) as well as by EURICH-MENDEN et al. (2011) refer to calculations of emissions per animal place. Therefore they had to be adjusted to the requirements of the inventory by converting them into emission factors related to N excretions. In the case of the emission factors provided by DÖHLER et al. (2002) this was done with the N excretion of $0,74 \text{ kg pl}^{-1} \text{ a}^{-1} \text{ N}$ according to DÖHLER et al., 2002, pg. 14A. The emission factors provided by EURICH-MENDEN et al. (2011) were converted on the basis of the DLG default N excretion of $0,786 \text{ kg N (pl} \cdot \text{a)}^{-1}$ referring to a housing utilization of 94 % (see DLG, 2005, pg. 47). This is equivalent to $0,836 \text{ kg N (pl} \cdot \text{a)}^{-1}$ for a housing utilization of 100 % as used in the inventory.

The housing systems “aviary” and “floor management with a one-time removal of manure per round” are differentiated in DÖHLER et al. (2002). From submission 2011 onwards both housing systems were combined to the housing system “aviary/floor management” (RÖSEMANN et al., 2011, pp 263/264). The emission factor of “floor management with a one-time removal of manure per round” is used in the inventory due to the fact that this housing system was considerable more common in the 1990s than the “aviary”. This turned into the opposite from 2010 onwards (EURICH-MENDEN B/KTBL, und HEIDENREICH TH/Sächsische Landesanstalt Kollitsch, personal communication). Therefore the emission factor for „aviary“ is used as of 2010 (KTBL-working group „Emissionsfaktoren Tierhaltung“, see EURICH-MENDEN et al., 2011). As described for the housing system

Die verschiedenen Legehennen-Haltungsformen sind mit unterschiedlichen Emissionspotentialen verbunden (DÖHLER et al., 2002, S. 60).

Seit der Submission 2011 beschränkt sich die Emissionsberichterstattung auf die Berücksichtigung dreier Haltungsformen: Käfig/Kleingruppenhaltung, Voliere/Bodenhaltung sowie Freiland. Die emissionsrelevante Differenzierung zwischen Käfigen/Kleingruppenhaltung mit Kotgrube, belüftetem oder unbelüftetem Kotband geschieht implizit durch einen gewichteten mittleren Emissionsfaktor (RÖSEMANN et al., 2011, S. 263/264). Wegen des Verbotes der herkömmlichen Käfige ab 2010 werden inzwischen andersartig gestaltete Käfigformen eingesetzt, die zur Abgrenzung gegenüber den früher üblichen Käfigen als „Kleingruppenhaltung“ bezeichnet werden (EURICH-MENDEN et al., 2011) und auch abweichende Emissionsfaktoren aufweisen. Allerdings wird für die Emissionsberichterstattung ab 2012 auch bei der „Kleingruppenhaltung“ nicht zwischen den verschiedenen Käfigformen und ihren Kotentsorgungsvarianten unterschieden, sondern ein gewichteter mittlerer Emissionsfaktor verwendet. Die in die Mittelung eingehenden Emissionsfaktoren beruhen auf nationalem Konsens (KTBL-Arbeitsgruppe „Emissionsfaktoren Tierhaltung“, siehe EURICH-MENDEN et al., 2011). Die Gewichte entsprechen den Haltungsform-Anteilen, wie sie aus der Landwirtschaftszählung 2010 (LZ2010) des Statistischen Bundesamtes hervorgegangen sind.

Sowohl die in DÖHLER et al. (2002) als auch die in EURICH-MENDEN et al. (2011) angegebenen Emissionsfaktoren sind auf den Tierplatz bezogen und waren deshalb für die Inventarberechnungen auf einen Bezug auf die N-Ausscheidung umzurechnen. Dies geschah für die Emissionsfaktoren aus DÖHLER et al. (2002) mit dem dort angegebenen N-Ausscheidungswert von $0,74 \text{ kg pl}^{-1} \text{ a}^{-1} \text{ N}$ (DÖHLER et al., 2002, S. 14A), während für die Umrechnung der Emissionsfaktoren aus EURICH-MENDEN et al. (2011) das DLG-Standardniveau der N-Ausscheidung zugrunde gelegt wurde. Dieser beläuft sich auf $0,836 \text{ kg N (pl} \cdot \text{a)}^{-1}$ (abgeleitet aus $0,786 \text{ kg N (pl} \cdot \text{a)}^{-1}$ bei 94 % Stallauslastung, siehe DLG, 2005, S. 47).

Die bei DÖHLER et al. (2002) getrennt aufgelisteten Haltungsformen „Voliere“ und „Bodenhaltung mit einmaliger Entmistung pro Durchgang“ wurden ab Submission 2011 (RÖSEMANN et al., 2011), S. 263/264 zu „Bodenhaltung/Voliere“ zusammengefasst. Als Emissionsfaktor wurde der für Bodenhaltung mit einmaliger Entmistung pro Durchgang gewählt, da diese Haltungsform in den 1990er Jahren deutlich häufiger vorkam als die Volierenhaltung. Dieses Verhältnis hat sich bis 2010 ins Gegenteil verkehrt (EURICH-MENDEN B/KTBL, und HEIDENREICH TH/Sächsische Landesanstalt Kollitsch, persönl. Mitteilung), so dass ab dem Zeitreihen 2010 der Emissionsfaktor für Volieren verwendet wird (KTBL-Arbeitsgruppe „Emissionsfaktoren Tierhaltung“, siehe EURICH-MENDEN et al., 2011). Dazwischen wird linear interpoliert. Insgesamt war ebenfalls eine Umrechnung auf die N-Ausscheidung erforderlich, die analog zum

“aviary/floor management” the emission factors had to be converted by analogy.

On the basis of a national consensus 1,1 times the emission factor for “aviary/floor management” is applied in the inventory for “free range” (KTBL-working group „Emissionsfaktoren Tierhaltung“, see EURICH-MENDEN et al., 2011).

Table 8.7 provides an overview of the emission factors used for the submission 2012.

Some laying hen houses are equipped with air scrubbing systems. Those air scrubbing systems remove both NH₃ and particulate matter from the house exhaust air. For further details see Chapter 3.4.5.2.

oben beschriebenen Vorgehen für die Käfighaltung/Kleingruppenhaltung erfolgte.

Für die Freilandhaltung wird dem nationalen Konsens entsprechend das 1,1-Fache des Emissionsfaktors für Bodenhaltung/Voliere verwendet (KTBL-Arbeitsgruppe „Emissionsfaktoren Tierhaltung“, siehe EURICH-MENDEN et al., 2011).

Table 8.7 gibt einen Überblick über die ab der Submission 2012 eingesetzten Emissionsfaktoren.

In einem Teil der Legehennenhaltung werden Abluftreinigungsanlagen eingesetzt. Diese Anlagen filtern sowohl NH₃ als auch Staub aus der Stallabluft. Zu weiteren Details siehe Kapitel 3.4.5.2.

Table 8.7: Laying hens, partial emission factors for NH₃ losses from housing (in kg NH₃-N per kg N excreted)

years		≤ 2000	2001 - 2009	≥2010
cages; from 2010 onwards: small group housing systems	Käfighaltung; ab 2010: Kleingruppenhaltung	0.164		0.066
floor management, aviary	Bodenhaltung, Voliere	0.351	linear interpolation	0.090
free range, organic farming	Intensive Auslaufhaltung, Freilandhaltung, ökologische Erzeugung	0.099		

Sources: see text

For the partial NH₃-N emission factor for storage, the value given in EMEP(2013)-3B-27, Table 3-7, is used: 0.14 kg kg⁻¹. The factor relates to the UAN amount entering the storage. (For UAN see Chapter 3.3.3.2). Due to lack of more detailed informations, this emission factor is used for all poultry storage systems.

Anaerobic digestion of poultry manure including storage of digestate is treated as a separate type of storage. The respective emission factors are calculated (see Chapter 3.3.4.4.1).

For the NH₃-N emission factors for spreading see Chapter 8.2.2, Table 8.3.

The factors for direct N₂O, NO and N₂ are combined factors for housing and storage. They are given in Table 8.2 (Chapter 8.2.1).

The emission factors for the separate storage type “anaerobic digestion of poultry manure” are calculated (see Chapter 3.3.4.4.1).

NO emissions from manure management are reported (as NO_x), but are neglected regarding the NEC emission threshold, see Chapter 3.3.4.2.

The uncertainty of the NH₃ emission factor characterizing the overall NH₃ emissions per animal place from the animal house, storage and application is calculated and provided in the inventory (see Chapter 14.5).

For the uncertainties of the N₂O emission factor for the combination of animal house and storage see Chapter 14.4.1.

Due to the lack of information on the uncertainties of the NO and N₂ emission factors, the uncertainty of the N₂O emission factor is adopted (see Chapter 14.4.2).

Der partielle NH₃-N-Emissionsfaktor für das Lager wird nach EMEP(2013)-3B-27, Table 3-7, mit 0,14 kg kg⁻¹ angesetzt. Der Faktor bezieht sich auf die UAN-Menge, die ins Lager gelangt. (Zu UAN siehe Kapitel 3.3.3.2). Der Emissionsfaktor wird mangels besserer Kenntnis für alle Lagerverfahren in der Geflügelhaltung angewendet.

Die Vergärung von Geflügelkot incl. Gärrestelagerung stellt einen eigenständigen Lagertyp dar. Die zugehörigen Emissionsfaktoren werden berechnet (siehe Kapitel 3.3.4.4.1).

Zu den NH₃-N-Emissionsfaktoren für die Ausbringung siehe Kapitel 8.2.2, Table 8.3.

Die für Stall und Lager zusammen geltenden Emissionsfaktoren für direktes N₂O, NO und N₂ sind Table 8.2 (Kapitel 8.2.1) zu entnehmen.

Die zum eigenständigen Lagertyp „Vergärung von Geflügelkot“ gehörigen Emissionsfaktoren werden berechnet (siehe Kapitel 3.3.4.4.1).

NO aus dem Wirtschaftsdünger-Management wird berichtet (als NO_x), bzgl. der NEC-Emissionsobergrenze aber nicht angerechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.

Die Unsicherheit des NH₃-Emissionsfaktors, der die auf tierplatzbezogene NH₃-Gesamtemissionen aus Stall, Lager und Ausbringung beschreibt, wird im Inventar berechnet, siehe Kapitel 14.5.

Für die Unsicherheit des N₂O-Emissionsfaktors für die Kombination „Stall/Lager“ wird auf Kapitel 14.4.1 verwiesen.

Mangels Daten zu den Unsicherheiten von NO- und N₂-Emissionsfaktor wird die Unsicherheit des N₂O-Emissionsfaktors übernommen, siehe Kapitel 14.4.2.

8.3.8.4 Indirect N₂O from manure management / Indirektes N₂O aus dem Wirtschaftsdünger-Management

Indirect N₂O from manure management (housing/storage without spreading) are calculated according to Chapter 3.3.4.3.6. See Chapter 3.3.4.3.6 also for the uncertainties of activity data and emission factor.

(Indirect N₂O emissions from agricultural soils after spreading of manures or digested manures are reported in Sector 3.D. For the calculation of these emissions see Chapter 12.)

Indirektes N₂O aus dem Wirtschaftsdünger-Management (Stall/Lager ohne Ausbringung) wird nach Kapitel 3.3.4.3.6 berechnet. Siehe dort auch wegen der Unsicherheiten von Aktivitätswert und Emissionsfaktor.

(Indirekte N₂O-Emissionen als Folge der Ausbringung von Wirtschaftsdüngern und Wirtschaftsdünger-Gärresten werden im Sektor 3.D berichtet. Zur Berechnung siehe Kapitel 12.)

8.3.8.5 Uncertainties of emission factors and activity data / Unsicherheiten von Emissionsfaktoren und Aktivitätsdaten

For the uncertainties of the emission factors see Chapter 4.2.2.4. The uncertainty of the activity data (amounts of N) is adopted from Chapter 4.3.8.9.

(Note that only for laying hens there is an option of being held in free range.)

Zu den Unsicherheiten der Emissionsfaktoren siehe Kapitel 4.2.2.4. Die Unsicherheit der Aktivitätsdaten (N-Mengen) wird wie in Kapitel 4.3.8.9 angesetzt.

(Hinweis: Nur für Legehennen gibt es die Möglichkeit für Freilandaufenthalt.)

8.3.9 Emissions of particulate matter / Partikelemissionen

The method to calculate particle emissions is described in Chapter 3.3.4.5. The emission factors are listed in Table 8.8. For the uncertainty of the emission factors see Chapter 3.3.4.5.

The mitigation of PM emissions by air scrubbers is taken into account, see Chapter 3.4.5.2.

Zur Berechnungsmethode für Partikelemissionen wird auf Kapitel 3.3.4.5 verwiesen. Die Emissionsfaktoren sind in Table 8.8 angegeben. Zur Unsicherheit der Emissionsfaktoren siehe Kapitel 3.3.4.5.

Die Minderung von Partikelemissionen durch Abluftreinigungsanlagen wird berücksichtigt, s. Kapitel 3.4.5.2.

Table 8.8: Laying hens, emission factors for particle emissions from housing

Housing type	Haltungssystem	Emission factor for TSP kg pl ⁻¹ a ⁻¹	Emission factor for PM ₁₀ kg pl ⁻¹ a ⁻¹	Emission factor for PM _{2.5} kg pl ⁻¹ a ⁻¹
all types	alle Systeme	0.19	0.04	0.003

Source: EMEP(2016)-3B-19, Table 3.5

8.3.10 References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung

Table 8.9: Laying hens, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)

			from	to
Emissions	Emissionen	CH ₄ enteric fermentation	---	
		CH ₄ manure management	EM1005.021	
		NM VOC	EM1007.021	
		NH ₃	EM1009.061	EM1009.063
		N ₂ O	EM1009.111	
		NO	EM1009.141	
		TSP	EM1010.021	
		PM ₁₀	EM1010.051	
		PM _{2.5}	EM1010.081	
Activity data	Aktivitäten		AC1005.025	
Emission factors	Emissionsfaktoren	CH ₄ enteric fermentation	---	
		CH ₄ manure management	IEF1005.021	
		NM VOC	IEF1007.021	
		NH ₃	IEF1009.058	IEF1009.060
		N ₂ O	IEF1009.104	
		NO	IEF1009.132	
		TSP	IEF1010.020	
		PM ₁₀	IEF1010.048	
		PM _{2.5}	IEF1010.076	
Additional information	zusätzliche Informationen		AI1005POU.001	AI1005POU.020
Excretion rates	Ausscheidungen	N	EXCR.081	EXCR.082

8.4 Broilers / Masthähnchen und –hühnchen

Broilers are special chicken lines reared for meat production.

The emissions are calculated according to the methods compiled in Table 8.10.

For the definition of the methods see Chapter 3.2.3.

Masthähnchen und –hühnchen sind auf Fleischproduktion spezialisierte Hühnerrassen.

Die Berechnung der Emissionen erfolgt nach den in Table 8.10 genannten Methoden.

Zur Methodendefinition siehe Kapitel 3.2.3.

Table 8.10: Broilers, calculation methods applied

Species	Origin	Tier	Method applied
CH ₄	enteric fermentation		no method
CH ₄	manure management	2	IPCC / national
NM VOC	manure management	1	EMEP
NH ₃	manure management	2	EMEP / national
N ₂ O, NO, N ₂	manure management	2	IPCC / national
TSP, PM ₁₀ , PM _{2.5}	manure management	2	EMEP

8.4.1 Animal numbers / Tierzahlen

Poultry numbers have been surveyed in each agricultural-structure surveys, i.e. until 1996 in each even year, from 1999 to 1997 in each odd year, 2010 in the LZ 2010 census (STATLA C III 1 – vj 4, see also Chapter 3.4.2.1), and 2013 and 2016 in agricultural structure surveys. For the years between the surveys the poultry numbers were estimated by linear interpolation. The striking increase of animal numbers between 2010 and 2013 is, for the most part, due to the fact that the number of farms questioned in 2013 was higher than in 2010 (see Chapter 3.4.2.1). The missing broiler numbers for 2017 and 2018 were estimated by keeping the 2016 numbers, see Chapter 3.4.2.2.

For animal number uncertainty see Chapter 8.1.2.

Geflügelzahlen wurden in jeder Agrarstrukturerhebung erhoben, d.h. bis 1996 in allen geraden Jahren, 1999 bis 2007 in allen ungeraden Jahren, 2010 in der LZ 2010 (STATLA C III 1 – vj 4, siehe auch Kapitel 3.4.2.1) und 2013 sowie 2016 in einer Agrarstrukturerhebung. In den Zwischenjahren wurden die Geflügelzahlen durch lineare Interpolation geschätzt. Der auffällig starke Anstieg zwischen 2010 und 2013 ist dabei im Wesentlichen auf die der Zählung 2013 zugrunde liegende Berichtskreisrevision (siehe Kapitel 3.4.2.1) zurückzuführen ist. Die für 2017 und 2018 fehlenden Masthähnchenzahlen wurden durch Beibehaltung des Wertes von 2016 geschätzt, siehe Kapitel 3.4.2.2.

Zur Unsicherheit der Tierzahlen siehe Kapitel 8.1.2.

8.4.2 Meat production / Fleischproduktion

8.4.2.1 Mean duration of fattening / Mittlere Mastdauer

In Germany there are different systems of broiler fattening with differing durations of fattening (see e. g. TÜLLER, 1989, and BERK, 2010). There are no statistical surveys of frequencies of fattening durations and no time series since 1990.

Based on recommendations for phase feeding and mean data of experimental studies in TÜLLER (1989) it is assumed that the typical duration of broiler fattening was 40 days in 1989. It seems plausible that this value also holds for 1990.

For 2010 it is concluded, based on data given in STREITZ (2008), that the so-called “Mittellangmast” with a fattening duration of 36 to 38 days can represent the mean conditions of broiler fattening. Hence it is assumed for the inventory that the mean fattening duration in 2010 was 37 days.

For the time after 2010 there is no evidence of a change in the duration of broiler fattening. Hence the 37 days estimated for 2010 are used for the years after 2010 as well.

The forementioned assumptions for the duration of broiler fattening were not used in the emission calculation.

Masthähnchen und –hühnchen wurden und werden in Deutschland unterschiedlich lange gemästet (siehe z. B. TÜLLER, 1989, und BERK, 2010). Es gibt keine statistischen Erhebungen zur Häufigkeit der verschiedenen Mastdauern und deren Zeitreihe seit 1990.

Anhand von Vorgaben für die Phasenfütterung sowie Durchschnittswerten von Versuchsreihen in TÜLLER (1989) wird für 1989 auf eine typische Mastdauer von 40 Tagen geschlossen. Dieser Wert wird auch für 1990 als gültig angesehen.

Für 2010 wurde in Anlehnung an Daten in STREITZ (2008) angenommen, dass die Mittellangmast mit einer Mastdauer von 36 bis 38 Tagen (siehe BERK, 2010) die mittlere Mastdauer verhältnisse repräsentiert. Für das Inventar wurde daher für 2010 eine mittlere Mastdauer von 37 Tagen angesetzt.

Für die Zeit nach 2010 liegen keine Anhaltspunkte für eine Veränderung der Hähnchenmast vor. Daher wird die für 2010 geschätzte mittlere Mastdauer für die Jahre danach beibehalten.

Diese Annahmen zur Mastdauer gehen nicht unmittelbar in die Emissionsberechnung ein, sondern dienen

tions but to estimate the emission-relevant feed conversion factor (see Chapter 8.4.8.2).

8.4.2.2 *Animal weights / Tiergewichte*

8.4.2.2.1 *Live weight / Lebendgewicht*

Official statistics do not report data on final live weights. Based on the estimates of mean fattening durations in Chapter 8.4.2.1, it is assumed that the mean final live weight was about 1.6 kg in 1990 and 2 to 2.2 kg in 2010. However, these values were not used in the emission calculations. The calculation of the mean poultry weight (see Chapter 8.9.1.2), that isn't used in the emission calculations as well, is based on a mean broiler live weight of 1 kg (rough estimate over the entire broiler lifetime).

der Schätzung des emissionsrelevanten Futterverwertungskoeffizienten (siehe Kapitel 8.4.8.2).

Die Officialstatistik berichtet keine Lebendendgewichte. Nach den Schätzungen der Mastdauer in Kapitel 8.4.2.1 wäre von einem mittleren Endgewicht von rund 1,6 kg (1990) bzw. 2 bis 2,2 kg (2010) auszugehen. Diese Werte gehen aber nicht in die Emissionsberechnung ein. Für die Berechnung des mittleren Geflügelgewichtes (siehe Kapitel 8.9.1.2), das ebenfalls nicht in die Emissionsberechnungen eingeht, wurde ein über die Lebensdauer eines Tieres gemittelt Gewicht von 1 kg unterstellt.

8.4.2.2.2 *Broiler meat production and carcass weight / Hähnchenfleischproduktion und Ausschlachtungsgrad*

The main input quantity for the emission calculations is the gross broiler meat production $\Sigma W_{BMP, gross}$. This quantity is not surveyed by German official statistics. However, data is available for each year as national totals (ZMP "Eier und Geflügel", annual reports; data from 2005 onwards are taken from MEG „Eier und Geflügel“, annual reports). The estimates are based on national data provided by German statistics on the net production of broilers (they include the production in minor slaughter houses) as well as on import and export of broilers. The Federal Statistical Office judges the broiler production data provided by ZMP/MEG/AMI for 2006 and the years before to be realistic, while in subsequent years the the broiler production data provided by ZMP/MEG/AMI is likely to significantly underestimate the actual development.

Therefore an agreement was reached with the Federal Statistical Office to establish a time series of national gross broiler production as follows: The estimates of ZMP for the years 1990 to 1999 were used without alterations. For the years after 1999, a methodology to estimate gross broiler meat production was developed that fits the time series from 1990 to 1999 and is able to reproduce the subsequent time series until 2006 provided by ZMP/MEG as best as possible.

Table 8.11 shows the resulting total time series of gross broiler meat production used for establishment of the inventory.

Die zur Berechnung der Emissionen benötigten Brutto-Hähnchenfleischproduktion $\Sigma W_{BMP, gross}$ wird durch die deutsche Officialstatistik nicht erhoben. Es liegen jedoch jährliche Schätzungen auf nationaler Ebene vor (ZMP "Eier und Geflügel", jährliche Reihe; für die Daten ab 2005 MEG/AMI „Eier und Geflügel“, jährliche Reihe). Die Schätzungen beruhen auf nationalen Daten des Statistischen Bundesamtes zur Netto-Eigenerzeugung von Jungmasthühnern (incl. einer Zuschätzung für die Netto-Erzeugung in kleinen Schlachtbetrieben) sowie der Ein- und Ausfuhr von Jungmasthühnern. Nach Einschätzung des Statistischen Bundesamts sind die ZMP/MEG/AMI-Werte der Brutto-Hähnchenfleischproduktion bis 2006 einschließlich als realistisch einzustufen, während die Werte in den Jahren danach die tatsächliche Entwicklung wahrscheinlich deutlich unterschätzen.

Daher wurde mit dem Statistischen Bundesamt folgendes Konzept zur Erstellung einer Zeitreihe der nationalen Brutto-Hähnchenfleischproduktion vereinbart: Die Schätzwerte von ZMP für 1990 - 1999 werden direkt verwendet. Für die Jahre danach wurde mit dem Statistischen Bundesamt ein Schätzverfahren entwickelt, das nahtlos an die ZMP-Werte 1990 bis 1999 anschließt und die noch als verlässlich eingestuften ZMP/MEG-Werte bis 2006 bestmöglich reproduziert.

Table 8.11 zeigt die resultierende, in der Emissionsberechnung verwendete Zeitreihe der Brutto-Hähnchenfleischproduktion.

Table 8.11: Broilers, national total of German broiler meat production (in Gg a⁻¹)

1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
317.0	322.7	344.3	348.7	364.5	360.8	387.9	402.8	444.4	460.2
2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
535.3	562.0	571.9	618.5	702.7	740.9	749.2	826.6	881.3	956.7
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1065.7	1156.0	1178.3	1212.9	1268.0	1298.8	1300.2	1316.7	1340.3	

Sources: see text.

The calculation for the last year of the time series is always based on provisional input data; the definite

Dabei beruht die Berechnung für das letzte Jahr der Zeitreihe immer auf vorläufigen Eingabedaten; das end-

result will be obtained only by the calculations for the next submission. For the same reason the value for the second last year of the time series has been modified in comparison to last year's submission.

8.4.3 Energy requirements / Energiebedarf

For broilers the ME requirement is not calculated since they are not needed to estimate feed intake (see subsequent chapter).

gültige Ergebnis kann erst im Rahmen der nächsten Submission ermittelt werden. Aus dem gleichen Grund wurde der Wert für das vorletzte Jahr der Zeitreihe gegenüber der letztjährigen Submission aktualisiert.

Der ME-Bedarf wird für Masthähnchen und -hühnchen nicht berechnet, da er für die Berechnung der Futteraufnahme nicht benötigt wird, siehe das nachfolgende Kapitel.

8.4.4 Feed and energy intake / Futter- und Energieaufnahme

The usual multiphase feeding in practice can not be represented in the inventory due to the lack of statistical surveys on the characteristics of the feeding. The inventory is therefore based on the concept of an average feed conversion coefficient and average feed properties.

Accordingly, starting from the German gross broiler production according to Chapter 8.4.2.2.2, the annual feed intake for the average animal area (definition see Chapter 3.1.2.2) is calculated as follows, whereby the low initial weight of the animals is conservatively neglected:

Die in der Praxis übliche Mehrphasenfütterung kann im Inventar nicht abgebildet werden, da statistische Erhebungen zu den Fütterungskennwerten fehlen. Das Inventar stützt sich daher auf das Konzept eines mittleren Futterverwertungskoeffizienten sowie mittlere Futtereigenschaften.

Demnach wird, ausgehend vom deutschen Brutto-schlachtfleischprodukt nach Kapitel 8.4.2.2.2, die jährliche Futteraufnahme für den mittleren Tierplatz (Definition siehe Kapitel 3.1.2.2) wie folgt berechnet, wobei in konservativer Weise das geringe Anfangsgewicht der Tiere vernachlässigt wird:

$$m_{F, FM} = x_{feed, br} \cdot \frac{1}{n_{br}} \cdot \frac{\sum w_{BMP, gross}}{x_{br, cw}} \quad (8.13)$$

$m_{F, FM}$	annual feed intake per broiler place, fresh matter (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
$x_{feed, br}$	mean feed conversion factor: diet mass (fresh matter) needed for animal weight gain (in kg kg ⁻¹), see below
n_{br}	annual mean of the total number of German broiler places (see Chapter 8.4.1)
$\sum w_{BMP, gross}$	German gross broiler meat production, see Chapter 8.4.2.2.2
$x_{br, cw}$	relative carcass weight, i. e. ratio of carcass weight to final live weight (in kg kg ⁻¹)

A relative carcass weight of $x_{br, cw} = 0.73$ kg kg⁻¹ is used (Federal Statistical Office, personal communication).

This immediately leads to the annual intake of dry matter:

Der Ausschachtungsgrad $x_{br, cw}$ wird mit 0,73 kg kg⁻¹ angesetzt (Statistisches Bundesamt, persönliche Mitteilung M. Dieterle).

Daraus ergibt sich direkt die jährliche Trockenmasseaufnahme:

$$m_{F, DM} = x_{DM} \cdot m_{F, FM} \quad (8.14)$$

$m_{F, DM}$	annual feed intake, dry matter (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
$m_{F, FM}$	annual feed intake, fresh matter (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
x_{DM}	dry matter content of feed (kg kg ⁻¹), see below

The dry matter content of feed is assumed to be 88 %.

The feed conversion factor $x_{feed, br}$ increases with the duration of fattening; however, it has generally decreased since 1990 due to progress in broiler rearing. Based on the data in TÜLLER (1989) and the assumption of a mean fattening duration of 40 days (see Chapter 8.4.2.1), a feed conversion factor of 1.87 kg kg⁻¹ was derived for 1990. For 2010 a feed conversion factor of 1.72 kg kg⁻¹ was derived; it is based on the assumption

Der Trockenmassegehalt des Futters wird mit 88 % angesetzt.

Der Koeffizient für die Futterverwertung ($x_{feed, br}$) wächst mit der Mastdauer an; generell aber hat sich sein Niveau durch züchterische Maßnahmen seit 1990 verringert. Anhand der Daten in TÜLLER (1989) wurde für 1990 bei einer mittleren Mastdauer von 40 Tagen (siehe Kapitel 8.4.2.1) ein Futterverwertungskoeffizient von 1,87 kg kg⁻¹ abgeleitet. Für 2010 ergab sich für die unterstellte mittlere Mastdauer von 37 Tagen (siehe Kapitel

of a fattening duration of 37 days (see Chapter 8.4.2.1) and data of BERK (2010). These feed conversion factors were linearly interpolated between 1990 and 2010. For the time after 2010 there is no evidence of a change in the duration of broiler fattening. Hence the 2010 feed conversion factor is kept for the years after 2010.

Additional feed properties are needed for the calculation of excretions of VS and N:

No data are available for the digestibility of energy $X_{DE, br}$. Hence, the value used for pullets is used instead ($X_{DE, br} = 0.779 \text{ MJ MJ}^{-1}$).

The digestibility of organic matter $X_{DOM, br}$ is likewise not known. It is replaced by $X_{DE, br}$. Due to the fact that the digestibility of energy is somewhat lower than of organic matter this assumption leads to a slight overestimation of CH_4 emissions from manure management.

The ash content of feed amounts 6,5 % of fresh matter (RHG, 2006), i. e. 7,4 % of dry matter (based on a matter content of 88 %).

Due to lack of information, the aforementioned feed properties are assumed to be constant with time and space.

In contrast to that, the mean content of crude protein ($X_{XP, feed}$) is estimated as time series using data given in HAENEL UND DÄMMGEN (2009a), see Table 8.12. The content of crude protein is needed for the calculation of N intake with feed, see Chapter 8.4.8.2. The 2007 content of crude protein of standard diets can be assumed to be representative also for the subsequent years (cf. HALLE UND TZSCHENTKE, 2009; SIMON UND STEGEMANN, 2009; DAMME UND LEMME, 2010; HILLER ET AL., 2011; HILLER UND NANNEN, 2015). For the years after 2015 new information is not yet available; hence the value of crude protein content keeps on being used.

Dividing $X_{XP, feed}$ by 6.25 yields the N content.

8.4.2.1) nach BERK (2010) ein Futterverwertungskoeffizient von $1,72 \text{ kg kg}^{-1}$. Diese Werte wurden zwischen 1990 und 2010 linear interpoliert. Für die Zeit nach 2010 liegen keine Anhaltspunkte für eine Veränderung der Hähnchenmast vor. Daher wird der Futterverwertungskoeffizient von 2010 für die Jahre danach beibehalten.

Für die Berechnung von VS- und N-Ausscheidung werden weitere Futtereigenschaften benötigt:

Für die Verdaulichkeit von Energie $X_{DE, br}$ konnten keine Daten ermittelt werden, weshalb der Junghennen-Wert $0,779 \text{ MJ MJ}^{-1}$ verwendet wird.

Die Verdaulichkeit von organischer Substanz $X_{DOM, br}$ ist ebenfalls nicht bekannt. Sie wird durch $X_{DE, br}$ ersetzt. Da die Verdaulichkeit von Energie etwas niedriger als die von organischer Substanz ist, bewirkt diese Annahme eine leichte Überschätzung der CH_4 -Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management.

Der Aschegehalt des Futters beträgt nach RHG (2006) 6,5 % der Frischmasse. Bezogen auf einen Trockenmassegehalt von 88 % entspricht dies 7,4 %.

Mangels besserer Informationen werden die vorgenannten Futterkennwerte als zeitlich und räumlich konstant angesehen.

Der für die Berechnung der N-Aufnahme mit dem Futter (siehe Kapitel 8.4.8.2) benötigte mittlere Rohproteingehalt des Futters ($X_{XP, feed}$) wird dagegen unter Bezug auf HAENEL UND DÄMMGEN (2009a) als Zeitreihe definiert, siehe Table 8.12. Der Rohproteingehalt von 2007 kann dabei auch für die nachfolgenden Jahre als repräsentativ für Standardfuttermischungen angesehen werden (vgl. HALLE UND TZSCHENTKE, 2009; SIMON UND STEGEMANN, 2009; DAMME UND LEMME, 2010; HILLER ET AL., 2011; HILLER UND NANNEN, 2015). Für die Jahre nach 2015 liegen noch keine Informationen vor, so dass der Wert des Rohproteingehalts weiterhin konstant beibehalten wird.

Division von $X_{XP, feed}$ durch 6,25 ergibt den N-Gehalt.

Table 8.12: Broilers, time series of mean crude protein content in feed $x_{XP, feed}$ (kg kg^{-1}), related to fresh matter

1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
0.230	0.230	0.230	0.230	0.230	0.230	0.230	0.230	0.230	0.220
2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
0.220	0.220	0.220	0.210	0.210	0.210	0.205	0.205	0.205	0.205
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
0.205	0.205	0.205	0.205	0.205	0.205	0.205	0.205	0.205	

Sources: see text.

The inventory does not calculate the amount of gross energy GE as is not needed for the VS calculation method used in the present inventory.

Die GE-Aufnahme mit dem Futter wird im Inventar nicht berechnet, da sie für die aktuell verwendete VS-Berechnungsmethode nicht benötigt wird.

8.4.5 Methane from enteric fermentation / Methan aus der Verdauung

For poultry, emissions from enteric fermentation are not calculated (IPCC(2006)-10.27).

Für Geflügel werden Emissionen aus der Verdauung nicht berechnet (IPCC(2006)-10.27).

8.4.6 Methane from manure management / Methan aus Wirtschaftsdünger-Management

CH₄ emissions from manure management are quantified using the Tier 2 methodology, see Chapter 3.3.4.1.

Volatile solids (VS) excretion rates are calculated using the modified IPCC approach described in DÄMMGEN et al. (2011a), see Chapter 3.3.3.1.

For the required data see Chapter 8.4.4.

The manure of broilers is stored as solid.

According to IPCC(2006)-10.82, the maximum methane producing capacity B_0 and the methane conversion factor MCF are $0.36 \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1}$ and 0.015 kg kg^{-1} respectively.

The MCF for anaerobic digestion of poultry manure including storage of digestate is calculated (see Chapter 3.3.4.4.1).

German data on the uncertainty of CH₄ emissions from manure management do not exist. IPCC(2006)-10.48 estimates the uncertainty of Tier 2 approaches to be 20 %. This value is, according to the definition of uncertainty used in Chapter 3 in IPCC (2006a), interpreted as half the 95 % confidence interval. A normal distribution is assumed.

Zur Berechnung der CH₄-Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management wird das Tier-2-Verfahren verwendet, siehe Kapitel 3.3.4.1.

Die VS-Ausscheidungen („volatile solids“) werden nach dem gegenüber IPCC modifizierten Verfahren von DÄMMGEN et al. (2011a) berechnet, siehe Kapitel 3.3.3.1.

Für die erforderlichen Daten siehe Kapitel 8.4.4.

Der Mist von Masthähnchen und -hühnchen wird trocken gelagert.

Nach IPCC(2006)-10.82 betragen die maximale Methan-Freisetzungskapazität B_0 $0,36 \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1}$ und der Methanumwandlungsfaktor MCF für alle in Deutschland vorkommenden Jahresmitteltemperaturen $0,015 \text{ kg kg}^{-1}$.

Der MCF -Wert für die Vergärung von Geflügelkot incl. Gärrestelagerung wird berechnet (siehe Kapitel 3.3.4.4.1).

Deutsche Zahlen zur Unsicherheit der CH₄-Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management liegen nicht vor. IPCC(2006)-10.48 schätzt die Unsicherheit bei Anwendung von Tier-2-Verfahren auf 20 %. Dieser Wert wird im Sinne von IPCC (2006a), Kapitel 3, als halbes 95 %-Konfidenzintervall interpretiert. Es wird Normalverteilung angenommen.

8.4.7 NMVOC emissions / NMVOC-Emissionen

The calculation of the NMVOC emissions of all animals except cattle are calculated with a Tier 1 methodology, see Chapters 3.3.4.2.1 and 3.3.4.2.3.

Agricultural NMVOC emissions are reported, but are neglected regarding the NEC emission threshold, see Chapter 3.3.4.2.

Die NMVOC-Emissionen von allen Tieren außer den Rindern werden mit einer Tier-1-Methode berechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.1 und 3.3.4.2.3.

Landwirtschaftliche NMVOC-Emissionen werden zwar berichtet, aber bzgl. der NEC-Emissionsobergrenze nicht angerechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.

8.4.8 Emissions of nitrogen species / Emissionen von Stickstoff-Spezies

The calculation of the emissions of nitrogen species is based on the knowledge of N excretions (their amounts and locations), of the N inputs with straw, the conversion of N_{org} in UAN as well as the frequency distributions of housing types and storage facilities, spreading techniques and times before incorporation.

Anaerobic digestion of poultry manure including storage of digestate is treated as a separate type of storage (see Chapter 3.3.4.4.1).

Die Berechnung der Emissionen der Stickstoff-Spezies beruht auf der Kenntnis der N-Ausscheidungen (Mengen und Orte), der N-Einträge mit Stroh, der Umwandlungen von N_{org} in UAN, der Häufigkeit von Stalltypen, Lagertypen, Ausbringungstechniken und Einarbeitungszeiten.

Die Vergärung von Geflügelkot incl. Gärrestelagerung stellt einen eigenständigen Lagertyp dar (siehe Kapitel 3.3.4.4.1).

8.4.8.1 N excretion / N-Ausscheidung

N excretions are calculated as a function of performance and feed properties.

The annual N excretion on an average animal place (for the definition of the average animal place see Chapter 3.1.2.2) results from N mass balance. As input data are constant in space, the calculated N excretion is the same for all federal states.

Die Ausscheidungen werden in Abhängigkeit von Leistung und Fütterung berechnet.

Die jährliche N-Ausscheidung auf einem mittleren Tierplatz (zur Tierplatzdefinition siehe Kapitel 3.1.2.2) wird über die N-Bilanz errechnet. Mangels räumlicher Differenzierung der Eingangsdaten ist das Ergebnis für alle Bundesländer gleich.

$$m_{\text{excr}} = m_{\text{feed}} - m_{\text{g}}$$

(8.15)

m_{excr}	amount of nitrogen excreted (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹), see Chapter 8.4.8.1
m_{feed}	amount of nitrogen intake with feed (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹), see Chapter 8.4.8.2
m_g	amount of nitrogen retained with growth (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹), see Chapter 8.4.8.3

The calculation of the amount of UAN excreted (which is a share of the amount of N excreted) is based on the digestibility of crude protein X_{XP} :

$$UAN_{\text{excr}} = X_{\text{DXP}} \cdot m_{\text{feed}} - m_g$$

UAN_{excr}	amount of UAN excreted (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
X_{DXP}	crude protein digestibility X_{DXP} (in kg kg ⁻¹)
m_{feed}	amount of nitrogen intake with feed (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
m_g	amount of nitrogen retained with growth (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹), see Chapter 8.4.8.3

As X_{DXP} is not available, the digestibility of energy X_{DE} is used. It is assumed that it can be adopted from pullets (see Chapter 8.5.8.1) as no data is available for broilers.

Die ausgeschiedene UAN-Menge, die eine Teilmenge der ausgeschiedenen N-Menge darstellt, wird wie folgt mit der Rohprotein-Verdaulichkeit X_{XP} berechnet:

In Ermangelung von X_{DXP} wird ersatzweise mit der Verdaulichkeit von Energie X_{DE} gerechnet. Der Wert hierfür wird von den Junghennen (siehe Kapitel 8.5.8.1) übernommen, da für Masthähnchen und -hühnchen kein X_{DE} -Wert verfügbar ist.

8.4.8.2 N intake with feed / N-Aufnahme über das Futter

The annual amount of N taken in with feed can be calculated from the amount of feed and the crude protein (XP) content of the feed:

Die Menge des jährlich mit dem Futter aufgenommenen Stickstoffs berechnet sich mithilfe von Futtermenge und Rohprotein-(XP-)Gehalt:

$$m_{\text{feed}} = X_{\text{N, XP}} \cdot X_{\text{XP, feed}} \cdot m_{\text{F, FM}} \quad (8.17)$$

m_{feed}	annual nitrogen intake with feed (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
$X_{\text{N, XP}}$	nitrogen content of crude protein ($x_{\text{N}} = 1/6.25$ kg kg ⁻¹)
$X_{\text{XP, feed}}$	crude protein content of feed, related to fresh matter (in kg kg ⁻¹), see Chapter 8.4.4
$m_{\text{F, FM}}$	annual feed intake, fresh matter (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹), see Chapter 8.4.4

No information is available on the frequencies of N reduced feed usage. Hence, the N excretion calculations are based on the assumption of a nationwide used "normal" feed composition, see Table 8.12.

Mangels Informationen zur Verbreitung von N-angepasster Fütterung erfolgen die Ausscheidungsrechnungen für das Inventar durchgängig mit nicht N-reduziertem Futter (siehe Table 8.12).

8.4.8.3 N retention in the animal / N-Retention im Tierkörper

In order to calculate the N excretion in Chapter 8.4.8.1 the N retention per animal place and year (m_g) must be known. It is calculated as follows:

Zur Berechnung der N-Ausscheidung in Kapitel 8.4.8.1 wird die N-Retention pro Tierplatz und Jahr (m_g) benötigt. Diese berechnet sich wie folgt:

$$m_g = X_{\text{N, ret}} \cdot \frac{1}{n_{\text{br}}} \cdot \frac{\Sigma w_{\text{BMP, gross}}}{x_{\text{br, cw}}} \quad (8.18)$$

m_g	amount of nitrogen retained with growth (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
$X_{\text{N, ret}}$	specific N retention as function of duration of fattening, gender-averaged (in kg kg ⁻¹), see below
n_{br}	mean annual number of animal places (see Chapter 8.4.1)
$\Sigma w_{\text{BMP, gross}}$	gross broiler meat production, see Chapter 8.4.2.2.2
$x_{\text{br, cw}}$	relative carcass weight, i. e. ratio of carcass weight to final live weight (in kg kg ⁻¹), see Chapter 8.4.2.2.2

LfL (2006a), Table 8, quantify the specific N retention with $x_{\text{N, ret}} = 0.035$ kg kg⁻¹. The description of broilers by GfE (2000, Table 2.3.1) suggests a smaller specific N retention, depending on animal age and, to some extent, on its gender. If the dependency on gender is ne-

Nach LfL (2006a), Tabelle 8, ist die spezifische N-Retention $x_{\text{N, ret}} = 0,035$ kg kg⁻¹. Tabelle 2.3.1 in GfE (2000,) deutet auf eine niedrigere spezifische N-Retention hin, die alters- und in geringem Maße geschlechtsabhängig ist. Unter Vernachlässigung der Ge-

glected, the mean specific N retention of broilers can well be approximated by a function of the fattening duration (HAENEL and DÄMMGEN, 2009a). This function is valid for fattening durations between 21 und 56 days:

$$x_{N, \text{ret}} = a_{\text{ret}} + b_{\text{ret}} \cdot k_{\text{fin}} + c_{\text{ret}} \cdot k_{\text{fin}}^2 \quad (8.19)$$

$x_{N, \text{ret}}$	specific N retention as function of duration of fattening, gender-averaged (in kg kg ⁻¹)
k_{fin}	number of final day of fattening period
a_{ret}	constant ($a_{\text{ret}} = 2.3806 \cdot 10^{-2}$ kg kg ⁻¹ N)
b_{ret}	constant ($b_{\text{ret}} = 2.5244 \cdot 10^{-4}$ kg kg ⁻¹ N)
c_{ret}	constant ($c_{\text{ret}} = -1.9964 \cdot 10^{-6}$ kg kg ⁻¹ N)

Based on a mean fattening duration of 40 days in 1990 (see Chapter 8.4.2.1), Equation (8.19) yields a N retention of $x_{N, \text{ret}} = 0.0304$ kg kg⁻¹. For 2010, with a mean fattening duration of 37 days, one obtains $x_{N, \text{ret}} = 0.0307$ kg kg⁻¹. In order to avoid underestimation of N excretions (and, as a consequence, N emissions) the inventory calculation used $x_{N, \text{ret}} = 0.03$ kg kg⁻¹.

schlechtsabhängigkeit ergibt sich in guter Näherung eine Formel für die mittlere spezifische N-Retention, die für Haltungsauern von 21 bis 56 Tage anwendbar ist (HAENEL und DÄMMGEN, 2009a):

Nach Kapitel 8.4.2.1 beträgt die mittlere Mastdauer für 1990 40 Tage und für 2010 37 Tage. Nach Gleichung (8.19) ergibt sich damit $x_{N, \text{ret}} = 0,0304$ kg kg⁻¹ für 1990 und $x_{N, \text{ret}} = 0,0307$ kg kg⁻¹ für 2010. Zu Vermeidung einer Unterschätzung der N-Ausscheidung (und damit der N-Emissionen) wurden die Inventarberechnungen mit $x_{N, \text{ret}} = 0,03$ kg kg⁻¹ durchgeführt.

8.4.8.4 N inputs with straw / N-Einträge mit Stroh

For straw based systems N inputs with straw are taken into account. According to KTBL (2006), pg. 586, an amount of straw fresh matter input of 1.4 kg per place and year is assumed.

For the properties of straw see Chapter 3.3.4.3.2.

Für Systeme mit Einstreu wird der N-Eintrag mit dem Stroh berücksichtigt. Nach KTBL (2006), S. 586, wird eine Einstreumenge von 1,4 kg Strohfrischmasse pro Platz und Jahr angenommen

Zu Stroh-Eigenschaften siehe Kapitel 3.3.4.3.2.

8.4.8.5 Partial emission factors / Partielle Emissionsfaktoren

The partial NH₃-N emission factor is based on emission factors collated by the KTBL working group on emission factors for animal husbandry (KTBL-Arbeitsgruppe „Emissionsfaktoren Tierhaltung“, EURICH-MENDEN et al., 2011). However, as these emission factors are defined per place and year and depend on the duration of the fattening period (see Table 8.13) they had to be recalculated in order to obtain a partial emission factor related to N excreted. The recalculation is demonstrated in Table 8.13. The resulting two emission factors only slightly differ with the duration of the fattening period. Hence it is assumed that for the inventory the partial NH₃ emission factor can be taken as a constant which is set to the higher value listed in Table 8.13.

Some broiler houses are equipped with air scrubbing systems. Those air scrubbing systems remove both NH₃ and particulate matter from the house exhaust air. For further details see Chapter 3.4.5.2.

Der partielle NH₃-N-Emissionsfaktor für den Stall basiert auf den Ergebnissen der KTBL-Arbeitsgruppe „Emissionsfaktoren Tierhaltung“ (EURICH-MENDEN et al., 2011), die die NH₃-Emission pro Tierplatz und Jahr in Abhängigkeit von der Mastdauer angibt, siehe Table 8.13. Für das Inventar ist eine Umrechnung von NH₃ auf NH₃-N sowie der Bezug auf die ausgeschiedene N-Menge erforderlich. Table 8.13 zeigt diese Umrechnung. Die beiden resultierenden Emissionsfaktoren unterscheiden sich so wenig, dass davon auszugehen ist, dass der auf die N-Ausscheidung bezogene Emissionsfaktor *keine* Funktion der Mastdauer ist. Für das Inventar wird daher in konservativer Wahl der höhere der beiden in Table 8.13 berechneten Emissionsfaktoren verwendet.

In einem Teil der Masthähnchenhaltung werden Abluftreinigungsanlagen eingesetzt. Diese Anlagen filtern sowohl NH₃ als auch Staub aus der Stallabluft. Zu weiteren Details siehe Kapitel 3.4.5.2.

Table 8.13: Broilers, derivation of partial emission factors for NH₃-N losses from housing

Fattening period	EF ^a	EF ^b	Standard N excretion ^c	EF related to standard N excretion	EF used in the inventory
d	kg NH ₃ (pl · a) ⁻¹	kg NH ₃ -N (pl · a) ⁻¹	kg N (pl · a) ⁻¹	kg NH ₃ -N (kg N _{excr}) ⁻¹	kg NH ₃ -N (kg N _{excr}) ⁻¹
33	0.035	0.029	0.319	0.090	
42	0.0486	0.040	0.469	0.085	0.090

^a Source: EURICH-MENDEN et al. (2011)

^b Source: EURICH-MENDEN et al. (2011), data multiplied by 14/17 to transform from NH₃ to NH₃-N units

^c Source: DLG (2005), pg. 49/50

For the partial NH_3 -N emission factor for storage, the value given in EMEP(2013)-3B-27, Table 3.7, is used: 0.17 kg kg^{-1} . The factor relates to the UAN amount entering the storage. (For UAN see Chapter 3.3.3.2).

Anaerobic digestion of poultry manure including storage of digestate is treated as a separate type of storage. The respective emission factors are calculated (see Chapter 3.3.4.4.1).

The emission factors for N_2O , NO and N_2 are combined factors for house and storage, see Chapter 8.2.1, Table 8.2.

For the NH_3 -N emission factors for spreading see Chapter 8.2.2, Table 8.3.

The emission factors for the separate storage type “anaerobic digestion of poultry manure” are calculated (see Chapter 3.3.4.4.1).

NO emissions from manure management are reported (as NO_x), but are neglected regarding the NEC emission threshold, see Chapter 3.3.4.2.

The uncertainty of the NH_3 emission factor characterizing the overall NH_3 emissions per animal place from the animal house, storage and application is calculated and provided in the inventory (see Chapter 14.5).

For the uncertainties of the N_2O emission factor for the combination “housing/storage” see Chapter 14.4.1. Due to the lack of information on the uncertainties of the NO and N_2 emission factors, the uncertainty of the N_2O emission factor is adopted (see Chapter 14.4.2).

Der partielle NH_3 -N-Emissionsfaktor für das Lager wird nach EMEP(2013)-3B-27, Table 3.7, mit $0,17 \text{ kg kg}^{-1}$ angesetzt. Der Faktor bezieht sich auf die UAN-Menge, die ins Lager gelangt. (Zu UAN siehe Kapitel 3.3.3.2).

Die Vergärung von Geflügelkot incl. Gärrestelagerung stellt einen eigenständigen Lagertyp dar. Die zugehörigen Emissionsfaktoren werden berechnet (siehe Kapitel 3.3.4.4.1).

Die Emissionsfaktoren für N_2O , NO und N_2 gelten für Stall und Lager zusammen, siehe Kapitel 8.2.1, Table 8.2.

Zu den NH_3 -N-Emissionsfaktoren für die Ausbringung siehe Kapitel 8.2.2, Table 8.3.

Die zum eigenständigen Lagertyp „Vergärung von Geflügelkot“ gehörigen Emissionsfaktoren werden berechnet (siehe Kapitel 3.3.4.4.1).

NO aus dem Wirtschaftsdünger-Management wird berichtet (als NO_x), bzgl. der NEC-Emissionsobergrenze aber nicht angerechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.

Die Unsicherheit des NH_3 -Emissionsfaktors, der die auf tierplatzbezogene NH_3 -Gesamtemissionen aus Stall, Lager und Ausbringung beschreibt, wird im Inventar berechnet, siehe Kapitel 14.5.

Für die Unsicherheit des N_2O -Emissionsfaktors für die Kombination „Stall/Lager“ siehe Kapitel 14.4.1. Mangels Daten zu den Unsicherheiten von NO- und N_2 -Emissionsfaktoren wird die Unsicherheit des N_2O -Emissionsfaktors übernommen, siehe Kapitel 14.4.2.

8.4.8.6 *Indirect N_2O from manure management / Indirektes N_2O aus dem Wirtschaftsdünger-Management*

Indirect N_2O emissions from manure management (housing/storage without spreading) are calculated according to Chapter 3.3.4.3.6. See Chapter 3.3.4.3.6 also for the uncertainties of activity data and emission factor.

(Indirect N_2O emissions from agricultural soils after spreading of manures or digestated manures are reported in Sector 3.D. For the calculation of these emissions see Chapter 12.)

Indirekte N_2O -Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management (Stall/Lager ohne Ausbringung) werden nach Kapitel 3.3.4.3.6 berechnet. Siehe dort auch wegen der Unsicherheiten von Aktivitätswert und Emissionsfaktor.

(Indirekte N_2O -Emissionen als Folge der Ausbringung von Wirtschaftsdüngern und Wirtschaftsdünger-Gärresten werden im Sektor 3.D berichtet. Zur Berechnung siehe Kapitel 12.)

8.4.8.7 *Uncertainties of emission factors and activity data / Unsicherheiten von Emissionsfaktoren und Aktivitätsdaten*

For the uncertainties of the emission factors see Chapter 4.2.2.4.

The uncertainty of the activity data (amounts of N) is adopted from Chapter 4.3.8.9.

(Note that only for laying hens there is an option of being held in free range (“grazing”).)

Zu den Unsicherheiten der Emissionsfaktoren siehe Kapitel 4.2.2.4.

Die Unsicherheit der Aktivitätsdaten (N-Mengen) wird wie in Kapitel 4.3.8.9 angesetzt.

(Hinweis: Nur für Legehennen gibt es die Möglichkeit für Freilandaufenthalt („Weidegang“).)

8.4.9 *Emissions of particulate matter / Partikelemissionen*

The method to calculate particle emissions is described in Chapter 3.3.4.5. The emission factors are listed in Table 8.14. For the uncertainty of the emission factors see Chapter 3.3.4.5.

Zur Berechnungsmethode für Partikelemissionen wird auf Kapitel 3.3.4.5 verwiesen. Die Emissionsfaktoren sind in Table 8.14 angegeben. Zur Unsicherheit der Emissionsfaktoren siehe Kapitel 3.3.4.5.

The mitigation of PM emissions by air scrubbers is taken into account, see Chapter 3.4.5.2.

Die Minderung von Partikelemissionen durch Abluftreinigungsanlagen wird berücksichtigt, s. Kapitel 3.4.5.2.

Table 8.14: Broilers, emission factors for particle emissions from housing

Housing type	Haltungssystem	Emission factor for TSP kg pl ⁻¹ a ⁻¹	Emission factor for PM ₁₀ kg pl ⁻¹ a ⁻¹	Emission factor for PM _{2.5} kg pl ⁻¹ a ⁻¹
straw based	strohbasierend	0.04	0.02	0.002

Source: EMEP(2016)-3B-19, Table 3.5

8.4.10 References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung

The subsequent table lists the references to information provided in the data collection (see Chapter 2.4).

Die nachfolgende Tabelle enthält Verweise auf die Informationen in der Datensammlung (siehe Kapitel 2.4).

Table 8.15: Broilers, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)

			from	to
Emissions	Emissionen	CH ₄ enteric fermentation	---	
		CH ₄ manure management	EM1005.022	
		NM VOC	EM1007.022	
		NH ₃	EM1009.064	EM1009.066
		N ₂ O	EM1009.112	
		NO	EM1009.142	
		TSP	EM1010.022	
		PM ₁₀	EM1010.052	
		PM _{2.5}	EM1010.082	
Activity data	Aktivitäten		AC1005.026	
Emission factors	Emissionsfaktoren	CH ₄ enteric fermentation	---	
		CH ₄ manure management	IEF1005.022	
		NM VOC	IEF1007.022	
		NH ₃	IEF1009.061	IEF1009.063
		N ₂ O	IEF1009.105	
		NO	IEF1009.133	
		TSP	IEF1010.021	
		PM ₁₀	IEF1010.049	
		PM _{2.5}	IEF1010.077	
Additional information	zusätzliche Informationen		AI1005POU.021	AI1005POU.036
Excretion rates	Ausscheidungen	N	EXCR.083	EXCR.084

8.5 Pullets / Junghennen

Pullets are young hens between hatching and the beginning of egg production (18th week). They do not yet produce eggs.

The emissions are calculated according to the methods compiled in Table 8.16.

For the definition of the methods see Chapter 3.2.3.

Junghennen sind Hennen zwischen Schlüpfen und Einstellung als Legehenne (18. Lebenswoche). Junghennen legen noch keine Eier.

Die Berechnung der Emissionen erfolgt nach den in Table 8.16 zusammengestellten Methoden

Zur Methodendefinition siehe Kapitel 3.2.3.

Table 8.16: Pullets, calculation methods applied

Species	Origin	Tier	Method applied
CH ₄	enteric fermentation		
CH ₄	manure management	2	IPCC / national
NMVOC	manure management	1	EMEP
NH ₃	manure management	2	EMEP / national
N ₂ O, NO, N ₂	manure management	2	IPCC / national
TSP, PM ₁₀ , PM _{2.5}	manure management	2	EMEP

8.5.1 Animal numbers / Tierzahlen

Poultry numbers have been surveyed in each agricultural-structure surveys, i.e. until 1996 in each even year, from 1999 to 1997 in each odd year, 2010 in the LZ 2010 census (STATLA C III 1 – vj 4, see also Chapter 3.4.2.1), and 2013 and 2016 in agricultural structure surveys. For the years between the surveys the poultry numbers were estimated by linear interpolation. The striking increase of animal numbers between 2010 and 2013 is, for the most part, due to the fact that the number of farms questioned in 2013 was higher than in 2010 (see Chapter 3.4.2.1). The missing pullet numbers for 2017 and 2018 were estimated by keeping the 2016 numbers, see Chapter 3.4.2.2.

Before 2010 the German census differentiated hens according to animal age: Hens younger than half a year and hens older than half a year. This means: In official surveys including 2007, young chickens up to the age of six months were counted as pullets, although in common husbandry practice pullets are considered laying hens when they complete their 18th week of life. For the inventory, therefore, a fraction of the pullets was shifted into the laying-hen category up to and including 2007. This correction assumed that the number of pullets produced be equal to the number of hens slaughtered. In addition, the sum of the recalculated numbers of pullets and laying hens had to be equal to the total of animal numbers in both poultry categories. The subsequent equation describes the resulting modification of the laying hen numbers:

$$n_{pu} = (n_{AA} + n_{AB}) \cdot \frac{\tau_{round,pu}}{\tau_{round,lh} + \tau_{round,pu}} \quad (8.20)$$

n_{pu}	modified of pullet places considered, used in the inventory for the years 1990 - 2007
n_{AA}	animal place numbers of type AA (i. e. laying hens) in the German census until 2007, see Table 8.1
n_{AB}	animal place numbers of type AB (i. e. laying pullets) in the German census until 2007, see Table 8.1
$\tau_{round, lh}$	duration of round for laying hens ($\tau_{round, lh} = 441$ d), see Chapter 8.3.2
$\tau_{round, pu}$	duration of round for pullets ($\tau_{round, pu} = 142$ d), see Chapter 8.5.2

Geflügelzahlen wurden in jeder Agrarstruktur-erhebung erhoben, d.h. bis 1996 in allen geraden Jahren, 1999 bis 2007 in allen ungeraden Jahren, 2010 in der LZ 2010 (STATLA C III 1 – vj 4, siehe auch Kapitel 3.4.2.1) und 2013 sowie 2016 in einer Agrarstruktur-erhebung. In den Zwischenjahren wurden die Geflügelzahlen durch lineare Interpolation geschätzt. Der auffällig starke Anstieg zwischen 2010 und 2013 ist dabei im Wesentlichen auf die der Zählung 2013 zugrunde liegende Berichtskreisre- vision (siehe Kapitel 3.4.2.1) zurückzuführen ist. Die für 2017 und 2018 fehlenden Junghennenzahlen wurden durch Beibehaltung des Wertes von 2016 geschätzt, siehe Kapitel 3.4.2.2.

Vor 2010 wurde bei der Erfassung von Hennen in Deutschland danach unterschieden, ob die Tiere jünger oder älter als ein halbes Jahr sind. Das bedeutet: Weibliche Jungtiere wurden bis einschließlich der Erhebung 2007 entgegen der Haltungspraxis (Aufstallung als Legehenne bereits nach der 18. Woche, wie es im Inventar auch berücksichtigt ist) offiziell bis zu einem Alter von 6 Monaten als Junghennen gezählt. Daher wurde für das Inventar bis einschließlich 2007 ein Teil der Junghennen in die Legehennen-Kategorie verschoben, wobei die Gesamtsumme aus Jung- und Legehennen nicht verändert wurde. Für diese Modifizierung der Tierzahlen wurde angenommen, dass genau so viele Junghennen aufgezogen werden, dass frei werdende Legehennenplätze wieder besetzt werden können. Die nachstehende Gleichung beschreibt diese Berechnung:

The next official survey after 2007 took place in 2010. As of this survey the numbers of pullets and laying hens were counted according to husbandry practice. Hence no animal number shifting is applied as of the 2010 survey and the laying hen numbers are $n_{pu} = n_{AB}$.

The animal numbers between 2007 and 2010 were estimated by linear interpolation, based on the modified 2007 animal numbers (see above).

For the uncertainty of the animal numbers see Chapter 8.1.2.

Die nächste Geflügelzählung nach 2007 fand 2010 statt. Ab dieser Zählung wurden die Tierzahlen von Junghennen und Legehennen entsprechend der Hal-
tungspraxis erhoben. Daher entfällt ab 2010 eine Um-
rechnung nach Gleichung (8.20) und es gilt $n_{pu} = n_{AB}$.

Die Tierzahlen zwischen 2007 und 2010 wurden durch lineare Interpolation geschätzt, wobei für 2007 die oben beschriebenen modifizierten Tierzahlen zu-
grunde gelegt wurden.

Zur Unsicherheit der Tierzahlen siehe Kapitel 8.1.2.

8.5.2 Animal weights and husbandry details / Tiergewichte und Haltungsdetails

Lifespan, duration of production cycle, animal weights (start weight, final weight) and egg weights are not surveyed officially. Hence other data sources are needed for the emission inventory calculations.

According to the date of adoption as laying hen (see KTBL, 2004, pg. 481) the lifespan of a pullet ($\tau_{\text{lifespan, pu}}$) is assumed to be 128 d. This leads to a production cycle of $\tau_{\text{round, pu}} = 142$ d, if a cleansing time of 14 days is taken into account (see HAENEL et al., 2007a). The start weight is 45 g, see DAENISCHESEN (2006). The final weight of pullets equals the start weight of laying hens, see Chapter 8.3.2.

Lebensdauer, Anfangs- und Endgewicht sowie Eige-
wicht werden nicht offiziell erhoben, so dass für das
Emissionsinventar andere Datenquellen herangezogen
werden müssen.

Die Lebensdauer ($\tau_{\text{lifespan, pu}}$) wird nach dem Termin für die Einstellung als Legehenne (siehe KTBL, 2004, S. 481) mit 128 Tagen angesetzt. HAENEL et al. (2007a) leiteten daraus unter Annahme einer Reinigungsdauer von 14 Tagen eine Durchgangsdauer von $\tau_{\text{round, pu}} = 142$ d ab. Für das Anfangsgewicht gibt DAENISCHESEN (2006) 45 g an. Als Endgewicht entspricht dem Anfangsgewicht der Legehennen (siehe Kapitel 8.3.2).

8.5.3 Energy requirements /Energiebedarf

The daily requirements of metabolizable energy per animal place consist of three partial requirements:

Der Tagesbedarf an metabolisierbarer Energie pro
Tierplatz setzt sich aus drei Teilbedarfen zusammen:

$$ME_{pu} = ME_m + ME_f + ME_g \quad (8.21)$$

ME_{pu}	daily requirements of metabolisable energy (in MJ $pl^{-1} d^{-1}$)
ME_m	daily metabolisable energy required for maintenance (in MJ $pl^{-1} d^{-1}$)
ME_f	daily metabolisable energy needed to obtain food (in MJ $pl^{-1} d^{-1}$)
ME_g	daily metabolisable energy consumed for growth (in MJ $pl^{-1} d^{-1}$)

The three terms on the right-hand side of the equation cannot be calculated in the inventory model because the data needed are not available. Hence the daily ME requirements can only be deduced from the knowledge of the ME content of the feed and the (mean) daily ME requirements:

Die drei Terme auf der rechten Seite dieser Gleichung können im Inventarmodell mangels Daten nicht berechnet werden. Daher kann nur aus der aufgenommenen Futtermenge und dem ME-Gehalt des Futters auf den (mittleren) täglichen Gesamt-ME-Bedarf zurückgeschlossen werden:

$$ME_{pu} = \eta_{ME, feed} \cdot m_{F, FM} \quad (8.22)$$

ME_{pu}	daily requirements of metabolisable energy (in MJ $pl^{-1} d^{-1}$)
$\eta_{ME, feed}$	content of metabolisable energy in pullet diet, related to fresh matter (in MJ kg^{-1}), see Chapter 8.5.4
$m_{F, FM}$	daily feed intake, fresh matter (in kg $pl^{-1} d^{-1}$), see Chapter 8.5.4

The determination of the feed intake and the ME content of the feed are described in the following chapter 8.5.4.

Die Ermittlung der aufgenommenen Futtermenge und des ME-Gehalts des Futters werden im nachfolgenden Kapitel 8.5.4 beschrieben.

8.5.4 Feed and energy intake / Futter- und Energieaufnahme

Pullets are normally fed in four to five phases, at least in two phases.

Die Junghennen-Fütterung erfolgt in der Regel in vier bis fünf Phasen, mindestens aber in zwei Phasen.

KTBL (2006), pg. 576, provides the amount of feed required for 4 phases, see Table 8.17 (fresh matter). As no data on the intake of metabolizable energy (ME) is mentioned by KTBL, Table 8.17 was complemented with data on the content of metabolizable energy provided by HALLE (2002), Table 1. This leads to a weighted mean ME content of the feed of $\eta_{\text{ME, feed}} = 11.22 \text{ MJ kg}^{-1}$, related to fresh matter.

KTBL (2006), S. 576, gibt den Futterbedarf für 4 Phasen an, siehe Table 8.17 (Frischmasse). Da KTBL keine entsprechenden Angaben zur Aufnahme an umsetzbarer Energie (ME) macht, wurde Table 8.17 mit Daten zum Gehalt an umsetzbarer Energie nach HALLE (2002), Tabelle 1, ergänzt. Daraus folgt als gewichtetes Mittel des ME-Gehaltes im Futter $\eta_{\text{ME, feed}} = 11,22 \text{ MJ kg}^{-1}$, bezogen auf Frischmasse.

Table 8.17: Pullets, phase-related diet mass intake (fresh matter) and ME contents of feed

phase	lifetime period, weeks	total of diet intake per phase (fresh matter) ^a kg	ME content ^b MJ kg ⁻¹
1	1 to 3	0.350	11.29
2	4 to 8	1.302	11.29
3	9 to 15	2.933	11.20
4	16 to 18	1.596	11.20
overall	1 to 18	6.181	11.22 ^c

Sources: ^a KTBL (2006), pg. 576; ^b HALLE (2002), Table 1; ^c weighted mean

The daily feed intake (fresh matter) is calculated as follows (average over the lifespan as pullet):

Für die tägliche Futteraufnahme (Frischmasse) gilt (Mittelwert über Junghennen-Lebensdauer):

$$m_{\text{F, FM}} = x_{\text{feed, pu}} \cdot \frac{\Delta w_{\text{pu}}}{\tau_{\text{lifespan, pu}}} \quad (8.23)$$

$m_{\text{F, FM}}$	daily feed intake, fresh matter (in kg pl ⁻¹ d ⁻¹)
$x_{\text{feed, pu}}$	pullet diet mass (fresh matter) needed for animal weight gain (in kg kg ⁻¹), see below
Δw_{pu}	weight gain during lifetime as pullet (in kg an ⁻¹), see Chapter 8.5.2
$\tau_{\text{lifespan, pu}}$	duration of lifetime as pullet (in d), see Chapter 8.5.2

For the weight gain-related amount of feed intake (fresh matter) the inventory uses $x_{\text{feed, pu}} = 5.12 \text{ kg kg}^{-1}$ (see HAENEL and DÄMMGEN, 2007a).

This leads to the daily intake of dry matter (average over all days of a production cycle):

Für die auf den Gewichtszuwachs bezogene Futteraufnahme (Frischmasse) rechnet das Inventar mit $x_{\text{feed, pu}} = 5,12 \text{ kg kg}^{-1}$, siehe HAENEL und DÄMMGEN (2007a).

Daraus ergibt sich die tägliche Trockenmasseaufnahme (Mittelwert über alle Tage eines Durchgangs):

$$m_{\text{F, DM}} = x_{\text{DM}} \cdot m_{\text{F, FM}} \quad (8.24)$$

$m_{\text{F, DM}}$	daily feed intake, dry matter (in kg pl ⁻¹ d ⁻¹)
$m_{\text{F, FM}}$	daily feed intake, fresh matter (in kg pl ⁻¹ d ⁻¹)
x_{DM}	dry matter content of feed (kg kg ⁻¹), see below

The inventory assumes a dry matter content of pullet feed of 0.88 kg kg^{-1} and a nitrogen content of $0.0247 \text{ kg kg}^{-1}$ (related to dry matter). Both values are based on the feed compositions described in HALLE (2002), Table 1, and the dry matter and crude protein contents of the various feed components as given in BEYER et al. (2004). By analogy, the GE and DE values provided by BEYER et al. (2004) lead to a mean specific GE content of $\eta_{\text{GE, feed}} = 15.77 \text{ MJ kg}^{-1}$ and a mean specific DE content of $\eta_{\text{DE, feed}} = 12.28 \text{ MJ kg}^{-1}$ (both related to fresh matter) which results in a digestibility of energy $x_{\text{DE}} = 0.779 \text{ MJ MJ}^{-1}$ and a metabolizability of energy $x_{\text{ME}} = 0.711 \text{ MJ MJ}^{-1}$ (HAENEL and DÄMMGEN, 2007a).

The digestibility of organic matter x_{DOM} is unknown. It is replaced with x_{DE} . As the digestibility of energy is

Das Inventar rechnet für das Junghennenfutter mit einem Trockenmassegehalt von $0,88 \text{ kg kg}^{-1}$ und einem auf Trockenmasse bezogenen N-Gehalt von $0,0247 \text{ kg kg}^{-1}$. Beide Werte ergeben sich aus den in HALLE (2002), Tabelle 1 angegebenen Futtermischungen und entsprechenden, aus BEYER et al. (2004) entnommenen Trockenmasse- und Rohproteingehalten der einzelnen Futterkomponenten. Daraus ergeben sich – bezogen auf Frischmasse – ein mittlerer spezifischer GE-Gehalt von $\eta_{\text{GE, feed}} = 15,77 \text{ MJ kg}^{-1}$ und ein mittlerer spezifischer DE-Gehalt von $\eta_{\text{DE, feed}} = 12,28 \text{ MJ kg}^{-1}$, sowie die Verdaulichkeit von Energie $x_{\text{DE}} = 0,779 \text{ MJ MJ}^{-1}$ und die Umsetzbarkeit von Energie $x_{\text{ME}} = 0,711 \text{ MJ MJ}^{-1}$ (HAENEL und DÄMMGEN, 2007a).

Die Verdaulichkeit von organischer Substanz $x_{\text{DOM, br}}$ ist nicht bekannt. Sie wird durch $x_{\text{DE, br}}$ ersetzt. Da die Verdaulichkeit

somewhat lower than that of organic matter, the assumption $X_{\text{DOM}} \approx X_{\text{DE}}$ leads to a slight overestimation of CH_4 emissions from manure management.

The ash content of feed is 6.5 % according to RHG (2006), related to fresh matter. Related to a typical dry matter content of 88 % the ash content is 7.4 %.

Due to lack of information, the feeding-related data are assumed to be constant with time and space.

Feeding data provided in DLG (2005), pg. 46, for N reduced feeding allow for the derivation of a fresh matter crude protein content of 0.146 kg kg^{-1} (averaged over all feeding phases). This corresponds to a fresh matter N content of $0.0234 \text{ kg kg}^{-1}$. Related to dry matter (using a dry matter content of 88 kg kg^{-1} , see above), this leads to a N content of $0.0206 \text{ kg kg}^{-1}$. However, due to lack of data on the temporal and spatial distribution, the N reduced feeding cannot be account for in the inventory.

The inventory does not calculate the amount of gross energy GE as is not needed for the VS calculation method used in the present inventory.

lichkeit von Energie etwas niedriger als die von organischer Substanz ist, bewirkt diese Annahme eine leichte Überschätzung der CH_4 -Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management.

Der Aschegehalt des Futters beträgt nach RHG (2006) 6,5 % der Frischmasse bzw. 7,4 % der Trockenmasse (typischer Trockenmassegehalt von 88 %).

Mangels besserer Informationen werden die Futterkennwerte als zeitlich und räumlich konstant angesehen.

Aus Fütterungsdaten in DLG (2005), S. 46, lässt sich für die N-reduzierte Fütterung ein über alle Phasen gemittelter Frischmasse-Rohproteingehalt von $0,146 \text{ kg kg}^{-1}$, entsprechend einem N-Gehalt in der Futterfrischmasse von $0,0234 \text{ kg kg}^{-1}$, ableiten. Bezogen auf Trockenmasse (bei einem Trockenmassegehalt von $0,88 \text{ kg kg}^{-1}$, s. o) ist das ein N-Gehalt von $0,0206 \text{ kg kg}^{-1}$. Eine N-reduzierte Fütterung kann im Inventar aber mangels Informationen zur räumlichen und zeitlichen Verteilung nicht berücksichtigt werden.

Die GE-Aufnahme mit dem Futter wird im Inventar nicht berechnet, da sie für die aktuell verwendete VS-Berechnungsmethode nicht benötigt wird.

8.5.5 Methane from enteric fermentation / Methan aus der Verdauung

For poultry, emissions from enteric fermentation are not calculated (IPCC(2006)-10.27).

Für Geflügel werden Emissionen aus der Verdauung nicht berechnet (IPCC(2006)-10.27).

8.5.6 Methane from manure management / Methan aus Wirtschaftsdünger-Management

CH_4 emissions from manure management are quantified using the Tier 2 methodology, see Chapter 3.3.4.1.

Volatile solids (VS) excretion rates are calculated using the modified IPCC approach described in DÄMMGEN et al. (2011a), see Chapter 3.3.3.1..

For the required data see Chapter 8.5.4.

IPCC (2006) does not provide B_0 and MCF default data for pullets. Hence, as there are no national data, Germany uses the high B_0 value provided by IPCC (2006), Table 10A-9, for laying hens: $0.39 \text{ m}^3 \text{ CH}_4 (\text{kg VS})^{-1}$. For the MCF the inventory uses the value provided by IPCC (2006) for laying hens, broilers, ducks and turkeys ($0.015 \text{ m}^3 \text{ m}^{-3}$).

The MCF for anaerobic digestion of poultry manure including storage of digestate is calculated (see Chapter 3.3.4.4.1).

German data on the uncertainty of CH_4 emissions from manure management do not exist. IPCC(2006)-10.48 estimates the uncertainty of Tier 2 approaches to be 20 %. This value is, according to the definition of uncertainty used in Chapter 3 in IPCC (2006a), interpreted as half the 95 % confidence interval. A normal distribution is assumed.

Zur Berechnung der CH_4 -Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management wird das Tier-2-Verfahren verwendet, siehe Kapitel 3.3.4.1.

Die VS-Ausscheidungen („volatile solids“) werden nach dem gegenüber IPCC modifizierten Verfahren von DÄMMGEN et al. (2011a) berechnet, siehe Kapitel 3.3.3.1.

Für die erforderlichen Daten siehe Kapitel 8.5.4.

IPCC (2006) gibt für Junghennen keine Defaultwerte für B_0 und MCF an. In Ermangelung eines nationalen Wertes wird in konservativer Weise der in IPCC (2006), Table 10A-9 angegebene hohe B_0 -Wert von Legehennen verwendet: $0,39 \text{ m}^3 \text{ CH}_4 (\text{kg VS})^{-1}$. Für den MCF wird der in IPCC (2006) für Legehennen, Masthähnchen, Enten und Puten angegebene Wert angesetzt: $0,015 \text{ m}^3 \text{ m}^{-3}$.

Der MCF -Wert für die Vergärung von Geflügelkot incl. Gärrestlagerung wird berechnet (siehe Kapitel 3.3.4.4.1).

Deutsche Zahlen zur Unsicherheit der CH_4 -Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management liegen nicht vor. IPCC(2006)-10.48 schätzt die Unsicherheit bei Anwendung von Tier-2-Verfahren auf 20 %. Dieser Wert wird im Sinne von IPCC (2006a), Kapitel 3, als halbes 95 %-Konfidenzintervall interpretiert. Es wird Normalverteilung angenommen.

8.5.7 NMVOC emissions / NMVOC-Emissionen

The calculation of the NMVOC emissions of all animals except cattle are calculated with a Tier 1 methodology, see Chapters 3.3.4.2.1 and 3.3.4.2.3.

Agricultural NMVOC emissions are reported, but are neglected regarding the NEC emission threshold, see Chapter 3.3.4.2.

Die NMVOC-Emissionen von allen Tieren außer den Rindern werden mit einer Tier-1-Methode berechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.1 und 3.3.4.2.3.

Landwirtschaftliche NMVOC-Emissionen werden zwar berichtet, aber bzgl. der NEC-Emissionsobergrenze nicht angerechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.

8.5.8 Emissions of nitrogen species / Emissionen von Stickstoff-Spezies

The calculation of the emissions of nitrogen species is based on the knowledge of N excretions (their amounts and locations), of the N inputs with straw, the conversion of N_{org} in UAN as well as the frequency distributions of housing types and storage facilities, spreading techniques and times before incorporation.

Anaerobic digestion of poultry manure including storage of digestate is treated as a separate type of storage (see Chapter 3.3.4.4.1).

Die Berechnung der Emissionen der Stickstoff-Spezies beruht auf der Kenntnis der N-Ausscheidungen (Mengen und Orte), der N-Einträge mit Stroh, der Umwandlungen von N_{org} in UAN, der Häufigkeit von Stalltypen, Lagertypen, Ausbringungstechniken und Einarbeitungszeiten.

Die Vergärung von Geflügelkot incl. Gärrestelagerung stellt einen eigenständigen Lagertyp dar (siehe Kapitel 3.3.4.4.1).

8.5.8.1 N excretion rates / N-Ausscheidungen

The annual N excretion on an average animal place (for the definition of the average animal place see Chapter 3.1.2.2) results from N mass balance. As input data are constant in space, the calculated N excretion is the same for all federal states.

Die jährliche N-Ausscheidung auf einem mittleren Tierplatz (zur Tierplatzdefinition siehe Kapitel 3.1.2.2) wird über die N-Bilanz errechnet. Mangels räumlicher Differenzierung der Eingangsdaten ist das Ergebnis für alle Bundesländer gleich.

$$m_{\text{excr}} = m_{\text{feed}} - m_{\text{g}} \quad (8.25)$$

m_{excr}	annual nitrogen excretion (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
m_{feed}	annual nitrogen intake with feed (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
m_{g}	annual nitrogen retention with growth (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)

The annual feed intake on an average animal place is given by:

Für die jährliche Futteraufnahme auf einem mittleren Tierplatz gilt:

$$m_{\text{feed}} = \alpha \cdot x_{\text{N}} \cdot m_{\text{F, DM}} \quad (8.26)$$

m_{feed}	annual nitrogen intake with feed (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
α	time units conversion factor ($\alpha = 365 \text{ d a}^{-1}$)
x_{N}	nitrogen content of feed, related to dry matter (in kg kg ⁻¹), see Chapter 8.5.4
$m_{\text{F, DM}}$	daily feed intake, dry matter (in kg pl ⁻¹ d ⁻¹), see Chapter 8.5.4

LFL (2006a), Table 8, report a specific N retention of 0.035 kg kg⁻¹ N. Thus, N retained on an average animal place amounts to

Die spezifische Retention beträgt nach LFL (2006a), Tabelle 8, 0,035 kg kg⁻¹ N. Daraus folgt für die N-Retention auf einem mittleren Tierplatz:

$$m_{\text{g}} = \alpha \cdot x_{\text{N, ret, pu}} \cdot \frac{\Delta w_{\text{pu}}}{\tau_{\text{lifespan, pu}}} \quad (8.27)$$

m_{g}	annual nitrogen retention with growth (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
α	time units conversion factor ($\alpha = 365 \text{ d a}^{-1}$)
$x_{\text{N, ret, pu}}$	nitrogen retained per kg weight gain (in kg kg ⁻¹), see above
Δw_{pu}	weight gain during lifetime as pullet, according to Chapter 3.1.2.5 (in kg a ⁻¹), see Chapter 8.5.2
$\tau_{\text{lifespan, pu}}$	duration of lifetime as pullet (in d), see Chapter 8.5.2

The share of UAN in the N excretions is calculated. The results are close to the standard value of 70 % given in EMEP (2016)-3B-29, Table 3.9 for various poultry categories (where, however, pullets are not mentioned explicitly).

8.5.8.2 *N inputs with straw / N-Einträge mit Stroh*

For straw based systems N inputs with straw are taken into account. According to KTBL (2006), pg. 568 and 570, an amount of straw fresh matter input of 0.75 kg per place and year is assumed. For the properties of straw see Chapter 3.3.4.3.2.

8.5.8.3 *Partial emission factors / Partielle Emissionsfaktoren*

A survey discussed in EURICH-MENDEN et al. (2011) reveals that for pullets no data exist that allow for the derivation of a NH_3 emission factor (emission per place and year) for pullet houses. The approach suggested in EURICH-MENDEN et al. (2011) uses fixed emission factors per place cannot be used, as the inventory calculations presuppose emission factors related to the rate of N excreted per place. However, there is a similarity of pullet housing with the keeping of laying hens in floor management or aviaries and the broiler housing. Both for laying hens and broilers the respective NH_3 emission factor used in the inventory is 0.09 kg kg^{-1} related to N excretion (see Chapters 8.3.8.3 and 8.4.8.5). This emission factor is adopted for pullets accordingly.

For storage no partial NH_3 -N emission factor is known. Hence, in the inventory the value given by EMEP(2013)-3B-27, Table 3.7, for broilers is adopted for pullets: 0.17 kg kg^{-1} . The factor relates to the amount of UAN entering the storage. (For UAN see Chapter 3.3.3.2).

Anaerobic digestion of poultry manure including storage of digestate is treated as a separate type of storage. The respective emission factors are calculated (see Chapter 3.3.4.4.1).

The EF for N_2O , NO and N_2 are combined factors for house and storage, see Chapter 8.2.1, Table 8.2.

For the NH_3 -N emission factors for spreading see Chapter 8.2.2, Table 8.3.

The emission factors for the separate storage type "anaerobic digestion of poultry manure" are calculated (see Chapter 3.3.4.4.1).

NO emissions from manure management are reported (as NO_x), but are neglected regarding the NEC emission threshold, see Chapter 3.3.4.2.

The uncertainty of the NH_3 emission factor characterizing the overall NH_3 emissions per animal place from the animal house, storage and application is calculated and provided in the inventory (see Chapter 14.5).

For the uncertainties of the N_2O emission factor for the combination of animal house and storage see Chapter 14.4.1.

Due to the lack of information on the uncertainties of the NO and N_2 emission factors, the uncertainty of the N_2O emission factor is adopted (see Chapter 14.4.2).

Der UAN-Gehalt im ausgeschiedenen N wird berechnet und liegt dicht beim Standardwert von 70 %, wie er von EMEP (2016)-3B-29, Table 3.9, für verschiedene Geflügelkategorien angegeben wird (wobei Junghennen allerdings nicht explizit erwähnt werden).

Für Systeme mit Einstreu wird der N-Eintrag mit dem Stroh berücksichtigt. Nach KTBL (2006), S. 568 und 570, wird eine Einstreumenge von 0,75 kg Strohfrischmasse pro Platz und Jahr angenommen. Zu den Stroh-Eigenschaften siehe Kapitel 3.3.4.3.2.

Nach einer Literaturrecherche in EURICH-MENDEN et al. (2011) existieren für Junghennen keine Daten zur Ableitung eines auf den Tierplatz bezogenen nationalen NH_3 -Emissionsfaktors für den Stall. Die in EURICH-MENDEN et al. (2011) vorgeschlagene Schätzung des Emissionsfaktors ist für das Inventar nicht verwendbar, da letzteres einen auf die N-Ausscheidung bezogenen Emissionsfaktor erfordert. Einen Ausweg bietet die Ähnlichkeit des Junghennenhaltungsverfahrens mit der Bodenhaltung von Legehennen und der Haltung von Masthähnchen. In beiden Fällen verwendet das Inventar einen auf die N-Ausscheidung bezogenen NH_3 -Emissionsfaktor von 0.09 kg kg^{-1} (siehe Kapitel 8.3.8.3 und 8.4.8.5). Dieser Emissionsfaktor wird für Junghühner übernommen.

Für das Lager ist kein partieller NH_3 -N-Emissionsfaktor bekannt. Es wird der für Masthähnchen in EMEP(2013)-3B-27, Table 3.7, angegebene Wert übernommen: 0.17 kg kg^{-1} . Der Faktor bezieht sich auf die UAN-Menge, die ins Lager gelangt. (Zu UAN siehe Kapitel 3.3.3.2).

Die Vergärung von Geflügelkot incl. Gärrestelagerung stellt einen eigenständigen Lagertyp dar. Die zugehörigen Emissionsfaktoren werden berechnet (siehe Kapitel 3.3.4.4.1).

Die Emissionsfaktoren für N_2O , NO und N_2 gelten für Stall und Lager zusammen, siehe Kapitel 8.2.1, Table 8.2.

Zu den NH_3 -N-Emissionsfaktoren für die Ausbringung siehe Kapitel 8.2.2, Table 8.3.

Die zum eigenständigen Lagertyp „Vergärung von Geflügelkot“ gehörigen Emissionsfaktoren werden berechnet (siehe Kapitel 3.3.4.4.1).

NO aus dem Wirtschaftsdünger-Management wird berichtet (als NO_x), bzgl. der NEC-Emissionsobergrenze aber nicht angerechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.

Die Unsicherheit des NH_3 -Emissionsfaktors, der die auf tierplatzbezogene NH_3 -Gesamtemissionen aus Stall, Lager und Ausbringung beschreibt, wird im Inventar berechnet, siehe Kapitel 14.5.

Für die Unsicherheit des N_2O -Emissionsfaktors für die Kombination „Stall/Lager“ wird auf Kapitel 14.4.1 verwiesen.

Mangels Daten zu den Unsicherheiten von NO- und N_2 -Emissionsfaktoren wird die Unsicherheit des N_2O -Emissionsfaktors übernommen, siehe Kapitel 14.4.2.

8.5.8.4 Indirect N₂O from manure management / Indirektes N₂O aus dem Wirtschaftsdünger-Management

Indirect N₂O emissions from manure management (housing/storage without spreading) are calculated according to Chapter 3.3.4.3.6. See Chapter 3.3.4.3.6 also for the uncertainties of activity data and EF.

(Indirect N₂O emissions from agricultural soils after spreading of manures or digested manures are reported in Sector 3.D. For the calculation see Chapter 12.)

Indirekte N₂O-Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management (Stall/Lager ohne Ausbringung) werden nach Kapitel 3.3.4.3.6 berechnet. Siehe dort auch wegen der Unsicherheiten von Aktivitätswert und EF.

(Indirektes N₂O infolge Ausbringung von Wirtschaftsdünger und Wirtschaftsdünger-Gärresten wird im Sektor 3.D berichtet. Zur Berechnung siehe Kapitel 12.)

8.5.8.5 Uncertainties of emission factors and activity data / Unsicherheiten von Emissionsfaktoren und Aktivitätsdaten

For the uncertainties of the emission factors see Chapter 4.2.2.4. The uncertainty of the activity data (amounts of N) is adopted from Chapter 4.3.8.9.

(Note that only for laying hens there is an option of being held in free range (“grazing”).)

Zu den Unsicherheiten der Emissionsfaktoren siehe Kapitel 4.2.2.4. Die Unsicherheit der Aktivitätsdaten (N-Mengen) wird wie in Kapitel 4.3.8.9 angesetzt.

(Hinweis: Nur für Legehennen gibt es die Möglichkeit für Freilandaufenthalt („Weidegang“).)

8.5.9 Emissions of particulate matter / Partikelemissionen

The method to calculate particle emissions is described in Chapter 3.3.4.5.

EMEP(2016)-3B-19, Table 3.5, does not provide emission factors for pullets. Based on the assumption that conditions in pullet and broiler husbandry are comparable, the emission factors for broilers are adopted. The emission factors are listed in Table 8.18. For the uncertainty of the emission factors see Chapter 3.3.4.5.

Zur Berechnungsmethode für Partikelemissionen wird auf Kapitel 3.3.4.5 verwiesen.

EMEP(2016)-3B-19, Table 3.5 gibt für Junghennen keine EF an. Unter der Annahme vergleichbarer Verhältnisse bei der Junghennen- und Masthähnchen-Haltung werden die EF von Masthähnchen übernommen. Die Emissionsfaktoren sind in Table 8.18 angegeben. Zur Unsicherheit der Emissionsfaktoren siehe Kapitel 3.3.4.5.

Table 8.18: Pullets, emission factors for particle emissions from housing

Housing type	Haltungssystem	Emission factor for TSP kg pl ⁻¹ a ⁻¹	Emission factor for PM ₁₀ kg pl ⁻¹ a ⁻¹	Emission factor for PM _{2.5} kg pl ⁻¹ a ⁻¹
straw based	strohbasierend	0.04	0.02	0.002
Source: see text				

8.5.10 References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung

Table 8.19: Pullets, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)

			from	to
Emissions	Emissionen	CH ₄ enteric fermentation	---	
		CH ₄ manure management	EM1005.023	
		NM VOC	EM1007.023	
		NH ₃	EM1009.067	EM1009.069
		N ₂ O	EM1009.113	
		NO	EM1009.143	
		TSP	EM1010.023	
		PM ₁₀	EM1010.053	
		PM _{2.5}	EM1010.083	
Activity data	Aktivitäten		AC1005.028	
Emission factors	Emissionsfaktoren	CH ₄ enteric fermentation	---	
		CH ₄ manure management	IEF1005.023	
		NM VOC	IEF1007.023	
		NH ₃	IEF1009.064	IEF1009.066
		N ₂ O	IEF1009.106	
		NO	IEF1009.134	
		TSP	IEF1010.022	
		PM ₁₀	IEF1010.050	
		PM _{2.5}	IEF1010.078	
Additional information	zusätzliche Informationen		AI1005POU.037	AI1005POU.053
Excretion rates	Ausscheidungen	N	EXCR.085	EXCR.086

8.6 Geese / Gänse

In Germany, the production of geese is of minor importance only. Data are sparse.

Geese are kept in in stables with an adjacent free-range area. However, due to the simple description of geese, this cannot be accounted for in the inventory.

The emissions are calculated according to the methods compiled in Table 8.20.

For the definition of the methods see Chapter 3.2.3.

Gänse-Haltung ist in Deutschland von untergeordneter Bedeutung. Die Verfügbarkeit von Daten ist eingeschränkt.

Gänse werden im Stall mit Freilandhaltung gehalten. Dies findet wegen der einfachen Behandlung der Gänse im Inventar aber keine Berücksichtigung.

Die Berechnung der Emissionen erfolgt nach den in Table 8.20 zusammengestellten Methoden.

Zur Methodendefinition siehe Kapitel 3.2.3.

Table 8.20: Geese, calculation methods applied

Species	Origin	Tier	Method applied
CH ₄	enteric fermentation		
CH ₄	manure management	2	IPCC
NM VOC	manure management	1	EMEP
NH ₃	manure management	1	EMEP
N ₂ O, NO, N ₂	manure management	1	IPCC
TSP, PM ₁₀ , PM _{2.5}	manure management	2	EMEP

8.6.1 Animal numbers / Tierzahlen

Poultry numbers have been surveyed in each agricultural-structure surveys, i.e. until 1996 in each even year, from 1999 to 1997 in each odd year, 2010 in the LZ 2010 census (STATLA C III 1 – vj 4, see also Chapter 3.4.2.1), and 2013 and 2016 in agricultural structure surveys. For the years between the surveys the poultry numbers were estimated by linear interpolation. The striking increase of animal numbers between 2010 and 2013 is, for the most part, due to the fact that the number of farms questioned in 2013 was higher than in 2010 (see Chapter 3.4.2.1). The missing goose numbers for 2017 and 2018 were estimated by keeping the 2016 numbers, see Chapter 3.4.2.2.

For the uncertainty of the animal numbers see Chapter 8.1.2.

Geflügelzahlen wurden in jeder Agrarstrukturerhebung erhoben, d.h. bis 1996 in allen geraden Jahren, 1999 bis 2007 in allen ungeraden Jahren, 2010 in der LZ 2010 (STATLA C III 1 – vj 4, siehe auch Kapitel 3.4.2.1) und 2013 sowie 2016 in einer Agrarstrukturerhebung. In den Zwischenjahren wurden die Geflügelzahlen durch lineare Interpolation geschätzt. Der auffällig starke Anstieg zwischen 2010 und 2013 ist dabei im Wesentlichen auf die der Zählung 2013 zugrunde liegende Berichts-kreisre-vision (siehe Kapitel 3.4.2.1) zurückzuführen ist. Die für 2017 und 2018 fehlenden Gänsezahlen wurden durch Beibehaltung des Wertes von 2016 geschätzt, siehe Kapitel 3.4.2.2.

Zur Unsicherheit der Tierzahlen siehe Kapitel 8.1.2.

8.6.2 Animal weights / Tiergewichte

In Germany, geese are – almost without exception – produced in a way that they are slaughtered in November/December with a weight of 7 kg an⁻¹. Predominant is a mean weight gain ("Mittelmast") (KTBL, 2005a, pg. 719).

Due to the simple calculation methodology for emissions from geese, the goose weight is not used in those calculations.

Gänse werden in Deutschland praktisch ausschließlich so produziert, dass sie im November/Dezember mit einem Gewicht von ca. 7 kg an⁻¹ geschlachtet werden. Regelform der Mast ist die Mittelmast (KTBL, 2005a, S. 719).

Aufgrund der einfachen Berechnungsmethodik für die Emissionen aus der Gänsehaltung geht das Gänse-gewicht nicht in die Berechnungen ein.

8.6.3 Methane from enteric fermentation / Methan aus der Verdauung

For poultry, emissions from enteric fermentation are not calculated (IPCC(2006)-10.27).

Für Geflügel werden Emissionen aus der Verdauung nicht berechnet (IPCC(2006)-10.27).

8.6.4 Methane from manure management / Methan aus Wirtschaftsdünger-Management

CH₄ emissions from manure management are quantified using the Tier 2 methodology, see Chapter 3.3.4.1.

Die CH₄-Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management werden mit dem Tier-2-Verfahren berechnet, siehe Kapitel 3.3.4.1.

This method requires the knowledge of VS excretions. However, due to the lack of a description of feed and energy intake by geese, VS excretions cannot be calculated. In addition, no default value is available, cf. IPCC (2006), Table 10A-9. Hence VS excretions had to be estimated. The estimation procedure is based on the assumption that the ratio of VS excretion to N excretion equals that of ducks. For the N excretion of geese see Chapter 8.6.6. The excretions of N and VS of ducks are dealt with in Chapter 8.7. The resulting estimate of VS excretions of geese is $8.5 \text{ kg pl}^{-1} \text{ a}^{-1}$ (ca. $0.023 \text{ kg pl}^{-1} \text{ d}^{-1}$). This estimate implicitly considers, like the N excretions of geese, the fact that geese places are occupied only part of the year.

IPCC (2006) does not provide B_0 and MCF default data for geese. However, as the estimate of VS excretion of geese is based on data used for ducks (see above), the value for B_0 is also taken from ducks: $0.36 \text{ m}^3 \text{ CH}_4 (\text{kg VS})^{-1}$. For the MCF the inventory uses the value provided by IPCC (2006) for laying hens, broilers, ducks and turkeys ($0.015 \text{ m}^3 \text{ m}^{-3}$).

The MCF for anaerobic digestion of poultry manure including storage of digestate is calculated (see Chapter 3.3.4.4.1).

German data on the uncertainty of CH_4 emissions from manure management do not exist. IPCC(2006)-10.48 estimates the uncertainty of Tier 2 approaches to be 20 %. This value is, according to the definition of uncertainty used in Chapter 3 in IPCC (2006a), interpreted as half the 95 % confidence interval. A normal distribution is assumed.

8.6.5 NMVOC emissions / NMVOC-Emissionen

The calculation of the NMVOC emissions of all animals except cattle are calculated with a Tier 1 methodology, see Chapters 3.3.4.2.1 and 3.3.4.2.3.

Agricultural NMVOC emissions are reported, but are neglected regarding the NEC emission threshold, see Chapter 3.3.4.2.

8.6.6 Emissions of nitrogen species / Emissionen von Stickstoff-Spezies

The calculation of emissions of nitrogen species is based on data on N excretion, its relative UAN content and assumptions for spreading techniques.

Input data are constant in space and time, implying the same for the calculation results.

Anaerobic digestion of poultry manure including storage of digestate is treated as a separate type of storage (see Chapter 3.3.4.4.1).

According to DLG (2005), pg. 53, geese excrete $554 \text{ g an}^{-1} = 554 \text{ g pl}^{-1} \text{ a}^{-1} \text{ N}$. This value is, in spite of the higher animal weight, lower than N excretion of ducks. The reason is that a geese place is occupied only for half a year.

Die dafür benötigten VS-Ausscheidungen können mangels Beschreibung der Futter- und Energieaufnahme der Gänse aber nicht berechnet werden. Ein VS-Defaultwert existiert ebenfalls nicht, vgl. IPCC(2006), Table 10A-9. Daher werden die VS-Ausscheidungen geschätzt. Das Schätzverfahren beruht auf der Annahme, dass das Verhältnis von VS- zu N-Ausscheidung dem von Enten gleicht (zur N-Ausscheidung von Gänsen siehe Kapitel 8.6.6; zur Ausscheidung von VS und N bei Enten wird auf Kapitel 8.7 verwiesen). Daraus ergibt sich für Gänse eine jährliche VS-Ausscheidung von $8,5 \text{ kg pl}^{-1} \text{ a}^{-1}$ (ca. $0,023 \text{ kg pl}^{-1} \text{ d}^{-1}$). Dieser Wert berücksichtigt wie die N-Ausscheidungen der Gänse bereits implizit den Umstand, dass ein Gänsemastplatz nicht ganzjährig besetzt ist.

IPCC (2006) gibt für Gänse keine Defaultwerte für B_0 und MCF an. Da aber die Schätzung der VS-Ausscheidung auf Enten-Daten beruht (s. o.), wird auch der B_0 -Wert von Enten verwendet: $0,36 \text{ m}^3 \text{ CH}_4 (\text{kg VS})^{-1}$. Für den MCF wird der in IPCC (2006) für Legehennen, Masthähnchen, Enten und Puten angegebene Wert angesetzt: $0,015 \text{ m}^3 \text{ m}^{-3}$.

Der MCF -Wert für die Vergärung von Geflügelkot incl. Gärrestlagerung wird berechnet (siehe Kapitel 3.3.4.4.1).

Deutsche Zahlen zur Unsicherheit der CH_4 -Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management liegen nicht vor. IPCC(2006)-10.48 schätzt die Unsicherheit bei Anwendung von Tier-2-Verfahren auf 20 %. Dieser Wert wird im Sinne von IPCC (2006a), Kapitel 3, als halbes 95 %-Konfidenzintervall interpretiert. Es wird Normalverteilung angenommen.

Die NMVOC-Emissionen von allen Tieren außer den Rindern werden mit einer Tier-1-Methode berechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.1 und 3.3.4.2.3.

Landwirtschaftliche NMVOC-Emissionen werden zwar berichtet, aber bzgl. der NEC-Emissionsobergrenze nicht angerechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.

Die Berechnung der Emissionen der Stickstoff-Spezies beruht auf Vorgaben zur N-Ausscheidung und deren UAN-Gehalt sowie Annahmen zur Ausbringung.

Eine räumlicher und zeitliche Differenzierung ist mangels entsprechender Eingangsdaten nicht möglich.

Die Vergärung von Geflügelkot incl. Gärrestlagerung stellt einen eigenständigen Lagertyp dar (siehe Kapitel 3.3.4.4.1).

DLG (2005), S. 53, gibt für die N-Ausscheidung $554 \text{ g an}^{-1} = 554 \text{ g pl}^{-1} \text{ a}^{-1} \text{ an}$. Dieser Wert ist trotz höheren Tiergewichts niedriger als die N-Ausscheidung von Enten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass ein Gänseplatz im Mittel nur bis zu einem halben Jahr besetzt ist.

The UAN content of the N excretions is assumed to be 70 % (see EMEP (2016)-3B-29, Table 3.9).

Due to lack of data, N inputs with bedding material are not taken into account.

As no national value is available for the NH_3 -N housing emission factor, the EMEP default emission factor of 0.57 kg kg^{-1} (related to UAN excretion; for UAN see Chapter 3.3.3.2) is used in the inventory (EMEP (2016)-3B-29, Table 3.9).

For the partial NH_3 -N emission factor for storage, the value given in EMEP (2016)-3B-29, Table 3.9, is used: 0.16 kg kg^{-1} . The factor relates to the UAN amount entering the storage.

The emission factors for N_2O , NO and N_2 are combined factors for house and storage, see Chapter 8.2.1, Table 8.2.

For the NH_3 -N emission factors for spreading see Chapter 8.2.2, Table 8.3.

The emission factors for the separate storage type "anaerobic digestion of poultry manure" are calculated (see Chapter 3.3.4.4.1).

NO emissions from manure management are reported (as NO_x), but are neglected regarding the NEC emission threshold, see Chapter 3.3.4.2.

Indirect N_2O emissions from manure management (housing/storage without spreading) are calculated according to Chapter 3.3.4.3.6. See Chapter 3.3.4.3.6 also for the uncertainties of activity data and emission factor.

(Indirect N_2O emissions from agricultural soils after spreading of manures or digested manures are reported in Sector 3.D. For the calculation of these emissions see Chapter 12.)

For the uncertainties of the emission factors see Chapter 4.2.2.4.

The uncertainty of the activity data (amounts of N) is adopted from Chapter 4.3.8.9.

(Note that only for laying hens there is an option of being held in free range ("grazing").)

8.6.7 Emissions of particulate matter / Partikelemissionen

The method to calculate particle emissions is described in Chapter 3.3.4.5.

The $\text{PM}_{2.5}$ emission factor provided by von EMEP (2016)-3B-19, Table 3.5, is different from the emission factor given in EMEP(2013)-3B-53, Table A3-4, only by rounding to two decimals. In order to avoid an apparent change in emissions from one emission reporting submission to the next, the original emission $\text{PM}_{2.5}$ factor provided by EMEP(2013)-3B-53, Table A3-4, was kept, see Table 6.3. In this overview the emission factors of TSP, PM_{10} and $\text{PM}_{2.5}$ correspond to the data provided in EMEP(2016)-3B-53, Table A1.6.

For the uncertainty of the emission factors see Chapter 3.3.4.5.

Der UAN-Gehalt der N-Ausscheidungen wird nach EMEP (2016)-3B-29, Table 3.9, mit 70 % angenommen.

N-Einträge durch Einstreu werden mangels Daten nicht berücksichtigt.

In Ermangelung eines nationalen Wertes für den partiellen NH_3 -N-Emissionsfaktor für den Stall wird nach EMEP (2016)-3B-29, Table 3.9, ein NH_3 -N-Emissionsfaktor von 0.57 kg kg^{-1} bezogen auf die UAN-Ausscheidung angesetzt.

Der partielle NH_3 -N-Emissionsfaktor für das Lager wird nach EMEP (2016)-3B-29, Table 3.9, mit 0.16 kg kg^{-1} angesetzt. Der Faktor bezieht sich auf die UAN-Menge, die ins Lager gelangt.

Die Emissionsfaktoren für N_2O , NO und N_2 gelten für Stall und Lager zusammen, siehe Kapitel 8.2.1, Table 8.2.

Zu den NH_3 -N-Emissionsfaktoren für die Ausbringung siehe Kapitel 8.2.2, Table 8.3.

Die zum eigenständigen Lagertyp „Vergärung von Geflügelkot“ gehörigen Emissionsfaktoren werden berechnet (siehe Kapitel 3.3.4.4.1).

NO aus dem Wirtschaftsdünger-Management wird berichtet (als NO_x), bzgl. der NEC-Emissionsobergrenze aber nicht angerechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.

Indirekte N_2O -Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management (Stall/Lager ohne Ausbringung) werden nach Kapitel 3.3.4.3.6 berechnet. Siehe dort auch wegen der Unsicherheiten von Aktivitätswert und Emissionsfaktor.

(Indirekte N_2O -Emissionen als Folge der Ausbringung von Wirtschaftsdüngern und Wirtschaftsdünger-Gärresten werden im Sektor 3.D berichtet. Zur Berechnung siehe Kapitel 12.)

Zu den Unsicherheiten der Emissionsfaktoren siehe Kapitel 4.2.2.4.

Die Unsicherheit der Aktivitätsdaten (N-Mengen) wird wie in Kapitel 4.3.8.9 angesetzt.

(Hinweis: Nur für Legehennen gibt es die Möglichkeit für Freilandaufenthalt („Weidegang“).)

Zur Berechnungsmethode für Partikelemissionen wird auf Kapitel 3.3.4.5 verwiesen.

Der von EMEP (2016)-3B-19, Table 3.5, angegebenen Emissionsfaktor für $\text{PM}_{2.5}$ unterscheidet sich von dem entsprechenden Emissionsfaktor aus EMEP(2013)-3B-53, Table A3-4, nur durch Rundung auf zwei Dezimalstellen. Um aber eine scheinbare Emissionsänderung von einer Berichterstattung zur nächsten nur wegen Rundung des Emissionsfaktors zu vermeiden, wird der ursprüngliche Emissionsfaktor aus EMEP(2013)-3B-53, Table A3-4, beibehalten. In dieser Zusammenstellung entsprechen die Emissionsfaktoren von TSP, PM_{10} und $\text{PM}_{2.5}$ den Angaben in EMEP(2016)-3B-53, Table A1.6. Zur Unsicherheit der Emissionsfaktoren siehe Kapitel 3.3.4.5.

Table 8.21: Geese, emission factors for particle emissions from housing

Housing type	Haltungssystem	Emission factor for TSP kg pl ⁻¹ a ⁻¹	Emission factor for PM ₁₀ kg pl ⁻¹ a ⁻¹	Emission factor for PM _{2.5} kg pl ⁻¹ a ⁻¹
straw based	strohbasierend	0.24	0.24	0.032

Source: EMEP(2016)-3B-53, Table A1.6 (with TSP = ID [inhalable dust])

8.6.8 References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung

Table 8.22: Geese, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)

			from	to
Emissions	Emissionen	CH ₄ enteric fermentation	---	
		CH ₄ manure management	EM1005.024	
		NMVOC	EM1007.024	
		NH ₃	EM1009.070	EM1009.072
		N ₂ O	EM1009.114	
		NO	EM1009.144	
		TSP	EM1010.024	
		PM ₁₀	EM1010.054	
		PM _{2.5}	EM1010.084	
Activity data	Aktivitäten		AC1005.030	
Emission factors	Emissionsfaktoren	CH ₄ enteric fermentation	---	
		CH ₄ manure management	IEF1005.024	
		NMVOC	IEF1007.024	
		NH ₃	IEF1009.067	IEF1009.069
		N ₂ O	IEF1009.107	
		NO	IEF1009.135	
		TSP	IEF1010.023	
		PM ₁₀	IEF1010.051	
		PM _{2.5}	IEF1010.079	
Additional information	zusätzliche Informationen		AI1005POU.054	AI1005POU.068
Excretion rates	Ausscheidungen	N	EXCR.087	EXCR.088

8.7 Ducks / Enten

In Germany, the better part of ducks produced is Peking ducks (expert judgement HÖPPNER). Hence, the inventory interpretes all officially counted ducks as Peking ducks.

In Germany, ducks are mostly kept in stables with bedding. Due to lack of data, the inventory does not consider duck husbandry in free ranges.

The emissions are calculated according to the methods compiled in Table 8.23.

For the definition of the methods see Chapter 3.2.3.

In Deutschland werden überwiegend Pekingenten produziert (Expertenurteil HÖPPNER), weshalb das Inventar alle offiziell gezählten Enten als Pekingenten rechnet.

Enten werden in Deutschland vornehmlich in Ställen mit Einstreu gehalten. Freilandhaltung kann im Inventar mangels Daten nicht berücksichtigt werden.

Die Berechnung der Emissionen erfolgt nach den in Table 8.23 zusammengestellten Methoden.

Zur Methodendefinition siehe Kapitel 3.2.3.

Table 8.23: Ducks, calculation methods applied

Species	Origin	Tier	Method applied
CH ₄	enteric fermentation		
CH ₄	manure management	2	IPCC
NMVOC	manure management	1	EMEP
NH ₃	manure management	2	EMEP
N ₂ O, NO, N ₂	manure management	2	IPCC
TSP, PM ₁₀ , PM _{2.5}	manure management	2	EMEP

8.7.1 Animal numbers / Tierzahlen

Poultry numbers have been surveyed in each agricultural-structure surveys, i.e. until 1996 in each even year, from 1999 to 1997 in each odd year, 2010 in the LZ 2010 census (STATLA C III 1 – vj 4, see also Chapter 3.4.2.1), and 2013 and 2016 in agricultural structure surveys. For the years between the surveys the poultry numbers were estimated by linear interpolation. The striking increase of animal numbers between 2010 and 2013 is, for the most part, due to the fact that the number of farms questioned in 2013 was higher than in 2010 (see Chapter 3.4.2.1). The missing duck numbers for 2017 and 2018 were estimated by keeping the 2016 numbers, see Chapter 3.4.2.2.

For the uncertainty of the animal numbers see Chapter 8.1.2.

Geflügelzahlen wurden in jeder Agrarstrukturerhebung erhoben, d.h. bis 1996 in allen geraden Jahren, 1999 bis 2007 in allen ungeraden Jahren, 2010 in der LZ 2010 (STATLA C III 1 – vj 4, siehe auch Kapitel 3.4.2.1) und 2013 sowie 2016 in einer Agrarstrukturerhebung. In den Zwischenjahren wurden die Geflügelzahlen durch lineare Interpolation geschätzt. Der auffällig starke Anstieg zwischen 2010 und 2013 ist dabei im Wesentlichen auf die der Zählung 2013 zugrunde liegende Berichtskreisrevisi- on (siehe Kapitel 3.4.2.1) zurückzuführen ist. Die für 2017 und 2018 fehlenden Entenzahlen wurden durch Beibehaltung des Wertes von 2016 geschätzt, siehe Kapitel 3.4.2.2.

Zur Unsicherheit der Tierzahlen siehe Kapitel 8.1.2.

8.7.2 Animal weights and duration of fattening period / Tiergewichte und Mastdauer

The duckling weight is 0,055 kg an⁻¹, the final weight 3.0 kg an⁻¹ (BREHME, 2007).

The total lifespan (rearing and fattening) is assumed to be 49 d (cf. TÜLLER, 1999, pg. 131). This means that about 7.4 animals are produced annually on a mean animal place (see Chapters 3.1.2.2 und 3.1.2.3).

Das Kükengewicht beträgt 0,055 kg an⁻¹, das mittlere Endgewicht 3,0 kg an⁻¹ (BREHME, 2007).

Die Lebensdauer (Aufzucht und Mast) wird mit 49 d angesetzt (vgl. TÜLLER, 1999, S. 131). Damit werden auf einem mittleren Tierplatz (siehe Kapitel 3.1.2.2 und 3.1.2.3) rund 7,4 Tiere pro Jahr produziert.

8.7.3 Energy requirements / Energiebedarf

Assuming a feed intake according to the requirements, the mean daily requirements of metabolizable energy can be calculated from the amount of feed intake and the ME content of the feed:

Der mittlere tägliche Bedarf an metabolisierbarer Energie kann unter der Annahme bedarfsgerechter Fütterung aus Futteraufnahme und ME-Gehalt des Futters berechnet werden:

$$ME_{du} = \eta_{ME, feed} \cdot m_{F, FM}$$

(8.28)

ME_{du}	daily metabolisable energy required (in MJ pl ⁻¹ d ⁻¹)
$\eta_{ME, feed}$	content of metabolisable energy in duck diet, related to fresh matter (in MJ kg ⁻¹)
$m_{F, FM}$	daily feed intake, fresh matter (in kg pl ⁻¹ d ⁻¹), see Chapter 8.7.4

8.7.4 Feed and energy intake / Futter- und Energieaufnahme

The daily feed intake (fresh matter) per place is calculated as follows (averaged over lifespan):

Für die tägliche Futteraufnahme (Frischmasse) pro Tierplatz gilt (Mittelwert über Lebensdauer):

$$m_{F, FM} = x_{feed, du} \cdot \frac{\Delta w_{du}}{\tau_{lifespan, du}} \quad (8.29)$$

$m_{F, FM}$	daily feed intake, fresh matter (in kg pl ⁻¹ d ⁻¹)
$x_{feed, du}$	duck diet mass (fresh matter) needed for animal weight gain (in kg kg ⁻¹), see below
Δw_{du}	animal weight gain during lifespan as defined in Chapter 3.1.2.4 (in kg an ⁻¹), see below
$\tau_{lifespan, du}$	duration of lifetime (in d), see Chapter 8.7.2

The feed conversion factor $x_{feed, du}$ is estimated by linear interpolation of feed consumption data given by TÜLLER (1999), pg. 131, as function of total weight gain (final weight minus duckling weight):

Die Futterverwertung $x_{feed, du}$ wird durch Interpolation der in TÜLLER (1999), S 131, angegebenen Daten zum Futterverbrauch in Abhängigkeit vom Zuwachs (Endgewicht abzgl. Kükengewicht) geschätzt:

$$x_{feed, du} = \frac{1}{\Delta w_{du}} \cdot \left(F_{du,1} + w_{fin} \cdot \frac{F_{du,2} - F_{du,1}}{w_2 - w_1} \right) \quad (8.30)$$

$x_{feed, du}$	duck diet mass (fresh matter) needed for animal weight gain (in kg kg ⁻¹)
Δw_{du}	animal weight gain during lifespan as defined in Chapter 3.1.2.4 (in kg an ⁻¹), see below
$F_{du,1}$	amount of feed needed to reach weight w_1 ($F_{du,1} = 6.140$ kg, see TÜLLER, 1999, pg. 131)
w_{fin}	final life weight (in kg, see Chapter 8.7.2)
$F_{du,2}$	amount of feed needed to reach weight w_2 ($F_{du,2} = 7.761$ kg, see TÜLLER, 1999, pg. 131)
w_1	animal weight related to amount of feed $F_{du,1}$ ($w_1 = 2.823$ kg, see TÜLLER, 1999, pg. 131)
w_2	animal weight related to amount of feed $F_{du,2}$ ($w_2 = 3.180$ kg, see TÜLLER, 1999, pg. 131)

The calculation of the weight gain Δw_{du} is based on duckling weight and final weight, see Chapter 8.7.2. With a final weight of 3 kg an⁻¹ (duckling weight 0.055 kg an⁻¹), $x_{feed, du}$ amounts to 2,357 kg kg⁻¹.

Die Gewichtszunahme Δw_{du} berechnet sich aus Küken- und Endgewicht, siehe Kapitel 8.7.2. Bei einem Endgewicht von 3 kg an⁻¹ (Anfangsgewicht 0.055 kg an⁻¹) ergibt sich $x_{feed, du} = 2,357$ kg kg⁻¹.

This leads to the daily intake of dry matter (average over lifespan):

Daraus ergibt sich die tägliche Trockenmasseaufnahme (Mittelwert über Lebensdauer):

$$m_{F, DM} = x_{DM} \cdot m_{F, FM} \quad (8.31)$$

$m_{F, DM}$	daily feed intake, dry matter (in kg pl ⁻¹ d ⁻¹)
$m_{F, FM}$	daily feed intake, fresh matter (in kg pl ⁻¹ d ⁻¹)
x_{DM}	dry matter content of feed (kg kg ⁻¹), see below

According to JEROCH und DÄNICKE (2005), pg. 166, the ME content of duck fattening ($\eta_{ME, feed}$) diet related to fresh matter is 11.5 MJ kg⁻¹, while BREHME (2007) reports a ME content of 12 MJ kg⁻¹ to 12.5 MJ kg⁻¹. The inventory uses 12 MJ kg⁻¹, related to fresh matter.

Nach JEROCH und DÄNICKE (2005), S. 166, liegt der ME-Gehalt von Entenmastfutter ($\eta_{ME, feed}$) bei 11,5 MJ kg⁻¹ bezogen auf Frischmasse. BREHME (2007) gibt 12 MJ kg⁻¹ bis 12,5 MJ kg⁻¹ an. Für das Inventar wird ein Wert von 12 MJ kg⁻¹ angesetzt (bezogen auf Frischmasse).

For the content of crude protein in duck feed, data in JEROCH und DÄNICKE (2005), pg. 166, allow for the derivation of a weighted mean: $x_{XP, feed} = 0.166$ kg kg⁻¹, related to fresh matter

Für den Rohproteingehalt des Entenfutters ($x_{XP, feed}$) ergibt sich aus Daten in JEROCH und DÄNICKE (2005), S. 166, ein gewichtetes Mittel von 0,166 kg kg⁻¹, bezogen auf Frischmasse.

No data are available for the digestibility $x_{DE, du}$. Thus, as no value is available for broilers, the value used for pullets is used instead ($x_{DE, br} = 0.779$ MJ MJ⁻¹) (see Chapter 8.5.4).

Für die Verdaulichkeit $x_{DE, du}$ sind keine Daten bekannt, weshalb (in Ermangelung eines Masthähnchen-Wertes) der Junghennen-Wert 0,779 MJ MJ⁻¹ übernommen wird (siehe Kapitel 8.5.4).

The digestibility of organic matter X_{DOM} is unknown. It is replaced with X_{DE} . As the digestibility of energy is somewhat lower than that of organic matter, the assumption $X_{DOM} \approx X_{DE}$ leads to a slight overestimation of CH_4 emissions from manure management.

The ash content of feed is 7.0 % according to RHG (2006), related to fresh matter. Related to a typical dry matter content of 88 % the ash content is 8.0 %.

Due to lack of information, the feeding-related data are assumed to be constant with time and space.

The inventory does not calculate the amount of gross energy GE as is not needed for the VS calculation method used in the present inventory.

8.7.5 Methane from enteric fermentation / Methan aus der Verdauung

For poultry, emissions from enteric fermentation are not calculated (IPCC(2006)-10.27).

Die Verdaulichkeit von organischer Substanz $X_{DOM, br}$ ist nicht bekannt. Sie wird durch $X_{DE, br}$ ersetzt. Da die Verdaulichkeit von Energie etwas niedriger als die von organischer Substanz ist, bewirkt diese Annahme eine leichte Überschätzung der CH_4 -Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management.

Der Aschegehalt des Futters beträgt nach RHG (2006) 7,0 % bezogen auf Frischmasse. Bezogen auf einen typischen Trockenmassegehalt von 88 % entspricht dies 8,0 %.

Mangels besserer Informationen werden die Futterkennwerte als zeitlich und räumlich konstant angesehen.

Die GE-Aufnahme mit dem Futter wird im Inventar nicht berechnet, da sie für die aktuell verwendete VS-Berechnungsmethode nicht benötigt wird.

8.7.6 Methane from manure management / Methan aus Wirtschaftsdünger-Management

CH_4 emissions from manure management are quantified using the Tier 2 methodology, see Chapter 3.3.4.1.

Volatile solids (VS) excretion rates are calculated using the modified IPCC approach described in DÄMMGEN et al. (2011a), see Chapter 3.3.3.1.

For the required data see Chapter 8.7.4.

According to IPCC(2006)-10.82, the maximum methane producing capacity B_0 and the methane conversion factor MCF are $0.36 \text{ m}^3 \text{ CH}_4 (\text{kg VS})^{-1}$ and $0.01 \text{ m}^3 \text{ m}^{-3}$ respectively. The MCF , however, is considered inconsistent in comparison with other poultry keeping in mind that it is almost impossible to keep a duck house "dry". Thus, this inventory uses an MCF of $0.015 \text{ m}^3 \text{ m}^{-3}$ as given for other poultry species.

The MCF for anaerobic digestion of poultry manure including storage of digestate is calculated (see Chapter 3.3.4.4.1).

German data on the uncertainty of CH_4 emissions from manure management do not exist. IPCC(2006)-10.48 estimates the uncertainty of Tier 2 approaches to be 20 %. This value is, according to the definition of uncertainty used in Chapter 3 in IPCC (2006a), interpreted as half the 95 % confidence interval. A normal distribution is assumed.

Zur Berechnung der CH_4 -Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management wird das Tier-2-Verfahren verwendet, siehe Kapitel 3.3.4.1.

Die VS-Ausscheidungen („volatile solids“) werden nach dem gegenüber IPCC modifizierten Verfahren von DÄMMGEN et al. (2011a) berechnet, siehe Kapitel 3.3.3.1.

Zu den benötigten Daten siehe Kapitel 8.7.4.

Nach IPCC(2006)-10.82 betragen die maximale Methan-Freisetzungskapazität B_0 $0,36 \text{ m}^3 \text{ CH}_4 (\text{kg VS})^{-1}$ und der Methanumwandlungsfaktor MCF für alle in Deutschland vorkommenden Jahresmitteltemperaturen $0,01 \text{ m}^3 \text{ m}^{-3}$. Der MCF erscheint allerdings ungerechtfertigt, da es nahezu unmöglich ist, einen Entenstall „trocken“ zu halten. Es wird daher der für andere Geflügelarten angegebene MCF von $0,015 \text{ m}^3 \text{ m}^{-3} \text{ CH}_4$ verwendet.

Der MCF -Wert für die Vergärung von Geflügelkot incl. Gärrestlagerung wird berechnet (siehe Kapitel 3.3.4.4.1).

Deutsche Zahlen zur Unsicherheit der CH_4 -Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management liegen nicht vor. IPCC(2006)-10.48 schätzt die Unsicherheit bei Anwendung von Tier-2-Verfahren auf 20 %. Dieser Wert wird im Sinne von IPCC (2006a), Kapitel 3, als halbes 95 %-Konfidenzintervall interpretiert. Es wird Normalverteilung angenommen.

8.7.7 NMVOC emissions / NMVOC-Emissionen

The calculation of the NMVOC emissions of all animals except cattle are calculated with a Tier 1 methodology, see Chapters 3.3.4.2.1 and 3.3.4.2.3.

Agricultural NMVOC emissions are reported, but are neglected regarding the NEC emission threshold, see Chapter 3.3.4.2.

Die NMVOC-Emissionen von allen Tieren außer den Rindern werden mit einer Tier-1-Methode berechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.1 und 3.3.4.2.3.

Landwirtschaftliche NMVOC-Emissionen werden zwar berichtet, aber bzgl. der NEC-Emissionsobergrenze nicht angerechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.

8.7.8 Emissions of nitrogen species / Emissionen von Stickstoff-Spezies

The calculation of the emissions of nitrogen species is based on the knowledge of N excretions (their amounts and locations), of the N inputs with straw, the conversion of N_{org} in UAN as well as the frequency distributions of housing types and storage facilities, spreading techniques and times before incorporation.

Anaerobic digestion of poultry manure including storage of digestate is treated as a separate type of storage (see Chapter 3.3.4.4.1).

Die Berechnung der Emissionen der Stickstoff-Spezies beruht auf der Kenntnis der N-Ausscheidungen (Mengen und Orte), der N-Einträge mit Stroh, der Umwandlungen von N_{org} in UAN, der Häufigkeit von Stalltypen, Lagertypen, Ausbringungstechniken und Einarbeitungszeiten.

Die Vergärung von Geflügelkot incl. Gärrestelagerung stellt einen eigenständigen Lagertyp dar (siehe Kapitel 3.3.4.4.1).

8.7.8.1 N excretion rates / N-Ausscheidungen

The annual N excretion on an average animal place (for the definition of the average animal place see Chapter 3.1.2.2) results from N mass balance. As input data are constant in space and time, the calculated N excretion is the same for all federal states and years.

Die jährliche N-Ausscheidung auf einem mittleren Tierplatz (zur Tierplatzdefinition siehe Kapitel 3.1.2.2) wird über die N-Bilanz errechnet. Mangels räumlicher und zeitlicher Differenzierung der Eingangsdaten ist das Ergebnis für alle Bundesländer und Jahre gleich.

$$m_{\text{excr}} = m_{\text{feed}} - m_{\text{g}} \quad (8.32)$$

m_{excr}	annual nitrogen excretion (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
m_{feed}	annual nitrogen intake with feed (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
m_{g}	annual nitrogen retention with growth (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)

The annual feed intake is given by:

Für die jährliche Futteraufnahme gilt:

$$m_{\text{feed}} = \alpha \cdot X_{\text{N,XP}} \cdot X_{\text{XP,feed}} \cdot m_{\text{F,FM}} \quad (8.33)$$

m_{feed}	annual nitrogen intake with feed (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
α	time units conversion factor ($\alpha = 365 \text{ d a}^{-1}$)
$X_{\text{N,XP}}$	nitrogen content of crude protein ($X_{\text{N,XP}} = 1/6.25 \text{ kg kg}^{-1}$)
$X_{\text{XP,feed}}$	content of crude protein in duck diet (kg kg ⁻¹), see Chapter 8.7.4
$m_{\text{F,FM}}$	daily feed intake, averaged over lifespan, fresh matter (in kg pl ⁻¹ d ⁻¹), see Chapter 8.7.4

According to LFL (2006a), Table 8, the specific N retention $x_{\text{N,ret,du}}$ is assumed to be 0.035 kg kg⁻¹. Thus, N retained on an average animal place amounts to

Die spezifische Retention $x_{\text{N,ret,du}}$ wird nach LFL (2006a), Tabelle 8, mit 0,035 kg kg⁻¹ angesetzt. Daraus folgt für die N-Retention auf einem mittleren Tierplatz:

$$m_{\text{g}} = \alpha \cdot x_{\text{N,ret,du}} \cdot \frac{\Delta w_{\text{du}}}{\tau_{\text{lifespan,du}}} \quad (8.34)$$

m_{g}	annual nitrogen retention with growth (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
α	time units conversion factor ($\alpha = 365 \text{ d a}^{-1}$)
$x_{\text{N,ret,du}}$	N retention per kg weight gain (in kg kg ⁻¹), see above
Δw_{du}	animal weight gain during lifespan as defined in Chapter 3.1.2.4 (in kg a ⁻¹), see below
$\tau_{\text{lifespan,du}}$	duration of lifetime (in d), see Chapter 8.7.2

According to Chapter 3.3.3.2, the share of UAN in the N excretions is calculated using the digestibility given in Chapter 8.7.4. One obtains 49.9 %, a result which is well below the default value of 70 % given in EMEP(2013)-3B-27, Table 3.7.

Der UAN-Gehalt im ausgeschiedenen N wird entsprechend Kapitel 3.3.3.2 mithilfe der Verdaulichkeit (siehe Kapitel 8.7.4) berechnet: Es ergibt sich ein Wert von 49,9 % (abweichend vom Standardwert von 70 % nach EMEP(2013)-3B-27, Table 3.7).

8.7.8.2 N inputs with straw / N-Einträge mit Stroh

For straw based systems N inputs with straw are taken into account. During the fattening of one duck

Für Systeme mit Einstreu wird der N-Eintrag mit dem Stroh berücksichtigt. Je produzierte Ente werden ca. 3 kg

about 3 kg straw is used (Brehme, 2007). With 7.4 animals produced per mean animal place (see Chapter 8.7.2) this amounts to about 22 kg straw per place and year.

For the properties of straw see Chapter 3.3.4.3.2.

Stroh veranschlagt (Brehme, 2007). Bei 7,4 produzierten Tieren pro Jahr (siehe Kapitel 8.7.2) entspricht dies einer jährlichen Einstreumenge von rund 22 kg pro Platz und Jahr.

Zu Stroh-Eigenschaften siehe Kapitel 3.3.4.3.2.

8.7.8.3 *Partial emission factors / Partielle Emissionsfaktoren*

The NH_3 emission factor for housing is based on emission factors collated by the KTBL working group on emission factors for animal husbandry (KTBL-Arbeitsgruppe „Emissionsfaktoren Tierhaltung“, EURICH-MENDEN et al., 2011). According to Eurich-Menden et al. (2011) the emission factor is $0.146 \text{ kg NH}_3 (\text{pl} \cdot \text{a})^{-1}$. For the inventory, this emission factor has to be converted into an emission factor related to N excreted. DLG (2005), pg. 52, provides a standard N excretion of 1.482 kg N per place and year. This value has to be approximately halved in order to account for the fact that for its derivation the total N excretion during the duck's total lifespan had been related only to the fattening period which is only about one half of the total lifespan. This is confirmed by applying the N excretion formula derived for the inventory to the DLG duck (final weight 3.4 kg a^{-1}) and using the number of production cycles given in DLG (2005), pg. 52 (6.5 cycles per year). It approximately yields half the N excretion given in DLG (2005): $0.751 \text{ kg N per place and year}$. This value is used for the conversion of the above mentioned KTBL emission factor of $0.146 \text{ kg NH}_3 (\text{pl} \cdot \text{a})^{-1}$ to the N excretion-related value of $0.160 \text{ kg NH}_3\text{-N} (\text{kg} \cdot \text{a})^{-1}$.

For the partial NH_3 emission factor for storage, the value given in EMEP(2013)-3B-27, Table 3.7, is used: $0.24 \text{ kg kg}^{-1} \text{ N}$. The factor relates to the UAN amount entering the storage.

Anaerobic digestion of poultry manure including storage of digestate is treated as a separate type of storage. The respective emission factors are calculated (see Chapter 3.3.4.4.1).

The emission factors for N_2O , NO and N_2 are combined factors for house and storage, see Chapter 8.2.1, Table 8.2.

For the $\text{NH}_3\text{-N}$ emission factors for spreading see Chapter 8.2.2, Table 8.3.

The emission factors for the separate storage type “anaerobic digestion of poultry manure” are calculated (see Chapter 3.3.4.4.1).

NO emissions from manure management are reported (as NO_x), but are neglected regarding the NEC emission threshold, see Chapter 3.3.4.2.

The uncertainty of the NH_3 emission factor characterizing the overall NH_3 emissions per animal place from the animal house, storage and application is calculated and provided in the inventory (see Chapter 14.5).

For the uncertainties of the N_2O emission factor for the combination of animal house and storage see Chapter 14.4.1.

Der NH_3 -Emissionsfaktor für den Stall basiert auf den Ergebnissen der KTBL-Arbeitsgruppe „Emissionsfaktoren Tierhaltung“ (EURICH-MENDEN et al., 2011), die die NH_3 -Emission pro Tierplatz und Jahr mit $0,146 \text{ kg NH}_3 (\text{pl} \cdot \text{a})^{-1}$ angibt. Für das Inventar ist eine Umrechnung auf $\text{NH}_3\text{-N}$ sowie der Bezug auf die ausgeschiedene N-Menge erforderlich. DLG (2005), S. 52, gibt eine Standard-N-Ausscheidung von $1,482 \text{ kg N pro Platz und Jahr an}$. Dieser Wert muss aber in etwa halbiert werden, da er darauf beruht, dass die Gesamtausscheidung während der Lebensdauer auf die reine Mastphase bezogen wurde, die aber nur etwa die Hälfte der gesamten Lebensdauer umfasst. Die Anwendung der für das Inventar entwickelten N-Ausscheidungsformel auf die DLG-Ente (Endgewicht $3,4 \text{ kg a}^{-1}$) liefert unter Berücksichtigung von 6,5 Durchgängen pro Jahr (DLG, 2005, S. 52) denn auch ungefähr die Hälfte der DLG-Standard-N-Ausscheidung: $0,751 \text{ kg N pro Platz und Jahr}$. Dieser Wert wird für die Umrechnung des o. g. Emissionsfaktors der KTBL-Arbeitsgruppe „Emissionsfaktoren Tierhaltung“ zugrunde gelegt ($0,146 \text{ kg NH}_3 (\text{pl} \cdot \text{a})^{-1}$), so dass sich der Emissionsfaktor schließlich zu $0,160 \text{ kg NH}_3\text{-N pro kg N-Ausscheidung und Jahr}$ ergibt.

Der partielle NH_3 -Emissionsfaktor für das Lager wird nach EMEP(2013)-3B-27, Table 3.7, mit $0,24 \text{ kg kg}^{-1} \text{ N}$ angesetzt. Der Faktor bezieht sich auf die UAN-Menge, die ins Lager gelangt.

Die Vergärung von Geflügelkot incl. Gärrestelagerung stellt einen eigenständigen Lagertyp dar. Die zugehörigen Emissionsfaktoren werden berechnet (siehe Kapitel 3.3.4.4.1).

Die Emissionsfaktoren für N_2O , NO und N_2 gelten für Stall und Lager zusammen, siehe Kapitel 8.2.1, Table 8.2.

Zu den $\text{NH}_3\text{-N}$ -Emissionsfaktoren für die Ausbringung siehe Kapitel 8.2.2, Table 8.3.

Die zum eigenständigen Lagertyp „Vergärung von Geflügelkot“ gehörigen Emissionsfaktoren werden berechnet (siehe Kapitel 3.3.4.4.1).

NO aus dem Wirtschaftsdünger-Management wird berichtet (als NO_x), bzgl. der NEC-Emissionsobergrenze aber nicht angerechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.

Die Unsicherheit des NH_3 -Emissionsfaktors, der die auf tierplatzbezogene NH_3 -Gesamtemissionen aus Stall, Lager und Ausbringung beschreibt, wird im Inventar berechnet, siehe Kapitel 14.5.

Für die Unsicherheit des N_2O -Emissionsfaktors für die Kombination „Stall/Lager“ wird auf Kapitel 14.4.1 verwiesen.

Due to the lack of information on the uncertainties of the NO and N₂ emission factors, the uncertainty of the N₂O emission factor is adopted (see Chapter 14.4.2).

Mangels Daten zu den Unsicherheiten von NO- und N₂-Emissionsfaktors wird die Unsicherheit des N₂O-Emissionsfaktors übernommen, siehe Kapitel 14.4.2.

8.7.8.4 *Indirect N₂O from manure management / Indirektes N₂O aus dem Wirtschaftsdünger-Management*

Indirect N₂O emissions from manure management (housing/storage without spreading) are calculated according to Chapter 3.3.4.3.6. See Chapter 3.3.4.3.6 also for the uncertainties of activity data and emission factor.

Indirekte N₂O-Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management (Stall/Lager ohne Ausbringung) werden nach Kapitel 3.3.4.3.6 berechnet. Siehe dort auch wegen der Unsicherheiten von Aktivitätswert und Emissionsfaktor.

(Indirect N₂O emissions from agricultural soils after spreading of manures or digestated manures are reported in Sector 3.D. For the calculation of these emissions see Chapter 12.)

(Indirekte N₂O-Emissionen als Folge der Ausbringung von Wirtschaftsdüngern und Wirtschaftsdünger-Gärresten werden im Sektor 3.D berichtet. Zur Berechnung siehe Kapitel 12.)

8.7.8.5 *Uncertainties of emission factors and activity data / Unsicherheiten von Emissionsfaktoren und Aktivitätsdaten*

For the uncertainties of the emission factors see Chapter 4.2.2.4.

Zu den Unsicherheiten der Emissionsfaktoren siehe Kapitel 4.2.2.4.

The uncertainty of the activity data (amounts of N) is adopted from Chapter 4.3.8.9.

Die Unsicherheit der Aktivitätsdaten (N-Mengen) wird wie in Kapitel 4.3.8.9 angesetzt.

(Note that only for laying hens there is an option of being held in free range ("grazing").)

(Hinweis: Nur für Legehennen gibt es die Möglichkeit für Freilandaufenthalt („Weidegang“).)

8.7.9 *Emissions of particulate matter / Partikelemissionen*

The method to calculate particle emissions is described in Chapter 3.3.4.5.

Zur Berechnungsmethode für Partikelemissionen wird auf Kapitel 3.3.4.5 verwiesen.

The PM_{2.5} emission factor provided by von EMEP (2016)-3B-19, Table 3.5, is different from the emission factor given in EMEP(2013)-3B-53, Table A3-4, only by rounding to two decimals. In order to avoid an apparent change in emissions from one emission reporting submission to the next, the original emission PM_{2.5} factor provided by EMEP(2013)-3B-53, Table A3-4, was kept, see Table 6.3. In this overview the emission factors of TSP, PM₁₀ and PM_{2.5} correspond to the data provided in EMEP(2016)-3B-53, Table A1.6.

Der von EMEP (2016)-3B-19, Table 3.5, angegebenen Emissionsfaktor für PM_{2.5} unterscheidet sich von dem entsprechenden Emissionsfaktor aus EMEP(2013)-3B-53, Table A3-4, nur durch Rundung auf zwei Dezimalstellen. Um aber eine scheinbare Emissionsänderung von einer Berichterstattung zur nächsten nur wegen Rundung des Emissionsfaktors zu vermeiden, wird der ursprüngliche Emissionsfaktor aus EMEP(2013)-3B-53, Table A3-4, beibehalten. In dieser Zusammenstellung entsprechen die Emissionsfaktoren von TSP, PM₁₀ und PM_{2.5} den Angaben in EMEP(2016)-3B-53, Table A1.6. Zur Unsicherheit der Emissionsfaktoren siehe Kapitel 3.3.4.5.

For the uncertainty of the emission factors see Chapter 3.3.4.5.

Table 8.24: Ducks, emission factors for particle emissions from housing

Housing type	Haltungssystem	Emission factor for TSP kg pl ⁻¹ a ⁻¹	Emission factor for PM ₁₀ kg pl ⁻¹ a ⁻¹	Emission factor for PM _{2.5} kg pl ⁻¹ a ⁻¹
straw based	strohbasierend	0.14	0.14	0.018

Source: EMEP(2016)-3B-53, Table A1.6 (with TSP = ID [inhalable dust])

8.7.10 *References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung*

The subsequent table lists the references to information provided in the data collection (see Chapter 2.4).

Die nachfolgende Tabelle enthält Verweise auf die Informationen in der Datensammlung (siehe Kapitel 2.4).

Table 8.25: Ducks, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)

			from	to
Emissions	Emissionen	CH ₄ enteric fermentation	---	
		CH ₄ manure management	EM1005.025	
		NMVOC	EM1007.025	
		NH ₃	EM1009.073	EM1009.075
		N ₂ O	EM1009.115	
		NO	EM1009.145	
		TSP	EM1010.025	
		PM ₁₀	EM1010.055	
		PM _{2.5}	EM1010.085	
Activity data	Aktivitäten		AC1005.031	
Emission factors	Emissionsfaktoren	CH ₄ enteric fermentation	---	
		CH ₄ manure management	IEF1005.025	
		NMVOC	IEF1007.025	
		NH ₃	IEF1009.070	IEF1009.072
		N ₂ O	IEF1009.108	
		NO	IEF1009.136	
		TSP	IEF1010.024	
		PM ₁₀	IEF1010.052	
		PM _{2.5}	IEF1010.080	
Additional information	zusätzliche Informationen		AI1005POU.069	AI1005POU.083
Excretion rates	Ausscheidungen	N	EXCR.089	EXCR.090

8.8 Turkeys / Puten

Due to sexual dimorphism cocks and hens are dealt with separately in the emission calculations. Free range husbandry is not considered due to lack of data.

The emissions are calculated according to the methods compiled in Table 8.26.

For the definition of the methods see Chapter 3.2.3.

Wegen des Geschlechtsdimorphismus erfolgt die Emissionsberechnung getrennt für Hähne und Hennen. Freilandhaltung wird mangels Daten nicht berücksichtigt.

Die Berechnung der Emissionen erfolgt nach den in Table 8.26 angegebenen Methoden.

Zur Methodendefinition siehe Kapitel 3.2.3.

Table 8.26: Turkeys, calculation methods applied

Species	Origin	Tier	Method applied
CH ₄	enteric fermentation		no method
CH ₄	manure management	2	IPCC / national
NM VOC	manure management	1	EMEP / national
NH ₃	manure management	2	EMEP / national
N ₂ O, NO, N ₂	manure management	2	IPCC / national
TSP, PM ₁₀ , PM _{2.5}	manure management	1	EMEP

8.8.1 Animal numbers / Tierzahlen

Poultry numbers have been surveyed in each agricultural-structure surveys, i.e. until 1996 in each even year, from 1999 to 1997 in each odd year, 2010 in the LZ 2010 census (STATLA C III 1 – vj 4, see also Chapter 3.4.2.1), and 2013 and 2016 in agricultural structure surveys. For the years between the surveys the poultry numbers were estimated by linear interpolation. The striking increase of animal numbers between 2010 and 2013 is, for the most part, due to the fact that the number of farms questioned in 2013 was higher than in 2010 (see Chapter 3.4.2.1). The missing turkey numbers for 2017 and 2018 were estimated by keeping the 2016 numbers, see Chapter 3.4.2.2.

German statistics do not differentiate between male and female turkeys. In order to generate gender-specific animal numbers, the turkey numbers reported in the census are disaggregated using the fraction of males as in the following relations:

$$n_{tu} = n_{tm} + n_{tf} \quad (8.35)$$

$$n_{tm} = n_{tu} \cdot x_{tm} \quad (8.36)$$

$$n_{tf} = n_{tu} \cdot (1 - x_{tm}) \quad (8.37)$$

n_{tu}	number of turkeys (census data) (in pl)
n_{tm}	number of male turkeys (in pl)
n_{tf}	number of female turkeys (in pl)
x_{tm}	fraction of male turkeys produced (in pl pl ⁻¹)

The fraction of male turkeys x_{tm} produced is documented in DAMME (2001-2010) for the years 2000 – 2009. For the other years of the time series no data are available. Hence the existing data were averaged and the result (55,7 %) is used for all years from 1990 onwards.

For animal number uncertainty see Chapter 8.1.2.

Geflügelzahlen wurden in jeder Agrarstrukturerhebung erhoben, d.h. bis 1996 in allen geraden Jahren, 1999 bis 2007 in allen ungeraden Jahren, 2010 in der LZ 2010 (STATLA C III 1 – vj 4, siehe auch Kapitel 3.4.2.1) und 2013 sowie 2016 in einer Agrarstrukturerhebung. In den Zwischenjahren wurden die Geflügelzahlen durch lineare Interpolation geschätzt. Der auffällig starke Anstieg zwischen 2010 und 2013 ist dabei im Wesentlichen auf die der Zählung 2013 zugrunde liegende Berichtskreisrevision (siehe Kapitel 3.4.2.1) zurückzuführen ist. Die für 2017 und 2018 fehlenden Putenzahlen wurden durch Beibehaltung des Wertes von 2016 geschätzt, siehe Kapitel 3.4.2.2.

Die deutsche Statistik unterscheidet nicht zwischen weiblichen und männlichen Puten. Zur Erzeugung geschlechtsspezifischer Tierzahlen werden die berichteten Putenzahlen unter Verwendung des Anteils der männlichen Tiere wie folgt aufgeschlüsselt:

Der Anteil männlicher Puten x_{tm} ist in DAMME (2001 - 2010) für 2000 - 2009 dokumentiert. Für die Jahre davor und danach liegen keine Daten vor, so dass die vorhandenen Daten gemittelt werden und der Mittelwert (55,7 %) für alle berichteten Jahre angenommen wird.

Zur Unsicherheit der Tierzahlen siehe Kapitel 8.1.2.

8.8.2 Animal performance and feed / Tierische Leistung und Fütterung

Turkey production in Germany is quasi industrial with uniform conditions. Hence, there is no need for regional differentiation.

Die quasi-industrielle Putenmast verläuft in Deutschland unter einheitlichen Bedingungen. Damit erübrigt sich eine regionale Differenzierung.

8.8.2.1 Animal weights and fattening period durations / Tiergewichte und Mastdauern


In Germany, the predominant genotype is B.U.T Big 6 (B.U.T.: British United Turkeys Ltd.). The inventory uses a default start weight of 60 g an⁻¹ (HAUS DÜSSE, 2008). Males have a typical slaughter weight of 18 to 21.5 kg an⁻¹, typical production time is 19 to 23 weeks. Females are slaughtered with a weight of 8.5 to 10.5 kg after 14 to 17 weeks of fattening (KTBL, 2006a, pg. 604 ff; FELDHAUS and SIEVERDING, 2007, pg. 31 ff). For the duration of the fattening periods used in the inventory see Table 8.27.

The significant difference between the final live weights and the characteristics of the respective fattening process (see Figure 8.2), cocks and hens are treated separately in this inventory. However, the calculation procedures themselves are identical.

Bei der deutschen Putenproduktion dominiert der Genotyp B.U.T Big 6 (B.U.T.: British United Turkeys Ltd.). Das Inventar rechnet mit einem Standard-Anfangsgewicht von 60 g an⁻¹ (HAUS DÜSSE, 2008). Hähne erreichen ein typisches Mastendgewicht von 18 bis 21,5 kg an⁻¹ bei einer Mastdauer von 19 bis 23 Wochen. Hennen werden mit 8,5 bis 10,5 kg an⁻¹ geschlachtet. Ihre Mastdauer beträgt 14 bis 17 Wochen (KTBL 2006a, S. 604 ff; FELDHAUS und SIEVERDING, 2007, S. 31 ff). Zu den im Inventar verwendeten Mastdauern siehe Table 8.27.

Wegen der erheblichen Unterschiede bei Mastverlauf und Mastendgewicht (siehe Figure 8.2) werden Hähne und Hennen im Inventar getrennt behandelt. Das Rechenverfahren selbst ist für beide Unterkategorien gleich.

Figure 8.2: Turkeys, typical animal weight and weight gain developments



Left: males, right: females; solid lines: weights; dotted lines: weight gains. (data source: DLG, 2005, pg. 51)

In order to reflect the development in turkey rearing since 1990, the inventory uses year-dependent data for the duration of fattening, final live weight and ratio of feed intake to weight gain. These data sets are taken from the poultry almanacs (PETERSEN, 1993-1999; DAMME, 2000-2017). There is no regional differentiation. However, as turkey rearing is quite uniform all over Germany, the data sets are considered applicable at national level.

For the years 1990 to 1992 and 2010 no data are available from the Poultry Almanacs. Hence the almanac data of 1993 are applied to 1990 to 1992, while for 2010 the data gaps were closed by linear interpolation. For the years 2013 to 2017, the poultry yearbooks show no change compared to the 2013 figures. As there is thus no trend, the values of 2017 for 2018 have been maintained. Table 8.27 shows the data used for the emission calculations.

Um die züchterische Entwicklung seit 1990 abbilden zu können, stützt sich das Inventar auf zeitlich variable Eingangsdaten zur Mastdauer, Mastendgewicht und Futterverwertungskoeffizient. Diese Daten werden den Geflügeljahrbücher (PETERSEN, 1993-1999; DAMME, 2000-2017) entnommen. Sie sind räumlich nicht differenziert und werden wegen der Einheitlichkeit der Putenhaltung deutschlandweit einheitlich verwendet.

In den Jahren 1990-1992 und 2010 sind keine Daten aus Geflügeljahrbüchern verfügbar, so dass für 1990-1992 die Daten aus 1993 angenommen werden und für 2010 die Datenlücken durch lineare Interpolation geschlossen wurden. Für die Jahre 2013 bis 2017 weisen die Geflügeljahrbücher keine Veränderung gegenüber den Werten von 2013 auf. Da es somit keinen Trend gibt, wurden die Werte von 2017 für 2018 beibehalten. Table 8.27 zeigt die den Emissionsberechnungen zugrunde liegenden Daten bzw. Zeitreihen.

The start weight of turkeys is not officially surveyed. The inventory uses a start weight of 0.06 kg (according to HAUS DÜSSE, 2008).

The weighted aggregation of the results of female and male turkeys is based on a fraction of maly turkey population of 55.7 %. This value is the arithmetic mean of the fractions reported in the poultry alamancs during the years 2000 to 2009. It is assumed constant, as no more up-to-data values have been reported in the years after 2009.

Das Puten-Anfangsgewicht wird offiziell nicht erhoben und daher einheitlich für alle Jahre der Zeitreihe mit 0,06 kg angesetzt (HAUS DÜSSE, 2008).

Für die gewichtete Aggregierung der Ergebnisse von weiblichen und männlichen Puten zum Puten-Gesamtergebnis wird ein Anteil der männlichen Population von 55,7 % zugrunde gelegt. Dieser Wert stellt einen Mittelwert über die Geflügeljahrbuchdaten für die Jahre 2000 bis 2009 dar, der mangels weiterer Daten für die gesamte Zeitreihe als konstant angenommen wird.

Table 8.27: Turkeys, animal performance and growth-related feed intake

t_{lifespan} : duration of fattening period; w_{fin} : final weight; x_{feed} : intake of diet mass (fresh matter) in kg per kg of animal weight gain. <i>Data gaps closed are indicated in italics.</i>					
	male turkeys		female turkeys		all turkeys
	$t_{\text{lifespan, tm}}$ d	$w_{\text{fin, tm}}$ kg	$t_{\text{lifespan, tf}}$ d	$w_{\text{fin, tf}}$ kg	$x_{\text{feed, tm/tf}}$ kg kg ⁻¹
1990	150.8	17.9	103.90	8.00	2.827
1991	150.8	17.9	103.90	8.00	2.827
1992	150.8	17.9	103.90	8.00	2.827
1993	150.8	17.9	103.90	8.00	2.827
1994	150.8	17.9	103.90	8.00	2.827
1995	150.8	17.9	103.90	8.00	2.827
1996	150.8	17.9	103.90	8.00	2.827
1997	150.8	17.9	103.90	8.00	2.827
1998	150.8	17.9	103.90	8.00	2.827
1999	150.8	17.9	103.90	8.00	2.827
2000	147.5	19.8	111.00	9.99	2.640
2001	146.8	19.9	111.50	9.95	2.660
2002	146.0	19.5	112.00	9.87	2.680
2003	146.0	20.3	112.00	10.10	2.680
2004	145.0	20.3	111.00	10.07	2.710
2005	146.0	20.6	111.00	10.20	2.730
2006	146.0	21.1	112.50	10.69	2.700
2007	145.0	21.0	111.00	10.57	2.680
2008	141.0	20.5	108.00	10.17	2.670
2009	145.0	21.2	111.00	10.83	2.620
2010	144.5	21.1	111.00	10.77	2.635
2011	144.0	21.0	111.00	10.70	2.650
2012	143.0	21.5	113.00	10.79	2.720
2013	145.0	21.4	113.00	10.86	2.690
2014	145.0	21.4	113.00	10.86	2.690
2015	145.0	21.4	113.00	10.86	2.690
2016	145.0	21.4	113.00	10.86	2.690
2017	145.0	21.4	113.00	10.86	2.690
2018	145.0	21.4	113.00	10.86	2.690

Sources: PETERSEN (1993, p. 168; 1994 p. 164; 1995, p. 181; 1996, p. 184; 1997, p. 192; 1998, p. 193; 1999, p. 196), DAMME (2000, p. 204; 2001, p. 189; 2002, p. 201; 2003, p. 76; 2004, p. 85; 2009, p. 87; 2010, p. 70; 2013, p. 79; 2014, p. 89; 2015, p. 93; 2016, p. 71; 2017, p. 91); for further information see text.

8.8.2.2 Energy requirements / Energiebedarf

Assuming a feed intake according to the requirements, the mean daily requirements of metabolizable energy can be calculated from the amount of feed intake and the ME content of the feed:

Der mittlere tägliche Bedarf an metabolisierbarer Energie kann unter der Annahme bedarfsgerechter Fütterung aus Futteraufnahme und ME-Gehalt des Futters berechnet werden:

$$ME_{\text{tf} / \text{tm}} = \eta_{\text{ME, feed}} \cdot m_{\text{F, FM, tf} / \text{tm}} \quad (8.38)$$

$ME_{\text{tf}} / \text{tm}$	requirements of metabolisable energy (in MJ $\text{pl}^{-1} \text{d}^{-1}$ ME)
$\eta_{\text{ME, feed}}$	content of metabolisable energy in turkey diet, related to fresh matter (in MJ kg^{-1} ME), see Chapter 8.8.2.3
$m_{\text{F, FM, tf}} / \text{tm}$	feed intake (fresh matter) of female or male turkeys (in $\text{kg} \text{pl}^{-1} \text{d}^{-1}$), see Chapter 8.8.2.3

8.8.2.3 Feed intake and feed properties / Futteraufnahme und Futtereigenschaften

In order to calculate VS excretions (see Chapter 8.8.4) the input data needed are the amount of feed taken in per place and year as well as dry matter content and digestibility of the feed.

The daily feed intake (fresh matter) is calculated separately for male and female turkeys. Equation (8.39) shows the calculation for female turkeys but applies to male turkeys by analogy.

$$m_{\text{F, FM, tf}} = X_{\text{feed, tf}} \cdot \frac{W_{\text{fin, tf}} - W_{\text{start, tf}}}{\tau_{\text{lifespan, tf}}} \quad (8.39)$$

$m_{\text{F, FM, tf}}$	feed intake (fresh matter) of female turkeys (in $\text{kg} \text{pl}^{-1} \text{d}^{-1}$)
$X_{\text{feed, tf}}$	intake of diet mass (fresh matter) per unit of animal weight gain (in $\text{kg} \text{kg}^{-1}$), see Chapter 8.8.2.1
W_{start}	start weight (in kg), see Chapter 8.8.2.1
$W_{\text{fin, tf}}$	final weight of female turkeys (in kg), see Chapter 8.8.2.1
$\tau_{\text{lifespan, tf}}$	duration of lifetime of female turkeys (in d), see Chapter 8.8.2.1

The dry matter intake is calculated from the fresh matter intake by multiplication with a typical dry matter content of 0.88 kg kg^{-1} (U. MEYER, Friedrich Löffler Institute, personal communication).

The unknown digestibility of energy $X_{\text{DE, tu}}$ is approximated by the digestibility of organic matter (67 %) as provided by SESKEVICIENE et al. (2005), i. e. $X_{\text{DE, tu}} = X_{\text{DOM, tu}} = 0.67 \text{ MJ MJ}^{-1}$. As the digestibility of energy actually is somewhat lower than the digestibility of organic matter, the assumption $X_{\text{DOM}} = X_{\text{DE}}$ leads to a slight overestimation of CH_4 emissions from manure management.

According to RHG (2006), the ash content of feed is 8 % for the starter phase, 6.5 % for the main phase and 5 % for the final phase. Taking into account that the main phase represents by far the greatest fraction of the total production cycle, its ash content (6.5 %) is assumed to be representative for the total production cycle. Based on the dry matter content of feed (88 %) the dry matter-related ash content is 7.4 %.

Due to lack of information, the feeding-related data are assumed to be constant with time and space.

In order to establish the N balance of the animal as a basis for the calculation of the emissions of N species the N content of the feed (x_{N}) is needed, see Chapter 8.8.6.1. The N content is derived from national data on turkey phase feeding, weighted with the amount of feed taken in, see Table 8.28. The data sets presented in Table 8.28 also show information on N reduced feeding. However, due to lack of data on the temporal and spatial distribution, the N reduced feeding cannot be accounted for in the inventory.

Für die VS-Ausscheidungsrechnung (siehe Kapitel 8.8.4) werden als Eingangsgrößen die pro Tierplatz und Jahr aufgenommene Futtermenge sowie Trockenmassegehalt und Verdaulichkeit des Futters benötigt.

Die tägliche Futtermenge (Frischmasse) wird für weibliche und männliche Puten getrennt berechnet. Gleichung (8.39) zeigt dies für die weiblichen Puten. Die Berechnung für die männlichen Puten erfolgt analog.

Die Trockenmasseaufnahme wird aus der Frischmasseaufnahme durch Multiplikation mit einem typischen Trockenmassegehalt von 0.88 kg kg^{-1} (U. MEYER, Friedrich-Löffler-Institut, persönliche Kommunikation) berechnet.

Die nicht bekannte Verdaulichkeit von Energie $X_{\text{DE, tu}}$ wird durch die von SESKEVICIENE et al. (2005) Verdaulichkeit von organischer Substanz approximiert: $X_{\text{DE, tu}} = X_{\text{DOM, tu}} = 0.67 \text{ MJ MJ}^{-1}$. Da die Verdaulichkeit von Energie eigentlich etwas niedriger als die von organischer Substanz ist, bewirkt diese Annahme eine leichte Überschätzung der CH_4 -Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management.

Der Aschegehalt des Futters beträgt, bezogen auf Frischmasse, nach RHG (2006) 8 % für die Starterphase, 6,5 % für die Mittelmast und 5 % für die Endmast. In Anbetracht des überwiegenden Zeitanteils der Mittelmast wird der entsprechende Aschegehalt als repräsentativ angesehen (6.5 %). Unter Berücksichtigung des Trockenmassegehaltes von 88 % ergibt sich daraus ein auf Trockenmasse bezogener Aschegehalt von 7,4 %.

Mangels besserer Informationen werden die Futterkennwerte als zeitlich und räumlich konstant angesehen.

Zur Erstellung der tierischen N-Bilanz als Grundlage für die Berechnung der Emissionen von N-Spezies wird der N-Gehalt x_{N} im Futter benötigt, siehe Kapitel 8.8.6.1. Dieser wird als mit der Futtermenge gewichtetes Mittel aus nationalen Daten zur Phasenfütterung abgeleitet, siehe Table 8.28. Diese Datenaufstellung zeigt auch Informationen zur N-reduzierten Fütterung. Mangels Daten zur regionalen und zeitlichen Verteilung kann eine mögliche N-reduzierte Fütterung in den Emissionsberechnungen derzeit aber nicht berücksichtigt werden.

For the mean specific ME content of the feed (η_{ME} , feed) see Table 8.28.

The inventory does not calculate the amount of gross energy GE as is not needed for the VS calculation method used in the present inventory.

Der mittlere spezifische ME-Gehalt des Futters (η_{ME} , feed) ist Table 8.28 zu entnehmen.

Die GE-Aufnahme mit dem Futter wird im Inventar nicht berechnet, da sie für die aktuell verwendete VS-Berechnungsmethode nicht benötigt wird.

Table 8.28: Turkeys, phase feeding, feed nitrogen contents (x_{N}) and specific ME contents ($\eta_{\text{ME, feed}}$); amounts of feed in fresh matter, nitrogen contents and specific ME contents related to fresh matter

Phase	lifetime period, weeks	feed intake, males ^a kg	feed intake, females ^a kg	x_{N} ^a kg kg ⁻¹	x_{N} , N reduced feed ^a kg kg ⁻¹	$\eta_{\text{ME, feed}}$ ^b MJ kg ⁻¹
turkeys A	1 to 2	0.47	0.43	0.0464	0.0464	11.0
turkeys B	3 to 5	2.44	2.02	0.0424	0.0424	11.0
turkeys C	6 to 9	7.38	5.97	0.0384	0.0368	11.4
turkeys D	10 to 13	11.09	8.80	0.0336	0.0320	11.4
turkeys E	14 to 17	13.90	10.68	0.0288 males 0.0296 females	0.0288 males 0.0296 females	11.8
turkeys F	18 to 22	21.50	---	0.0256	0.0240	12.6
overall feed intake (kg)		56.78	27.90			
weighted mean (in kg kg ⁻¹)				0.0305 males 0.0339 females	0.0294 males 0.0331 females	11.93 males 11.52 females

^a Source: DLG, 2005, pg. 51

^b Source: KTBL (2006), pg. 618

8.8.3 Methane from enteric fermentation / Methan aus der Verdauung

For poultry, emissions from enteric fermentation are not calculated (IPCC(2006)-10.27).

Für Geflügel werden Emissionen aus der Verdauung nicht berechnet (IPCC(2006)-10.27).

8.8.4 Methane from manure management / Methan aus Wirtschaftsdünger-Management

CH₄ emissions from manure management are quantified using the Tier 2 methodology, see Chapter 3.3.4.1.

Volatile solids (VS) excretion rates are calculated using the modified IPCC approach described in DÄMMGEN et al. (2011a), see Chapter 3.3.3.1.

For the required data see Chapter 8.8.2.3.

According to IPCC(2006)-10.82, the maximum methane producing capacity B_0 and the methane conversion factor MCF are $0.36 \text{ m}^3 \text{ CH}_4 (\text{kg VS})^{-1}$ and $0.01 \text{ m}^3 \text{ m}^{-3}$ respectively.

The MCF for anaerobic digestion of poultry manure including storage of digestate is calculated (see Chapter 3.3.4.4.1).

German data on the uncertainty of CH₄ emissions from manure management do not exist. IPCC(2006)-10.48 estimates the uncertainty of Tier 2 approaches to be 20 %. This value is, according to the definition of uncertainty used in Chapter 3 in IPCC (2006a), interpreted as half the 95 % confidence interval. A normal distribution is assumed.

Zur Berechnung der CH₄-Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management wird das Tier-2-Verfahren verwendet, siehe Kapitel 3.3.4.1.

Die VS-Ausscheidungen („volatile solids“) werden nach dem gegenüber IPCC modifizierten Verfahren von DÄMMGEN et al. (2011a) berechnet, siehe Kapitel 3.3.3.1.

Für die erforderlichen Daten siehe Kapitel 8.8.2.3.

Nach IPCC(2006)-10.82 liegt die maximale Methan-Freisetzungskapazität B_0 bei $0,36 \text{ m}^3 \text{ CH}_4 (\text{kg VS})^{-1}$, und der Methanumwandlungsfaktor MCF wird mit $0,01 \text{ m}^3 \text{ m}^{-3}$ angesetzt.

Der MCF -Wert für die Vergärung von Geflügelkot incl. Gärrestelagerung wird berechnet (siehe Kapitel 3.3.4.4.1).

Deutsche Zahlen zur Unsicherheit der CH₄-Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management liegen nicht vor. IPCC(2006)-10.48 schätzt die Unsicherheit bei Anwendung von Tier-2-Verfahren auf 20 %. Dieser Wert wird im Sinne von IPCC (2006a), Kapitel 3, als halbes 95 %-Konfidenzintervall interpretiert. Es wird Normalverteilung angenommen.

8.8.5 NMVOC emissions / NMVOC-Emissionen

The calculation of the NMVOC emissions of all animals except cattle are calculated with a Tier 1 methodology, see Chapters 3.3.4.2.1 and 3.3.4.2.3.

Die NMVOC-Emissionen von allen Tieren außer den Rindern werden mit einer Tier-1-Methode berechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.1 und 3.3.4.2.3.

Agricultural NMVOC emissions are reported, but are neglected regarding the NEC emission threshold, see Chapter 3.3.4.2.

Landwirtschaftliche NMVOC-Emissionen werden zwar berichtet, aber bzgl. der NEC-Emissionsobergrenze nicht angerechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.

8.8.6 Emissions of nitrogen species / Emissionen von Stickstoff-Spezies

The calculation of the emissions of nitrogen species is based on the knowledge of N excretions (their amounts and locations), of the N inputs with straw, the conversion of N_{org} in UAN as well as the frequency distributions of housing types and storage facilities, spreading techniques and times before incorporation.

Anaerobic digestion of poultry manure including storage of digestate is treated as a separate type of storage (see Chapter 3.3.4.4.1).

Die Berechnung der Emissionen der Stickstoff-Spezies beruht auf der Kenntnis der N-Ausscheidungen (Mengen und Orte), der N-Einträge mit Stroh, der Umwandlungen von N_{org} in UAN, der Häufigkeit von Stalltypen, Lagertypen, Ausbringungstechniken und Einarbeitungszeiten.

Die Vergärung von Geflügelkot incl. Gärrestelage rung stellt einen eigenständigen Lagertyp dar (siehe Kapitel 3.3.4.4.1).

8.8.6.1 N excretion rates / N-Ausscheidungen

The annual N excretion on an average animal place (for the animal place definition see Chapter 3.1.2.2) results from N mass balance. As input data are assumed to be constant in space (see Chapter 8.8.2.1), the calculated N excretion is the same for all federal states.

The respective equations are given for female turkeys but apply to male turkeys by analogy:

Die jährliche N-Ausscheidung auf einem mittleren Tierplatz (zur Tierplatzdefinition siehe Kapitel 3.1.2.2) wird über die N-Bilanz berechnet. Da die Eingangsdaten als räumlich konstant angenommen werden (siehe Kapitel 8.8.2.1), ist das Ergebnis für alle Bundesländer gleich.

Die Berechnung wird für die weiblichen Puten dargestellt, gilt analog aber auch für männliche Puten:

$$m_{\text{excr, tf}} = m_{\text{feed, tf}} - m_{\text{g, tf}} \quad (8.40)$$

$m_{\text{excr, tf}}$	annual nitrogen excretion (female turkeys) (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
$m_{\text{feed, tf}}$	annual nitrogen intake with feed (female turkeys) (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
$m_{\text{g, tf}}$	annual nitrogen retention with growth (female turkeys) (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)

with

$$m_{\text{feed, tf}} = \alpha \cdot m_{\text{F, FM, tf}} \cdot X_N \quad (8.41)$$

$m_{\text{feed, tf}}$	annual nitrogen intake with feed (female turkeys) (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
α	time units conversion factor ($\alpha = 365 \text{ d a}^{-1}$)
$m_{\text{F, FM, tf}}$	daily intake of feed, fresh matter (female turkeys) (in kg pl ⁻¹ d ⁻¹), see Chapter 8.8.2.3
X_N	mean nitrogen content of feed (in kg kg ⁻¹), see Chapter 8.8.2.3

and

$$m_{\text{g, tf}} = \alpha \cdot X_{N, \text{ret, tu}} \cdot \frac{w_{\text{fin, tf}} - w_{\text{start, tf}}}{\tau_{\text{lifespan, tf}}} \quad (8.42)$$

$m_{\text{g, tf}}$	annual nitrogen retention with growth (female turkeys) (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
α	time units conversion factor ($\alpha = 365 \text{ d a}^{-1}$)
$X_{N, \text{ret, tu}}$	mean N content of turkeys ($X_{N, \text{ret, tu}} = 0.035 \text{ kg kg}^{-1}$, see LFL, 2006a, Tabelle 8)
w_{start}	start weight (in kg), see Chapter 8.8.2.1
$w_{\text{fin, tf}}$	final weight of female turkeys (in kg), see Chapter 8.8.2.1
$\tau_{\text{lifespan, tf}}$	duration of lifetime of female turkeys (in d), see Chapter 8.8.2.1

The share of UAN in the N excretions is calculated: 63 %. It is lower than the EMEP standard value of 70 % (EMEP, 2016-3B-29, Table 3.9).

Der UAN-Gehalt im ausgeschiedenen N wird berechnet und liegt bei rund 63 % und damit unter dem EMEP-Standardwert von 70 % (EMEP, 2016-3B-29, Table 3.9).

8.8.6.2 N inputs with straw / N-Einträge mit Stroh

N inputs with bedding material is taken into account. Bedding material is assumed to be straw. According to

Der N-Eintrag durch Einstreu wird in Form von Strohn berücksichtigt. Nach KTBL (2006), S. 604, wird eine

KTBL (2006), pg. 604, an input of straw fresh matter of 10.3 kg per place and year is assumed.

For the properties of straw see Chapter 3.3.4.3.2.

Einstreumenge von 10,3 kg Strohfrischmasse pro Platz und Jahr angenommen.

Zu Kennwerten von Stroh siehe Kapitel 3.3.4.3.2.

8.8.6.3 Partial emission factors / Partielle Emissionsfaktoren

For male and female turkeys the KTBL working group on emission factors for animal husbandry (KTBL-Arbeitsgruppe „Emissionsfaktoren Tierhaltung“, EURICH-MENDEN et al., 2011) provide emission factors of 0.680 kg NH₃ and 0.387 kg NH₃, respectively (per place and year). The conversion into emission factors related to N excreted is presented in Table 8.29. This conversion is needed for the inventory. However, considering the similarity of housing conditions for hens and cocks, the resulting difference between both emission factors is implausible. Hence, the arithmetic mean is used.

For the partial NH₃-N emission factor for storage, the value given in EMEP(2013)-3B-27, Table 3.7, is used: 0.24 kg kg⁻¹. The emission factor relates to the UAN amount entering the storage.

Für Hähne gibt die KTBL-Arbeitsgruppe „Emissionsfaktoren Tierhaltung“ (EURICH-MENDEN et al., 2011) (Landtechnik-Artikel) einen platzbezogenen Stall-Emissionsfaktor von 0,680 kg NH₃ pro Platz und Jahr an, für Hennen 0,387 kg NH₃ pro Platz und Jahr. Die für das Inventar erforderliche Umrechnung auf NH₃-N sowie der Bezug auf die ausgeschiedene N-Menge sind in Table 8.29 dargestellt. Der sich dabei ergebende Unterschied ist in Anbetracht vergleichbarer Haltungsverfahren nicht plausibel, weshalb im Inventar mit dem Mittelwert der beiden Emissionsfaktoren gerechnet wird.

Der partielle NH₃-N-Emissionsfaktor für das Lager wird nach EMEP(2013)-3B-27, Table 3.7, mit 0,24 kg kg⁻¹ angesetzt. Der Faktor bezieht sich auf die UAN-Menge, die ins Lager gelangt.

Table 8.29: Turkeys, derivation of partial emission factors for NH₃ losses from housing

	EF ^a	EF ^b	standard N excretion ^c	standard N excretion ^d	EF related to standard N excretion	EF used in the inventory ^e
	kg NH ₃ (pl · a) ⁻¹	kg NH ₃ -N (pl · a) ⁻¹	kg N per animal	kg N (pl · a) ⁻¹	kg NH ₃ -N (kg N _{excr}) ⁻¹	kg NH ₃ -N (kg N _{excr}) ⁻¹
cocks	0.680	0.560	0.973	2.200	0.2545	
hens	0.387	0.319	0.564	1.676	0.1902	0.222

^a Source: EURICH-MENDEN et al. (2011)

^b Source: EURICH-MENDEN et al. (2011), data multiplied by 14/17 to transform from NH₃ to NH₃-N units

^c Source: DLG (2005), pg. 51

^d Derived from the standard N excretion per animal by multiplying with the number of production cycles per year

^e see text

The emission factors for N₂O, NO and N₂ are combined factors for house and storage, see Chapter 8.2.1, Table 8.2.

For the NH₃-N emission factors for spreading see Chapter 8.2.2, Table 8.3.

Anaerobic digestion of poultry manure including storage of digestate is treated as a separate type of storage. The respective emission factors are calculated (see Chapter 3.3.4.4.1).

The emission factors for the separate storage type “anaerobic digestion of poultry manure” are calculated (see Chapter 3.3.4.4.1).

NO emissions from manure management are reported (as NO_x), but are neglected regarding the NEC emission threshold, see Chapter 3.3.4.2.

The uncertainty of the NH₃ emission factor characterizing the overall NH₃ emissions per animal place from the animal house, storage and application is calculated and provided in the inventory (see Chapter 14.5).

For the uncertainties of the N₂O emission factor combined for animal house and storage see Chapter 14.4.1.

Due to the lack of information on the uncertainties of the NO and N₂ emission factors, the uncertainty of the N₂O emission factor is adopted (see Chapter 14.4.2).

Die Emissionsfaktoren für N₂O, NO und N₂ gelten für Stall und Lager zusammen, siehe Kapitel 8.2.1, Table 8.2.

Zu den NH₃-N-Emissionsfaktoren für die Ausbringung siehe Kapitel 8.2.2, Table 8.3.

Die Vergärung von Geflügelkot incl. Gärrestelagerung stellt einen eigenständigen Lagertyp dar. Die zugehörigen Emissionsfaktoren werden berechnet (siehe Kapitel 3.3.4.4.1).

Die zum eigenständigen Lagertyp „Vergärung von Geflügelkot“ gehörigen Emissionsfaktoren werden berechnet (siehe Kapitel 3.3.4.4.1).

NO aus dem Wirtschaftsdünger-Management wird berichtet (als NO_x), bzgl. der NEC-Emissionsobergrenze aber nicht angerechnet, siehe Kapitel 3.3.4.2.

Die Unsicherheit des NH₃-Emissionsfaktors, der die auf tierplatzbezogene NH₃-Gesamtemissionen aus Stall, Lager und Ausbringung beschreibt, wird im Inventar berechnet, siehe Kapitel 14.5.

Für die Unsicherheit des N₂O-Emissionsfaktors für die Kombination „Stall/Lager“ siehe Kapitel 14.4.1.

Mangels Daten zu den Unsicherheiten von NO- und N₂-Emissionsfaktors wird die Unsicherheit des N₂O-Emissionsfaktors übernommen, siehe Kapitel 14.4.2.

8.8.6.4 Indirect N₂O from manure management / Indirektes N₂O aus dem Wirtschaftsdünger-Management

Indirect N₂O emissions from manure management (housing/storage without spreading) are calculated according to Chapter 3.3.4.3.6. See Chapter 3.3.4.3.6 also for the uncertainties of activity data and EF.

(Indirect N₂O emissions from agricultural soils after spreading of manures or digested manures are reported in Sector 3.D. For the calculation of these emissions see Chapter 12.)

Indirekte N₂O-Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management (Stall/Lager ohne Ausbringung) werden nach Kapitel 3.3.4.3.6 berechnet. Siehe dort auch wegen der Unsicherheiten von Aktivitätswert und EF.

(Indirekte N₂O-Emissionen als Folge der Ausbringung von Wirtschaftsdüngern und Wirtschaftsdünger-Gärresten werden im Sektor 3.D berichtet. Zur Berechnung siehe Kapitel 12.)

8.8.6.5 Uncertainties of emission factors and activity data / Unsicherheiten von Emissionsfaktoren und Aktivitätsdaten

For the uncertainties of the emission factors see Chapter 4.2.2.4.

The uncertainty of the activity data (amounts of N) is adopted from Chapter 4.3.8.9.

(Note that only for laying hens there is an option of being held in free range ("grazing").)

Zu den Unsicherheiten der Emissionsfaktoren siehe Kapitel 4.2.2.4.

Die Unsicherheit der Aktivitätsdaten (N-Mengen) wird wie in Kapitel 4.3.8.9 angesetzt.

(Hinweis: Nur für Legehennen gibt es die Möglichkeit für Freilandaufenthalt („Weidegang“).)

8.8.7 Emissions of particulate matter / Partikelemissionen

The method to calculate particle emissions is described in Chapter 3.3.4.5. The emission factors are listed in Table 8.30. For the uncertainty of the emission factors see Chapter 3.3.4.5.

Zur Berechnungsmethode für Partikelemissionen wird auf Kapitel 3.3.4.5 verwiesen. Die Emissionsfaktoren sind in Table 8.30 angegeben. Zur Unsicherheit der Emissionsfaktoren siehe Kapitel 3.3.4.5.

Table 8.30: Turkeys, emission factors for particle emissions from housing

Housing type	Haltungssystem	Emission factor for TSP kg pl ⁻¹ a ⁻¹	Emission factor for PM ₁₀ kg pl ⁻¹ a ⁻¹	Emission factor for PM _{2.5} kg pl ⁻¹ a ⁻¹
straw based	strohbasierend	0.11	0.11	0.02

Source: EMEP(2016)-3B-19, Table 3.5

8.8.8 References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung

Table 8.31: Turkeys, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)

			from	to
Emissions	Emissionen	CH ₄ enteric fermentation	---	
		CH ₄ manure management	EM1005.026	EM1005.028
		NM VOC	EM1007.026	EM1007.028
		NH ₃	EM1009.076	EM1009.084
		N ₂ O	EM1009.116	EM1009.118
		NO	EM1009.146	EM1009.148
		TSP	EM1010.026	EM1010.028
		PM ₁₀	EM1010.056	EM1010.058
Activity data	Aktivitäten	PM _{2.5}	EM1010.086	EM1010.088
			AC1005.032	AC1005.034
Emission factors	Emissionsfaktoren	CH ₄ enteric fermentation	---	
		CH ₄ manure management	IEF1005.026	IEF1005.028
		NM VOC	IEF1007.026	IEF1007.028
		NH ₃	IEF1009.073	IEF1009.081
		N ₂ O	IEF1009.109	IEF1009.111
		NO	IEF1009.137	IEF1009.139
		TSP	IEF1010.025	IEF1010.027
		PM ₁₀	IEF1010.053	IEF1010.055
Additional information	zusätzliche Informationen	PM _{2.5}	IEF1010.081	IEF1010.083
			AI1005POU.084	AI1005POU.129
Excretion rates	Ausscheidungen	N	EXCR.091	EXCR.092

8.9 Poultry – collective description / Geflügel - zusammenfassende Daten

For greenhouse gases, emissions have to be reported for poultry as a single category. The aggregation of data sets is described in Chapter 8.9.1. (For the basic rules of data aggregation see Chapter 4.9.2.)

For the emission reporting of air pollutants, a differentiation has to be made between laying hens, broilers, turkeys and “other poultry”. For the aggregation of “other poultry” data the methods listed in Chapter 8.9.1 are used by analogy.

Treibhausgasemissionen sind für Geflügel insgesamt zu berichten. Die Aggregation der Daten wird in Kapitel 8.9.1 beschrieben. (Zu Grundprinzipien der Aggregation siehe Kapitel 4.9.2.)

Bei den luftverschmutzenden Gasen und Stoffen wird in der Berichterstattung nach Legehennen, Masthähnchen und –hühnchen, Puten sowie „anderes Geflügel“ unterschieden. Die Datenaggregation für „anderes Geflügel“ folgt sinngemäß Kapitel 8.9.1.

8.9.1 Aggregated data for poultry / Zusammenfassende Daten für Geflügel

8.9.1.1 Animal numbers / Tierzahlen

The total animal number of poultry is the sum of the official animal numbers in Table 8.1.

Die Gesamtzahl des Geflügels im Inventar entspricht der Summe der amtlichen Tierzahlen in Table 8.1.

$$n_{\text{poultry}} = n_{\text{AA}} + n_{\text{AB}} + n_{\text{AC}} + n_{\text{AD}} + n_{\text{AE}} + n_{\text{AF}} = n_{\text{lh}} + n_{\text{br}} + n_{\text{pu}} + n_{\text{ge}} + n_{\text{du}} + n_{\text{tu}} \quad (8.43)$$

n_{AA} etc. number of animals in census subcategory AA, etc. (see Table 8.1)
 n_{lh} etc. number of animals in inventory categories, etc. (see Chapters 8.3 to 8.8)

For poultry numbers a standard error of 5 % is assumed (normal distribution). Then half the 95 % confidence interval is 10 %.

Für Geflügelzahlen wird ein Standardfehler von 5 % angenommen (Normalverteilung). Das halbe 95 %-Konfidenzintervall beträgt 10 %.

8.9.1.2 Animal weights / Tiergewichte

The mean animal weight of poultry is calculated from the mean weights of the various poultry categories. The mean weight represents a value valid for a certain reference date and is assumed to be valid for the entire year like the numbers of animal places (for constancy of animal places see Chapter 3.1.2.2).

Das mittlere Gewicht von Geflügel wird aus den mittleren Gewichten der einzelnen Geflügelkategorien berechnet. Es stellt einen auf einen Stichtag bezogenen Gewichtswert dar und wird wie die Tierplatzzahlen als konstant während eines Jahres angesehen. (Zur Konstanz der Tierplatzzahlen siehe Kapitel 3.1.2.2.)

$$w_{\text{mean, poultry}} = \frac{n_{\text{lh}} \cdot w_{\text{mean, lh}} + n_{\text{br}} \cdot w_{\text{mean, br}} + n_{\text{pu}} \cdot w_{\text{mean, pu}} + n_{\text{ge}} \cdot w_{\text{mean, ge}} + n_{\text{du}} \cdot w_{\text{mean, du}} + n_{\text{tu}} \cdot w_{\text{mean, tu}}}{n_{\text{poultry}}} \quad (8.44)$$

$w_{\text{mean, poultry}}$	mean weight of poultry (in kg an ⁻¹)
n_{lh}	number of places of laying hens (in pl)
$w_{\text{mean, lh}}$	mean weight of laying hens (in kg an ⁻¹)
etc.	
n_{poultry}	total number of poultry places (in pl), see Chapter 8.9.1.1

The mean animal weights of the poultry poultry categories are estimated as follows:

- The mean weight of laying hens is the arithmetic mean of the weights at the beginning and the end of the laying period.
- The mean weight of broilers is assumed to be 1 kg as there is no data to calculate this mean weight.
- The mean weight of pullets is half the the sum of chicklet weight and final weight, where the final pullet weight is the initial weight of laying hens.

Die mittleren Gewichte der Geflügelkategorien werden wie folgt geschätzt:

- Als mittleres Gewicht von Legehennen wird das arithmetische Mittel der Gewichte zu Beginn und zum Ende der Legeperiode angesehen.
- Für Masthähnchen und –hühnchen wird ein mittleres Gewicht von 1 kg pro Tier angesetzt, da Daten für eine Berechnung fehlen.
- Das mittlere Gewicht von Junghennen wird als Hälfte der Summe von Küken- und Endgewicht berechnet, wobei das Endgewicht der Junghennen dem Anfangsgewicht der Legehennen entspricht.

- The mean weight of geese, ducks, female and male and turkeys is calculated in a simplified manner as half the final fattening weight.
- For geese the mean weight is primarily calculated according to the procedure used for ducks and turkeys, but is then multiplied by the factor 0.5 to account of the fact that a geese place is occupied about half a year only.
- Das mittlere Gewicht von Enten, weiblichen und männlichen Puten wird vereinfachend mit der Hälfte des Mastendgewichtes gleichgesetzt
- Bei Gänsen wird das mittlere Gewicht zunächst wie bei Enten und Puten berechnet, zusätzlich aber noch mit dem Faktor 0,5 multipliziert, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass ein Gänseplatz größenordnungsmäßig nur ein halbes Jahr besetzt ist.

8.9.1.3 Calculation of mean VS and N excretions / Berechnung mittlerer VS- und N-Ausscheidungen

The mean daily VS excretion for poultry are assessed as follows:

Die mittlere tägliche VS-Ausscheidung für Geflügel wird wie folgt berechnet:

$$VS_{\text{mean, poultry}} = \frac{n_{lh} \cdot VS_{lh} + n_{br} \cdot VS_{br} + n_{pu} \cdot VS_{pu} + n_{ge} \cdot VS_{ge} + n_{du} \cdot VS_{du} + n_{tu} \cdot VS_{tu}}{n_{\text{poultry}}} \quad (8.45)$$

$VS_{\text{mean, poultry}}$ mean daily VS excretion of poultry (in kg pl⁻¹ d⁻¹)
 n_{lh} number of places of laying hens (in pl)
 VS_{lh} daily VS excretion of laying hens (in kg pl⁻¹ d⁻¹)
 etc.
 n_{poultry} total number of poultry places (in pl), see Chapter 8.9.1.1

Opposite to the calculation procedure for the mean weight (see Chapter 8.9.1.2), the annual VS excretion of geese is not multiplied by 0.5 as this factor is already implicitly included in the value of the VS excretion, see Chapter 8.6.4.

Anders als beim Gewicht (siehe Kapitel 8.9.1.2) wird die jährliche VS-Ausscheidung von Gänsen nicht mit einem Faktor 0,5 multipliziert, da dieser Faktor implizit bereits in der VS-Ausscheidung enthalten ist, siehe Kapitel 8.6.4.

The different poultry subcategories have different values of the maximum possible methane production capacity B_o . Averaging of the different values of B_o is based on Equation (3.29) in Chapter 3.3.4.1:

Die Geflügel-Unterkategorien haben unterschiedliche maximale Methanproduktionskapazitäten B_o . Deren Mittelung erfolgt unter Berücksichtigung von Gleichung (3.29) in Kapitel 3.3.4.1):

$$B_{o, \text{mean, poultry}} = \frac{EM_{\text{CH}_4, \text{MM, poultry}}}{\sum n_i \cdot VS_i \cdot \rho_{\text{CH}_4} \cdot MCF_i} \quad (8.46)$$

$B_{o, \text{mean, poultry}}$ mean B_o of poultry (in m³ kg⁻¹)
 $EM_{\text{CH}_4, \text{MM, poultry}}$ total CH₄ emissions from manure management of poultry (in Gg a⁻¹)
 n_i population of poultry category i
 VS_i total VS excretion of poultry category i (in Gg a⁻¹)
 ρ_{CH_4} density of methane ($\rho_{\text{CH}_4} = 0.67 \text{ kg m}^{-3}$)
 MCF_i methane conversion factor for the manure management of poultry poultry category i (in kg kg⁻¹), see text

Mean N excretion is calculated by analogy to mean VS excretion.

Die mittlere N-Ausscheidung wird analog zur mittleren VS-Ausscheidung berechnet.

8.9.1.4 Implied emission factors (IEF) / Aggregierte Emissionsfaktoren (IEF)

The calculation of the mean IEF for poultry is done by analogy to the calculation of the mean VS excretion, see Chapter 8.9.1.3.

Die Berechnung des mittleren IEF für Geflügel erfolgt analog zur Berechnung der mittleren VS-Ausscheidung, siehe Kapitel 8.9.1.3.

8.9.2 International comparison / Internationaler Vergleich

Within the framework of quality assurance a comparison of input data and inventory results was made on European level. (For details of the procedure of the comparison see Chapter 4.3.10.)

Im Zuge der Qualitätssicherung wurde ein Vergleich von Eingangsdaten und Inventarergebnissen auf europäischer Ebene durchgeführt. (Nähere Angaben zur Durchführung: Siehe Kapitel 4.3.10.)

In Table 8.32 a comparison is made of implied emission factors (IEF) and emission explaining variables for the overall animal category “poultry” as reported in GHG emission reporting.

For IEF_{CH₄} from enteric fermentation no comparison is made, because IPCC does not provide a methodology and Germany therefore did not calculate such emissions.

Table 8.32 vergleicht die aggregierten Emissionsfaktoren (IEF) und emissionserklärenden Variablen für alle Geflügelkategorien zusammengefasst, wie es der Berichtsweise für Treibhausgase entspricht.

Ein Vergleich für den IEF_{CH₄} aus der Verdauung entfällt, da IPCC dafür keine Methode angibt und Deutschland daher keine Emissionen berechnet hat.

Table 8.32: Poultry, 2017, international comparison of emission explaining variables and implied emission factors for manure management (MM)

	mean animal weight	VS excretion	N excretion	IEF		
				CH _{4, MM}	NH ₃	direct N ₂ O
					(without spreading)	
	kg an ⁻¹	kg pl ⁻¹ d ⁻¹	kg pl ⁻¹ a ⁻¹	kg pl ⁻¹ a ⁻¹	kg pl ⁻¹ a ⁻¹	kg pl ⁻¹ a ⁻¹
Austria	NA	0.017	0.54	0.024	0.212	0.00077
Belgium	1.55	NE	0.59	0.023	0.092	0.00092
Czech Republic	2.00	NA	0.75	0.100	0.169	0.01120
Denmark ^a	2.00	0.017	0.46	0.025	0.103	0.00073
France	NE	0.019	0.48	0.026	0.127	0.00070
Germany	1.68	0.026	0.73	0.034	0.175	0.00132
Netherlands	NE	0.020	n/a	0.029	0.089	n/a
Poland	NA	NA	0.48	0.027	0.107	0.00076
Switzerland	NA	0.014	0.48	0.019	0.105	0.00073
United Kingdom	NE	0.013	0.58	0.021	0.089	0.00493
Median		0.017	0.54	0.026	0.106	0.00077
IPCC (2006)- 10.82, Western Europe, cool region, developed countries ^b	1.62	0.017	0.53	0.027		
EMEP (2016)-3B-29, 16 ^c			0.58		0.23	

Sources: Germany: Submission 2020; all other countries: UNFCCC (2019), CRF Tables; CEIP (2019), NFR

n/a, NA, NE: No data available for different reasons

^a Denmark without Greenland and Faroe Island

^b Weighted means, calculated using IPCC default weights, IPCC default VS and N excretions, and 2018 national animal numbers; assumptions for missing IPCC values: geese weight = 1/2 default turkey weight; pullet weight = 1/2 default layer weight; geese excretions = turkey excretions; pullet excretions and IEF = 1/3 of the respective values for layers.

^c Weighted means, calculated by analogy to footnote b, using EMEP (2016) default values.

Six countries do not provide mean animal weights. The Czech Republic and Denmark report an integer value that gives the appearance of an estimate, but is not given as default value by either IPCC (2006) nor EMEP (2016). The German value is calculated from differentiated animal weight data. The result is located between the animal weights reported by Belgium and Czech Republic/Denmark and is somewhat higher than the IPCC reference value. The latter is not explicitly provided in IPCC (2006), but has been calculated according to the methodology described in IPCC (2006) and using the animal numbers of the different German poultry categories.

The German values for the excretions of VS and N have the same order of magnitude like the values of the other countries, but mark the upper end. The same holds for the CH₄ IEFs for manure management, if the implausibly high Czech value is neglected. A possible explanation is that Germany calculates N excretions from the N balances of the animals (except for geese) and that VS excretions are calculated not with the IPCC methodology but with an improved methodology.

Für sechs Länder liegen keine mittleren Tiergewichte vor. Tschechien und Dänemark geben einen ganzzahligen Wert an, der den Anschein einer Schätzung erweckt, aber weder von IPCC (2006) noch EMEP (2016) als Defaultwert angegeben wird. Der berechnete deutsche Wert beruht auf differenzierten Tiergewichtsangaben. Er liegt zwischen den Werten von Belgien und Tschechien/Dänemark und etwas über dem IPCC-Vergleichswert, der in IPCC (2006) nicht explizit angegeben wird, sondern für den hier vorliegenden Vergleich nach IPCC-Regeln unter Berücksichtigung der Tierzahlen der verschiedenen deutschen Geflügelkategorien ermittelt wurde.

Die deutschen Ausscheidungswerte (VS und N) passen in der Größenordnung zu den Werten der anderen Länder, liegen aber am oberen Ende der Skala. Das Gleiche gilt für den CH₄-IEF für das Wirtschaftsdünger-Management, wenn man den unplausibel hohen tschechischen Wert unberücksichtigt lässt. Eine mögliche Erklärung ist, dass Deutschland die N-Ausscheidungen mithilfe einer tierischen N-Bilanz (außer für Gänse) und die VS-Ausscheidungen mit einer gegenüber IPCC verbesserten Methodik berechnet.

The NH_3 -IEF values have a relatively wide range, which is partly due to the also scattering N excretion values. Dividing the NH_3 -IEF by the N excretion to eliminate its influence on the IEF yields some sort of effective emission factor for manure management (not shown in Table 8.32). Its median is 0.222 kg kg^{-1} . The German value is 8% higher, at 0.239 kg kg^{-1} .

As to direct N_2O from manure management, the Czech Republic has an implausibly high value (like for CH_4 from manure management). In order to facilitate the international comparison the data given in Table 8.32 were used to derive a N_2O emission factor that is related to N excreted ($= 28/44 * \text{N}_2\text{O-N IEF} / \text{N excretion}$, not shown in Table 8.32). This emission factor is for all countries except the Czech Republic and United Kingdom at the level of the corresponding IPCC default value (0.001 kg kg^{-1}), the German value being $0.0012 \text{ kg kg}^{-1}$. The Czech value is $0.0095 \text{ kg kg}^{-1}$, which is almost one order of magnitude too high compared to the IPCC default value. The UK value ($0.0053 \text{ kg kg}^{-1}$) seems to too high as well.

Table 8.33 presents the IEF values for TSP, PM and NMVOC. For Switzerland are only data for laying hens available. Hence no Swiss IEFs for total poultry are provided in Table 8.33.

Die NH_3 -IEF-Werte streuen relativ breit, was zum Teil auf die ebenfalls streuenden N-Ausscheidungswerte zurückzuführen ist. Dividiert man den NH_3 -IEF durch die N-Ausscheidung, um deren Einfluss auf den IEF zu eliminieren, erhält man eine Art effektiven Emissionsfaktor für das Wirtschaftsdünger-Management (nicht gezeigt in Table 8.32). Dessen Median liegt bei $0,222 \text{ kg kg}^{-1}$. Der deutsche Wert liegt 8 % darüber bei $0,239 \text{ kg kg}^{-1}$.

Beim direkten N_2O aus dem Wirtschaftsdünger-Management weist Tschechien wie beim CH_4 einen unplausibel hohen IEF auf. Um den internationalen Vergleich zu erleichtern, lässt sich aus den Daten in Table 8.32 ein auf den ausgeschiedenen Stickstoff bezogener N_2O -N-Emissionsfaktor ($= 28/44 * \text{N}_2\text{O-N-IEF} / \text{N-Ausscheidung}$, nicht gezeigt in Table 8.32) berechnen. Dieser liegt für alle Länder außer Tschechien und das Vereinigte Königreich auf dem Niveau des entsprechenden IPCC-Defaultwertes ($0,001 \text{ kg kg}^{-1}$), wobei der deutsche Wert $0,0012 \text{ kg kg}^{-1}$ beträgt. Der tschechische Wert liegt bei $0,0095 \text{ kg kg}^{-1}$, also fast eine Größenordnung zu hoch im Vergleich zum IPCC-Defaultwert. Auch der britische Wert erscheint mit $0,0053 \text{ kg kg}^{-1}$ zu hoch.

Table 8.33 zeigt die IEFs für TSP, PM und NMVOC. Für die Schweiz liegen nur die Ergebnisse für Legehennen vor, so dass keine IEFs für Geflügel insgesamt angegeben werden können.

Table 8.33: Poultry, 2017, international comparison of implied emission factors for TSP, PM and NMVOC

	IEF _{TSP} kg pl ⁻¹ a ⁻¹	IEF _{PM10} kg pl ⁻¹ a ⁻¹	IEF _{PM2.5} kg pl ⁻¹ a ⁻¹	IEF _{NMVOC} kg pl ⁻¹ a ⁻¹
Austria	0.016	0.007	0.002	0.054
Belgium	0.082	0.027	0.003	0.131
Czech Republic	0.093	0.031	0.003	NE
Denmark ^a	0.087	0.027	0.002	0.150
France	0.053	0.044	0.007	IE
Germany	0.092	0.034	0.004	0.158
Netherlands	0.040	0.040	0.003	0.073
Poland	0.088	0.037	0.004	0.151
Switzerland	0.082	0.026	0.002	0.132
United Kingdom	0.092	0.035	0.004	0.123
Median	0.085	0.033	0.003	0.131
EMEP (2016)-3B-19, 18	0.04 to 0.24	0.02 to 0.24	0.002 to 0.03	0.108 to 0.489

Sources: Germany: Submission 2020; all other countries: CEIP (2019), calculated from original data

IE, NA, NE: No data available for different reasons

^a Denmark without Greenland and Faroe Island

The values of TSP-IEF vary by nearly a factor of 6; Germany is relatively close to the median. The same applies to the PM_{10} -IEF. For $\text{PM}_{2.5}$, the high value of France is noticeable; Germany is at the same level as Switzerland and the UK, which, however, is 29 % above the median.

For NMVOC, Germany reports the highest IEF. However, it is only 20% above the median and is still comparable to that of Denmark and Poland.

Die Werte des TSP-IEF variieren um fast den Faktor 6; Deutschland liegt relativ nahe am Median. Das Gleiche gilt für den PM_{10} -IEF. Bei $\text{PM}_{2.5}$ fällt der hohe Wert von Frankreich auf; Deutschland liegt gleichauf mit der Schweiz und UK, allerdings 29 % über dem Median.

Bei NMVOC berichtet Deutschland den höchsten IEF. Er liegt aber nur 20 % über dem Median und ist noch vergleichbar mit den Werten von Dänemark und Polen.

8.9.3 References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung

Table 8.34: Poultry, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)

			from	to
Emissions	Emissionen	CH ₄ enteric fermentation	---	
		CH ₄ manure management	EM1005.029	
		NMVOC	EM1007.029	
		NH ₃	EM1009.085	EM1009.087
		N ₂ O	EM1009.119	
		NO	EM1009.149	
		TSP	EM1010.029	
		PM ₁₀	EM1010.059	
		PM _{2.5}	EM1010.089	
Activity data	Aktivitäten		AC1005.035	
Emission factors	Emissionsfaktoren	CH ₄ enteric fermentation	---	
		CH ₄ manure management	IEF1005.029	
		NMVOC	IEF1007.029	
		NH ₃	IEF1009.082	IEF1009.084
		N ₂ O	IEF1009.112	
		NO	IEF1009.140	
		TSP	IEF1010.028	
		PM ₁₀	IEF1010.056	
		PM _{2.5}	IEF1010.084	
Additional information	zusätzliche Informationen		AI1005POU.130	AI1005POU.144
Excretion rates	Ausscheidungen	N	EXCR.093	EXCR.094

9 Deer, rabbits, ostrich and fur-bearing animals / Gehegewild, Kaninchen, Strauße und Pelztiere

9.1 Overview / Überblick

The CRF tables under IPCC (2006) provide for emission reporting for the following animal categories not covered in Chapters 4 to 8 („other animals“):

- Deer
- Rabbit
- Reindeer
- Ostrich
- Fur-bearing animals

The reporting of air pollutants (NFR reporting format) also provides for the reporting of emissions from the keeping of other animal categories ("other animals"), but without naming them specifically. In the following, therefore, the emissions of the animal categories mentioned by IPCC (2006) (see above) are discussed.

There is no reindeer husbandry in Germany. For the other four categories, green house gas emissions as well as emissions of NH₃, NO and N₂ are estimated exemplarily for one single year, see Chapters 9.2 bis 9.7.

Table 9.1 shows the results of those calculations for the Green House Gas emissions. These results served the National Co-ordination Agency (NaKo) within the Federal Environment Agency as a basis for the decision that these emissions are of little account and that they need not to be reported in the GHG inventory (see NIR 2018, Chapter 19.3.1 and 21). The use of a N₂O emission factor for solid manure in Submission 2019 that is lower than it was in Submission 2018 results in reduced total N₂O emissions compared to Submission 2018. The total result in CO_{2eq} is thus also lower, which means that the threshold of significance is even further undercut. (The conversions of CH₄ and N₂O to CO_{2eq} have been based on GWP values given in IPCC (2007): 25 for CH₄ and 298 for N₂O, see IPCC (2007).)

Die CRF-Tabellen unter IPCC (2006a) sehen die Emissionsberichterstattung für die folgenden, in den Kapiteln 4 bis 8 nicht berücksichtigten Tierkategorien vor („other animals“):

- Gehegewild
- Kaninchen
- Rentiere
- Strauße
- Fur-bearing animals

Im Rahmen der Schadstoffe-Berichterstattung (NFR-Berichtsformat) ist ebenfalls die Angabe von Emissionen aus der Haltung anderer Tierkategorien („other animals“) vorgesehen, allerdings ohne diese konkret zu benennen. Im Folgenden werden daher die Emissionen der von IPCC (2006) genannten Tierkategorien (s. o.) diskutiert.

Rentiere werden in Deutschland nicht gehalten. Für die übrigen vier Kategorien werden in Kapitel 9.2 bis 9.7 die Treibhausgasemissionen sowie die Emissionen von NH₃, NO und N₂ exemplarisch für ein Jahr geschätzt.

Table 9.1 fasst die Ergebnisse dieser Berechnungen für den Bereich der Treibhausgase zusammen. Sie dienen der Nationalen Koordinierungsstelle (NaKo) des Umweltbundesamtes als Grundlage für die Entscheidung, dass die entsprechenden Emissionen als geringfügig einzustufen sind und daher im THG-Inventar nicht berichtet werden müssen (siehe NIR 2018, Kapitel 19.3.1 und 21). Die Absenkung des N₂O-Emissionsfaktors für Festmist von Submission 2018 zu Submission 2019 führt zu verringerten N₂O-Gesamtemissionen im Vergleich zu Submission 2018. Das Gesamtergebnis in CO_{2eq} liegt damit ebenfalls niedriger, womit die Geringfügigkeitsschwelle noch weiter unterschritten wird. (Die Umrechnung in die Einheit CO_{2eq} erfolgte mit einem GWP von 25 für CH₄ und von 298 für N₂O. Zu den GWP-Werten siehe IPCC (2007).)

Table 9.1: GHG emissions of deer, rabbits, ostrich and fur-bearing animals

	CH ₄ (Gg a ⁻¹)	N ₂ O (Gg a ⁻¹)	CO _{2eq} (Gg a ⁻¹)
total	5.635	0.108	172.91
deer	5.348	0.085	159.11
rabbit	0.194	0.011	7.98
ostrich	0.043	0.003	1.83
fur-bearing animals	0.050	0.009	3.99

The estimates for NH₃ and NO (or NO_x) in the 2017 submission for NH₃ accounted for only 0.1% of total German emissions and for NO (or NO_x) for 0.01% of total German emissions (total emissions before each application of the adjustments, see Chapter 1). The Technical Expert Review Team of the 2017 NECD Review ranked the NH₃ and NO (or NO_x) emissions from the

Die Schätzwerte für NH₃ und NO (bzw. NO_x) betrugen in der Submission 2017 bei NH₃ lediglich 0,1 % der deutschen Gesamtemission und bei NO (bzw. NO_x) bei 0,01 % der deutschen Gesamtemission (Gesamtemission jeweils vor Anwendung der in Kapitel 1 erwähnten Adjustments). Das Technical Expert Review Team des NECD-Review der Submission 2017 stufte die NH₃- und NO-

other animals as below the significance threshold. Hence, these emissions did not have to be reported, which was in line with the GHG reporting.

Table 9.2 shows the summary of estimates for NH_3 and NO in the framework of submission 2019. Due to the N_2O emission factor modification mentioned above in the context of Table 9.1 (i.e., the associated increased N level in manure application of rabbits and fur animals) the emissions are higher by 2% for NH_3 and by 57% for NO (or NO_x) than the respective Submission 2017 values. Nevertheless, for both gases the impact on total German emissions is to be considered marginal; hence they are, furthermore, not reported.

(bzw. NO_x)-Emissionen der anderen Tiere als unterhalb der Signifikanzschwelle liegend ein. Damit mussten diese Emissionen – in Entsprechung zur THG-Berichterstattung – nicht berichtet werden.

Table 9.2 zeigt die Zusammenfassung der Schätzungen für NH_3 und NO im Rahmen von Submission 2019. Die Werte liegen wegen der oben im Kontext von Table 9.1 erwähnten Änderung des N_2O -Emissionsfaktors (d. h. wegen der damit verbundenen erhöhten N-Menge bei der Wirtschaftsdüngerausbringung von Kaninchen und Pelztieren) bei NH_3 um 2 % und bei NO (bzw. NO_x) um 57 % höher als die Schätzwerte der Submission 2017. Dennoch ist bei beiden Gasen die Auswirkung auf die deutschen Gesamtemissionen als geringfügig einzustufen, so dass weiterhin keine Berichterstattung erfolgt.

Table 9.2: NH_3 and NO emissions of deer, rabbits, ostrich and fur-bearing animals

	NH_3 (Gg a^{-1})	NO (Gg a^{-1})
total	0.746	0.123
deer	0.231	0.109
rabbit	0.239	0.007
ostrich	0.081	0.002
fur-bearing animals	0.195	0.006

9.2 Animal numbers / Tierplatzzahlen

In Germany there are no official statistics on population sizes of deer, rabbit, ostrich and fur animals.

Table 9.3 shows estimates made by the Federal Statistical Office (C. Schreiner, Federal Statistical Office, personal communication). These figures are interpreted as numbers of mean animal places occupied all year round (see Chapter 3.1.2.2). The FAO also provides figures for rabbits (looked up 28 November 2018, <http://www.fao.org/faostat/en/#data/QA>), but those figures are far lower than the figures estimated by the Federal Statistical Office. For this reason, the approach used here may be considered a conservative one.

In Deutschland gibt es für Gehegewild, Kaninchen, Strauße und Pelztiere keine offizielle Erhebung der Tierzahlen.

Table 9.3 zeigt Schätzungen des Statistischen Bundesamtes (C. Schreiner, Statistisches Bundesamt, pers. Mitteilung). Diese Zahlen werden als durchgängig belegte Tierplätze interpretiert (siehe Kapitel 3.1.2.2). Die FAO bietet für Kaninchen ebenfalls Zahlen an (Stand 28.11.2018, <http://www.fao.org/faostat/en/#data/QA>), die aber weit unter den nationalen Zahlen liegen. Daher ist der Ansatz, der hier gewählt wird, als konservativ einzustufen.

Table 9.3: Mean animal populations estimated by Federal Statistical Office

	population	source	Quelle
deer	264 500	federal-state associations for agricultural husbandry of deer, survey for 2008/2009	Landesverbände für landwirtschaftliche Wildtierhaltung, Umfrage im Zeitraum 2008/2009
rabbit	440 000	German association of producers of rabbit meat and rabbit fur	Bundesverband deutscher Kaninchenfleisch- und -wollerzeuger e.V.
ostrich	7 632	Animal Diseases Fund (2012)	Tierseuchenkasse (2012)
fur-bearing animals	63 500	Federal Ministry of Food, Agriculture and Consumer Protection (BMELV), 18 farms in 2012	Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV), 18 Pelztierfarmen in 2012

9.3 CH_4 from enteric fermentation / CH_4 aus der Verdauung

For ostrich no CH_4 emissions from enteric fermentation have been calculated, because IPCC (2006) does not provide a methodology. The emissions for deer, rabbit and fur-bearing animals have been calculated by multiplying the animal numbers with the respective emission factor.

Für Strauße wurden keine CH_4 -Emissionen aus der Verdauung berechnet, da IPCC (2006) keine Methodik angibt. Die Emissionsberechnung für Gehegewild, Kaninchen und Pelztiere erfolgte durch Multiplikation der Tierzahl mit dem entsprechenden Emissionsfaktor.

Für Gehegewild gibt IPCC (2006)-10.28, Table 10.10,

For deer the default CH₄ emission factor given in IPCC (2006)-10.28, Table 10.10, was used (20 kg pl⁻¹ a⁻¹).

IPCC (2006) does not provide an emission factor for rabbit. However, according to Footnote 1 of Table 10.10 in IPCC (2006)-10.28, the emission factor can be approximated by scaling the emission factor of an animal category with similar enteric digestion system with the ratio of animal weights raised to the power of 0.75. For such an estimate, the animal category of horses was chosen as horses are neither ruminants (like cattle, sheep or goats) nor omnivores (like pigs). According to IPCC (2006)-10.28, Table 10.10, the live weight of horses was chosen to be 550 kg. The rabbit weight was assumed to be 3.0 kg. This is the final live weight of fattened rabbit, see LfL Bayern [<http://www.lfl.bayern.de/ilt/tierhaltung/kleintiere/023092/>]. Using the CH₄ EF for horses (18 kg pl⁻¹ a⁻¹, IPCC (2006)-10.28, Table 10.10), the resulting CH₄ emission factor of rabbit is 0.36 kg pl⁻¹ a⁻¹.

For fur-bearing animals, the emission factor used by Estonia, Iceland, Latvia, Lithuania and Norway (see NIR 2017) has been adopted: 0.1 kg pl⁻¹ a⁻¹.

Table 9.4 shows the calculated annual emissions from enteric fermentation with deer, rabbit and fur-bearing animals (totals of the emissions all animals of the respective categories). The conversion of CH₄ to CO_{2eq} has been based on the GWP of given in IPCC (2007), which is 25.

einen CH₄-Default-Emissionsfaktor von 20 kg pl⁻¹ a⁻¹ an.

IPCC (2006) gibt keinen Emissionsfaktor für Kaninchen an. Laut Fußnote 1 zur Table 10.10, pg. 10.28, in IPCC (2006) kann der Emissionsfaktor aber approximiert werden, indem man eine Tierkategorie mit ähnlichem Verdauungssystem auswählt und deren Emissionsfaktor mithilfe des mit 0,75 potenzierten Verhältnisses der Tiergewichte skaliert. Für eine solche Schätzung wurde das Pferd als Vergleichstier gewählt, da es weder Wiederkäuer (Rind, Schaf, Ziege) noch Allesfresser (Schwein) ist. Nach IPCC (2006)-10.28, Table 10.10, wurde für das Pferdegewicht mit 550 kg pro Tier gerechnet. Das Kaninchengewicht wurde mit 3,0 kg angesetzt (Lebendengewicht eines Mastkaninchens, nach LfL Bayern [<http://www.lfl.bayern.de/ilt/tierhaltung/kleintiere/023092/>]). Mit dem CH₄-EF für Pferde (18 kg pl⁻¹ a⁻¹, IPCC (2006)-10.28, Table 10.10), ergab sich damit für Kaninchen ein CH₄-Emissionsfaktor von 0,36 kg pl⁻¹ a⁻¹.

Für Pelztiere wurde der von Estland, Island, Lettland, Litauen und Norwegen im NIR 2017 verwendete Emissionsfaktor übernommen: 0,1 kg pl⁻¹ a⁻¹.

Table 9.4 zeigt die berechneten jährlichen Emissionen aus der Verdauung bei Gehegewild, Kaninchen und Pelztieren (Summen der Emissionen aller Tiere einer Tierkategorie). Die Umrechnung in die Einheit CO_{2eq} erfolgte mit einem CH₄-GWP von 25. Zum GWP-Wert siehe IPCC (2007).

Table 9.4: CH₄ emissions from enteric fermentation of deer, rabbit and fur-bearing animals (GWP_{CH₄} = 25)

	EF (kg pl ⁻¹ a ⁻¹)	CH ₄ (Gg a ⁻¹)	CO _{2eq} (Gg a ⁻¹)
total		5.45	136.37
deer	20.00	5.29	132.25
rabbit	0.36	0.16	3.96
fur-bearing animals	0.10	0.0064	0.16

9.4 CH₄ from manure management and free range / CH₄ aus Wirtschaftsdünger-Management und Freiland

The default emission factors given in IPCC (2006)-10.83, Table 10A-9, have been used. The resulting emissions are given in Table 9.5. The conversion of CH₄ to CO_{2eq} has been based on the GWP of given in IPCC (2007), which is 25.

Es wurden die Default-Emissionsfaktoren aus IPCC (2006)-10.83, Table 10A-9, verwendet. Die resultierenden Emissionen sind Table 9.5 zu entnehmen. Die Umrechnung in die Einheit CO_{2eq} erfolgte mit einem CH₄-GWP von 25. Zum GWP-Wert siehe IPCC (2007).

Table 9.5: CH₄ from manure management (deer: free range) (GWP_{CH₄} = 25)

	EF (kg pl ⁻¹ a ⁻¹)	CH ₄ (Gg a ⁻¹)	CO _{2eq} (Gg a ⁻¹)
total		0.180	4.50
deer	0.22	0.058	1.45
rabbit	0.08	0.035	0.88
ostrich	5.67	0.043	1.08
fur-bearing animals	0.68	0.043	1.08

9.5 N emissions from housing and storage / N-Emissionen aus Stall und Lager

The calculation of N emissions from housing and storage requires the knowledge of N excretions, relative TAN contents and, where applicable, frequencies of the different husbandry systems. However, no such fre-

Zur Berechnung der N-Emissionen aus Stall und Lager wird die N-Ausscheidung, der TAN-Gehalt sowie ggf. die Aufteilung der Tierpopulation auf verschiedene Haltungssysteme benötigt. Solche Daten sind für Gehe-

quencies are known in Germany for deer, rabbit, fur-bearing animals and ostrich. For sake of simplicity it was assumed that deer is kept outdoor throughout the year, while rabbit, fur-bearing animals and ostrich are taken to stay in stables the whole year round.

9.5.1 Excretions of total N and TAN / Ausscheidungen von Gesamt-N und TAN

Neither IPCC (2006) nor EMEP (2016) provide a default value for the N excretions of deer. The German calculations have been based on the N excretion value reported by Denmark (16 kg pl⁻¹ a⁻¹) as it is assumed that conditions of deer husbandry in Denmark and Germany are comparable.

The IPCC default N excretions for rabbit is 8.1 kg pl⁻¹ a⁻¹, see IPCC (2006), pg. 10.59, Table 10.19. This value is unrealistically high as it is in the order of magnitude of the annual total of life weight gain.

This total of weight gain can be calculated as follows (based on data given by LfL Bayern (<http://www.lfl.bayern.de/ilt/tierhaltung/kleintiere/023092/>)): duration of fattening period of 87 days, i.e. about four production cycles per year, and final live weight of 3.0 kg per animal, leading to a total weight gain of 12 kg per place and year. Hence, the N excretions of rabbit have been estimated from the N balance:

$$N_{\text{excr, rabbit}} = n_{\text{round}} \cdot \Delta w_{\text{round}} \cdot (x_N \cdot x_{\text{XP, feed}} \cdot x_{\text{feed}} - x_{\text{N, ret}}) \quad (9.1)$$

$N_{\text{excr, rabbit}}$	N excretion of rabbit per animal place and year (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
n_{round}	number of production cycles per year (in animal pl ⁻¹ a ⁻¹)
Δw_{round}	total weight gain per production cycle (in kg animal ⁻¹)
x_N	N content of crude protein (1/6.25 kg kg ⁻¹)
$x_{\text{XP, feed}}$	content of crude protein in feed (fresh matter) (in kg kg ⁻¹)
x_{feed}	feed needed for animal weight gain (fresh matter) (in kg kg ⁻¹)
$x_{\text{N, ret}}$	specific N retention (kg kg ⁻¹)

In conservative manner, Δw_{round} was simply set equal to the final live weight (see above). The content of crude protein of the feed, $x_{\text{XP, feed}}$, was chosen to be 0.17 kg kg⁻¹ cf. http://www.meissner-widder-kaninchen.de/F_WERT_TAB1.html. The amount of feed (fresh matter) needed for animal weight gain is 3.5 kg kg⁻¹ (LfL Bayern).

According to DLG (2005), pg.12, $x_{\text{N, ret}}$ is 0.03 kg kg⁻¹. Using this data, the resulting N excretion is 0.8 kg pl⁻¹ a⁻¹.

Neither IPCC (2006) nor EMEP (2016) provide a default value for N excretions of ostrich. By analogy to the procedure for deer, the Danish value of ostrich N excretions has been adopted: 15,6 kg pl⁻¹ a⁻¹ N.

According to IPCC (2006)-10.59, Table 10.19, the default value of N excretions of minks is 4.59 kg pl⁻¹ a⁻¹. This value has been adopted for all fur-bearing animals.

For deer, rabbit and ostrich there are no data on the TAN content of N excretions. Hence the respective values given in EMEP (2016)-3B-29 for sheep, horses and geese have been used.

Table 9.6 gives an overview of N excretions and relative TAN contents used for the emission calculations.

gewild, Kaninchen, Pelztier und Strauße in Deutschland nicht bekannt. Es wurde daher vereinfachend für Gehegewild ganzjährige Freilandhaltung und für Kaninchen, Pelztier und Strauße eine ganzjährige Haltung in festmistbasierten Ställen angenommen.

Weder IPCC (2006) noch EMEP (2016) geben einen Default-Wert für die N-Ausscheidung von Gehegewild an. Für die deutschen Berechnungen wurde der Wert aus Dänemark verwendet (16 kg pl⁻¹ a⁻¹, NIR 2017), da davon ausgegangen wird, dass die Gehegewildhaltung in Dänemark und Deutschland vergleichbar ist.

Für Kaninchen gibt IPCC (2006), pg. 10.59, Table 10.19 eine Default-N-Ausscheidung von 8,1 kg pl⁻¹ a⁻¹ an. Dieser Wert erscheint unrealistisch hoch, da er in der Größenordnung des Gesamtzuwachses an Lebendmasse pro Tierplatz und Jahr liegt. Letzterer berechnet sich bei jährlich ca. vier Durchgängen (abgeleitet aus 87 Tagen Mastdauer nach LfL Bayern (<http://www.lfl.bayern.de/ilt/tierhaltung/kleintiere/023092/>)) und einem Lebendendgewicht von ca. 3 kg Tier⁻¹ (siehe ebenfalls LfL Bayern) zu rund 12 kg pl⁻¹ a⁻¹. Daher wurde die N-Ausscheidung von Kaninchen auf Grundlage der tierischen N-Bilanz geschätzt:

In konservativer Weise wurde Δw_{round} vereinfachend mit dem Mastendgewicht (siehe oben) gleichgesetzt. Der Rohproteingehalt des Futters, $x_{\text{XP, feed}}$, liegt nach http://www.meissner-widder-kaninchen.de/F_WERT_TAB1.html bei etwa 0,17 kg kg⁻¹. Der Futteraufwand x_{feed} (Frischmasse) beträgt ca. 3,5 kg kg⁻¹ (LfL Bayern). Laut DLG (2005), S.12, ist $x_{\text{N, ret}} = 0,03 \text{ kg kg}^{-1}$. Mit diesen Daten ergibt sich eine N-Ausscheidung von 0,8 kg pl⁻¹ a⁻¹.

Für Strauße geben weder IPCC (2006) noch EMEP (2016) einen Defaultwert für die N-Ausscheidung an. Für die deutschen Berechnungen wird auch hier der dänische Wert verwendet (NIR 2017): 15,6 kg pl⁻¹ a⁻¹.

Für Nerze gibt IPCC (2006)-10.59, Table 10.19, eine Default-N-Ausscheidung von 4,59 kg pl⁻¹ a⁻¹ an. Dieser Wert wurde für alle Pelztier übernommen.

Für Gehegewild, Kaninchen und Strauße liegen keine Daten zum TAN-Gehalt in der N-Ausscheidung vor. Daher wurden die Default-Werte für Schafe, Pferde und Gänse aus EMEP (2016)-3B-29 übernommen.

Table 9.6 zeigt die für die Emissionsberechnungen verwendeten N-Ausscheidungen und TAN-Gehalte.

Table 9.6: N excretions and TAN contents used for German emission estimates

	N_{excr} (kg pl ⁻¹ a ⁻¹)	TAN content (kg kg ⁻¹)	sources of TAN contents
deer	16	0.5	default for sheep, EMEP (2016)-3B-29
rabbit	0.8	0.6	default for horses, EMEP (2016)-3B-29
ostrich	15.6	0.7	default for geese, EMEP (2016)-3B-29
fur-bearing animals	4.59	0.6	default, EMEP (2016)-3B-29

9.5.2 NH_3 from housing and storage / NH_3 aus Stall und Lager

NH_3 emissions from housing are calculated by multiplying the amount of TAN excreted with the respective emission factor. The amount of TAN excreted is the product of N excretion and relative TAN content of the N excretion (see Chapter 9.5.1). Due to lack of data, N contributions by use of bedding material could not be taken into account.

NH_3 emissions from storage are proportional to the amount of TAN available after subtracting the N losses by NH_3 emissions from housing. The factor of proportionality is the emission factor of the storage.

No NH_3 emission factors are available for rabbit and ostrich. Hence, the EMEP NH_3 emission factors EMEP (2016)-3B-29 for horses and geese have been used. For deer there are no NH_3 emissions from housing and storage as deer is presumably kept outdoor all year round. Table 9.7 shows the emission factors used. Table 9.8 shows the resulting emissions as totals of all animals in the respective animal categories.

Die NH_3 -Emissionen aus dem Stall wurden durch Multiplikation der ausgeschiedenen TAN-Menge mit dem entsprechenden Emissionsfaktor berechnet. Dabei ist die TAN-Menge das Produkt aus der N-Ausscheidung und deren relativem TAN-Gehalt (siehe Kapitel 9.5.1). Stickstoffeinträge aus Einstreu konnten mangels Daten nicht berücksichtigt werden.

Die NH_3 -Emissionen aus dem Lager sind proportional zur TAN-Menge, die nach Abzug der N-Verluste aufgrund der NH_3 -Emissionen aus dem Stall verbleibt. Als Proportionalitätsfaktor dient der Lager-Emissionsfaktor.

Für Kaninchen und Strauße sind keine NH_3 -N-Emissionsfaktoren verfügbar. Es wurden die Default-Werte für Pferde und Gänse aus EMEP (2016)-3B-29 übernommen. Für Gehegewild entsteht keine NH_3 -Emission aus Stall oder Lager, da ganzjährige Freilandhaltung unterstellt wurde. Die verwendeten Emissionsfaktoren sind in Table 9.7 aufgelistet. Table 9.8 zeigt die resultierenden NH_3 -Emissionen aller Tiere der jeweiligen Tierkategorie.

Table 9.7: NH_3 emission factors for housing and storage in kg NH_3 -N per kg TAN

	EF housing (kg kg ⁻¹)	EF storage (kg kg ⁻¹)	sources
rabbit	0.22	0.35	default for horses, EMEP (2016)-3B-29
ostrich	0.57	0.16	default for geese, EMEP (2016)-3B-29
fur-bearing animals	0.27	0.09	default, EMEP (2016)-3B-29

Table 9.8: NH_3 emissions from housing and storage

	NH_3 housing (Gg a ⁻¹)	NH_3 storage (Gg a ⁻¹)
total	0.171	0.091
rabbit	0.056	0.070
ostrich	0.058	0.007
fur-bearing animals	0.057	0.014

9.5.3 Direct N_2O from housing and storage / Direktes N_2O aus Stall und Lager

For rabbit and fur-bearing animals, the direct N_2O emissions from housing and storage have been calculated by multiplying the number of animal places with the N excretion per animal place and year, the IPCC default emission factor for N_2O -N from solid manure (0.005 kg kg⁻¹, see IPCC (2006)-10.63, Table 10.21) and the ratio of molecular weights of N_2O and N (44/28). Due to lack of data, N contributions by use of bedding material could not be taken into account.

The emissions of ostrich were calculated by analogy using the IPCC default emission factor for N_2O -N of 0.001 kg kg⁻¹. For deer there are no N_2O emissions from housing and storage as deer is presumably kept outdoor all year round.

Die Berechnung der direkten N_2O -Emissionen aus Stall und Lager für Kaninchen und Pelztiere erfolgte durch Multiplikation der Tierplatzzahl mit der jährlichen N-Ausscheidung pro Platz, dem IPCC-Defaultwert für den N_2O -N-Emissionsfaktor für Festmist (0,005 kg kg⁻¹, siehe IPCC (2006)-10.63, Table 10.21) und dem Molgewichtsverhältnis von N_2O zu N (44/28). Stickstoffeinträge aus Einstreu konnten mangels Daten nicht berücksichtigt werden.

Die Berechnung für Strauße erfolgte analog; als N_2O -N-Emissionsfaktor wurde der IPCC-Defaultwert 0,001 kg kg⁻¹ verwendet. Für Gehegewild entstand im Bereich Stall/Lager keine N_2O -Emission, da ganzjährige Freilandhaltung unterstellt wurde.

The conversion of N_2O to $\text{CO}_{2\text{eq}}$ is based on the GWP of given in IPCC (2007), which is 298.

Die Umrechnung in die Einheit $\text{CO}_{2\text{eq}}$ erfolgte mit einem GWP von 298. Zum GWP-Wert siehe IPCC (2007).

Table 9.9: Direct N_2O emissionen from housing/storage ($\text{GWP}_{\text{N}_2\text{O}} = 298$)

	N_2O (Gg a^{-1})	$\text{CO}_{2\text{eq}}$ (Gg a^{-1})
total	0.005	1.56
rabbit	0.003	0.82
ostrich	0.0002	0.06
fur-bearing animals	0.002	0.68

9.5.4 NO and N_2 from housing and storage / NO und N_2 aus Stall und Lager

Emissions of NO and N_2 were calculated by analogy the calculations for the direct N_2O emissions from housing/Storage (see Chapter 9.5.3). Like for other animal categories (see Chapter 3.3.4.3.5), the emission factor for NO-N is assumed to be ten percent of the N_2O -N emission factor: 0.0005 kg kg^{-1} for rabbit and fur-bearing animals and 0.0001 kg kg^{-1} for ostrich. According to Chapter 3.3.4.3.5 the emission factor for N_2 is assumed to be thrice the N_2O -N emission factor: 0.015 kg kg^{-1} for rabbit and fur-bearing animals and 0.003 kg kg^{-1} for ostrich. For deer there are no emissions of NO and N_2 from housing and storage as deer is presumably kept outdoor all year round.

In the same way, the resulting emissions of NO-N and N_2 are proportional to N_2O -N emissions. Those N_2O -N emissions can be derived from the N_2O emissions presented in Chapter 9.5.3 by multiplying with the ratio of the molar weights (28/44).

Die Berechnung der Emissionen von NO und N_2 erfolgte analog zur Berechnung der direkten N_2O -Emissionen aus Stall/Lager (siehe Kapitel 9.5.3). Der NO-N-Emissionsfaktor wurde wie bei den anderen Tieren (siehe Kapitel 3.3.4.3.5) mit zehn Prozent des N_2O -N-Emissionsfaktors angesetzt: 0,0005 kg kg^{-1} für Kaninchen und Pelztiere bzw. 0,0001 kg kg^{-1} für Strauße. Für N_2 wurde nach Kapitel 3.3.4.3.5 das Dreifache des N_2O -N-Emissionsfaktors verwendet: 0,015 kg kg^{-1} für Kaninchen und Pelztiere bzw. 0,003 kg kg^{-1} für Strauße. Für Gehegewild entstanden im Bereich Stall/Lager keine NO- und N_2 -Emissionen, da ganzjährige Freilandhaltung unterstellt wurde.

Die berechneten NO-N und N_2 -Emissionen verhalten sich in den gleichen Verhältnissen zu den N_2O -N-Emissionen. Diese N_2O -N-Emissionen können aus den in Kapitel 9.5.3 angegebenen N_2O -Emissionen durch Multiplikation mit dem Molgewichtsverhältnis 28/44 abgeleitet werden.

9.5.5 Indirect N_2O from housing and storage / Indirektes N_2O aus Stall und Lager

Like for other animal categories (see Chapter 3.3.4.3.6), indirect N_2O emissions have been calculated only for the source "deposition of reactive nitrogen" (due to emissions of NH_3 and NO from housing and storage, see Chapters 9.5.2 und 9.5.4). The emission factor is 0.01 kg kg^{-1} N_2O -N (IPCC(2006)-11.24, Table 11.3).

For deer there are no such emissions as deer is presumably kept outdoor all year round.

Table 9.10 shows the resulting indirect N_2O emissions as well as the underlying amount of reactive nitrogen (N_{reac}).

Wie bei den anderen Tieren (siehe Kapitel 3.3.4.3.6) wurden nur die indirekten N_2O -Emissionen infolge der Deposition reaktiven Stickstoffs aus NH_3 - und NO-Emissionen aus Stall und Lager (siehe Kapitel 9.5.2 und 9.5.4) berechnet. Der Emissionsfaktor wurde mit 0,01 kg kg^{-1} N_2O -N angesetzt (IPCC(2006)-11.24, Table 11.3).

Für Gehegewild entfiel die Berechnung, da es sich angenommenerweise ganzjährig im Freien aufhält.

Die resultierenden indirekten N_2O -Emissionen sind in Table 9.10 wiedergegeben, ebenso wie die zugrunde liegende Menge an reaktivem Stickstoff (N_{reac}).

Table 9.10: Indirect N_2O from deposition of reactive N from NH_3 and NO lost from housing and storage ($\text{GWP}_{\text{N}_2\text{O}} = 298$)

	N_{reac} (Gg a^{-1})	N_2O (Gg a^{-1})	$\text{CO}_{2\text{eq}}$ (Gg a^{-1})
total	0.2164	0.00340	1.01
rabbit	0.1043	0.00164	0.49
ostrich	0.0533	0.00084	0.25
fur-bearing animals	0.0589	0.00092	0.28

9.6 NH₃ from spreading and free range / NH₃ aus Ausbringung und Freilandaufenthalt

Table 9.11 shows the NH₃-N emission factors used. The resulting NH₃ emissions are given in Table 9.12.

Table 9.11 zeigt die verwendeten NH₃-N-Emissionsfaktoren, Table 9.12 die resultierenden NH₃-Emissionen.

Table 9.11: NH₃ emission factors for spreading and free range in kg NH₃-N per kg TAN

	EF spreading (kg kg ⁻¹)	EF free range (kg kg ⁻¹)	sources
deer	-	0.09	default for sheep, EMEP (2016)-3B-29
rabbit	0.90	-	default for horses, EMEP (2016)-3B-29
ostrich	0.45	-	default for geese, EMEP (2016)-3B-29
fur-bearing animals	0.90	-	default for horses, EMEP (2016)-3B-29

Table 9.12: NH₃ from spreading and/or free range in Gg NH₃ per year

	NH ₃ spreading (Gg a ⁻¹)	NH ₃ free range (Gg a ⁻¹)
total		0.484
deer	-	0.231
rabbit	0.113	-
ostrich	0.016	-
fur-bearing animals	0.124	-

9.7 N₂O from agricultural soils / N₂O aus landwirtschaftlichen Böden

9.7.1 Direct N₂O / Direktes N₂O

Spreading of manure of rabbit, ostrich and fur-bearing animals as well as N excretions by deer lead to direct N₂O emissions from agricultural soils.

For spreading of manure, the emissions have been calculated by multiplying the amounts of N left after subtracting the N losses from housing and storage (by emissions of NH₃, N₂O, NO und N₂) with the IPCC default emission factor emission factor EF₁ (0.01 kg N₂O-N pro kg N, IPCC (2006)-11.11, Table 11.1) and the ratio of molculare weights of N₂O and N (44/28).

The emissions caused by N excretions of deer have been calculated by multiplying the number of animals with the TAN excretion per animal place and year, the N₂O-N emission factor for grazing/pasture and the ratio of molculare weights of N₂O and N (44/28). Tan excretion ist the product of N excretion and relative TAN content. It has been assumed that the IPCC default emission factor for sheep and other animals (see IPCC (2006)-11.11, Table 11.1) can be used: EF_{3PRP,SO} = 0.01 kg N₂O-N per kg of N excretion.

Table 9.13 shows the amounts of N that, being multiplied with the pertaining emission factors and the ratio of molculare weights of N₂O and N (44/28), lead to the emissions also given in Table 9.13. The conversion of N₂O to CO_{2eq} has been based on the GWP of given in IPCC (2007), which is 298.

Die Ausbringung des Wirtschaftsdüngers von Kaninchen, Straußen und Pelztieren sowie die N-Ausscheidungen von Gehegewild führen zu direkten N₂O-Emissionen aus landwirtschaftlichen Böden.

Die Emissionen durch Wirtschaftsdünger-Ausbringung wurden berechnet, indem die jeweilige N-Menge, die nach N-Verlusten (als NH₃, N₂O, NO und N₂) aus Stall und Lager noch zur Verfügung steht, mit dem IPCC-Default-Emissionsfaktor EF₁ (0,01 kg N₂O-N pro kg N, IPCC (2006)-11.11, Table 11.1) und dem Molgewichtsverhältnis 44/28 multipliziert wurde.

Die durch das Gehegewild verursachte N₂O-Emission ergab sich, indem die Tierzahl mit der TAN-Ausscheidung, dem N₂O-N-Emissionsfaktor für Weidegang und dem Molgewichtsverhältnis 44/28 multipliziert wurde. Dabei ist die TAN-Menge das Produkt aus der N-Ausscheidung und deren relativem TAN-Gehalt. Als Emissionsfaktor wurde gemäß IPCC (2006)-11.11, Table 11.1, der EF_{3PRP,SO} für Schafe und andere Tiere angewendet (0,01 kg N₂O-N pro kg N-Ausscheidung).

Table 9.13 zeigt die N-Menge, deren Multiplikation mit dem jeweiligen Emissionsfaktor und dem Molgewichtsverhältnis 44/28 zur ebenfalls angegebenen Emission führt. Die Umrechnung von N₂O in die Einheit CO_{2eq} erfolgte mit einem GWP von 298. Zum GWP-Wert siehe IPCC (2007).

Table 9.13: Direct N₂O from soils after spreading and (for deer) free-range N excretions (GWP_{N2O} = 298)

	N (Gg a ⁻¹)	N ₂ O (Gg a ⁻¹)	CO _{2eq} (Gg a ⁻¹)
total	4.765	0.0749	22.31
deer	4.232	0.0665	19.82
rabbit	0.241	0.0038	1.13
ostrich	0.065	0.0010	0.31
fur-bearing animals	0.227	0.0036	1.06

9.7.2 Indirect N₂O / Indirektes N₂O

Indirect N₂O emissions from agricultural soils were calculated using the amounts of deposition of reactive nitrogen originating from emissions of NH₃-N and NO-N from N excreted by deer in the free range as well as manure spreading. These emissions are calculated in Chapters 9.5.2 and 9.5.4).

The NO-N emissions from free-range husbandry of deer and from spreading of manure of rabbits, ostrich, and fur-bearing animals are calculated by analogy to Chapter 11.5.2, i. e. with the emission factor derived by STEHFEST & BOUWMAN (2006) (0.012 kg NO-N per kg of nitrogen available).

Table 9.14 shows the calculated deposition of reactive nitrogen (N_{reac}) as well as the resulting indirect N₂O emissions. The emission factor used for indirect N₂O was taken from IPCC (2006a)-11.24, Table 11.3: EF₄ = 0.01 kg N₂O-N per kg N_{reac}.

The conversion of N₂O to CO_{2eq} has been based on the GWP of given in IPCC (2007), which is 298.

Zur Berechnung der indirekten Emissionen aus der Deposition von reaktivem N werden die NH₃-N-Emissionen aus dem Gehegewild-Freilandaufenthalt und der Ausbringung von Wirtschaftsdünger sowie die entsprechenden NO-N-Emissionen benötigt (siehe dazu Kapitel 9.5.2 und 9.5.4).

Die NO-N-Emissionen aus dem Gehegewild-Freilandaufenthalt sowie aus der Wirtschaftsdünger-Ausbringung von Kaninchen, Straußen und Pelztieren werden analog zu Kapitel 11.5.2 mit dem von STEHFEST & BOUWMAN (2006) abgeleiteten Emissionsfaktor 0,012 kg NO-N pro kg verfügbaren Stickstoffs berechnet.

Die resultierende Deposition von reaktivem Stickstoff (N_{reac}) sowie die daraus folgenden indirekten N₂O-Emissionen sind in Table 9.14 wiedergegeben, wobei nach IPCC (2006a)-11.24, Table 11.3, der Emissionsfaktor EF₄ = 0,01 kg N₂O-N pro kg N_{reac} verwendet wurde.

Die Umrechnung von N₂O in die Einheit CO_{2eq} erfolgte mit einem GWP von 298. Zum GWP-Wert siehe IPCC (2007).

Table 9.14: Indirect N₂O from deposition of reactive N from NH₃ and NO lost during spreading or (for deer) from free-range N excretions (GWP_{N₂O} = 298)

	N _{reac} (Gg a ⁻¹)	N ₂ O (Gg a ⁻¹)	CO _{2eq} (Gg a ⁻¹)
total	0.456	0.0072	2.13
deer	0.241	0.0038	1.13
rabbit	0.096	0.0015	0.45
ostrich	0.014	0.0002	0.07
fur-bearing animals	0.104	0.0016	0.49

The indirect emissions caused by leaching or surface runoff N were calculated by multiplying the amount of N applied to the soil (N_{applied}) with Frac_{Leach} (0.3 kg kg⁻¹ according to IPCC (2006)-11.24, Table 11.3) and the emission factor EF₅ = 0.0075 kg N₂O-N per kg of N available (IPCC (2006)-11.24, Table 11.3).

Die indirekten Emissionen als Folge von Auswaschung/Oberflächenabfluss wurden berechnet, indem die auf den Boden ausgebrachte N-Menge (N_{applied}) mit mit Frac_{Leach} (0,3 kg kg⁻¹ nach IPCC (2006)-11.24, Table 11.3) und dem Emissionsfaktor EF₅ = 0,0075 kg N₂O-N pro kg an verfügbarem N (IPCC (2006)-11.24, Table 11.3) multipliziert wurde.

Table 9.15: Indirect N₂O from soils due to leaching and runoff (GWP_{N₂O} = 298)

	N _{applied} (Gg a ⁻¹)	N ₂ O (Gg a ⁻¹)	CO _{2eq} (Gg a ⁻¹)
total	4.765	0.0168	5.02
deer	4.232	0.0150	4.46
rabbit	0.241	0.0009	0.25
ostrich	0.065	0.0002	0.07
fur-bearing animals	0.227	0.0008	0.24

10 Digestion of energy crops / Vergärung von Energiepflanzen

In general, energy crops are digested along with animal manures. However, the emission calculations are done separately for the digestion of manure and energy crops in order to be able to report these emissions separately (for manure see Chapter 3.3.4.4). This is important with respect to emissions of NH_3 and NO from storage and spreading of digestate of energy crops. These emissions were not included in the negotiations for the emission ceilings currently being in force (NEC, see Chapter 1). As of Submission 2016 the emissions of NH_3 and NO from storage and spreading of digestate of energy crops are included in emission reporting from agriculture; however, they are subtracted from the national total emissions by a so-called adjustment before the national totals are checked for compliance with the emission ceilings, see Chapter 1.

The calculation of emissions originating from anaerobic digestion of energy crops is based on a national concept (HAENEL und WULF, 2016), that represents a widened version of the IPCC concept for green house gas emissions and an approach for NH_3 emissions that works by analogy to the green house gas concept.

The calculation of emissions of N_2O , NO and N_2 from agricultural soils after spreading of digestate of energy crops is described in Chapter 11.3.

Energiepflanzen werden in aller Regel zusammen mit Wirtschaftsdünger vergoren. Für das Inventar werden die Emissionen dieser beiden Substratkategorien aber separat berechnet, um sie getrennt ausweisen zu können (zu Wirtschaftsdünger siehe Kapitel 3.3.4.4). Dies ist im Hinblick auf die NH_3 - und NO -Emissionen aus der Lagerung und Ausbringung von Energiepflanzen-Gärresten erforderlich, da diese Emissionen bei der Aushandlung gegenwärtig geltender Emissionshöchstgrenzen (NEC, siehe Kapitel 1) nicht mit einbezogen wurden. Ab Submission 2016 werden die NH_3 - und NO -Emissionen aus der Lagerung und Ausbringung von Energiepflanzen-Gärresten zusammen mit den übrigen Emissionen aus der Landwirtschaft berichtet; sie werden aber durch ein so genanntes Adjustment subtrahiert, bevor die Prüfung der berichteten Emissionen auf Einhaltung der Emissionsobergrenzen erfolgt, s. Kapitel 1.

Die Methodik der Emissionsberechnung für die Vergärung von Energiepflanzen basiert auf einem nationalen Konzept (HAENEL und WULF, 2016), das im Bereich der Treibhausgase eine Erweiterung des IPCC-Konzeptes darstellt und für NH_3 einen analogen Ansatz ableitet.

Die Berechnung der bei der Gärreste-Ausbringung entstehenden N_2O , NO und N_2 -Emissionen aus landwirtschaftlichen Böden wird in Kapitel 11.3 beschrieben.

10.1 Activity data and parameters / Aktivitätsdaten und Parameter

The activity data covers the six energy-crop categories that are the most important in Germany in terms of quantities: corn silage, grass silage, whole-plant silage, wheat grain, rye grain and Corn Cob Mix (CCM). They differ only slightly in terms of their key characteristics (N and VS content in dry matter, maximum methane formation potential B_0 , cf. KTBL (2019a)). This makes it possible to treat the total dry matter for all included energy crops as a single energy-crop category.

The amounts of N and VS contained in the energy crops fed into the digester are needed as time series on national and federal-state level. They have to be calculated from the amounts of substrates used for digestion. At the time being, there is not yet a fully developed strategy of data collecting by KTBL, TI, DBFZ and UBA. Hence, the amounts of substrates (in fresh matter) have been estimated by KTBL (2019a) for the most important energy crops (see above) on federal-state level for the entire time series 1990 – 2014, see Chapter 3.4.4.1. Based on the properties of the substrates (fresh-matter content, contents of N and VS, B_0 ; data provided by KTBL), weighted averaging led to mean properties valid for the overall category “energy crops” for all years and federal states (related to dry matter): N content 1.48 %, VS content 94.7 %, $B_0 = 0.36 \text{ m}^3$ per kg VS. Note that this B_0 value has already been converted in order to be consistent with the IPCC default of methane density ((0.67 kg m^{-3}) rather than the methane norm density (0.72 kg m^{-3}).

Bei den Aktivitätsdaten werden die in Deutschland mengenmäßig relevanten sechs Energiepflanzen-Kategorien Maissilage, Grassilage, Ganzpflanzensilage, Weizenkorn, Roggenkorn und Maiskolbenschat (Corn-Cob-Mix, CCM) berücksichtigt. Sie unterscheiden sich nur wenig in ihren wesentlichen Eigenschaften (N- und VS-Gehalt der Trockenmasse, maximales Methanausbeute-Potenzial B_0 , siehe KTBL (2019a)). Damit kann die Gesamttrockenmasse dieser Energiepflanzen als eine einzige Energiepflanzenkategorie behandelt werden.

Die in den zu vergärenden Energiepflanzen enthaltenen N- und VS-Mengen werden als Zeitreihen auf Bundesländer- und Bundesebene benötigt. Sie müssen aus den Mengen der eingesetzten Substrate berechnet werden. Da es zwischen KTBL, TI-LR, DBFZ und UBA noch keine abgestimmte Strategie zur Datengewinnung gibt, hat KTBL (2019a) die Einsatzmengen (Frischmassen) der wichtigsten vergorenen Energiepflanzen (siehe oben) differenziert nach Bundesländern und Jahren abgeschätzt, siehe dazu auch Kapitel 3.4.4.1. Mithilfe der Eigenschaften dieser Substrate (Trockenmasse-Gehalt, N- und VS-Gehalt, B_0 ; Daten von KTBL) lassen sich durch gewichtete Mittelung für alle Jahre und Bundesländer einheitliche Eigenschaften für die Sammelkategorie „Energiepflanzen“ ableiten (auf Trockenmasse bezogen): N-Gehalt 1,48 %, VS-Gehalt 94,7 %, $B_0 = 0,36 \text{ m}^3$ pro kg VS. B_0 wurde hierzu bereits von der CH_4 -Normdichte ($0,72 \text{ kg m}^{-3}$) auf die im Inventar gebräuchliche IPCC-Dichte ($0,67 \text{ kg m}^{-3}$) umgerechnet.

Table 10.1 shows the time series of total dry matter and of the amounts of N and VS used in the inventory calculations.

Table 10.1 zeigt die Zeitreihen der im Inventar berücksichtigten Gesamttrockenmassen, VS- und N-Mengen.

Table 10.1: Digestion of energy crops, activity data (in Gg a⁻¹)

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
total dry mass	3.4	8.3	11.2	14.6	18.0	43.9	73.2	92.7	209.9	239.2
VS	3.2	7.9	10.6	13.9	17.1	41.6	69.3	87.8	198.7	226.5
N	0.05	0.12	0.17	0.22	0.27	0.66	1.1	1.4	3.1	3.6
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
total dry mass	380.8	541.8	781.0	927.5	1205.5	3215.6	4509.4	6165.0	7194.2	9232.8
VS	360.5	513.0	739.5	878.1	1141.4	3045.8	4268.5	5837.4	6813.2	8743.4
N	5.7	8.1	11.7	13.9	18.1	47.2	67.4	91.8	106.8	137.2
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
total dry mass	11618.6	14491.6	15870.4	19193.6	20089.5	20865.3	20749.5	20410.5	20505.0	
VS	11002.5	13724.1	15030.6	18182.1	19030.8	19766.4	19657.6	19334.3	19423.7	
N	172.7	215.1	235.1	283.1	296.4	307.6	305.7	301.3	302.7	

KTBL (2019a) estimates the upper limit of the uncertainty of the substrate inputs to be $\pm 10\%$ (95 % confidence interval, normal distribution). This value is used in the inventory for the amounts of dry matter, VS and N.

KTBL (2019a) schätzt die Obergrenze der Unsicherheit des Substratinputs mit $\pm 10\%$ (95 %-Konfidenzintervall, Normalverteilung). Das Inventar verwendet diesen Wert für Trockenmasse, VS- und N-Menge.

Table 10.2 shows, as German mean values, the fractions of gas-tight storage of residues of energy-crop digestion, as percentages of the pertinent input fresh mass. However, for the emission calculations the corresponding data on federal-state level were used. They are used as percentages of the amounts of N contained in the animal manures fed into the digester. These percentages were also applied to amounts of VS contained in the animal manures.

The data on gastight storage of digestate of energy crops differ somewhat from those for storage of digestate of animal manures (see Chapter 3.4.4.2.1). The reason for this is (KTBL, 2019a) that the total fraction of energy crops, with respect to the manure / energy-crop substrate mix, increases with plant (i.e. facility) size (a relationship that also holds for the covered-system fraction of systems for storage of digestion residues).

The marked increase of the use of gastight storage of digestate from 2011 to 2012 is seen as a consequence of the Renewable Energy Act 2012 that prescribes gastight coverage for all storages of digestate that are put into operation as of 1 January 2012. As no value is available for 2017, the 2016 value was kept for 2017.

Table 10.2 zeigt als Mittelwerte für die Deutschlandebene die Anteile der gasdichten Lagerung von Energiepflanzen-Gärresten. Für die Emissionsberechnung wurden die entsprechenden Daten auf Bundesländerebene verwendet. Die Werte stellen prozentuale Anteile der N-Mengen dar, die in den Substratmengen enthalten sind, die in die Vergärung gehen. Diese Prozentangaben wurden wie beim Wirtschaftsdünger auch für die VS-Mengen übernommen.

Die Anteile der gasdichten Lagerung von Energiepflanzen-Gärresten unterscheiden sich etwas von denen bei der Lagerung von Wirtschaftsdünger-Gärresten (siehe Kapitel 3.4.4.2.1). Dies ist darauf zurück zu führen (KTBL, 2019a), dass der Gesamtanteil von Energiepflanzen am Substratmix Wirtschaftsdünger/Energiepflanzen mit der Anlagengröße zunimmt, was auch für den Abdeckungsgrad der Gärrestelager gilt.

Der starke Anstieg in der Verbreitung der gasdichten Gärrestlagerung von 2011 zu 2012 wird auf das Energieeinspeisegesetz 2012 zurück geführt, das für alle Gärrestlager, die ab 1. Januar 2012 in Betrieb genommen wurden, eine gasdichte Abdeckung vorschreibt. Da für 2017 kein Wert verfügbar war, wurde der Wert von 2016 beibehalten.

Table 10.2: Digestion of energy crops, percentages of storage types of energy-plant digestate (in %)

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
gastight	0.0	0.9	1.9	2.8	3.8	4.7	5.7	6.6	7.5	8.5
non-gastight	100.0	99.1	98.1	97.2	96.2	95.3	94.3	93.4	92.5	91.5
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
gastight	9.4	10.4	11.3	12.8	14.3	15.8	21.1	26.4	31.7	37.0
non-gastight	90.6	89.6	88.7	87.2	85.7	84.2	78.9	73.6	68.3	63.0
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
gastight	42.2	47.5	59.4	61.9	63.9	64.6	64.8	64.5	64.5	
non-gastight	57.8	52.5	40.6	38.1	36.1	35.4	35.2	35.5	35.5	

A range of different application methods and different incorporation times are used for the field application of energy-crop digestate. The frequencies of the spreading of digestates from the anaerobic digestion of animal manures are adopted, see Chapter 3.4.3.4.

Die Ausbringung der Energiepflanzen-Gärreste erfolgt mit verschiedenen Techniken und Einarbeitungszeiten, deren Häufigkeiten von der Ausbringung von Gärresten aus der Vergärung von Wirtschaftsdünger übernommen werden (siehe Kapitel 3.4.3.4).

10.2 Calculation of emissions / Emissionsberechnung

10.2.1 Methodological Aspects and emission factors / Methodische Aspekte und Emissionsfaktoren

Emissions are calculated by analogy to the respective procedures for farmyard manure, see Chapters 3.3.4.4 and 3.4.4.2. There one can also find information on the emission factors. For the activity data see chapter 10.1. Despite the prevailing co-fermentation of farmyard manure and energy crops, the calculation for energy crops is separate from that for manure.

Die Emissionsberechnungen erfolgen analog zu den entsprechenden Berechnungen für Mist, siehe Kapitel 3.3.4.4 und 3.4.4.2. Dort finden sich auch Angaben zu den Emissionsfaktoren. Zu den Aktivitätsdaten siehe Kapitel 10.1. Trotz der in der Praxis vorherrschenden Ko-Fermentierung von Wirtschaftsdünger und Energiepflanzen erfolgt die Berechnung für die Energiepflanzen getrennt von der für Wirtschaftsdünger.

However, unlike farmyard manure, emissions from pre-storage can be neglected for energy crops (which is achieved by using emission factors that are zero): Energy crops are stored as silage. This storage aims, among other things, at inhibiting the gas exchange with the environment. The procedure of silaging is connected with a high degree of dryness which suppresses the formation of CH_4 . In order to ensure conservation of the silage a low pH value is achieved, which counteracts the development of NH_3 . In addition, no N_2O is formed, because during the fermentation of lactic acid no nitrate can be formed. As in the inventory NO emissions are calculated proportionally to N_2O (see Chapter 3.3.4.3.5) and no N_2O emissions can develop in the silage storage, there is no calculation of NO emissions from the storage.

Anders als bei Mist können bei Energiepflanzen die Emissionen aus dem Vorlager vernachlässigt werden (d. h. die Emissionsfaktoren auf null gesetzt werden): Energiepflanzen werden in Form von Silage derart gelagert, dass der Gasaustausch mit der Umgebung möglichst unterbunden wird. Ein prozesstechnisch erforderlicher hoher Trockenheitsgrad unterdrückt die Bildung von CH_4 . Die im Silagelager zu Konservierungszwecken unabdingbare Absenkung des pH-Wertes steht der Entwicklung von NH_3 entgegen. Es entsteht auch kein N_2O , da bei der im Silagelager stattfindenden Milchsäuregärung kein Nitrat entstehen kann. Entsprechend dem Inventar-Ansatz, dass NO-Emissionen proportional zu N_2O berechnet werden (siehe Kapitel 3.3.4.3.5), entfällt damit auch die Berechnung von NO-Emissionen.

As with farmyard manure, the digestion of energy crops also takes into account the fact that organic matter is broken down in the fermenter (especially protein compounds), which leads to the mineralization of organic nitrogen and thus to an increase in the relative TAN content. However, since the nitrogen in the energy plants fed into the digestion process is initially only in organic form, energy plants can not be assigned a TAN content (TAN_{dig}) when they enter the fermenter. Hence, based on KTBL (2013a), pg. 252 (table line: „Nawaro, flüssig“), it is assumed that after anaerobic digestion (i. e. in the digestate) about 56 % of total N is present as TAN. As a consequence, the equations given for digestion of manure in Chapter 3.3.4.4.3 can be used for digestion of energy crops as well (with $\text{TAN}_{\text{dig}} = 0$, $N_{\text{org, dig}} = N_{\text{total, dig}}$ and $g_{\text{TAN}} = 0.56 \text{ kg kg}^{-1}$).

Wie bei Mist wird auch bei der Vergärung von Energiepflanzen berücksichtigt, dass im Fermenter organische Substanz abgebaut wird (speziell Eiweißverbindungen), was zur Mineralisierung von organischem Stickstoff und damit zu einem Anstieg des relativen TAN-Gehaltes führt. Da aber der Stickstoff in den zur Vergärung vorgesehenen Energiepflanzen zunächst nur in organischer Form vorliegt, kann Energiepflanzen beim Eintritt in den Fermenter kein TAN-Gehalt (TAN_{dig}) zugeordnet werden. Es wird daher nach KTBL (2013a), S. 252 (Tabellenzeile „Nawaro, flüssig“) angenommen, dass nach der Vergärung (d. h. in den Gärresten) ein Anteil von 56 % des vorhandenen Gesamt-N als TAN vorliegt. Damit sind auch für die Energiepflanzen-Vergärung die Gleichungen in Kapitel 3.3.4.4.3 anwendbar, wobei $\text{TAN}_{\text{dig}} = 0$, $N_{\text{org, dig}} = N_{\text{total, dig}}$ und $g_{\text{TAN}} = 0,56 \text{ kg kg}^{-1}$ zu setzen ist.

There are no N losses from fermenter, see Chapter 3.3.4.4.2 for N_2O , NO and N_2 as well as Chapter 3.3.4.4.3 for NH_3 .

Aus dem Fermenter gibt es keine N-Verluste, siehe dazu Kapitel 3.3.4.4.2 für N_2O , NO und N_2 sowie Kapitel 3.3.4.4.3 für NH_3 .

N_2 emissions are calculated for the storage, as the associated N losses affect the amount of N in the digestates to be applied and thus the N emissions resulting from application. In contrast, the N_2 emissions resulting from application are not calculated because they do not influence other N emissions in the given calculation

N_2 -Emissionen werden für das Lager berechnet, da die damit verbundenen N-Verluste die N-Menge in den auszubringenden Gärresten und damit die ausbringungsbedingte N-Emissionen beeinflussen. Die als Folge der Ausbringung entstehenden N_2 -Emissionen werden dagegen nicht berechnet, weil sie im gegebenen Be-

concept and therefore do not need to be reported.

Taking into account the methodological aspects described above, there is a need to calculate the following emissions:

Digester

- CH₄, via leakage

Storage

- CH₄, via leakage
- direct N₂O as well as NO and N₂
- indirect N₂O resulting from deposition of NH₃ and NO from storage
- NH₃

Application

- NH₃
- direct N₂O and NO due to application (see Chapter 11.3)
- indirect N₂O resulting from deposition of NH₃ and NO from application (see Chapter 12.1)
- indirect N₂O resulting from leaching/surface runoff of the N entering in the soil via application (see Chapter 12.2)

Table 10.3 shows the times series of the resulting total CH₄ emission factor for digestion of energy crops (digester + storage of digestate), related to the amount of dry matter fed into the digestion process. The decrease in the emission factor over time results from increasing use of gas-tight storage. For such storage, only the CH₄ leakage rate has to be taken into account, instead of the higher emission factor for open storage.

rechnungskonzept keine anderen N-Emissionen beeinflussen und daher auch nicht berichtet werden müssen.

Unter Berücksichtigung der oben beschriebenen methodischen Aspekte ergibt sich die Notwendigkeit zur Berechnung der folgenden Emissionen:

Fermenter

- CH₄ durch Leckage

Lagerung

- CH₄ durch Leckage
- direktes N₂O sowie NO und N₂
- indirektes N₂O als Folge der Deposition von NH₃ und NO aus der Lagerung
- NH₃

Ausbringung

- NH₃
- direktes N₂O sowie NO als Folge der Ausbringung (siehe Kapitel 11.3)
- indirektes N₂O als Folge der Deposition von NH₃ und NO aus der Ausbringung (siehe Kapitel 12.1)
- indirektes N₂O durch Auswaschung/Oberflächenabfluss des durch die Ausbringung in den Boden gelangenden N (siehe Kapitel 12.2)

Table 10.3 zeigt den zeitlichen Verlauf des so berechneten Gesamt-CH₄-Emissionsfaktors für die Vergärung von Energiepflanzen (Fermenter + Gärrestelager). Der Emissionsfaktor bezieht sich auf die Trockenmasse der vergorenen Energiepflanzen. Die Abnahme mit der Zeit beruht auf der Zunahme der gasdichten Lagerung der Gärreste, für die anstelle des höheren Emissionsfaktors der offenen Lagerung nur die CH₄-Leckagerate zu berücksichtigen ist.

Table 10.3: Digestion of energy crops, effective emission factor for CH₄, related to dry matter input (in kg kg⁻¹)

1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
0.00323	0.00322	0.00321	0.00320	0.00319	0.00319	0.00318	0.00317	0.00316	0.00315
2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
0.00314	0.00313	0.00312	0.00311	0.00309	0.00308	0.00303	0.00298	0.00293	0.00288
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
0.00283	0.00278	0.00267	0.00264	0.00263	0.00262	0.00262	0.00262	0.00262	

The time series of the calculated total emission factor for direct N₂O-N emissions from the storage of anaerobically digested energy crops is shown in Table 10.4. This emission factor is calculated for each year of the time series from the total N₂O-N emission from the storage of digested energy crops divided by the amount of N introduced into the digestion process with the energy crops. The decreasing trend of the emission factor over the years reflects the increasing frequency of gas-tight storage, which does not emit N₂O.

As with manure storage (see Chapter 3.3.4.3.5), the NO-N and N₂ emission factors of the digestate storage are one-tenth and three times the N₂O-N emission

Der zeitliche Verlauf des berechneten Gesamt-Emissionsfaktors für direkte N₂O-N-Emissionen aus der Lagerung vergorener Energiepflanzen ist in Table 10.4 dargestellt. Dieser Emissionsfaktor berechnet sich für jedes Jahr der Zeitreihe aus der N₂O-N-Gesamt-Emission aus der Lagerung vergorener Energiepflanzen dividiert durch die mit den Energiepflanzen in den Vergärungsprozess eingebrachte N-Menge. Der mit den Jahren abnehmende Trend des Emissionsfaktors spiegelt die zunehmende Verbreitung der gasdichten Lagerung wieder, die kein N₂O emittiert.

Wie bei der Wirtschaftsdüngerlagerung (siehe Kapitel 3.3.4.3.5) betragen NO-N- und N₂-Emissionsfaktor der Gärrestlagerung ein Zehntel bzw. das Dreifache des

factor, respectively, and can thus be derived directly from Table 10.4.

N₂O-N-Emissionsfaktors und sind somit direkt aus Table 10.4 ableitbar.

Table 10.4: Digestion of energy crops, effective emission factor for direct N₂O-N, related to N input (in kg kg⁻¹)

1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
0.00500	0.00495	0.00491	0.00486	0.00481	0.00477	0.00472	0.00467	0.00462	0.00458
2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
0.00453	0.00448	0.00444	0.00436	0.00429	0.00421	0.00396	0.00368	0.00341	0.00315
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
0.00289	0.00263	0.00203	0.00190	0.00180	0.00177	0.00176	0.00177	0.00177	

Like for manure management (see Chapter 3.3.4.3.6), indirect N₂O emissions due to deposition of reactive N from emissions of NH₃ and NO from storage are calculated for the storage of energy-plant digestate. The N₂O-N emission factor is the same as for manure: 0.01 kg kg⁻¹, related to the amount of reactive N.

No indirect N₂O from leaching and runoff from storage of digestate is calculated. This is consistent with the procedure for manure management. Leaching and/or uncontrolled surface runoff from manure management (including management of digestate) is forbidden by law on grounds of protection of inshore waters (see "JGS-Anlagenverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen" (JGS-ANLAGENV, 1998) und "Wasserhaushaltsgesetz" (WHG, 2010).

Table 10.5 shows the time series of the NH₃-N emission factors for storage of energy-plant digestate only as well as for the combination of storage and spreading of the digestates of energy crops. Both types of emission factors are related to the amount of N fed into the digestion process. The decreasing trend in the emission factor for storage of energy-plant digestate only is a consequence of increasing frequencies of gastight storage. This can also be seen in the combined storage-and-spreading emission factor the strong increase of which from 2005 to 2006 is due to a marked increase of the use of anaerobic digestion in Bavaria as the Bavarian emission factor for spreading is higher than the German mean. The significant decrease, however, from 2011 to 2012 is mostly due to the short incorporation time of 4 hours after spreading that is mandatory as of 2012 (see Chapter 3.4.3.2.6).

Für die Energiepflanzen-Vergärung werden wie beim Wirtschaftsdünger-Management (siehe Kapitel 3.3.4.3.6) indirekte N₂O-Emissionen berechnet, die auf die Deposition von reaktivem Stickstoff aus dem Lager (NH₃, NO) zurückgehen (hier: Gärrestelager). Der N₂O-N-Emissionsfaktor wird wie bei Wirtschaftsdünger mit 0,01 kg kg⁻¹ angesetzt (bezogen auf die reaktive N-Menge).

Wie beim Wirtschaftsdünger werden keine indirekte N₂O-Emissionen aus Auswaschung oder Oberflächenabfluss aus dem Gärrestelager berechnet, da Versickerung oder unkontrollierter oberirdischer Abfluss aus dem Gärreste-Management aus Gründen des Gewässerschutzes zu vermeiden sind (siehe dazu u. a. JGS-Anlagenverordnung NRW 1998, Wasserhaushaltsgesetz WHG 2010).

Table 10.5 zeigt die Zeitreihe der NH₃-N-Emissionsfaktoren für Gärrestelagerung allein sowie Gärrestelagerung und Ausbringung zusammen, bezogen in beiden Fällen auf die mit den Energiepflanzen in die Vergärung eingebrachte N-Menge. Der abnehmende Trend beim Gärrestelager-Emissionsfaktor wird durch die zunehmende Verbreitung der gasdichten Lagerung bestimmt. Dies wirkt sich auch deutlich auf den Emissionsfaktor für „Lagerung + Ausbringung“ aus. Der Anstieg dieses Emissionsfaktors von 2005 zu 2006 ist auf einen starken Anstieg der Vergärung in Bayern zurück zu führen, da der mittlere bayerische EF für die Ausbringung über dem deutschen Durchschnitt liegt. Die starke Abnahme des Gesamt-Emissionsfaktors von 2011 zu 2012 ist zu einem großen Teil auf die ab 2012 geltende Beschränkung der Einarbeitungszeit auf maximal 4 Stunden zurückzuführen (siehe Kapitel 3.4.3.2.6).

Table 10.5: Digestion of energy crops, effective emission factor for NH₃-N, related to N input (in kg kg⁻¹)

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
storage	0.0252	0.0250	0.0247	0.0245	0.0243	0.0240	0.0238	0.0235	0.0233	0.0231
storage + spreading	0.2074	0.2072	0.2070	0.2068	0.2066	0.2064	0.2062	0.2060	0.2058	0.2056
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
storage	0.0228	0.0226	0.0224	0.0220	0.0216	0.0212	0.0199	0.0186	0.0172	0.0159
storage + spreading	0.2054	0.2052	0.2050	0.2047	0.2043	0.2039	0.2061	0.2023	0.1991	0.1983
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
storage	0.0146	0.0132	0.0102	0.0096	0.0091	0.0089	0.0089	0.0089	0.0089	
storage + spreading	0.1979	0.1972	0.1846	0.1756	0.1684	0.1618	0.1618	0.1624	0.1624	

10.2.2 Uncertainties of the emission factors / Unsicherheiten der Emissionsfaktoren

For the uncertainty (half the 95 % confidence interval) of the CH₄ emission factor the uncertainty of the CH₄ emission factor for the manure management of cattle and pigs is adopted: 20 % and normal distribution, see e. g. Chapter 4.3.6.

By analogy to manure management (IPCCC (2006), see Chapter 14.4.1), a factor of 2 is assumed as uncertainty range (95 % confidence interval) of the emission factor of direct N₂O emission from storage of energy-plant digestate, i. e. from -50 % to +100 %. According to the convention for Approach 1, the larger of the two percentages is to be applied in the calculation of the overall uncertainty of the GHG inventory (see Chapter 14.2), i.e. +100 %.

For the uncertainty of the indirect N₂O emission factors see Chapter 12.1.

Due to the lack of information on the uncertainties of the NO emission factor, the uncertainty of the emission factor for direct N₂O from storage is adopted (see Chapter 14.4.2).

The uncertainties of the NH₃ emission factors are estimated by analogy to manure management as well. This means an uncertainty (95 % confidence interval with normal distribution) of 36 % for the storage of digestate (c.f. manure management, Chapter 14.5) and 30 % for spreading of digestate (c.f. spreading of manure, Chapter 4.3.8.9).

Note that, as the emissions of NH₃ from storage and spreading of digestate of energy crops are subtracted by an adjustment procedure (see farther above), these emissions are not taken into account in the calculation of the total uncertainty of the German ammonia inventory, see Chapter 14.7).

Die Unsicherheit (halbes 95 %-Konfidenzintervall) des CH₄-Emissionsfaktors wird mit dem beim Wirtschaftsdünger-Management von Rindern und Schweinen zu findenden Unsicherheitswert angenommen: 20 % mit Normalverteilung, siehe z. B. Kapitel 4.3.6.

Für direktes N₂O aus dem Lager wird wie beim Wirtschaftsdünger-Management (IPCC (2006), siehe Kapitel 14.4.1) ein Unsicherheitsfaktor von 2 angenommen, der einer Unsicherheit von -50 % / +100 % entspricht. Diese Werte begrenzen das 95 %-Konfidenzintervall. Entsprechend der Konvention für das Approach-1-Verfahren zur Berechnung der Gesamtunsicherheit des THG-Inventars (siehe Kapitel 14.2) ist das größere der beiden Intervalle zu verwenden, also +100 % (Lognormal-Verteilung).

Zur Unsicherheit des Emissionsfaktors des depositionsbedingten indirekten N₂O siehe Kapitel 12.1.

Wie beim Wirtschaftsdünger wird für die Unsicherheit des Emissionsfaktors für NO aus dem Lager die Unsicherheit des Emissionsfaktors für direktes N₂O aus dem Lager übernommen (siehe Kapitel 14.4.2).

Auch für die Unsicherheit der NH₃-Emissionsfaktoren wird eine Analogie zum Wirtschaftsdünger angenommen. Das bedeutet eine Unsicherheit (halbes 95 %-Konfidenzintervall bei Normalverteilung) von 36 % für das Gärrestlager (vgl. Wirtschaftsdünger-Management, Kapitel 14.5) und 30 % für die Ausbringung (vgl. Wirtschaftsdünger-Ausbringung, Kapitel 4.3.8.9).

Anmerkung: Die durch das Adjustmentverfahren nicht berücksichtigten NH₃-Emissionen aus Lagerung und Ausbringung von Energiepflanzen-Gärresten (siehe weiter oben) werden in der Gesamtunsicherheit des deutschen Ammoniakinventars nicht berücksichtigt, siehe Kapitel 14.7).

10.3 References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung

The subsequent table lists the references to information provided in the data collection (see Chapter 2.4).

Die nachfolgende Tabelle enthält Verweise auf die Informationen in der Datensammlung (siehe Kapitel 2.4).

Table 10.6: Digestion of energy crops, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)

			from	to
Emissions	Emissionen	NH ₃ , storage	EM1001.006	
		NH ₃ , spreading	EM1001.004	
		N ₂ O, storage	EM1001.024	
		N ₂ O, spreading	EM1001.010	
		N ₂ O, indirect, leaching	EM1001.016	
		N ₂ O, indirect, deposition,spreading	EM1001.019	
		N ₂ O, indirect, deposition,storage	EM1001.022	
		NO, storage	EM1001.030	
		NO, spreading	EM1001.028	
		CH ₄ , digester + storage	EM1001.035	
Activity data	Aktivitäten	N amount (storage)	AC1001.006	
		N amount (spreading)	AC1001.007	
		Dry matter	AC1101.014	
		N returned to soil	AC1101.020	
		N deposited (spreading)	AC1101.023	
		N deposited (storage)	AC1001.026	
Emission factors	Emissionsfaktoren	NH ₃ , storage	IEF1001.006	
		NH ₃ , spreading	IEF1001.004	
		N ₂ O, storage	IEF1001.018	
		N ₂ O, spreading	IEF1001.010	
		N ₂ O, indirect, leaching	IEF1001.015	
		N ₂ O, indirect, deposition,spreading	IEF1001.016	
		N ₂ O, indirect, deposition,storage	IEF1001.017	
		NO, storage	IEF1001.024	
		NO, spreading	IEF1001.022	
		CH ₄ , digester + storage	IEF1001.029	

11 Direct emissions from managed agricultural soils and cultures / Direkte Emissionen aus landwirtschaftlichen Nutzflächen und Kulturen

Emissions from managed agricultural soils and cultures fall into two categories: direct emissions and indirect emissions.

Direct emissions are emissions that are a primary effect of soil management, like e. g. NH_3 from and N_2O after spreading of fertilizers, or emissions of particulate matter. The calculation procedures for direct emissions are described in the following.

Indirect emissions are N_2O emissions that are a secondary effect of agricultural activities, i. e. N_2O emissions from soils due to deposition of reactive nitrogen (NH_3 and NO) emitted from agricultural sources, and N_2O emissions that are a consequence of nitrogen leaching and runoff. The indirect emissions are described in Chapter 12.

For the following sources direct emissions are reported:

- Application of synthetic fertilizers,
- spreading of animal manures,
- spreading of energy-plant digestate,
- application of sewage sludge,
- N excretions during grazing,
- cultivation of organic soils,
- crop residues,
- mineralization,
- liming.

The gases emitted are NH_3 , N_2O , NO , N_2 und CO_2 . In addition, the inventory calculates the emissions of NMVOC and particulate matter (PM).

No emissions from rice cultivation occur in Germany. Fire clearing is not practiced in Germany, so that no emissions can be calculated for this.

Emissions from the burning of crop residues in the field are negligible in Germany. This is the subject of Chapter 11.9.

Table 11.1 gives an overview of the methodologies used. NH_3 emissions originating from the application of animal manures and digestate of energy crops, N_2O emissions from the cultivation of organic soils and NMVOC emissions from cultures are calculated using Tier 2 methodologies. For all other emissions Tier 1 approaches are used as there are no more differentiated methods. The quantification of the NH_3 emissions from grazing and spreading is not described here, as these emissions are dealt with in combination with the calculation of the emissions from animal husbandry (Chapters 4 to 9).

Bei den Emissionen aus landwirtschaftlicher Nutzflächen und Kulturen wird zwischen direkten und indirekten Emissionen unterschieden.

Direkte Emissionen sind Emissionen, die sich unmittelbar aus der Bodennutzung ergeben, wie z. B. NH_3 und N_2O infolge der Ausbringung von Dünger, aber auch Partikel. Die Berechnung dieser Emissionen wird im Folgenden beschrieben.

Bei den indirekten Emissionen handelt es sich um N_2O -Emissionen, die eine Sekundärfolge landwirtschaftlicher Aktivitäten sind: N_2O -Emissionen aus dem Boden infolge Deposition von reaktivem N aus landwirtschaftlichen Quellen (NH_3 - und NO -Emissionen), sowie N_2O -Emissionen infolge von Stickstoff-Auswaschung bzw. -Abfluss. Zu den indirekten Emissionen siehe Kapitel 12.

Es werden direkte Emissionen für die folgenden Quellen berichtet:

- Ausbringung von Mineraldünger,
- Ausbringung von Wirtschaftsdünger,
- Ausbringung von Energiepflanzen-Gärresten,
- Ausbringung von Klärschlamm,
- tierische Ausscheidungen auf der Weide,
- Bewirtschaftung organischer Böden,
- Ernterückstände,
- Mineralisierung,
- Düngekalzung.

Hierbei handelt es sich Emissionen von NH_3 , N_2O , NO , N_2 und CO_2 . Zusätzlich werden für das Inventar auch Emissionen von NMVOC und Partikeln (PM) berechnet.

Emissionen aus dem Reisanbau kommen in Deutschland nicht vor. Brandrodung wird in Deutschland nicht praktiziert, so dass auch hierfür keine Emissionen zu berechnen sind.

Emissionen aus dem Verbrennen von Ernterückständen auf dem Feld sind in Deutschland vernachlässigbar. Hierauf geht Kapitel 11.9 ein.

Table 11.1 zeigt eine Übersicht über die verwendeten Verfahren. NH_3 -Emissionen aus der Ausbringung von Mineraldünger und Energiepflanzen-Gärresten, N_2O -Emissionen aus der Bewirtschaftung organischer Böden und NMVOC-Emission aus Pflanzen werden mit Tier-2-Verfahren berechnet. Alle übrigen Emissionen werden mangels differenzierterer Methodik nach Tier-1-Verfahren berechnet. Die Berechnung der NH_3 -Emissionen aus Weidegang und Ausbringung wird nicht hier, sondern im Zusammenhang mit den Emissionsberechnungen aus der Nutztierhaltung (Kapitel 4 bis 9) behandelt.

Table 11.1: Agricultural soils, procedures used for the calculation of direct emissions

Species	Origin	Tier	Method applied
NH ₃	mineral fertilizer	2	EMEP
N ₂ O, NO, N ₂	mineral fertilizer	1	IPCC
N ₂ O, NO, N ₂	animal manures	1	IPCC
NH ₃	digestate of energy crops	2	national
N ₂ O, NO, N ₂	digestate of energy crops	1	national / IPCC
N ₂ O	sewage sludge	1	IPCC
N ₂ O, NO, N ₂	excretions during grazing	1	IPCC
N ₂ O	mineralization	1	IPCC
N ₂ O	organic soils	2	national
N ₂ O, N ₂	crop residues	1	IPCC
CO ₂	liming	1	IPCC
CO ₂	Urea application	1	IPCC
NMVOC	cultivated crops	2	EMEP
TSP, PM ₁₀ , PM _{2.5}	crop production	1	EMEP

The emission calculations use federal-state resolution (except for spreading of manures from animal husbandry and grazing) as data on district level are available only for specific years.

Die Emissionsberechnungen erfolgen auf Länderebene, da Aktivitätsdaten auf Kreisebene außer für Wirtschaftsdüngerausbringung und Weidegang nur in vereinzelt Jahren vorliegen.

11.1 Application of mineral fertilizers / Mineraldüngerausbringung

This chapter details the calculation of NH_3 , direct N_2O and NO resulting from the application of mineral fertilizers. For the calculation of the indirect N_2O emissions see Chapter 12.

Dieses Kapitel beschreibt die Berechnung von NH_3 -, direkten N_2O - und NO -Emissionen, die infolge von Mineraldüngerausbringung entstehen. Zur Berechnung der indirekten N_2O -Emissionen siehe Kapitel 12.

11.1.1 Activity data: Amounts of fertilizers / Aktivitätsdaten: Düngermengen

Data on amounts of fertilizers applied is not available. The missing data is replaced by the amounts of fertilizers *sold* which are recorded on federal state level (STATBA FS 4, R 8.2, annually). For all years of the time series it is assumed that the amounts of fertilizer sold in the second half of the previous year plus the amounts sold in first half of the current year are applied during the current year.

Identifying applied amounts of mineral fertilizers with the amounts sold, due to lack of data on the amounts sold, means that increase or decrease of stocks of mineral fertilizers are neglected. This ignores i. a. the influence of fertilizer price developments.

Moreover, due to a lack of data, the inventory does not take into account the extent to which sold fertilizer is brought to neighboring federal states or to neighboring countries, or fertilizer from beyond the borders is purchased. While at the German level it can be assumed that the associated error is small to negligible, it is not a priori at the federal state level, as shown by an internal analysis of agricultural sales data for all federal states and Germany.

It is assumed that the total emissions from the application of mineral fertilizers as calculated and reported in the German inventory are approximately correct at least on average over a period of several years. By contrast, for the federal states, emissions are calculated with reservations, mainly because of the fact that cross-border transports of sold fertilizer are not taken into account. For future inventories, an improved estimate of activity data at federal state level is sought.

Table 11.2 shows the German classification of N fertilizers and the corresponding EMEP (2016) categories.

Daten ausgebrachter Düngermengen sind nicht verfügbar. Daher wird mit den statistisch erfassten Düngerverkaufsmengen auf Bundeslandebene (STATBA FS 4, R 8.2, für jedes Jahr) gerechnet. Es wird angenommen, dass die im Verlauf des letzten Halbjahrs des Vorjahres und des ersten Halbjahrs des aktuellen Jahres verkaufte Düngermenge im aktuellen Jahr ausgebracht wird.

Die durch Datenmangel bedingte Gleichsetzung von ausgebrachter Düngermenge mit verkaufter Düngermenge bedeutet, dass Bildung und Abbau von Düngervorräten vernachlässigt werden. Dies lässt u. a. den Einfluss der Düngerpreisentwicklung außer Acht.

Überdies kann im Inventar mangels Daten nicht berücksichtigt werden, in welchem Umfang verkaufter Dünger in benachbarte Bundesländer oder ins benachbarte Ausland verbracht wird, oder Dünger von jenseits der Grenzen hinzugekauft wird. Während auf Bundeslandebene der damit verbundene Fehler wahrscheinlich gering bis vernachlässigbar ist, ist er das auf Bundeslandebene a priori nicht, wie eine interne Analyse der auf die landwirtschaftliche Fläche bezogenen Verkaufsdaten für alle Bundesländer und Deutschland zeigte.

Es wird davon ausgegangen, dass die im Inventar für Deutschland insgesamt berechneten und berichteten Emissionen aus der Mineraldüngeranwendung zumindest im Mittel über mehrere Jahre zutreffend sind. Für die Bundesländer dagegen werden die Emissionen vor allem wegen der Nichtberücksichtigung der grenzüberschreitenden Mengen an verkauftem Dünger mit Vorbehalt berechnet. Für zukünftige Inventare wird eine verbesserte Schätzung der Aktivitätsdaten auf Bundeslandebene angestrebt.

Table 11.2 zeigt die deutschen Dünger-Bezeichnungen sowie die aus EMEP (2016).

Table 11.2: German classification of N fertilizers and corresponding EMEP (2016) categories

German classification	English terms	corresponding EMEP (2016) categories
Kalkammonsalpeter	calcium ammonium nitrate	calcium ammonium nitrate
Ammonitrat-Harnstoff-Lösung	ammonium solutions	ammonium solutions (Urea AN)
Harnstoff	urea	urea
NP-Dünger	ammonium phosphates	ammonium phosphates (MAP and DAP)
NK- und NPK-Dünger	NK and NPK fertilizers	NPK mixtures
andere Einnährstoffdünger	straight fertilizers / single nutrient fertilizers	other straight N compounds

For 1990 to 1993, information about fertilizer in the new federal states (former GDR) was available as total of N sold. The detailed data for 1994 were used to estimate the distribution of fertilizer for the single Länder as well as the frequency distribution of the various fertilizer types.

1990 bis 1993 lagen für die Neuen Bundesländer Angaben über Düngemittel nur als Summe der verkauften N-Dünger, angegeben als Dünger-N, vor. Unter Verwendung der detaillierten Daten für 1994 wurden die auf die einzelnen Bundesländer und die einzelnen Düngersorten entfallenden Teilmengen proportional erschlossen.

The missing data for Saarland in 1991 were replaced by the respective data for 1990.

According to the quality report in STATBA FS 4, R 8.2 the data of the statistics on mineral fertilizers sold are considered as “reliable and precise”, as they are based on a comprehensive survey without statistical errors and very few gaps due to insufficient reporting. On this basis, an uncertainty (95% confidence interval) of 1% is assumed for the inventory, valid for each of the six categories of fertilizer used in the inventory (see Table 11.2)). The systematic uncertainty resulting from the emission calculation being based on the fertilizere amounts sold instead of the amounts applied to the field cannot be quantified.

The aggregate uncertainty of the total amount of N in the fertilizers sold, m_{fert} , results according to the rules of Gaussian error propagation, see Chapter 14.2, equation (14.3), from the combination of the uncertainties of the individual contributions to m_{fert} . Since these individual contributions are weighted into the result, the aggregate uncertainty of m_{fert} varies from year to year within the time series and - depending on updates of methodologies and input data - from submission to submission. For Submission 2020, the total uncertainty of m_{fert} in 2018 is 0.5 %. The aggregate uncertainty from the last time series year is used to calculate the uncertainty of the total inventories of GHG and NH_3 (see Chapters 14.6 and 14.7) because the underlying Tier 1 scheme cannot take into account uncertainties that vary from year to year.

Die für das Saarland fehlenden Angaben für 1991 wurden durch entsprechende Daten für 1990 ersetzt.

Nach dem Qualitätsbericht zu STATBA FS 4, R 8.2 sind die Daten der Düngemittelverkaufstatistik als „zuverlässig und präzise“ einzustufen, da sie auf einer Totalerhebung ohne statistischen Fehler mit seltenen Antwortausfällen basiert. Davon ausgehend wird für das Inventar eine Unsicherheit (95%-Konfidenzintervall) von 1 % angenommen, gültig für jede einzelne der im Inventar verwendeten sechs Düngerkategorien (siehe Table 11.2). Die systematische Unsicherheit, die daraus resultiert, dass der Emissionsberechnung statt ausgebrachter Düngermengen die verkauften Mengen zugrunde gelegt werden, kann nicht quantifiziert werden.

Die aggregierte Unsicherheit der Gesamt-N-Menge an verkauftem Mineraldünger, m_{fert} , ergibt sich nach den Regeln der Gaußschen Fehlerfortpflanzung, siehe Kapitel 14.2, Gleichung (14.3), aus der Kombination der Unsicherheiten der Einzelbeiträge zu m_{fert} . Da diese Einzelbeiträge gewichtet in das Ergebnis eingehen, variiert die aggregierte Unsicherheit von m_{fert} innerhalb der Zeitreihe von Jahr zu Jahr und - in Abhängigkeit von Aktualisierungen von Methodiken und Eingangsdaten – auch von Submission zu Submission. Für Submission 2020 beträgt die Gesamtunsicherheit von m_{fert} im Jahr 2018 0,5 %. Die aggregierte Unsicherheit aus dem letzten Zeitreihenjahr wird für die Berechnung der Unsicherheit der Gesamtinventare von THG und NH_3 (siehe Kapitel 14.6 und 14.7) verwendet, weil das dort zugrunde liegende Tier-1-Schema keine zeitlich veränderlichen Unsicherheiten berücksichtigen kann.

11.1.2 Calculation of emissions / Emissionsberechnung

11.1.2.1 Emissions of NH_3 / NH_3 -Emissionen

Ammonia emissions from the application of the six categories of mineral fertilizers (see Chapter 11.1.1) are calculated using the Tier 2 methodology provided by EMEP(2016)-3.D-11.

Die Ammoniak-Emissionen der in Kapitel 11.1.1. angegebenen sechs Mineraldünger-kategorien werden nach einem Tier-2-Verfahren nach EMEP(2016)-3.D-11 berechnet.

$$E_{\text{NH}_3\text{-N, fert}} = \frac{\sum (m_{\text{fert},i} \cdot EF_{\text{NH}_3,i})}{\gamma_{\text{NH}_3}} \quad (11.1)$$

$E_{\text{NH}_3\text{-N, fert}}$	$\text{NH}_3\text{-N emission flux from fertilizers (in Gg a}^{-1}\text{)}$
γ_{NH_3}	mass conversion factor ($\gamma_{\text{NH}_3} = 17/14 \text{ g g}^{-1} \text{ mol mol}^{-1}$)
$m_{\text{fert},i}$	mass of N applied with fertilizer type i (in Gg a ⁻¹)
$EF_{\text{NH}_3,i}$	NH_3 emission factor for fertilizer type i (in kg kg ⁻¹)

The pertinent emission factors are listed in Table 11.3. In order to reflect average German conditions the emission factors for cool climate and a pH value lower than 7 was chosen.

For the uncertainty of the emission factor see Chapter 11.1.2.4.

Die entsprechenden Emissionsfaktoren zeigt Table 11.3. Den mittleren deutschen Bedingungen entsprechend sind es Emissionsfaktoren für die Klimakategorie „cool“ bei einem pH-Wert kleiner 7.

Zur Emissionsfaktor-Unsicherheit siehe Kapitel 11.1.2.4.

Table 11.3: Mineral fertilizers, NH₃ emission factors for the fertilizer categories applied in Germany

fertilizer category	emission factor EF^a kg NH ₃ (kg N) ⁻¹
calcium ammonium nitrate	0.008
ammonium solutions	0.098
urea	0.155
ammonium phosphates	0.050
NK and NPK fertilizers	0.050
straight fertilizers / single nutrient fertilizers	0.010

^aSource: EMEP(2016)-3D, Table 3-2, for cool climate and pH < 7 (typical conditions in Germany); see Table 11.2 in the report at hand for the relation between German fertilizer categories and fertilizer categories according to EMEP (2016).

11.1.2.2 Emissions of N₂O / N₂O-Emissionen

For N₂O, a Tier 1 approach is used according to IPCC(2006)-11.7/11.11. It calculates the N₂O-emission as proportional to the amount of fertilizer N applied. The N₂O-N emission factor is $EF_{\text{fert, N}_2\text{O-N}} = 0.01 \text{ kg kg}^{-1}$.

For the uncertainty of the emission factor see Chapter 11.1.2.4.

N₂O wird mit einem Tier-1-Verfahren (IPCC (2006)-11.7) proportional zur ausgebrachten N-Menge berechnet. Der N₂O-N-Emissionsfaktor ist $EF_{\text{fert, N}_2\text{O-N}} = 0,01 \text{ kg kg}^{-1}$, siehe IPCC(2006)-11.11.

Zur Emissionsfaktor-Unsicherheit siehe Kapitel 11.1.2.4.

$$E_{\text{N}_2\text{O-N, fert}} = m_{\text{fert}} \cdot EF_{\text{N}_2\text{O-N, fert}} \quad (11.2)$$

$E_{\text{N}_2\text{O-N, fert}}$ emission of N₂O-N directly emitted from soils due to application of mineral fertilizer (in Gg a⁻¹)
 m_{fert} amount of N applied with mineral fertilizer (in Gg a⁻¹)
 $EF_{\text{N}_2\text{O-N, fert}}$ emission factor for emissions of N₂O-N due to mineral fertilizer application (in kg kg⁻¹)

11.1.2.3 Emissions of NO / NO-Emissionen

NO emissions from cultivation of agricultural soils and crops manure management are reported (as NO_x), but are neglected regarding the NEC emission threshold. This procedure is based on the fact that these emissions had not been accounted for in the definition of the national emission ceiling for NO_x (1051 Gg a⁻¹, NEC Directive 2011/81/EC).

The NO emissions are calculated with a Tier 1 methodology (see EMEP(2016)-3.D-11):

NO aus dem Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Böden wird zwar berichtet (als NO_x), bzgl. der NEC-Emissionsobergrenze aber nicht angerechnet. Hintergrund für dieses Vorgehen ist, dass diese Emissionen nicht Gegenstand der Festlegung der seit 2010 geltenden nationalen Emissionsobergrenze (1051 Gg a⁻¹, NEC-Richtlinie 2011/81/EC) waren.

Die NO-Emissionen werden mit einem Tier-1-Verfahren berechnet (siehe EMEP (2016)-3.D-11):

$$E_{\text{NO-N, fert}} = m_{\text{fert}} \cdot EF_{\text{NO-N, fert}} \quad (11.3)$$

$E_{\text{NO-N, fert}}$ emission of NO-N emitted from soils due to application of mineral fertilizer (in Gg a⁻¹)
 m_{fert} amount of N applied with mineral fertilizer (in Gg a⁻¹)
 $EF_{\text{NO-N, fert}}$ emission factor for emissions of NO-N due to mineral fertilizer application (in kg kg⁻¹)

EMEP (2016)-3D-12, Table 3-1, does not provide the emission factor for NO-N, but for NO₂. Nevertheless this NO₂ emission factor is based on the NO-N emission factor by STEHFEST UND BOUWMAN (2006), which is 0.012 kg NO-N per kg of N applied and is used in the German inventory.

For the uncertainty of the emission factor see Chapter 11.1.2.4.

EMEP (2016)-3D-12, Table 3-1, gibt den Emissionsfaktor nicht für NO-N, sondern für NO₂ an. Dahinter steht aber der NO-N-Emissionsfaktor von STEHFEST UND BOUWMAN (2006), der 0,012 kg NO-N pro kg an ausgebrachtem N beträgt; dieser Emissionsfaktor wird im deutschen Inventar verwendet.

Zur Emissionsfaktor-Unsicherheit siehe Kapitel 11.1.2.4.

11.1.2.4 *Uncertainties of the N emissions / Unsicherheiten der N-Emissionen*

The uncertainty (95 % confidence interval) of the NH_3 emissions is, according to EMEP(2016)-3D-21, no better than ± 50 %. This value of 50 % is adopted also for the emission factors as there is no emission factor uncertainty provided by EMEP (2016). A normal distribution is assumed. This applies to each of the six categories of fertiliser. However, since only the total amount of emissions from the mineral fertiliser application has to be reported, an aggregate uncertainty has to be determined for this purpose. This is calculated according to the following scheme:

The aggregate uncertainty of the NH_3 emission factor averaged over all fertiliser categories is determined by the rules of Gaussian error propagation (see Chapter 14.2, combination of equations (14.3) and (14.4)) from activity data and emission factors of the partial contributions and their uncertainties.

For the uncertainty of activity data, see Chapter 11.1.1. The uncertainty of the NH_3 emission factor of the partial emissions is estimated at 50 %, see above. This results, for the 2020 Submission, in an aggregate uncertainty of 32.4 % for the average NH_3 emission factor of the total amount of mineral fertilisers applied in the year 2018. As with activity data (see Chapter 11.1.1), variations are possible from submission to submission and, within a submission, from year to year. For the calculation of the uncertainty of the total NH_3 inventory (see Chapter 14.7), as in the activity data, the uncertainty value of the last time series year is used.

For the N_2O -N emission factor, IPCC (2006)-11.11, Table 11.1, specifies an uncertainty range from 0.003 to 0.03 kg kg^{-1} . This is understood as a 95 % confidence interval.

The interval between the upper boundary of the confidence interval and the emission factor is 200 % of the emission factor, the interval between the lower boundary of the confidence interval and the emission factor is around 70 %. Due to the asymmetry, a lognormal distribution is assumed. The overall uncertainty calculation of the GHG inventory is based on the Tier 1 methodology "Approach 1" provided by IPCC (2006), see Chapter 14.6. The input data required by this approach, in case of asymmetric distributions, is the larger of the two ranges between the emission factor and the confidence interval boundaries, i.e. 200 %.

By analogy with the NH_3 calculation, an aggregation of the uncertainties of the N_2O emission factors of the six mineral fertilizer categories is required for the calculation of the total GHG inventory. The procedure is the same as described above for NH_3 . This results, for the year 2018 of Submission 2020, in an uncertainty of 100.6 percent. This value can change from submission to submission and from year to year. As with activity data (see Chapter 11.1.1), the uncertainty of the last time series year is used in the uncertainty calculation of the total GHG inventory.

Die Unsicherheit der NH_3 -Emissionen (95 %-Konfidenzintervall) ist nach EMEP(2016)-3D-21 nicht kleiner als ± 50 %. Der Wert von 50 % wird, da eine entsprechende Angabe für die Emissionsfaktoren fehlt, für diese übernommen. Angenommen wird Normalverteilung. Diese Angaben gelten für jede einzelne der sechs Mineraldünger-kategorien. Da aber lediglich die Gesamtsumme der Emissionen aus der Mineraldüngeranwendung zu berichten sind, ist dafür eine aggregierte Unsicherheit zu ermitteln. Diese wird nach folgendem Schema berechnet:

Die aggregierte Unsicherheit des über alle Düngerkategorien gemittelten NH_3 -Emissionsfaktors ergibt sich nach den Regeln der Gaußschen Fehlerfortpflanzung (siehe Kapitel 14.2, Kombination der Gleichungen (14.3) und (14.4) aus Aktivitätsdaten und Emissionsfaktoren der Teilbeiträge sowie deren Unsicherheiten.

Zur Unsicherheit der Aktivitätsdaten siehe Kapitel 11.1.1. Die Unsicherheit des NH_3 -Emissionsfaktors der Teilemissionen wird, siehe oben, mit 50 % angesetzt. Daraus ergibt sich für den mittleren NH_3 -Emissionsfaktor der ausgebrachten Gesamt-Mineraldüngermenge für das Jahr 2018 der Submission 2020 eine aggregierte Unsicherheit von 32,4 %. Wie bei den Aktivitätsdaten (siehe Kapitel 11.1.1) sind Variationen von Submission zu Submission und innerhalb einer Submission von Jahr zu Jahr möglich. Für die Berechnung der Unsicherheit des NH_3 -Gesamtinventars (siehe Kapitel 14.7) wird wie bei den Aktivitätsdaten der Unsicherheitswert des letzten Zeitreihenjahres verwendet.

Für den N_2O -N-Emissionsfaktor wird in IPCC (2006)-11.11, Table 11.1, ein Unsicherheitsbereich von 0,003 bis 0,03 kg kg^{-1} angegeben. Dieser wird als 95 %-Konfidenzintervall aufgefasst. Dabei entspricht das Intervall zwischen oberer Konfidenzintervall-Grenze und verwendetem Emissionsfaktor 200 % des Emissionsfaktors, das Intervall zwischen unterer Konfidenzintervall-Grenze und Emissionsfaktor rund 70 %. Aufgrund der Asymmetrie wird Lognormalverteilung angenommen. Der Gesamtunsicherheitsberechnung des THG-Inventars liegt der Tier-1-Ansatz „Approach 1“ von IPCC(2006) zugrunde, siehe Kapitel 14.6. Dieser Ansatz verlangt als Eingabegröße bei asymmetrischen Verteilungen die größere der beiden Spannen zwischen Emissionsfaktor und Konfidenzintervallgrenze, hier also 200 %.

In Analogie zur NH_3 -Berechnung ist für die Berechnung des Gesamt-THG-Inventars zuvor eine Aggregation der Unsicherheiten der N_2O -Emissionsfaktoren der sechs Mineraldünger-kategorien erforderlich. Die Vorgehensweise ist die gleiche wie oben für NH_3 beschrieben. Für das Jahr 2018 der Submission 2020 erhält man eine Unsicherheit von 100,6 %. Dieser Wert kann sich von Submission zu Submission und Jahr zu Jahr ändern. Wie bei den Aktivitätsdaten (siehe Kapitel 11.1.1) wird in der Unsicherheitsberechnung des Gesamt-THG-Inventars der Unsicherheitswert des letzten Zeitreihenjahres verwendet.

Based on Stehfest und Bouwman (2006), EMEP (2016)-3D-21 estimates an uncertainty of factor 5, which would correspond to a 95 % confidence interval between -80 % and +400 %. EMEP (2016) does not provide the distribution type; however, a lognormal distribution seems plausible. (Note: The absolute values of the boundaries of the uncertainty range given in EMEP (2016)-3D-12, Table 3-1, are not correct, because they are the same values like in EMEP (2013)-3D-11, Table 3-1, even though the definition of the emission factor was changed in the new guidebook.)

The uncertainty of the NO emission factor of the total application of mineral fertilizers, calculated by analogy to the calculations for NH₃ and N₂O, is 201.3% for the year 2018 of Submission 2020. This value can also change from submission to submission and from year to year.

Für NO schätzt EMEP (2016)-3D-21 in Anlehnung an Stehfest und Bouwman (2006) einen Unsicherheitsfaktor von 5, was einem 95 %-Konfidenzintervall von -80 % bis +400 % entspräche. Der Verteilungstyp wird in EMEP (2016) nicht angegeben; eine Lognormal-Verteilung erscheint plausibel. (Anmerkung: Die in EMEP (2016)-3D-12, Table 3-1, angegebenen absoluten Unsicherheitsbereichsgrenzen sind nicht korrekt, da sie aus EMEP (2013)-3D-11, Tabel 3-1, übernommen wurden, obwohl sich im neuen EMEP-Guidebook von 2016 in Table 3-1 die Definition des Emissionsfaktors geändert hat.)

Die analog zur Vorgehensweise bei NH₃ und N₂O berechnete Unsicherheit des NO-Emissionsfaktors der Gesamtanwendung von Mineraldünger beträgt für das Jahr 2018 der Submission 2020 201,3 %. Auch dieser Wert kann sich von Submission zu Submission und von Jahr zu Jahr ändern.

11.2 Application of animal manures and digestates of animal manures / Ausbringung von Wirtschaftsdüngern und Wirtschaftsdünger-Gärresten

This chapter details the calculation of NH₃, direct N₂O and NO resulting from the application of animal manures and digestates of animal manures. For the calculation of the indirect N₂O emissions see Chapter 12.

Dieses Kapitel beschreibt die Berechnung von NH₃, direkten N₂O- und NO-Emissionen, die infolge von der Ausbringung von Wirtschaftsdünger und Wirtschaftsdünger-Gärresten entstehen. Zur Berechnung der indirekten N₂O-Emissionen siehe Kapitel 12.

11.2.1 Activity data / Aktivitätsdaten

IPCC(2006) and EMEP (2016) require, that, as activity value, the total N quantity m_{man} of animal manures and digestates from anaerobically digestion of animal manures be reported. In the German inventory, m_{man} consists of partial contributions from the individual animal categories. Such a partial contribution is calculated separately for each animal category according to the mass flow concept (see Chapter 3.3.4.3). The amounts of N of excretions and straw entering the system as well as the N losses due to emissions of NH₃, N₂O, NO and N₂ from housings and storage systems are taken into account.

The uncertainty (half 95% confidence interval) of the total N quantity m_{man} is determined as follows:

The unknown uncertainty of the partial contributions to the total activity rate is estimated at 20 % (normal distribution), i.e. twice the uncertainty of N excretion (10 %, see Chapter 14.4.1). The aim is to approximate the additional uncertainties involved between excretion and application to field.

The aggregate uncertainty of the total activity rate m_{man} is then determined by the rules of Gaussian error-propagation, see Chapter 14.2, equation (14.3), from the combination of the uncertainties of the individual contributions to m_{man} . Since the individual contributions to m_{man} are used as weights in the calculation of the overall uncertainty, the latter varies from year to year within the time series and - depending on updates of methodologies and input data - may also vary from submission

IPCC(2006) und EMEP (2016) schreiben vor, dass als Aktivitätswert die Gesamt-N-Menge m_{man} der ausgebrachten Wirtschaftsdünger und Wirtschaftsdünger-Gärreste berichtet wird. Im deutschen Inventar setzt sich m_{man} aus Teilbeiträgen der einzelnen Tierkategorien zusammen. Ein solcher Teilbetrag wird separat für jede Tierkategorie nach dem Massenfluss-Konzept (siehe Kapitel 3.3.4.3) berechnet. Dabei werden die ins System gelangenden N-Mengen aus Ausscheidungen und Stroh sowie die N-Verluste durch Emissionen von NH₃, N₂O, NO und N₂ aus Stall und Lager berücksichtigt.

Die Unsicherheit (halbes 95 %-Konfidenzintervall) der Gesamt-N-Menge m_{man} wird wie folgt ermittelt:

Die unbekannte Unsicherheit der Teilbeiträge zur Gesamtaktivitätsrate m_{man} wird mit 20 % geschätzt (Normalverteilung), also dem Doppelten der Unsicherheit der N-Ausscheidung (10 %, siehe Kapitel 14.4.1). Damit sollen die zwischen Ausscheidung und Ausbringung zusätzlich mitwirkenden Unsicherheiten näherungsweise berücksichtigt werden.

Die aggregierte Unsicherheit der Gesamtaktivitätsrate m_{man} ergibt sich dann nach den Regeln der Gaußschen Fehlerfortpflanzung, siehe Kapitel 14.2, Gleichung (14.3), aus der Kombination der Unsicherheiten der Einzelbeiträge zu m_{man} . Da die Einzelbeiträge zu m_{man} gewichtend in das Ergebnis eingehen, variiert die aggregierte Unsicherheit von m_{man} innerhalb der Zeitreihe von Jahr zu Jahr und - in Abhängigkeit von Aktualisierungen von Methodiken und Eingangsdaten – ggf. auch von Submis-

to submission. For 2018 in Submission 2020, the aggregate uncertainty of m_{man} is 9.3 %. The value of the last year of the time series is used in the calculation of the overall uncertainty of the total inventories of GHG and NH_3 (see Chapters 14.6 and 14.7), because the underlying Tier 1 scheme cannot take into account any time-changing uncertainties.

11.2.2 Calculation of emissions / Emissionsberechnung

The calculation of NH_3 emissions is carried out separately for each animal category in the context of emission modelling of animal husbandry, see Chapters 4 to 8.8. It also contains information on the emission factors and their uncertainties. According to EMEP (2016), these animal category-specific emissions are combined, for emission reporting purposes, to a total emission.

According to IPCC (2006), the emissions of direct N_2O and NO resulting from the application of animal manures and digestates from anaerobic digestion of animal manures are also reported as total N_2O and NO emissions. As with NH_3 (see above), the total mission consists of partial contributions from the various animal categories. The N_2O and NO emissions from the application of manure and digestates are calculated like the emissions from application of mineral fertilisers (see Chapter 11.1.2), i.e. with a Tier 1 methodology and the same emission factors.

The aggregate uncertainty (half 95% confidence interval) of the emission factors for NH_3 , N_2O and NO, averaged over all partial emission contributions, are determined by the rules of Gaussian error propagation (see Chapter 14.2, combination of equations (14.3) and (14.4)) from activity data and emission factors of the individual contributions as well as their uncertainties.

For the uncertainty of activity data, see Chapter 11.2.1. The uncertainty of the NH_3 emission factor of the partial emissions is 30 % (normal distribution) in accordance with Chapter 4.2.2.4. For N_2O and NO, the values of the mineral fertilizer application are adopted:

They are 200 % for N_2O (see Chapter 11.1.2.2) and 400 % for NO (see Chapter 11.1.2.3), with the assumption of lognormal distribution in both cases. Using the above uncertainties for the emission factors of the total emissions from application, the following aggregate uncertainties result for the year 2018 of Submission 2020: 15.2 % for NH_3 , 92.9 % for N_2O and 185.7 % for NO.

These values can, similar to the situation with the activity data (see Chapter 11.2.1), vary from submission to submission and, within a submission, from year to year. As in Chapter 11.2.1, the uncertainty value of the last year of time series is used to calculate the overall uncertainty of the total inventories of GHG and NH_3 (see Chapters 14.6 and 14.7).

sion zu Submission. Für das Jahr 2018 in Submission 2020 beträgt die aggregierte Unsicherheit von m_{man} 9,3 %. Der Wert des letzten Zeitreihenjahres wird für die Berechnung der Unsicherheit der Gesamtinventare von THG und NH_3 (siehe Kapitel 14.6 und 14.7) verwendet, weil das dort zugrunde liegende Tier-1-Schema keine zeitlich veränderlichen Unsicherheiten berücksichtigen kann.

Die Berechnung der NH_3 -Emissionen erfolgt getrennt für jede einzelne Tierkategorie im Rahmen der Emissionsmodellierung der Tierhaltung, siehe Kapitel 4 bis 8.8. Dort finden sich auch die Angaben zu den Emissionsfaktoren und deren Unsicherheiten. Gemäß EMEP (2016) werden diese tierkategoriespezifischen Emissionen für die Berichterstattung zu einer Gesamtemission zusammengefasst.

Nach IPCC (2006) werden auch die Emissionen von direktem N_2O und NO, die sich aus der Ausbringung von Wirtschaftsdüngern und Wirtschaftsdünger-Gärresten ergeben, als N_2O - bzw. NO-Gesamtemission berichtet. Die Gesamtemission setzt sich wie bei NH_3 (siehe oben) aus Teilbeiträgen der verschiedenen Tierkategorien zusammen. Die N_2O - und NO-Emissionen aus der Ausbringung von Wirtschaftsdünger und Gärresten werden wie die Emissionen aus der Ausbringung von Mineraldünger berechnet (siehe Kapitel 11.1.2), d. h. mit einem Tier-1-Verfahren und den gleichen Emissionsfaktoren.

Die aggregierten Unsicherheiten (halbes 95 %-Konfidenzintervall) der über alle Teilbeträge gemittelten Emissionsfaktoren für NH_3 , N_2O und NO ergeben sich nach den Regeln der Gaußschen Fehlerfortpflanzung (siehe Kapitel 14.2, Kombination der Gleichungen (14.3) und (14.4)) aus Aktivitätsdaten und Emissionsfaktoren der einzelnen Teilbeiträge sowie deren Unsicherheiten.

Zur Unsicherheit der Aktivitätsdaten siehe Kapitel 11.2.1. Die Unsicherheit des NH_3 -Emissionsfaktors der Teilemissionen beträgt nach Kapitel 4.2.2.4 30 % (Normalverteilung). Für N_2O und NO werden die Werte der Mineraldüngerausbringung übernommen: Sie liegen bei 200 % für N_2O (siehe Kapitel 11.1.2.2) und 400 % bei NO (siehe Kapitel 11.1.2.3), wobei in beiden Fällen Lognormalverteilung angenommen wird. Aus den vorgenannten Unsicherheitswerten ergeben sich für die Emissionsfaktoren der ausbringungsbedingten Gesamtemissionen schließlich für das Jahr 2018 der Submission 2020 aggregierte Unsicherheiten von 15,2 % für NH_3 , 92,9 % für N_2O und 185,7 % für NO. Wie bei den Aktivitätsdaten (siehe Kapitel 11.2.1) sind Variationen von Submission zu Submission und innerhalb einer Submission von Jahr zu Jahr möglich. Analog zu Kapitel 11.2.1 wird der Unsicherheitswert des letzten Zeitreihenjahres für die Berechnung der Unsicherheit der Gesamtinventare von THG und NH_3 (siehe Kapitel 14.6 und 14.7) verwendet.

11.3 Application of digestate from energy crops / Ausbringung der Gärreste aus der Energiepflanzen-Vergärung

For the application of the digestate of energy crops emissions of NH_3 , N_2O and NO are calculated.

Für die Ausbringung von Gärresten der Energiepflanzenvergärung werden Emissionen von NH_3 , N_2O und NO berechnet.

11.3.1 Activity data / Aktivitätsdaten

The amounts of N (m_{DEC}) contained in energy-plant digestate to be applied to the field are calculated as the difference of the amount of N fed into the digestion process and the sum of N losses by emissions of NH_3 , N_2O , NO and N_2 from storage of the digestate. For the calculation of these N losses see Chapter 3.3.5.

The uncertainty of m_{DEC} is unknown. For the emission inventory the boundaries of the 95 % confidence interval are assumed to be located at ± 10 % of the mean. A normal distribution is assumed.

Die N-Menge m_{DEC} in den auszubringenden Energiepflanzen-Gärreste wird berechnet als die Differenz der N-Menge, die mit den Energiepflanzen in die Vergärung eingebracht wird, und der Summe der N-Verluste durch NH_3 , N_2O , NO und N_2 aus der Gärreste-Lagerung. Zur Berechnung dieser N-Verluste siehe Kapitel 3.3.5.

Die Unsicherheit von m_{DEC} ist unbekannt. Für das Emissionsinventar werden die 95-%-Konfidenzintervall-Grenzen mit ± 10 % des Mittelwertes angesetzt. Die Verteilung ist normal.

11.3.2 Calculation of emissions / Emissionsberechnung

The NH_3 emissions originating from spreading are described in Chapter 10.2.

Direct N_2O emissions as well as NO emissions from soils after the application of manure are calculated in analogy to the application of mineral fertilizers (see Chapter 11.1, equation (11.2)) by replacing m_{fert} with m_{DEC} (see Chapter 11.3.1). The emission factors provided for mineral fertilizers (see Chapter 11.2.2) are adopted. Hence the uncertainties of the emission factors are the same as for the emission factors of mineral fertilizer.

NO emissions from cultivation of agricultural soils and crops manure management are reported (as NO_x), but are neglected regarding the NEC emission threshold, see Chapter 11.1.2.3.

For the indirect N_2O emissions see Chapter 12.

Die mit der Ausbringung verbundenen NH_3 -Emissionen werden in Kapitel 10.2 beschrieben.

Direkte N_2O - sowie NO -Emissionen aus landwirtschaftlichen Böden nach der Ausbringung von Energiepflanzen-Gärresten werden in Analogie zur Mineraldünger-Anwendung (siehe Kapitel 11.1, Gl. (11.2)) berechnet, indem m_{fert} durch m_{DEC} (siehe Kapitel 11.3.1) ersetzt wird. Es werden die entsprechenden Emissionsfaktoren und ihre Unsicherheiten von Mineraldünger übernommen, siehe Kapitel 11.2.2.

NO aus der Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Böden wird zwar berichtet (als NO_x), bzgl. der NEC-Emissionsobergrenze aber nicht angerechnet, siehe Kapitel 11.1.2.3.

Zu den indirekten N_2O -Emissionen siehe Kapitel 12.

11.4 Application of sewage sludge / Ausbringung von Klärschlämmen

For the application of sewage sludge emissions of NH_3 , N_2O and NO are calculated.

Für die Ausbringung von Klärschlämmen werden Emissionen von NH_3 , N_2O und NO berechnet.

11.4.1 Activity data / Aktivitätsdaten

The amounts of N applied with sewage sludge to agricultural systems are assessed from the amounts produced in each single federal state (SCHULTHEISS et al., 2000, and references cited therein; MUNLV, 2001), the portion which is applied to agricultural soils, and the respective N content (DWA, 2004) according to:

Die mit Klärschlämmen in landwirtschaftliche Systeme eingetragenen N-Mengen ergeben sich aus dem Klärschlamm-Aufkommen je Bundesland (SCHULTHEISS et al., 2000, und dort zit. Lit.; MNULV 2001), dem Anteil, der landwirtschaftlich verwertet wird, und dem jeweiligen N-Gehalt der Schlämme (DWA, 2004) gemäß:

$$m_{\text{N,SL}} = m_{\text{SL}} \cdot x_{\text{agr}} \cdot x_{\text{FS}} \cdot (x_{\text{WS}} \cdot c_{\text{N,WS}} + x_{\text{DHS}} \cdot c_{\text{N,DHS}} + x_{\text{LS}} \cdot c_{\text{N,LS}} + x_{\text{DS}} \cdot c_{\text{N,DS}}) \quad (11.4)$$

$m_{\text{N,SL}}$	nitrogen input with sewage sludge (in Mg a^{-1})
m_{SL}	sewage sludge produced (national total, dry matter) (in Mg a^{-1})
x_{agr}	fraction of sewage sludge applied in agriculture (in Mg Mg^{-1})
x_{FS}	fraction of sewage sludge applied in a single federal state (in Mg Mg^{-1})
x_{WS}	fraction of wet sewage sludge (in Mg Mg^{-1})
$c_{\text{N,WS}}$	nitrogen content of wet sewage sludge (in $\text{Mg Mg}^{-1} \text{ N}$)
x_{DHS}	fraction of dehydrated sewage sludge (in Mg Mg^{-1})
x_{LS}	fraction of limed sewage sludge (in Mg Mg^{-1})
x_{DS}	fraction of dried sewage sludge (in Mg Mg^{-1})

A data set which was derived from this information was provided by UMWELTBUNDESAMT (Section III 3.3). Since 2009 the STATISTISCHE BUNDESAMT (Referat G 202) is responsible to provide these data. They are generated for reporting of the recycling of sewage sludge to the EU in compliance with directive 86/278/EEC (EEC, 1986).

Die hieraus abgeleiteten Daten wurden vom UMWELTBUNDESAMT bereitgestellt (Fachgebiet III 3.3). Seit 2009 ist für die Bereitstellung der Daten das STATISTISCHE BUNDESAMT zuständig (Referat G 202). Die Daten werden für die Berichtspflicht gegenüber der EU zu Verwertung von Klärschlämmen erarbeitet. Rechtsgrundlage ist die Richtlinie 86/278/EWG (EEC, 1986).

Table 11.4 and Table 11.5 give a review on the raw data available:

Table 11.4 und Table 11.5 geben einen Überblick über die verfügbaren Rohdaten:

Both the amounts of sewage sludge produced and the amounts used in agriculture are available as incomplete time series as national totals for the time between 1991 and 2000. For 1995 and since 1998, data for single federal states is available. At the time the emission reporting submission at hand was prepared no data was available for the last year of the time series. The missing value is estimated by adopting the value of the second-last year that in turn could be updated with new data.

Klärschlamm-Mengen und landwirtschaftlich genutzte Klärschlamm-Mengen liegen seit 1991 als unvollständige Zeitreihen für das gesamte Bundesgebiet vor. Für 1995 und ab 1998 sind Daten für Bundesländer verfügbar. Zum Zeitpunkt der Erstellung der aktuellen Emissionsberichterstattung lagen noch keine Daten für das letzte Zeitreihenjahr vor. Als Ersatz wird der Wert des vorletzten Zeitreihenjahres verwendet, der anhand neuer Daten aktualisiert werden konnte.

Table 11.4: Sewage sludge applied within agriculture (in Gg a⁻¹, dry matter) (statistical data)

	1991	1992	1995	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
BW			106		83	83	76	63	52	52	39	28	19	8	6	6	7	5	5	3	3	2	2	2
BY			159		141	138	128	98	86	84	73	63	60	57	53	56	50	53	48	47	47	39	41	31
BB			16		26	23	20	17	21	17	17	15	16	17	20	18	17	18	16	14	15	14	10	
HE			76		68	67	63	64	55	58	53	42	43	51	49	52	54	56	55	48	54	51	52	38
MV			9		22	29	32	31	27	25	26	46	46	35	36	32	36	34	35	33	30	22	23	18
NI			198		173	179	176	157	164	170	162	152	149	141	138	136	133	128	124	90	90	81	81	73
NW			168		146	157	166	128	133	126	121	117	107	101	97	91	90	87	80	77	68	61	58	32
RP			57		56	57	65	69	66	64	63	64	61	63	69	65	63	65	58	57	61	61	55	43
SL			6		4	5	4	5	5	5	5	5	4	7	7	8	8	9	9	9	8	7	5	2
SN			10		1	7	8	5	5	6	2	4	4	8	9	12	14	14	14	13	11	9	12	11
ST			22		37	26	29	28	73	27	26	22	21	16	18	21	20	19	22	20	19	16	16	11
SH			81		67	70	70	73	73	69	65	66	61	63	62	59	55	52	52	52	47	50	52	34
TH			6		6	8	8	7	7	11	12	11	10	10	10	10	9	11	12	11	9	9	7	6
StSt			20		13	14	16	12	10	10	9	9	11	11	12	13	13	12	11	7	8	5	6	1
Ger-many	732	699	941	910	842	862	862	759	727	723	672	645	613	587	586	577	568	564	542	484	471	428	423	312

Source: UMWELTBUNDESAMT, reports to EU; SCHULTHEIß et al., 2000; STATISTISCHES BUNDESAMT (personal communication)

Table 11.5: Sewage sludge, nitrogen content (in g kg⁻¹, related to dry matter) (statistical data)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
BW	28.2	29.2	32.2	34.1	38.9	35.1	40.8	36.4	36.1	42.1	38.4	35.5	41.0	39.0	37.9	43.0	41.0	47.0	42.0	37.0
BY	39.0	36.0	39.5	40.4	39.9	42.1	44.6	47.1	45.8	45.2	45.2	43.4	46.6	47.7	46.8	45.2	46.6	49.0	48.9	53.0
BB	36.8	43.8	33.9	37.0	39.6	41.9	46.1	48.2	55.6	53.2	52.4	50.8	65.4	48.9	51.6	47.9	47.1	42.8	42.3	48.6
HE	30.5	29.8	29.6	27.7	30.6	31.6	32.0	34.3	33.2	31.6	33.5	34.6	33.2	34.9	34.7	37.7	36.0	35.9	35.3	34.1
MV	48.1	50.5		51.4	51.0	57.3	54.1	46.9	46.9	43.9	45.5	47.5	48.4	47.9	51.1	54.4	54.2	51.6	53.8	58.0
NI	53.6	53.7	55.3	56.3	56.4	56.1	56.8	58.4	60.6	65.3	58.9	58.4	56.5	59.1	60.3	58.0	60.4	61.6	60.7	61.4
NW	35.0	36.0	31.0	33.0	29.0	32.0	32.0	33.0	29.0	33.8	33.1	34.5	34.3	31.1	34.3	33.4	35.6	31.0	32.0	29.9
RP	33.9	31.5	33.1	31.1	34.4	36.8	37.2	39.1	39.7	39.8	40.9	40.9	43.3	41.7	41.4	41.1	40.4	41.7	43.8	43.9
SL	42.4	42.0	40.5	44.1	44.2	50.7	46.6	45.1	42.6	44.8	53.2	48.9	49.4	47.2	51.2	48.5	52.0	53.6	53.3	58.8
SN	30.0	26.0	27.0	36.0	25.0	22.0	37.0	35.0	35.0	37.1	36.0	42.7	37.0	36.2	34.9	32.0	34.0	42.0	37.0	28.0
ST	32.7	30.5	29.5	44.7	29.5	42.6	43.5	38.3	43.2	37.0	47.0	49.4	54.6	51.1	48.4	52.6	50.2	50.4	47.6	43.8
SH	17.3	6.2	26.0	27.0	25.0	24.0	28.0	27.0	37.0	30.0	32.0	35.0	40.2	33.0	38.0	34.0	35.0	31.0	34.0	35.0
TH	29.0	33.0	31.0	33.0	36.0	38.0	35.0	35.0	40.0	37.0	44.0	44.0	42.0	42.0	40.4	38.1	36.7	33.4	28.6	21.7
StSt	48.9	52.6	58.7	52.9	41.8	45.6	49.2	47.0	50.4	48.1	65.6	64.1	68.0	69.6	76.8	81.0	80.1	55.4	55.3	56.1
Ger-many	37.5	36.6	38.3	39.4	38.8	40.5	42.0	42.5	43.9	44.4	44.2	44.7	45.8	44.5	46.0	44.4	45.2	43.8	44.1	45.4

Source: UMWELTBUNDESAMT, reports to EU; SCHULTHEIß et al., 2000; STATISTISCHES BUNDESAMT (personal communication)

In the time series for national activities, missing data were replaced by those from previous years. For 1990, data from 1991 were used. The missing N contents before 1998 were replaced by the mean concentrations from 1998 for each Federal State.

In Mecklenburg-Vorpommern the amount of sewage sludge was available for 2000, but not the respective N content. The N content of 1999 was combined with the amount spread to estimate the amount of N applied.

The missing information of the amount of sewage sludge applied in the Federal States from 1990 until 1994 and 1996 until 1997 were replaced in the following way: the fraction of the amount applied in each federal state in 1995 of the total amount of sewage sludge applied in 1995 in Germany was multiplied by the amount of sewage sludge that was applied in the whole of Germany in the missing years. Multiplying by N contents allowed to complete the N amount applied in the concerning years in the Federal States.

Data gaps at the end of the time series are closed by adopting the value last reported.

Bei den Zeitreihen der nationalen Aktivitäten wurden fehlende Werte durch Vorjahreswerte ersetzt. Für 1990 wurde der Wert für 1991 angesetzt. Für die fehlenden N-Gehalte der Schlämme vor 1998 wurde in den Ländern jeweils der Wert von 1998 angenommen.

In Mecklenburg-Vorpommern war für das Jahr 2000 die Klärschlamm Menge, aber kein N-Gehalt verfügbar. Hier wurde der N-Gehalt von 1999 eingesetzt und die ausgebrachte N Menge vervollständigt.

Datenlücken der ausgebrachten Klärschlammmengen in den Ländern von 1990 bis 1994 und 1996 bis 1997 wurden wie folgt geschlossen: Der Anteil der 1995 im jeweiligen Bundesland ausgebrachten Menge an der insgesamt 1995 in Deutschland ausgebrachten Klärschlammmenge wurde mit der in den fehlenden Jahren in ganz Deutschland ausgebrachten Klärschlammmenge multipliziert. Durch Multiplikation mit den N-Gehalten konnte die ausgebrachte N Menge in den betroffenen Jahren für die Bundesländer vervollständigt werden.

Für am Ende der Zeitreihe fehlende Daten werden die letzten berichteten Werte eingesetzt.

The uncertainty of the sewage sludge data is unknown. The preliminary assumption is that officially recorded data do not deviate more than 20 %, with a mean of 10 %. The N contents reported should have a similar uncertainty: for the emission inventory the boundaries of the 95 % confidence interval are assumed to be located at ± 20 % of the mean. A normal distribution is assumed.

11.4.2 Calculation of emissions / Emissionsberechnung

11.4.2.1 Emissions of NH_3 / NH_3 -Emissionen

EMEP (2016)-3.D, Table 3-1, provides a Tier 1 emission factor for NH_3 from spreading of sewage sludge. However, the units provided in that table are not correct, as can be deduced from the derivation of the emission factor in the respective guidebook appendix (EMEP (2016)-3D, Appendix A1.2.2.1): It must read 0.13 kg NH_3 per kg N in sewage sludge instead of 0.13 kg NH_3 per capita. The German inventory uses an equivalent emission factor in NH_3 -N units: 0.11 kg NH_3 -N per kg N in sewage sludge. This emission factor is applied for all years of the series.

According to EMEP (2016)-3.D, Table 3-1, there is no information on the uncertainty of the emission factor. Therefore the German inventory assumes that this uncertainty is the same like the uncertainty for the application of mineral fertilizers (see Chapter 11.1.2.1): 50 % for half the 95 % confidence interval (normal distribution).

11.4.2.2 Emissions of N_2O / N_2O -Emissionen

Direct N_2O emissions from soils after the application of sewage sludge are calculated by analogy to the application of mineral fertilizers (see Chapter 11.1, equation (11.2)) by replacing m_{fert} with $m_{\text{N,SL}}$ (see Chapter 11.4.1). The N_2O emission factor provided for mineral fertilizers is adopted. Hence the uncertainty of the emission factor is the same as for the emission factor of mineral fertilizer.

For the indirect N_2O emissions see Chapter 12.

11.4.2.3 Emissions of NO / NO -Emissionen

EMEP (2016)-3.D, Table 3-1, provides, for the first time, a Tier 1 emission factor for NO_2 from spreading of sewage sludge. This NO_2 emission factor is based on the NO -N emission factor by STEHFEST UND BOUWMAN (2006), which is 0.012 kg NO -N per kg of N applied. This NO -N emission factor is used in the German inventory.

EMEP (2016)-3.D, Table 3-1, does not provide the uncertainty of the emission factor. However, as the emission factor is identical to that used for mineral fertilizers (see Chapter 11.1.2.3), the pertinent boundaries of the 95 % confidence interval are adopted.

Die Unsicherheit der Klärschlamm-Daten ist unbekannt. Vorläufig wird angenommen, dass offiziell gemeldete Mengen mit einem Fehler von höchstens 20 %, im Mittel von 10 % behaftet sind. Die Unsicherheit der N-Gehalte sollte in der gleichen Größenordnung liegen: Für das Emissionsinventar werden die 95 %-Konfidenzintervall-Grenzen mit ± 20 % des Mittelwertes angesetzt. Die Verteilung ist normal.

EMEP (2016)-3.D, Table 3-1, gibt einen Tier-1-Emissionsfaktor für NH_3 aus der Klärschlammausbringung an, allerdings mit einer falschen Einheit, wie anhand der im zugehörigen Anhang des Guidebooks (EMEP (2016)-3D, Appendix A1.2.2.1) beschriebenen Emissionsfaktor-Herleitung festzustellen ist: Statt 0,13 kg NH_3 pro Kopf der Bevölkerung muss es 0,13 kg NH_3 pro kg Klärschlamm-N heißen. Das deutsche Inventar verwendet einen dazu äquivalenten Emissionsfaktor in NH_3 -N-Einheiten: 0,11 kg NH_3 -N pro kg Klärschlamm-N. Dieser Emissionsfaktor wird für alle Jahre der Zeitreihe verwendet.

Laut EMEP (2016)-3.D, Table 3-1, gibt es keine Information zur Unsicherheit des Emissionsfaktors. Das deutsche Inventar nimmt daher an, dass diese Unsicherheit die gleiche ist wie bei der Ausbringung von Mineraldünger (siehe Kapitel 11.1.2.1): 50 % für das halbe 95 %-Konfidenzintervall (Normalverteilung).

Die direkten N_2O -Emissionen aus landwirtschaftlichen Böden als Folge der Ausbringung von Klärschlämmen werden in Analogie zur Anwendung von Mineraldünger (siehe Kapitel 11.1, Gleichung (11.2)) berechnet, indem m_{fert} durch $m_{\text{N,SL}}$ (siehe Kapitel 11.4.1) ersetzt wird. Es wird der N_2O -Emissionsfaktor von Mineraldünger übernommen. Siehe dort auch zu den Unsicherheiten des Emissionsfaktors.

Zu den indirekten N_2O -Emissionen siehe Kapitel 12.

In EMEP (2016)-3.D, Table 3-1, wird erstmals ein Tier-1-Emissionsfaktor für NO_2 aus der Ausbringung von Klärschlamm angegeben. Dieser basiert auf dem NO -N-Emissionsfaktor von STEHFEST UND BAUMANN (2006), der 0,012 kg NO -N pro kg an ausgebrachtem N beträgt. Dieser NO -N-Emissionsfaktor wird im deutschen Inventar verwendet.

EMEP (2016)-3.D, Table 3-1, gibt keine EF-Unsicherheit an. Da der EF aber identisch mit dem für Mineraldünger verwendeten EF ist (siehe Kapitel 11.1.2.3), werden die dort angegebenen Grenzen des 95 %-Konfidenzintervalls übernommen.

11.5 Grazing / Weidegang

The inventory considers grazing for cattle (including buffalo, but without calves), horses (including mules and asses), sheep and goats.

For grazing emissions of NH_3 , N_2O and NO are calculated.

Weidegang wird im Inventar für Rinder (einschließlich Büffel, aber ohne Kälber), Pferde (einschließlich Esel und Maultiere), Schafe und Ziegen berücksichtigt.

Für Weidegang werden Emissionen von NH_3 , N_2O und NO berechnet.

11.5.1 Activity data / Aktivitätsdaten

N_2O and NO emissions from agricultural soils as a consequence of excreta dropped during grazing are calculated proportionally to the amount of N excreted. N excretions are described in the animal Chapters.

Based on DÄMMGEN et al., 2009b it is assumed that the assessment of N excretions can be achieved with an uncertainty < 10 %. The inventory uses 10 % as a standard error, i.e. that the uncertainty (half the 95 % confidence interval) is taken to be 20 %. A normal distribution is assumed.

NO emissions from cultivation of agricultural soils and crops manure management are reported (as NO_x), but are neglected regarding the NEC emission threshold, see Chapter 11.1.2.3.

Bodenbürtige N_2O - und NO -Emissionen aufgrund von Weidegang werden proportional zur Menge des auf der Weide ausgeschiedenen N berechnet. Die N -Ausscheidungen werden in den Tier- Kapiteln beschrieben.

In Anlehnung an DÄMMGEN et al. (2009b) wird angenommen, dass die Bestimmung der N -Ausscheidungen mit einer Unsicherheit < 10 % erfolgt. Für das Inventar wird ein Wert von 10 % angesetzt, der als Standardfehler interpretiert wird. Das halbe 95 %-Konfidenzintervall beträgt demnach 20 %. Die Verteilung wird als normal angenommen.

NO aus der Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Böden wird zwar berichtet (als NO_x), bzgl. der NEC-Emissionsobergrenze aber nicht angerechnet, siehe Kapitel 11.1.2.3.

11.5.2 Calculation of emissions / Emissionsberechnung

The quantification of the NH_3 emissions is described in context with the calculation of the emissions from animal husbandry (Chapters 4 to 7).

The direct N_2O - N emissions are calculated according to IPCC(2006)-11.6 ff The emissions of NO are assessed accordingly. In both cases the methodology is a Tier 1 methodology.

Die NH_3 -Emissionen werden im Zusammenhang mit den Emissionen aus der Nutztierhaltung (Kapitel 4 bis 7) berechnet.

Die direkten N_2O - N -Emissionen werden nach IPCC(2006)-11.6 ff berechnet. Die Berechnung der NO -Emissionen erfolgt in Analogie dazu. In beiden Fällen handelt es sich um eine Tier-1-Methodik.

$$E_{\text{N}_2\text{O}-\text{N}, \text{graz}} = m_{\text{N}, \text{graz}, 1} \cdot EF_{\text{N}_2\text{O}-\text{N}, \text{graz}, 1} + m_{\text{N}, \text{graz}, 2} \cdot EF_{\text{N}_2\text{O}-\text{N}, \text{graz}, 2} \quad (11.5)$$

$$E_{\text{NO}-\text{N}, \text{graz}} = m_{\text{N}, \text{graz}, 1} \cdot EF_{\text{NO}-\text{N}, \text{graz}, 1} + m_{\text{N}, \text{graz}, 2} \cdot EF_{\text{NO}-\text{N}, \text{graz}, 2} \quad (11.6)$$

$E_{\text{N}_2\text{O}-\text{N}, \text{graz}}$	N_2O - N emission due to animal grazing (in Gg a^{-1})
$m_{\text{N}, \text{graz}, 1}$	amount of N excreted during grazing of cattle (in Gg a^{-1})
$EF_{\text{N}_2\text{O}-\text{N}, \text{graz}, 1}$	N_2O - N emission factor for grazing of cattle (in kg kg^{-1})
$m_{\text{N}, \text{graz}, 2}$	amount of N excreted during grazing of sheep, goats and horses (in Gg a^{-1})
$EF_{\text{N}_2\text{O}-\text{N}, \text{graz}, 2}$	N_2O - N emission factor for grazing of sheep, goats and horses (in kg kg^{-1})
$E_{\text{NO}-\text{N}, \text{graz}}$	NO - N emission due to animal grazing (in Gg a^{-1})
$EF_{\text{NO}-\text{N}, \text{graz}, 1}$	NO - N emission factor for grazing of cattle (in kg kg^{-1})
$EF_{\text{NO}-\text{N}, \text{graz}, 2}$	NO - N emission factor for grazing of sheep, goats and horses (in kg kg^{-1})

The following emission factors are used for N_2O - N (IPCC(2006)-11.11, Table 11.1):

- $EF_{\text{N}_2\text{O}-\text{N}, \text{graz}, 1} = 0.02 \text{ kg } \text{N}_2\text{O}-\text{N} (\text{kg N})^{-1}$
- $EF_{\text{N}_2\text{O}-\text{N}, \text{graz}, 2} = 0.01 \text{ kg } \text{N}_2\text{O}-\text{N} (\text{kg N})^{-1}$

The uncertainty range of $EF_{\text{N}_2\text{O}-\text{N}, \text{graz}, 1}$ and $EF_{\text{N}_2\text{O}-\text{N}, \text{graz}, 2}$ is given by $0.007 - 0.06 \text{ kg kg}^{-1}$ and $0.003 - 0.03 \text{ kg kg}^{-1}$, respectively. It is assumed that these intervals represent the 95 % confidence intervals. In both cases, the interval between the upper limit of the confidence interval and the mean emission factor is 200 % of the mean emission

Für N_2O - N werden die folgenden Emissionsfaktoren verwendet (IPCC(2006)-11.11, Table 11.1):

- $EF_{\text{N}_2\text{O}-\text{N}, \text{graz}, 1} = 0,02 \text{ kg } \text{N}_2\text{O}-\text{N} (\text{kg N})^{-1}$
- $EF_{\text{N}_2\text{O}-\text{N}, \text{graz}, 2} = 0,01 \text{ kg } \text{N}_2\text{O}-\text{N} (\text{kg N})^{-1}$

Der Unsicherheitsbereich wird für $EF_{\text{N}_2\text{O}-\text{N}, \text{graz}, 1}$ mit $0,007 - 0,06 \text{ kg kg}^{-1}$ und für $EF_{\text{N}_2\text{O}-\text{N}, \text{graz}, 2}$ mit $0,003 - 0,03 \text{ kg kg}^{-1}$ angegeben. Diese Intervalle werden als 95 %-Konfidenzintervall aufgefasst. Dabei entspricht in beiden Fällen das Intervall zwischen oberer Konfidenzintervall-Grenze und verwendetem Emissionsfaktor 200 % des

factor, while the interval between the lower limit of the confidence interval and the mean emission factor is 70 %. According to IPCC(2006)-3.29, the higher percentage, i. e. 200 %, is to be used for the calculation of the overall uncertainty of the GHG inventory (see Chapter 14.6). Based on the asymmetry of the confidence intervals, lognormal distribution is assumed.

Regarding the NO emission factor, EMEP (2016)-3D, Table 3-1, does not distinguish between emissions from animal excretions on pasture, application of animal manures and application of mineral fertilizers. For those three sources the same emission factor is used; it is based on the NO emission factor by STEHFEST UND BOUWMAN (2006): $0.012 \text{ kg NO-N (kg N)}^{-1}$. This emission factor is used in the German inventory as of Submission 2018: $EF_{\text{NO-N, graz, 1}} = EF_{\text{NO-N, graz, 2}} = 0.012 \text{ kg NO-N (kg N)}^{-1}$.

The uncertainty of the NO emission factor is assumed to be the same like for mineral fertilizers, see Chapter 11.1.2.3.

Emissionsfaktors, das Intervall zwischen unterer Konfidenzintervall-Grenze und Emissionsfaktor liegt bei 70 %. Nach IPCC(2006)-3.29 geht in die Gesamtunsicherheit des deutschen Treibhausgasinventars (siehe Kapitel 14.6) der größere Prozentwert ein, d. h. 200 %. Aufgrund der Asymmetrie des Konfidenzintervalls wird Lognormalverteilung angenommen.

EMEP (2016)-3D, Tabelle 3-1, unterscheidet bzgl. des Emissionsfaktors nicht zwischen tierischen Ausscheidungen auf der Weide, Ausbringung von Wirtschaftsdünger und Ausbringung von Mineraldünger. Für alle drei Quellen wird der gleiche NO-Emissionsfaktor verwendet, der auf dem NO-Emissionsfaktor von STEHFEST UND BOUWMAN (2006) beruht: $0,012 \text{ kg NO-N (kg N)}^{-1}$. Dieser Emissionsfaktor wird ab Submission 2018 im deutschen Inventar verwendet: $EF_{\text{NO-N, graz, 1}} = EF_{\text{NO-N, graz, 2}} = 0,012 \text{ kg NO-N (kg N)}^{-1}$.

Die Unsicherheit des NO-Emissionsfaktor wird wie bei Mineraldünger angesetzt, siehe Kapitel 11.1.2.3.

11.6 Management of drained organic soils / Bewirtschaftung drainierter organischer Böden

The degradation of managed organic soils (histosols) leads to direct N₂O emissions. Only drained organic soils are used for agricultural management.

No methodology is available to calculate the degradation of organic soils and the resulting amounts of N as activity data. Hence, direct N₂O emissions are calculated as proportional to the area of managed organic soils.

Die Degradation bewirtschafteter organischer Böden (Histosols) führt zu direkten N₂O-Emissionen. Nur drainierte Böden werden bewirtschaftet.

Es steht kein Verfahren zur Verfügung, die bei der Degradation freiwerdende N-Menge als Aktivitätswert zu berechnen. Daher werden direkte N₂O-Emissionen proportional zur Fläche der bewirtschafteten organischen Böden berechnet.

11.6.1 Activity data / Aktivitätsdaten

Data on areas with drained organic soils have been provided separately for arable land and drained grassland by the LULUCF sector for each year and each federal state (GENSIOR 2019, personal communication), see Table 11.6. Due to a new calculation methodology, these values differ significantly from those on which Submission 2019 was based. The areas for grassland listed in Table 11.6 differ from the grassland areas reported by the LULUCF sector: the difference is the total area of the undrained grassland.

Die Flächen drainierter organischer Böden wurden durch den LULUCF-Sektor für jedes Jahr und jedes Bundesland getrennt für Ackerland und drainiertes Grünland bereitgestellt (GENSIOR 2019, persönliche Mitteilung), siehe Table 11.6. Aufgrund einer neuen Berechnungsmethodik unterscheiden sich diese Werte merklich von denen, die der Submission 2019 zugrunde gelegt wurden. Die in Table 11.6 genannten Flächen für Grünland weichen von den Grünlandflächen ab, die der LULUCF-Sektor berichtet: Die Differenz ist die Gesamtfläche des nicht drainierten Grünlandes.

Table 11.6: Organic soils, German totals of areas of arable land and drained grassland (in 1000 ha)

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
total	1244.2	1244.5	1244.9	1245.2	1245.6	1245.9	1246.3	1246.6	1247.0	1247.4
arable land	335.7	334.4	333.0	331.7	330.3	329.0	327.6	326.3	325.0	323.6
grassland (drained)	908.5	910.2	911.9	913.6	915.3	916.9	918.7	920.3	922.0	923.7
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
total	1247.7	1274.4	1247.1	1246.8	1246.5	1246.2	1243.2	1240.2	1237.2	1236.0
arable land	322.3	324.6	326.8	329.1	331.4	333.6	334.2	334.8	335.3	339.5
grassland (drained)	925.4	922.8	920.3	917.7	915.2	912.6	909.0	905.5	901.9	896.5
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
total	1234.7	1233.5	1232.2	1230.2	1228.2	1226.2	1224.1	1221.5	1218.9	
arable land	343.6	347.7	351.8	351.4	350.9	350.5	350.0	346.1	342.1	
grassland (drained)	891.1	885.8	880.4	878.8	877.2	875.7	874.1	875.4	876.7	

The areas used in LULUCF have an overall uncertainty of < 1 % (half the 95 % confidence interval) (GENSIOR 2012, personal communication). This value is also taken to be valid for histosols.

Die in LULUCF eingehenden Flächendaten haben eine Gesamtunsicherheit (halbes 95 %-Konfidenzintervall) von < 1 % (GENSIOR 2012, persönliche Mitteilung). Dieser Wert wird für die organischen Böden übernommen.

11.6.2 Calculation of emissions / Emissionsberechnung

The N₂O emissions strongly depend on soil type, intensity of management and climate. However, due to lack of an appropriate methodology, these processes cannot be taken into account. Hence, similar to the Tier 1 approach given in IPCC(2006)-11.10 ff, the N₂O emissions are calculated proportionally to the area (separately for arable land and drained grassland):

Die N₂O-Emissionen hängen stark vom Bodentyp, der Intensität der Nutzung und vom Klima ab. Diese Einflüsse können mangels einer geeigneten Methodik nicht berücksichtigt werden. Daher werden in Anlehnung an das Tier-1-Verfahren in IPCC(2006)-11.10 f die N₂O-N-Emissionen proportional zur Fläche berechnet, getrennt nach Acker und drainiertem Grünland:

$$E_{\text{N}_2\text{O-N, hist}} = \beta \cdot A_{\text{hist}} \cdot EF_{\text{N}_2\text{O-N, hist}} \quad (11.7)$$

$E_{\text{N}_2\text{O-N, hist}}$	emission flux of N ₂ O-N directly emitted from organic soils (arable land or drained grassland) (in Gg a ⁻¹)
β	mass units conversion factor ($\beta = 10^{-6}$ Gg kg ⁻¹)
A_{hist}	area of organic soils (arable land or drained grassland) (in ha)
$EF_{\text{N}_2\text{O-N, hist}}$	N ₂ O-N emissions factor for organic soils (arable land or drained grassland) (in kg ha ⁻¹ a ⁻¹)

The German average emission factor for arable land (10.7 kg N₂O-N per hectare and year) was derived from German data used by LEPELT et al. (2014) for their European study. For drained grassland an emission factor of 2.3 kg N₂O-N per hectare and year is used; it was derived from a study (TIEMEYER et al., 2016) that synthesizes datasets from 6 publications with 122 full annual measurements covering 12 different peatland areas in Germany.

As the shares of arable land and grassland vary year by year, the overall emission factor is not a constant, see the time series shown in Table 11.7. This overall emission factor is significantly lower than the IPCC default of 8 kg N₂O-N per hectare and year (IPCC (2006)-11.10 ff).

Der mittlere deutsche Emissionsfaktor für Acker (10,7 kg N₂O-N je Hektar und Jahr) wurde aus den deutschen Daten abgeleitet, die LEPELT et al. (2014) für ihre europaweite Studie verwendeten. Für drainiertes Grünland wird nach TIEMEYER et al. (2016) ein Emissionsfaktor von 2,3 kg N₂O-N je Hektar und Jahr verwendet; er wurde im Rahmen einer Studie (TIEMEYER et al., 2016) abgeleitet, die auf Datensätzen aus 6 Publikationen mit 122 ganzjährigen Messungen für 12 verschiedene Moorgebiete in Deutschland beruht.

Die von Jahr zu Jahr variierenden Acker- und Grünlandflächen führen zu einem nicht konstanten effektiven Emissionsfaktor, siehe Table 11.7. Dieser liegt deutlich niedriger als der IPCC-Defaultwert von 8 kg N₂O-N je ha und Jahr (IPCC (2006)-11.10 f).

Table 11.7: Organic soils, overall N₂O-N emission factors (in kg kg⁻¹)

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
N ₂ O-N	4.57	4.56	4.55	4.54	4.53	4.52	4.51	4.50	4.49	4.48
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
N ₂ O-N	4.47	4.49	4.50	4.52	4.53	4.55	4.56	4.57	4.58	4.61
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
N ₂ O-N	4.64	4.67	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70	4.68	4.66	

For the emission factor of arable land the data used by LEPELT et al. (2014) lead to a 95 % confidence interval between 1.6 and 41.4 kg ha⁻¹ a⁻¹ (FREIBAUER 2014, personal communication). According to TIEMEYER et al. (2016) the standard error for the emission factor for grassland is ± 2.4 kg ha⁻¹ a⁻¹. This is, using an approximate factor of 2 between standard error and half the 95 % confidence interval (see Chapter 14.2), equivalent to a 95 % confidence interval of [-2.5 kg ha⁻¹ a⁻¹; 7.1 kg ha⁻¹ a⁻¹]. Taking into account the uncertainties of the areas of arable land and drained grassland on organic soils (see Chapter 11.6.1), the boundaries of the 95 % confidence interval of the overall emission factor are: - 63 %, + 179 %. According to IPCC(2006)-3.29, the higher (absolute) percentage is to be used for the calculation of the overall uncertainty of the GHG inventory (see Chapter 14.6). It was conservatively rounded to the next one hundred, i.e. 200 %.

Based on the asymmetry of the confidence intervals, lognormal distribution is assumed.

Die von LEPELT et al. (2014) verwendeten Daten führen (FREIBAUER 2014, persönliche Mitteilung) zu einem 95 %-Konfidenzintervall für den Emissionsfaktor für Ackerland zwischen 1,6 und 41,4 kg ha⁻¹ a⁻¹. TIEMEYER et al. (2016) geben für den Emissionsfaktor für Grünland einen Standardfehler von $\pm 2,4$ kg ha⁻¹ a⁻¹ an. Dies entspricht, wenn man näherungsweise einen Faktor 2 zwischen Standardfehler und halben Konfidenzintervall zugrunde legt (siehe Kapitel 14.2), einem 95 %-Konfidenzintervall von [-2,5 kg ha⁻¹ a⁻¹; 7,1 kg ha⁻¹ a⁻¹]. Daraus wurden unter Berücksichtigung der Unsicherheit der eingehenden Flächen (siehe Kapitel 11.6.1) die 95 %-Konfidenzintervall-Grenzen für den über Acker- und Grünland gemittelten Emissionsfaktor abgeleitet: - 63 %, + 179 %. Entsprechend IPCC(2006)-3.29 ist davon der absolut größere Wert für die Berechnung der Gesamt-THG-Unsicherheit (siehe Kapitel 14.6) zu verwenden. Er wurde für das Inventar auf 200 % aufgerundet.

Aufgrund der Asymetrie wird eine lognormale Verteilung angenommen.

11.7 Crop residues / Ernterückstände

The inventory calculates N₂O emissions from the biological decomposition of crop residues in the field. (For field burning of crop residues see Chapter 11.9.)

Das Inventar berechnet N₂O aus dem biologischen Zerfall von Ernterückständen auf dem Feld. (Zum Verbrennen von Ernterückständen siehe Kapitel 11.9.)

11.7.1 Activity data / Aktivitätsdaten

The N₂O emissions are calculated proportionally to the amounts of N stored in the above-ground and below-ground biomass. This requires the knowledge of the areas of cultivation, of crop yields and of the N contents of the crop residues. The data used for calculation are compiled in Table 11.8 and

Table 11.9, unless they are variables.

Before the calculation of N₂O emissions, the amount of N removed with straw to be used as bedding material ($m_{N, \text{straw}}$) is calculated according to the requirements (see from Chapter 4 onwards) and subtracted from the total N in crop residues

The uncertainty of the activity data is addressed in Chapter 11.7.1.6.

Die N₂O-Emissionen werden proportional zu den N-Mengen berechnet, die in den oberirdischen und unterirdischen Ernterückständen verbleiben. Benötigt werden die jeweiligen Anbauflächen, die Erträge und die N-Gehalte der Ernterückstände. Die zur Berechnung benötigten Daten sind in Table 11.8 und

Table 11.9 zusammengestellt, sofern es sich nicht um Variablen handelt.

Vor der Berechnung der N₂O-Emissionen wird die N-Menge, die mit Stroh zu Einstreuzwecken in der Tierhaltung von der Fläche entfernt wird, ermittelt ($m_{N, \text{straw}}$, siehe ab Kapitel 4) und von der N-Menge in den Ernteresten abgezogen.

Zur Aktivitätsdaten-Unsicherheit siehe Kapitel 11.7.1.6.

11.7.1.1 Area under cultivation / Anbauflächen

For federal states, areas under cultivation are reported annually in the official statistics in StatBA FS 3, R 3. For districts, data are available for the years 1991, 1995, 1999 and 2003 (STATLA, R CI).

For the emission reporting only the data on federal-state level are used.

The area reported for "Sommermenggetreide" (mix of spring barley and oats) is treated as being spring barley, the area covered with "Wintermenggetreide" (mix of wheat and rye) is attributed to rye.

Data gaps are filled with data of the latest year without data gaps.

Die Anbauflächen werden jährlich vom Statistischen Bundesamt StatBA FS 3, R 3 auf Bundeslandebene bereitgestellt. Auf Kreisebene stehen Daten für 1991, 1995, 1999 und 2003 zur Verfügung (STATLA R CI).

Für die Emissionsberichterstattung werden ausschließlich die Daten auf Bundeslandebene verwendet.

Die Fläche für Sommermenggetreide wird der Fläche für Hafer zugeschlagen; die Fläche für Wintermenggetreide wird unter Roggen erfasst.

Bei fehlenden einzelnen Werten wird auf die Anbauflächen des letzten verfügbaren Jahres zurückgegriffen.

11.7.1.2 Yields / Erträge

For federal states, yields are reported annually in the official statistics in StatBA FS 3, R 3. For districts, data are available for the years 1991, 1995, 1999, 2003 (STATLA, R CI).

For the emission reporting only the data on federal-state level are used, they are related to fresh matter.

Data gaps are filled with the mean yields reported for Germany as a whole for this year.

For Berlin the yields of Brandenburg, for Bremen the yields of Lower Saxony and for Hamburg the yields of Schleswig-Holstein are used.

Erträge werden jährlich vom Statistischen Bundesamt StatBA FS 3, R 3 auf Bundeslandebene bereitgestellt. Auf Kreisebene existieren stehen Daten für 1991, 1995, 1999, 2003 zur Verfügung (STATLA R CI).

Für die Emissionsberichterstattung werden ausschließlich die Daten auf Bundeslandebene verwendet, sie beziehen sich auf Frischmasse.

Datenlücken werden durch die durchschnittlichen Erträge Deutschlands des jeweiligen Jahres geschlossen.

Für Berlin werden die Erträge von Brandenburg, für Bremen von Niedersachsen und für Hamburg von Schleswig-Holstein verwendet.

11.7.1.3 Constants for agricultural crops and grassland / Konstanten für Grünland und Ackerland

The calculation of emissions from crop residues require a number of constants that are described in the following.

Zur Berechnung der Emissionen aus Ernterückständen werden eine Reihe von Konstanten benötigt, die im Folgenden beschrieben werden.

Table 11.8 in Chapter 11.7.1.5 lists all constants used for agricultural crops and grassland.

Table 11.8 in Kapitel 11.7.1.5 gibt alle verwendeten Konstanten für Grünland und Ackerland an.

11.7.1.3.1 Nitrogen content of the above-ground crop residues ($x_{N, \text{above}, i}$) / Stickstoff-Gehalte der oberirdischen Ernterückstände ($x_{N, \text{above}, i}$)

The values used were taken from the German Fertilizer Ordinance (DÜNGEVERORDNUNG, 2017, Anlage 7, Tabelle 1); they are related to fresh matter.

Die benötigten Daten wurden der DÜNGEVERORDNUNG (2017, Anlage 7, Tabelle 1) entnommen, sie beziehen sich auf Frischmasse.

11.7.1.3.2 Nitrogen content of below ground crop residues ($x_{N, \text{below}, i}$) / Stickstoff-Gehalte der unterirdischen Ernterückstände ($x_{N, \text{below}, i}$)

All data for $x_{N, \text{below}, i}$ except for rape were taken from IPCC(2006)-11.17, since there is no corresponding data in the German Fertilizer Ordinance (DÜNGEVERORDNUNG, 2017). For rape, an expert judgement (ROGASIK, JKI-PB) was used. These values are related to dry matter.

Die Werte für $x_{N, \text{below}, i}$ mit Ausnahme von Raps wurden IPCC(2006)-11.17 entnommen da in der Düngeverordnung (DÜNGEVERORDNUNG, 2017) entsprechende Daten fehlen. Für Raps wurde eine Expertenschätzung (ROGASIK, JKI-PB) verwendet. Diese Werte beziehen sich auf Trockenmasse.

11.7.1.3.3 Dry matter content of yield and above ground residues ($x_{Y, DM, i}$ / $x_{AGR, DM, i}$) / Trockenmassegehalte von Erntegut und oberirdischen Ernterückständen ($x_{Y, DM, i}$ / $x_{AGR, DM, i}$):

For the calculation of below-ground crop residues, fresh matter-related data have to be converted into dry matter-related data.

Bei der Berechnung der unterirdischen Ernterückstände müssen Angaben die sich auf Frischmasse beziehen, auf Trockenmasse umgerechnet werden.

The values used were taken from the German Fertilizer Ordinance (DÜNGEVERORDNUNG, 2017, Anlage 7, Tabelle 1).


Die benötigten Daten wurden der DÜNGEVERORDNUNG (2017, Anlage 7, Tabelle 1) entnommen.

11.7.1.3.4 Ratio of above ground crop residues to yield ($a_{\text{above}, i}$) / Verhältnis der oberirdischen Ernterückstände zur Ernte ($a_{\text{above}, i}$)

Figure 11.1 illustrates the relations between the various parts of the plants used to establish the ratios between above ground biomass, below ground biomass and yield.

Die Zusammenhänge zur Berechnung der unterschiedlichen Verhältnisse von oberirdischen und unterirdischen Biomasse sowie Erträgen gehen aus Figure 11.1 hervor.

Figure 11.1: Above and below ground parts of crops, tuber crops and grasses



For grains, rape, grain maize and legumes (Figure 11.1, left) $a_{\text{above}, i} = a_2/a_1$, which is the reciprocal of the corn straw ratio. These values were taken from the German Fertilizer Ordinance (DÜNGEVERORDNUNG, 2017, Anlage 7, Tabelle 1). They are related to fresh matter.

For tuber crops (Figure 11.1, centre), $a_{\text{above}, i} = a/b_1$, which is the reciprocal of the root leaf ratio. These

Für Getreide, Raps, Körnermais und Ackerleguminosen (Figure 11.1, links) gilt $a_{\text{above}, i} = a_2/a_1$; das entspricht dem Kehrwert des Korn-Stroh-Verhältnisses. Diese Werte stammen aus der DÜNGEVERORDNUNG (2017, Anlage 7, Tabelle 1); sie beziehen sich auf Frischmasse.

Für Hackfrüchte (Figure 11.1, Mitte) gilt $a_{\text{above}, i} = a/b_1$; das entspricht dem Kehrwert des Knolle/Wurzel-

values were taken from the German Fertilizer Ordinance (DÜNGEVERORDNUNG, 2017, Anlage 7, Tabelle 1). They are related to fresh matter.

For permanent grassland (pastures and meadows) and fodder production (grass, clover grass mixtures) and alfalfa (Figure 11.1, right) $a_{\text{above}, i} = a_2/a_1$. These ratios were calculated according to IPCC(2006)-11.17. The result is in each case (rounded for alfalfa) 0.3. This value is related to dry matter. However, it is valid for fresh matter as well in these cases, because it can be assumed that the dry matter contents of a_1 and a_2 do not differ.

In case of maize for silage and cereals harvested as a whole, the complete above ground biomass is harvested. Hence $a_{\text{above}, i} = 0$.

It is assumed that the grain to straw ratios and the root to leave ratios have not changed during the reporting period.

Laub-Verhältnisses. Diese Werte stammen aus der DÜNGEVERORDNUNG (2017, Anlage 7, Tabelle 1); sie beziehen sich auf Frischmasse.

Für Dauergrünland (Weiden und Wiesen) und Feldfutterbau (Gras und Graskleegemische) sowie Luzerne (Figure 11.1, rechts) gilt $a_{\text{above}, i} = a_2/a_1$. Diese Verhältnisse wurden gemäß IPCC(2006)-11.17 ausgerechnet. Der Wert beträgt jeweils 0,3 (für Luzerne gerundet) und bezieht sich auf Trockenmasse. Da jedoch angenommen werden kann, dass in diesen Fällen die Trockenmassegehalte von a_1 und a_2 sich nicht unterscheiden, gilt er ebenso für die Frischmasse.

Bei Silomais und Getreide zur Ganzpflanzenernte wird die ganze oberirdische Pflanze geerntet. Daher ist $a_{\text{above}, i} = 0$.

Es wird davon ausgegangen, dass sich das Korn-Stroh-Verhältnis bzw. das Knolle/Wurzel-Laub-Verhältnis im Berichtszeitraum nicht geändert hat.

11.7.1.3.5 *Ratio of below ground crop residues to above ground biomass ($a_{\text{below}, \text{Bio}, i}$) / Verhältnis der unterirdischen Ernterückstände zur oberirdischen Biomasse ($a_{\text{below}, \text{Bio}, i}$)*

To calculate the below ground crop residues, the ratio of below ground crop residues to above ground biomass $a_{\text{below}, \text{bio}, i}$ (= $R_{\text{BG-BIO}}$ aus IPCC 2006, 11.17) is used. For tuber crops, above ground biomass equals above ground crop residues; apart from that it is the sum of yield and above ground crop residues.

For rye, triticale and rape there is no information in IPCC (2006). The value for grains is used instead. These values are related to dry matter.

Zur Berechnung der unterirdischen Ernterückstände wird das Verhältnis der unterirdischen Ernterückstände zur oberirdischen Biomasse $a_{\text{below}, \text{bio}, i}$ (= $R_{\text{BG-BIO}}$ aus IPCC 2006, 11.17) verwendet. Die oberirdische Biomasse ist dabei für Hackfrüchte gleichzusetzen mit den oberirdischen Ernterückständen, ansonsten ist sie die Summe aus Ernte und oberirdischen Ernterückständen.

Für Roggen, Triticale und Raps enthält IPCC (2006) keine Angaben. Stattdessen wird der Wert für Getreide verwendet. Die Werte beziehen sich auf Trockenmasse.

11.7.1.3.6 *Duration of cropped system ($x_{\text{renew}, i}$) and frequency of harvesting ($x_{\text{mow}, i}$) / Dauer der Kultur ($x_{\text{renew}, i}$) und Erntefrequenz der Kultur ($x_{\text{mow}, i}$)*

For pastures and meadows and fodder production (grass or grass-clover mixtures) crop residues only occur at a noticeably extent, when the field is ploughed up, which does not occur every year. This is accounted for by the factor $x_{\text{renew}, i}$.

The factor $x_{\text{renew}, i}$ equals $1/x$, where x represents the duration of the cropped system in years. For annual crops $x_{\text{renew}, i} = 1$. For pastures and meadows $x_{\text{renew}, i} = 0.1$ (expert judgement ROGASIK), meaning that 10 % of the area with permanent grassland is producing crop residues which have to be taken into account. For fodder production a mean lifetime of 2 to 5 a are usual. A mean of 2.5 a for grass and 3 a for grass-clover mixtures was used in this inventory (expert judgement ROGASIK).

For permanent grassland and fodder production (grass or grass-clover mixtures) it is further assumed, that they are mowed three times a year but that crop residues are produced once only. This is accounted for by the factor $x_{\text{mow}, i}$.

The factor $x_{\text{mow}, i}$ equals $1/x$, where x is the frequency of mowing. For annual crops is $x_{\text{mow}, i} = 1$. For permanent grassland and fodder production is $x_{\text{mow}, i} = 1/3$.

Ernterückstände fallen bei Dauergrünland und Feldfutterbau (Gras und Klee-gras-Mischungen) nur dann in nennenswertem Ausmaß an, wenn nach der Ernte gepflügt wird, was nicht in jedem Jahr der Fall ist. Dies wird durch den Faktor $x_{\text{renew}, i}$ berücksichtigt.

Der Faktor $x_{\text{renew}, i}$ ist gleich $1/x$, wobei x der Dauer der jeweiligen Kultur in Jahren entspricht. Bei einjährigen Kulturen gilt: $x_{\text{renew}, i} = 1$. Für Weiden und Wiesen gilt $x_{\text{renew}, i} = 0,1$ (Expertenurteil ROGASIK), das bedeutet auf 10 % der Grünlandfläche entstehen Ernterückstände, die berücksichtigt werden müssen. Für Feldfutterbau wird eine mittlere Dauer von 2 bis 5 a, im Mittel 2,5 a für Gras und 3 a für Klee-gras-Mischungen angenommen (Expertenurteil ROGASIK).

Für Dauergrünland und Feldfutterbau (Gras und Klee-gras-Mischungen) wird weiter angenommen, dass dreimal im Jahr gemäht wird, aber nur einmal Ernterückstände anfallen. Dies wird durch den Faktor $x_{\text{mow}, i}$ berücksichtigt.

Der Faktor $x_{\text{mow}, i}$ ist gleich $1/x$, wobei x der Mähhäufigkeit pro Jahr entspricht. Bei den einjährigen Kulturen gilt: $x_{\text{mow}, i} = 1$. Bei Dauergrünland und Feldfutterbau gilt $x_{\text{mow}, i} = 1/3$.

11.7.1.4 *Constants needed for horticultural crops and Strawberries / Für Gemüse und Erdbeeren benötigte Konstanten*

The calculation of emissions from crop residues require a number of constants that are described in the following.

Table 11.9 in Chapter 11.7.1.5 lists all constants used for horticultural crops and Strawberries.

Zur Berechnung der Emissionen aus Ernterückständen werden eine Reihe von Konstanten benötigt, die im Folgenden beschrieben werden.

Table 11.9 in Kapitel 11.7.1.5 gibt alle verwendeten Konstanten für Gemüse und Erdbeeren an.

11.7.1.4.1 *Ratio of crop residues to yield (a_i) / Verhältnis der Ernterückstände zur Ernte (a_i)*

For horticultural crops and Strawberries, there is no data to distinguish between above and below ground crop residues. The ratio of crop residues to yield is used instead. It was calculated using informations from IGZ (2011).

Exceptions are data for asparagus and strawberries (SLULG, 2019), and horse radish (SLL, 2007).

Für Gemüse und Erdbeeren gibt es keine Daten zur Unterscheidung zwischen ober- und unterirdischen Ernterückständen. Stattdessen wird das aus Angaben in IGZ (2011) berechnete Verhältnis Ernterückstände/Ernte verwendet.

Ausnahmen sind die Angaben für Spargel und Erdbeeren (SLULG, 2019) und Meerrettich (SLL, 2007).

11.7.1.4.2 *Nitrogen content of crop residues ($x_{N,i}$) and harvested crop products ($x_{N,yield,i}$) / Stickstoff-Gehalte der Ernterückstände ($x_{N,i}$) und der geernteten Produkte ($x_{N,yield,i}$):*

Nitrogen contents of crop residues were taken from IGZ (2011). Exceptions are data for asparagus, rhubarb and strawberries (SLULG, 2019), and horse radish (SLL, 2007).

Nitrogen content of harvested crop products were obtained from the German Fertilizer Ordinance (DÜNGEVERORDNUNG, 2017, Anlage 7, Tabelle 2).

Die Stickstoff-Gehalte der Ernterückstände wurden aus IGZ (2011) übernommen. Ausnahmen sind Angaben für Spargel, Rhabarber und Erdbeeren (SLULG, 2019) und Meerrettich (SLL, 2007).

Die Stickstoff-Gehalte der geernteten Produkte wurden aus der DÜNGEVERORDNUNG (2017, Anlage 7, Tabelle 2) übernommen.

11.7.1.4.3 *Factor for not harvested horticultural crops (δ_{HC}) / Faktor für nicht geerntetes Gemüse (δ_{HC})*

Following expert judgement (FELLER C, IGZ Großbeeren and Erfurt) it is to be expected that only 70 to 90 % of the horticultural crops grown are actually harvested. The rest of 10 to 30 % is not marketable and will not be harvested. For the inventory the percentage of the total amount of not harvested horticultural crops is assumed to be $q = 20\%$. Then the ratio of the amounts of unharvested crops to harvested crops is given by $\delta_{HC} = q / (100 - q) = 20/80$. This ratio is also adopted for strawberries.

The unharvested fraction of the horticultural crops are treated as additional crop residues.

Laut Expertenurteil (FELLER C, IGZ Großbeeren und Erfurt) ist davon auszugehen, dass nur zwischen 70 und 90 % des aufgewachsenen Gemüses auch geerntet werden, die restlichen 10 bis 30 % verbleiben als nicht vermarktbare auf dem Feld. Für das Inventar wird dieser auf dem Feld verbleibende Anteil des aufgewachsenen Gemüses mit $q = 20\%$ angesetzt. Damit lässt sich das Mengenverhältnis von nicht geerntetem zu geerntetem Gemüse durch $\delta_{HC} = q / (100 - q) = 20/80$ beschreiben. Dieses Verhältnis wird auch für Erdbeeren übernommen.

Der auf dem Feld verbleibende Anteil des Gesamtaufwuchses wird den Ernterückständen hinzugerechnet.

11.7.1.5 Overview of data used to estimate the activity data / Übersicht über die zur Aktivitätsdatenberechnung verwendeten Daten

Table 11.8 und Table 11.9 list the constants used to estimate the activity data.

Table 11.8 und Table 11.9 geben die zur Aktivitätsdatenberechnung verwendeten Konstanten wieder.

Table 11.8: Crop residues (agricultural crops and grassland), data used to calculate N₂O and N₂ emissions

Agricultural Crop	$X_{\text{renew},i}$ ha ha ⁻¹	$X_{\text{mow},i}$	$X_{Y,DM,i}$ kg kg ⁻¹	$X_{AGR,DM,i}$	$a_{\text{above},i}$ kg kg ⁻¹	$X_{N,\text{above},i}$ kg (kg FM) ⁻¹	$a_{\text{below},bio,i}$ kg kg ⁻¹	$X_{N,\text{below},i}$ kg (kg DM) ⁻¹
winter wheat	1	1	0.86	0.86	0.8	0.0050	0.23	0.009
spring wheat	1	1	0.86	0.86	0.8	0.0050	0.28	0.009
rye	1	1	0.86	0.86	0.9	0.0050	0.22	0.011
winter barley	1	1	0.86	0.86	0.7	0.0050	0.22	0.014
spring barley	1	1	0.86	0.86	0.8	0.0050	0.22	0.014
oat	1	1	0.86	0.86	1.1	0.0050	0.25	0.008
triticale	1	1	0.86	0.86	0.9	0.0050	0.22	0.009
Cereals, harvest of whole plants	1	1	0.35	0.35	0.0	0.0056	0.22	0.009
grain maize	1	1	0.86	0.86	1.0	0.0090	0.22	0.007
maize for silage	1	1	0.28	0.28	0.0	0.0038	0.22	0.007
rape	1	1	0.91	0.86	1.7	0.0070	0.22	0.010
sugar beet	1	1	0.23	0.18	0.7	0.0040	0.20	0.014
fodder beet	1	1	0.12	0.16	0.4	0.0025	0.20	0.014
clover, grass-clover leys, clover alfalfa mixtures (fodder production on arable land)	1/3	1/3	0.20	0.20	0.3	0.0058	0.80	0.016
alfalfa	1	1	0.20	0.20	0.3	0.0065	0.40	0.019
grass (fodder production)	0.4	1/3	0.20	0.20	0.3	0.0053	0.80	0.012
potatoes	1	1	0.22	0.15	0.2	0.0020	0.20	0.014
broad beans	1	1	0.86	0.86	1.0	0.0150	0.40	0.022
peas	1	1	0.86	0.86	1.0	0.0150	0.40	0.022
other pulses	1	1	0.86	0.86	1.0	0.0150	0.40	0.022
pastures and meadows	0.1	1/3	0.20	0.20	0.3	0.0048	0.80	0.012

Sources: see Chapter 11.7.1.3

Table 11.9: Crop residues (horticultural crops), data used to calculate N₂O emissions (N contents related to fresh matter)

Horticultural Crop	a_i kg kg ⁻¹	$X_{N,i}$ kg kg ⁻¹	$X_{N,\text{yield},i}$ kg kg ⁻¹	Horticultural Crop	a_i kg kg ⁻¹	$X_{N,i}$ kg kg ⁻¹	$X_{N,\text{yield},i}$ kg kg ⁻¹
cauliflower	1.29	0.0034	0.0028	fennel	0.75	0.0030	0.0020
broccoli	3.67	0.0035	0.0045	celery root	0.50	0.0030	0.0025
chinese cabbage	0.71	0.0018	0.0015	horseradish	1.30	0.0037	0.0051
curly kale	1.25	0.0035	0.0049	carrots	0.17	0.0017	0.0017
kohlrabi	0.33	0.0035	0.0028	red radish	0.17	0.0020	0.0020
Brussels sprouts	2.60	0.0040	0.0065	white radish	0.20	0.0017	0.0017
red cabbage	0.80	0.0030	0.0022	beetroot	0.67	0.0025	0.0028
white cabbage	0.67	0.0030	0.0020	gherkin	0.71	0.0020	0.0015
Savoy cabbage	1.00	0.0040	0.0035	cucumber	0.71	0.0020	0.0015
red oak leaf lettuce	0.31	0.0019	0.0019	marrows	1.00	0.0025	0.0025
crisphead lettuce	0.33	0.0013	0.0014	courgette	0.85	0.0030	0.0016
endive	0.29	0.0025	0.0025	sweet corn	2.00	0.0030	0.0035
lamb's lettuce	0.25	0.0045	0.0045	French bean	1.83	0.0040	0.0025
butterhead lettuce	0.20	0.0018	0.0018	broad bean	1.80	0.0030	0.0013
lollo lettuce	0.31	0.0019	0.0019	runner bean (incl. scarlet runner bean)	1.80	0.0032	0.0025
radicchio	0.79	0.0025	0.0025	peas for threshing (without pods)	4.67	0.0040	0.0100
Romaine lettuce	0.22	0.0020	0.0020	peas for picking (with pods)	4.67	0.0040	0.0100
arugula	0.71	0.0030	0.0040	spring onions	0.18	0.0020	0.0020
other lettuce	0.31	0.0019	0.0019	onions (incl. shallots)	0.25	0.0040	0.0018
spinach	0.60	0.0036	0.0045	parsley	0.38	0.0040	0.0045
rhubarb	0.60	0.0050	0.0018	leek	0.68	0.0030	0.0025
asparagus	1.60	0.0046	0.0026	chive	0.20	0.0050	0.0050
celery stalks	0.60	0.0025	0.0025	strawberry	0.70	0.0060	0.0017

Sources: see Chapter 11.7.1.4; a_i rounded to two decimals.

11.7.1.6 Uncertainty of activity data / Unsicherheit der Aktivitätsdaten

The amounts of N contained in the crop residues are the activity data relevant for the assessment of the uncertainty of the emissions. These amounts of N are calculated from a number of input data, see Chapter 11.7.2. However, uncertainties are available not for all of these input data (e.g. harvest yields). Hence the uncertainty of the resulting N amounts needs to be estimated: Based on EMEP(2007)-B1020-14 it seems reasonable to assume a standard error of 25 %, i.e. 50 % for half the the 95 % confidence interval. The exact value of the uncertainty of the Amounts of N is of less concern, as the total uncertainty of the emissions from crop residues is dominated by the much higher uncertainty of the emission factor, as can be seen in Table 14.1 in Chapter 14.6.4.

Die für die Unsicherheitsberechnung der Emissionen relevanten Aktivitätsdaten sind die in den Ernterückständen enthaltenen N-Mengen. Diese berechnen sich nach Kapitel 11.7.2 aus verschiedenen Eingangsgrößen. Da nicht zu allen diesen Eingangsgrößen die Unsicherheiten bekannt sind (z. B. bei den Ertragswerten) muss die Unsicherheit der resultierenden N-Mengen geschätzt werden: Nach EMEP(2007)-B1020-14 erscheint die Annahme eines Standardfehlers von 25 % sinnvoll, d. h. 50 % für das halbe 95 %-Konfidenzintervall. Der genaue Unsicherheitswert ist von untergeordneter Bedeutung, da die Gesamtunsicherheit der Emissionen aus Ernterückständen durch die sehr viel größere Unsicherheit des Emissionsfaktors dominiert wird, wie aus Table 14.1 in Kapitel 14.6.4 hervorgeht.

11.7.2 Calculation of emissions / Emissionsberechnung

11.7.2.1 The method applied / Angewandte Methode

The general calculation procedure for N₂O is described in IPCC(2006)-11.11 ff as Tier 2 methodology (based on equation 11.2 in IPCC (2006)-11.11). In order to account for different data structures, the calculation is performed separately for agricultural crops and horticultural crops:

Das prinzipielle N₂O-Rechenverfahren ist in IPCC(2006)-11.11 ff als Tier-2-Verfahren beschrieben (aufbauend auf Gleichung 11.2 in IPCC (2006)-11.11). Aufgrund unterschiedlicher Datengrundlagen erfolgt die Berechnung der Emissionen für Ackerbau und Gemüse getrennt:

$$E_{N_2O-N, CR} = E_{N_2O-N, CR, AC} + E_{N_2O-N, CR, HC} \quad (11.8)$$

with

$$E_{N_2O-N, CR, AC} = \left(\sum_i (m_{N, AGR, i} + m_{N, BGR, i}) - m_{N, straw} \right) \cdot EF_{N_2O-N, CR} \cdot \beta \quad (11.9)$$

$$E_{N_2O-N, CR, HC} = \left(\sum_j A_j \cdot y_j \cdot a_j \cdot x_{N, j} + A_j \cdot y_j \cdot a_j \cdot x_{N, j} \cdot \delta_{HC} + A_j \cdot y_j \cdot x_{N, yield, j} \cdot \delta_{HC} \right) \cdot EF_{N_2O-N, CR} \cdot \beta \quad (11.10)$$

where

$$m_{N, AGR, i} = A_i \cdot x_{renew, i} \cdot x_{mow, i} \cdot y_i \cdot a_{above, i} \cdot x_{N, above, i} \quad (11.11)$$

and, for all agricultural and grassland crops except tuber crops,

$$m_{N, BGR, i} = A_i \cdot x_{renew, i} \cdot x_{mow, i} \cdot y_i \cdot (x_{Y, DM, i} + a_{above, i} \cdot x_{AGR, DM, i}) \cdot a_{below, Bio, i} \cdot x_{N, below, i} \quad (11.12)$$

and, for tuber crops,

$$m_{N, BGR, i} = A_i \cdot x_{renew, i} \cdot x_{mow, i} \cdot y_i \cdot (a_{above, i} \cdot x_{AGR, DM, i}) \cdot a_{below, Bio, i} \cdot x_{N, below, i} \quad (11.13)$$

and

$E_{N_2O-N, CR}$	N ₂ O-N emissions due to rotting of crop residues (in Gg a ⁻¹)
$E_{N_2O-N, CR, AC}$	N ₂ O-N emissions due to rotting of agricultural and grassland crop residues (in Gg a ⁻¹)
$E_{N_2O-N, CR, HC}$	N ₂ O-N emissions due to rotting of horticultural crop residues (in Gg a ⁻¹)
i	running index of agricultural crops
j	running index of horticultural crops
$m_{N, AGR, i}$	amount of nitrogen in above ground residues of crop i (in kg a ⁻¹)
$m_{N, BGR, i}$	amount of nitrogen in below ground residues of crop i (in kg a ⁻¹)

$m_{N, \text{straw}}$	amount of nitrogen removed with straw used as bedding (in kg a^{-1})
A_i	area covered by crop i (in ha)
$x_{\text{renew}, i}$	fraction of area under crop i that is renewed annually (in ha ha^{-1})
$x_{\text{mow}, i}$	1 / number of harvests of crop i per year (dimensionless)
y_i	yield of crop i, in fresh matter (in $\text{kg ha}^{-1} \text{a}^{-1}$)
$a_{\text{above}, i}$	ratio of above ground residues (fresh matter) to crop yield of crop i (fresh matter) (in kg kg^{-1})
$x_{N, \text{above}, i}$	N content of above ground residues of crop i, related to fresh matter (in kg kg^{-1})
$x_{Y, \text{DM}, i}$	dry matter content of yield of crop i (in kg kg^{-1})
$x_{\text{AGR}, \text{DM}, i}$	dry matter content of above ground residues of crop i (in kg kg^{-1})
$a_{\text{below}, \text{Bio}, i}$	ratio of below ground residues (dry matter) to above ground biomass of crop i (dry matter) (in kg kg^{-1})
$x_{N, \text{below}, i}$	N content of below ground residues of crop i, related to dry matter (in kg kg^{-1})
$EF_{\text{N}_2\text{O}-\text{N}, \text{CR}}$	N_2O -N emission factor for crop residues (in $\text{kg N}_2\text{O}-\text{N} (\text{kg N})^{-1}$)
θ	mass units conversion factor ($\theta = 10^{-6} \text{ Gg kg}^{-1}$)
a_j	ratio of crop residues to crop yield of crop j (in kg kg^{-1})
$x_{N, j}$	N content of crop residues of crop j, related to fresh matter (in kg kg^{-1})
$x_{N, \text{yield}, j}$	N content of normally harvested parts of crop j, related to fresh matter (in kg kg^{-1})
δ_{HC}	not harvested horticultural crops factor ($\delta_{\text{HC}} = 20/80 \text{ kg kg}^{-1}$)

According to IPCC (2006)-11.11, Table 11.1, the N_2O -N emission factor is the same like for the application of synthetic fertilizers, see Chapter 11.1.2.2 (see Chapter 11.1.2.2 also for the uncertainty of the emission factor).

Der N_2O -N-Emissionsfaktor ist nach IPCC (2006)-11.11, Table 11.1, der gleiche wie bei Mineraldünger-
ausbringung, siehe Kapitel 11.1.2.2 (auch bzgl. der Unsicherheit des Emissionsfaktors).

11.8 Mineralization of soil organic matter / Mineralisierung organischer Bodensubstanz

In the LULUCF sector, Germany differentiates, as of Submission 2020, between annual and perennial crops for mineral soils with remaining use as arable land. This results, unlike in previous submissions, in a mineralization of organic soil substance that is different from zero.

The released N quantities lead to both direct and – due to leaching - indirect N₂O emissions. These emissions are to be reported in the agriculture sector in accordance with IPCC (2006), Chapter 11.2.1.

Details of the direct emissions are described in the following two sub-chapters. For the indirect emissions, reference is made to Chapter 12.2.

Deutschland differenziert im LULUCF-Sektor bei Mineralböden unter verbleibender Nutzung als Ackerland ab Submission 2020 zwischen annuellen und perenniel- len Kulturen. Daraus ergibt sich, anders als in vorausge- gangenen Submissionen, eine von Null verschiedene Mineralisierung organischer Bodensubstanz.

Die dabei frei werdenden N-Mengen führen sowohl zu direkten als auch – auswaschungsbedingt - zu indirek- ten N₂O-Emissionen. Diese Emissionen sind nach IPCC (2006), Chapter 11.2.1, im Sektor Landwirtschaft zu berichten.

Details der direkten Emissionen werden in den bei- den nachfolgenden Unterkapiteln beschrieben. Für die indirekten Emissionen wird auf Kapitel 12.2 verwiesen.

11.8.1 Activity data / Aktivitätsdaten

The N quantities released during the mineralization of organic soil are calculated by the LULUCF sector (GENSIOR, 2019, personal communication), see Table 11.10.

Die bei der Mineralisierung organischer Bodensub- stanz frei werdenden N-Mengen werden durch den LULUCF-Sektor berechnet (GENSIOR, 2019, persönliche Mitteilung), siehe Table 11.10.

Table 11.10: Mineralization, total amounts of N from mineralization of soil organic matter

In 10 ³ kg	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
N	2474.2	2903.3	2770.7	2700.7	2655.0	2619.0	2590.7	2565.7	2544.3	2527.2
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
N	2511.8	2468.5	2428.8	2391.1	2356.4	2326.4	2284.3	2243.2	2208.5	2136.4
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
N	2066.1	2026.9	1990.2	1959.3	1929.4	1897.2	1867.6	1857.7	1850.7	

The uncertainty of the N quantities, i.e. half the 95% confidence interval, is calculated by the LULUCF sector (GENSIOR, 2019, personal communication). The uncer- tainty varies from year to year. The maximum value of the time series 1990 - 2018 is 20.1%. This value is used to estimate the overall uncertainty of the German agri- cultural GHG emission inventory in Chapter 14.6. Normal distribution is assumed.

Die Unsicherheit der N-Mengen, d. h. das halbe 95%- Konfidenzintervall, wird durch den LULUCF-Sektor be- rechnet (GENSIOR, 2019, persönliche Mitteilung). Die Unsicherheit variiert von Jahr zu Jahr. Der Maximalwert der Zeitreihe 1990 – 2018 beträgt 20,1 %. Dieser Wert wird der Abschätzung der Gesamtunsicherheit des deut- schen landwirtschaftlichen THG-Emissionsinventars in Kapitel 14.6 zugrunde gelegt. Es wird von Normalvertei- lung ausgegangen.

11.8.2 Calculation of emissions / Emissionsberechnung

The direct N₂O emissions resulting from the N quan- tities referred to in Chapter 11.8.1 are calculated by the LULUCF sector (GENSIOR, 2019,, personal communica- tion). For the methodology, see IPCC (2006)-11.7: N quantities are multiplied by the emission factor 0.01 kg N₂O-N per kg N according to IPCC (2006)-11.11, Table 11.1.

For the uncertainty of the emission factor see Chap- ter 11.1.2.4.

Die direkten N₂O-Emissionen, die sich aus den in Ka- pitel 11.8.1 genannten N-Mengen ergeben, werden durch den LULUCF-Sektor berechnet (GENSIOR, 2019, persönliche Mitteilung). Zur Methodik siehe IPCC (2006)- 11.7: Die N-Mengen werden mit dem Emissionsfaktor 0,01 kg N₂O-N pro kg N nach IPCC (2006)-11.11, Table 11.1, multipliziert.

Zur Emissionsfaktor-Unsicherheit siehe Kapitel 11.1.2.4.

11.9 Field burning of agricultural residues / Verbrennen von Ernterückständen

11.9.1 Overview / Übersicht

Already 1990, the first year of the emission reporting time series, the burning of crop residues was banned by law in Germany. Only in specific, exceptional situations (e. g. infestation by insects) permissions can be issued on municipal level. However, no official data are available on those exceptions the emissions of which are assumed to be negligible. For details see Chapter 11.9.2.

Schon 1990, im ersten Jahr des Emissionsberichtszeitraums, war das Verbrennen von landwirtschaftlichen Rückständen in Deutschland gesetzlich untersagt. Nur im besonderen Ausnahmefall (z.B. bei Insektizidbefall) ist eine Genehmigung auf kommunaler Ebene möglich. Hierüber liegen keine offiziellen Daten vor. Die dabei entstehenden Emissionen werden als vernachlässigbar eingeschätzt. Zu Details siehe Kapitel 11.9.2.

11.9.2 Details / Details

The Waste Disposal Act (Abfallbeseitigungsgesetz, AbfG) of 1972 was the first regulation of waste legislation on national level in Germany. Art. 4, para. 4, regulated that waste (including crop residues, corresponding to Art. 1) was to be disposed of only in licensed facilities. Exceptions (to be permitted on federal state level by the respective government) were subject to restrictions.

In order to implement the national Pollution Control Act (Bundesimmissionsschutzgesetzes, BImSchG), federal state governments can enact pollution control acts on federal state level. E. g., Art. 7 of the pollution control act of the federal state of Brandenburg (come into force 3 March 1992) bans outdoor burning of any materials.

Within the reform of the European Common Agricultural Policy (CAP) a specific national act was set into force 2004 in order to implement EU legislation on national level (DirektZahlVerpflG: Act on the compliance of farmers with obligations within the framework of EU directives on direct payments and other supporting systems, see BGBl 2004). Based on its Art. 5, para. 1, clause 2 to 4, in connection with its Art. 4, the ordinance on basic rules for the maintenance of agricultural areas in a good agricultural and ecological state (DirektZahlVerpflV, 2004) says the following in its Art. 3:

“(4) Burning of stubble fields is prohibited. Authorities in charge according to federal state legislation can permit ... burning of stubble fields if it is required on grounds of plant protection ... and if no damage to the ecosystem is to be expected.”

The ordinance on obligations in connection with agricultural payments (AgrarZahlVerpflV, as of 17 December 2014) states, as well, in its Art. 7 that stubble fields must not be burned.

Only in specific, exceptional situations (e. g. infestation by insects) permissions for burning of agricultural and forest areas can be issued on municipal level. Inquiries with several district administration offices revealed that such exceptional permissions do mostly concern forest areas rather than agricultural areas, and that there are no official statistics on those exceptions.

Due to the restrictions in legislation and the information gathered from the district administration offices it is assumed that burning of agricultural areas is occurring extremely seldom and that the pertinent emissions can be neglected.

Mit dem Abfallbeseitigungsgesetz (AbfG) trat 1972 in Deutschland die erste bundeseinheitliche Regelung zum Abfallrecht in Kraft. Darin regelte § 4, Abs. 1, dass Abfälle (nach §1 sinngemäß auch Ernterückstände) nur in dafür zugelassenen Anlagen oder Einrichtungen entsorgt werden durften. Ausnahmen waren (durch die Landesregierungen) nur unter Einschränkungen möglich.

Zur Umsetzung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) können die Landesregierungen Landesimmissionsschutzgesetze erlassen. So verbietet z. B. das Landesimmissionsgesetz (LImSchG) Brandenburg vom 3. März 1992 in § 7 das Verbrennen von Stoffen im Freien.

Über die Reform der europäischen Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) wurde mit dem Gesetz zur Regelung der Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen durch Landwirte im Rahmen gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften über Direktzahlungen und sonstige Stützungsregelungen (DirektZahlVerpflG von 2004, siehe BGBl 2004) EU-Recht national umgesetzt. Unter Bezug auf § 5, Abs. 1, Satz 1 Nr. 2 bis 4, in Verbindung mit §4, legt § 3 der Verordnung über die Grundsätze der Erhaltung landwirtschaftlicher Flächen in einem guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand (DirektZahlVerpflV - Direktzahlungen-Verpflichtungenverordnung) Folgendes fest:

„(4) Das Abbrennen von Stoppelfeldern ist verboten. Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann abweichend ... das Abbrennen von Stoppelfeldern genehmigen, sofern Gründe des Pflanzenschutzes ... dies erfordern und schädliche Auswirkungen auf den Naturhaushalt nicht zu besorgen sind.“

Die Agrarzahlungen-Verpflichtungenverordnung (AgrarZahlVerpflV) vom 17.12.2014 legt in § 7 ebenfalls fest, dass Stoppelfelder nicht abgebrannt werden dürfen.

Nur im besonderen Ausnahmefall, z. B. bei Insektizidbefall, kann auf kommunaler Ebene eine Genehmigung zum Abbrennen von land- und forstwirtschaftlichen Flächen erteilt werden. Die Nachfrage bei einigen Landratsämtern erbrachte, dass diese Ausnahmen weniger die Landwirtschaft als den forstwirtschaftlichen Bereich betreffen, und dass darüber keine Statistiken geführt werden.

Aufgrund der restriktiven Gesetzeslage und der Informationen aus den Landratsämtern wird davon ausgegangen, dass das Abbrennen von landwirtschaftlichen Flächen extrem selten vorkommt und dass die damit verbundenen Emissionen vernachlässigbar sind.

11.10 CO₂ from liming / CO₂ aus Kalkung

The application of calcium fertilizers reduces the degree of acidity of the soil and improves the conditions of plant growth while leading to emissions of CO₂.

For the calculation of CO₂ from liming, the inventory takes account of all types of calcium fertilizers including dolomite and calcium ammonium nitrate, but not burnt lime and slag lime as these do not contain carbon.

As of Submission 2017 the calculation of CO₂ emissions from liming (see Chapter 11.10.2) distinguishes, because of different emission factors, between Dolomite and limestone. With this modification German emission reporting follows the requirement by the Expert Review Team of the In Country Review for Submission 2016.

As of Submission 2018, reported emissions are split into emissions from "lime", "dolomite" and "calcium ammonium nitrate". The emissions from lime and dolomite are reported under CRF 3.G, while the emissions from calcium ammonium nitrate are reported under CRF 3.I (other carbon-containing fertilizers).

As required by the CRF tables, the CO₂ emissions reported comprise also the CO₂ emissions from liming of forests.

11.10.1 Activity data / Aktivitätsdaten

11.10.1.1 Official data / Offizielle Daten

Data on the amounts of calcium fertilizers applied are not available. Hence it is assumed that the amounts of fertilizers sold in Germany during the business year Y-1/Y (e. g. 1989/1990) can serve as an estimate of the amounts applied in the calendar year 1990. Data on the amounts of calcium fertilizers sold includes amounts of calcium fertilizers used for liming in forestry.

The annual amounts of fertilizers sold for liming are provided by the Federal Statistical Office in CaO units (STATBA FS4 R8.2) without distinguishing between limestone and Dolomite. The amounts of calcium ammonium nitrate (CAN) are reported in units of nitrogen (N). The conversion of the CAN amounts in N units into amounts of CaO units is based on the fact that usually 27 % of CAN weight is N (e. g. CAN by manufacturer YARA). Considering the chemical composition of the CAN components ammonium nitrate (NH₄NO₃) and calcium carbonate (CaCO₃), and using integer values for the molar weights of C, Ca, H, N, and O, the inventory converts the given amounts of CAN-N in CaO by multiplication with 0.128/0.27.

The total amounts of fertilizers applied in forestry are explicitly surveyed by the Official Statistics. The share of total calcium fertilizers that was applied in forestry was, in units of CaO, in the order of magnitude of 10 % in the first half of the 1990s, while it was only slightly more than 3 % in the years as of 2010.

For each of the new federal states official data on amounts of calcium fertilizers sold are missing for the

Kalkdüngung verringert den Säuregehalt des Bodens und verbessert das Pflanzenwachstum, wobei CO₂ freigesetzt wird.

Das Inventar berücksichtigt bei der Berechnung von CO₂ aus Kalkung alle Kalkdüngerarten einschließlich Dolomit und Kalkammonsalpeter, aber nicht Branntkalk und Hüttenkalk, da diese keinen Kohlenstoff enthalten.

Seit Submission 2017 wird bei der Düngekalkung wegen unterschiedlicher CO₂-Emissionsfaktoren (siehe Kapitel 11.10.2) zwischen Dolomit und den übrigen Kalkdüngern unterschieden. Die deutsche Berichterstattung folgt damit der Forderung des Expert Review Teams des In-Country-Review der Submission 2016.

Ab Submission 2018 werden die berichteten Emissionen aufgeteilt in die Emissionen aus Kalkstein, Dolomit und Kalkammonsalpeter. Die CO₂-Emissionen aus Kalkstein und Dolomit werden unter CRF 3.G berichtet, die Emissionen aus Kalkammonsalpeter unter CRF 3.I („Andere kalkhaltige Dünger“).

Die berichteten CO₂-Emissionen umfassen entsprechend der Anforderung in den CRF-Tabellen auch die Emissionen aus der Kalkung im Forstbereich.

Daten zur ausgebrachten Düngekalkmenge sind nicht verfügbar. Diese werden daher aus den in Deutschland verkauften Produktmengen abgeleitet. Dazu wird angenommen, dass die im Kalenderjahr Y (z. B. 1990) ausgebrachte Menge gleich der im Wirtschaftsjahr Y-1/Y (d. h. 1989/1990) verkauften Menge entspricht. Die verkauften Produktmengen enthalten auch die Mengen, die zur Kalkung im Forst verwendet wurden.

Die Officialstatistik (STATBA FS4 R8.2) berichtet jährlich die verkauften Düngekalkmengen in CaO-Einheiten (ohne getrennte Ausweisung von Dolomit), während Kalkammonsalpeter(KAS)-Mengen jährlich als Stickstoffmengen berichtet werden. Die für das Inventar erforderliche Umrechnung von KAS-Stickstoffmengen in CaO-Einheiten beruht darauf, dass KAS üblicherweise (z.B KAS der Firma YARA) 27 Gewichtsprozent N enthält. Unter Berücksichtigung der Zusammensetzung der KAS-Bestandteile Ammoniumnitrat (NH₄NO₃) und Calciumcarbonat (CaCO₃) sowie ganzzahliger Molgewichtswerte für C, Ca, H, N, und O rechnet das Inventar die gegebene KAS-N-Menge durch Multiplikation mit 0,128/0,27 in eine entsprechende CaO-Menge um.

Die im Forst ausgebrachte Gesamtdüngermenge wird in der Officialstatistik gesondert ausgewiesen. Der Anteil des Forstes an der Düngekalkgesamtmenge lag, in CaO-Einheiten, in der ersten Hälfte der 1990er Jahre im Mittel noch in der Größenordnung von 10 %, während er in den Jahren seit 2010 nur noch etwas mehr als 3 % beträgt.

Für jedes der neuen Bundesländer fehlen in den Jahren 1990 bis 1993 offizielle Angaben zu den verkauften

years 1990 to 1993. However, the total amount of calcium fertilizers sold in all new federal states in 1990 is known. This total amount of 1990 was disaggregated into sub-amounts on federal-state level by using the respective percentages known for 1994. Then the still missing federal-state shares of 1991 to 1993 were derived, for every single new federal state, by linear interpolation between 1990 and 1994.

11.10.1.2 *Share of Dolomite / Dolomit-Anteil*

Total amounts of calcium fertilizers are officially surveyed without distinguishing between limestone and Dolomite. Hence, for the inventory, the share of Dolomite is estimated based on an expert judgment by R. Müller of the Düngerkalk-Hauptgemeinschaft (Main Association for Liming), Cologne (25 August 2016). This expert judgment says that one third of the calcium fertilizers applied in forestry is MgCO_3 and that the application of Dolomite in agriculture can be neglected.

Hence the inventory assumes that 100 % of calcium fertilizers applied in agriculture are limestone (CaCO_3). For forestry the expert judgement leads (in CaO units) to: Limestone 40 %, Dolomite 60 % (figures rounded to the next integer). This can be checked with the subsequent example calculation, which is based on integer values of the molar weights: C (12), Ca (40), Mg (24) and O (16).

The example calculation is performed for 1000 kg CaO applied in forestry.

40 % of the 1000 kg CaO is limestone, which is, in CaCO_3 units, $1000 \cdot 0.4 \cdot 100/56 = 714.2857 \text{ kg CaCO}_3$. The factor 100/56 serves for the conversion from CaO units to CaCO_3 units.

60 % of the 1000 kg CaO is Dolomite, which is in units of $\text{MgCa}(\text{CO}_3)_2$: $1000 \cdot 0.6 \cdot 184/56 = 1971.4286 \text{ kg MgCa}(\text{CO}_3)_2$. The factor 184/56 serves for the conversion from CaO units to $\text{MgCa}(\text{CO}_3)_2$ units.

The 1971.4286 kg of Dolomite consist of the following amounts of CaCO_3 und MgCO_3 :

$1971.4286 \cdot 100/184 = 1071.4286 \text{ kg CaCO}_3$, with 100/184 the factor for the conversion from $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$ to CaCO_3 .

$1971.4286 \cdot 84/184 = 900 \text{ kg MgCO}_3$ with 84/184 the factor for the conversion from $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$ to MgCO_3 .

As a result of these calculations the total amount of $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$ and CaCO_3 applied in forestry is $1971.4286 \text{ kg} + 714.2857 \text{ kg} = 2685.7143 \text{ kg}$. Here the percentage of MgCO_3 is $900 \text{ kg} / 2685.7143 \text{ kg} \cdot 100 = 33.51 \%$, which approximates one third. The slight deviation from one third is accepted in order to have the integer percentages of 40 and 60 % as mentioned above. In the light of the fact that the percentages are based on an expert judgment a more precise calculation of these percentages seems inappropriate.

Düngerkalkmengen. Allerdings ist für 1990 die Gesamtsumme der in den neuen Bundesländern verkauften Düngerkalkmengen bekannt. Diese Gesamtsumme von 1990 wurde entsprechend den relativen Anteilen von 1994 auf die einzelnen neuen Bundesländer aufgeteilt. Anschließend wurde für jedes einzelne neue Bundesland die 1991 bis 1993 fehlenden Düngerkalkmengen durch lineare Interpolation zwischen 1990 und 1994 geschätzt.

Der Anteil von Dolomit ($\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$) an der Düngerkalk-Gesamtmenge wird statistisch nicht erfasst. Er wird für das Inventar anhand eines Expertenurteils (R. Müller, Düngerkalk-Hauptgemeinschaft, Köln, 25.08.2016) berechnet, nach dem der im Forstbereich eingesetzte Düngerkalk zu einem Drittel aus MgCO_3 besteht und die Anwendung von Dolomit in der Landwirtschaft vernachlässigt werden kann.

Für die Landwirtschaft geht das Inventar daher von 100 % Kalkstein (CaCO_3) aus. Für den Forst entspricht das Expertenurteil, in CaO-Einheiten, den folgenden auf ganze Zahlen gerundeten Prozentanteilen: Kalkstein 40 %, Dolomit 60%. Dies lässt sich anhand der nachfolgenden Beispielrechnung nachvollziehen, der die ganzzahligen Molgewichte von C (12), Ca (40), Mg (24) und O (16) zugrunde liegen.

Für dieses Rechenbeispiel werden 1000 kg CaO für Waldkalkung angenommen.

40 % der 1000 kg CaO werden als Kalkstein (CaCO_3) angesetzt und entsprechen $1000 \cdot 0.4 \cdot 100/56 = 714,2857 \text{ kg CaCO}_3$, wobei 100/56 der Umrechnungsfaktor von CaO nach CaCO_3 ist.

60 % der 1000 kg CaO werden als Dolomit ($\text{MgCa}(\text{CO}_3)_2$) angesetzt und entsprechen $1000 \cdot 0.6 \cdot 184/56 = 1971,4286 \text{ kg MgCa}(\text{CO}_3)_2$, wobei 184/56 der Umrechnungsfaktor von CaO nach $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$ ist.

Die Dolomitmenge von 1971,4286 kg teilt sich wie folgt in CaCO_3 und MgCO_3 auf:

$1971,4286 \cdot 100/184 = 1071,4286 \text{ kg CaCO}_3$, mit dem Umrechnungsfaktor 100/184 von $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$ nach CaCO_3 .

$1971,4286 \cdot 84/184 = 900 \text{ kg MgCO}_3$. Dies ist die Menge des im Wald ausgebrachten MgCO_3 (84/184: Umrechnungsfaktor von $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$ nach MgCO_3).

Nach diesen Berechnungen beträgt die Gesamtmenge des im Wald ausgebrachten $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$ und CaCO_3 : $1971,4286 \text{ kg} + 714,2857 \text{ kg} = 2685,7143 \text{ kg}$. Der Prozentanteil von MgCO_3 beträgt dabei $900 \text{ kg} / 2685,7143 \text{ kg} \cdot 100 = 33,51 \%$, also rund ein Drittel. Die geringe Abweichung von einem Drittel wird in Kauf genommen, um die o. g. ganzen Prozentzahlen von 40 und 60 % zu erreichen. Eine genauere Berechnung dieser Prozentzahlen auf ein oder zwei Dezimalstellen erscheint in Anbetracht des Umstandes, dass ein Expertenurteil zugrunde gelegt wurde, nicht gerechtfertigt.

11.10.1.3 Conversion of fertilizer amounts into emission factor units / Umrechnung der Düngermengen auf Emissionsfaktor-Einheiten

The emission factor for limestone is to be applied to amounts of CaCO₃, and the emission factor for Dolomite is to be applied to amounts of CaMg(CO₃)₂, see Chapter 11.10.2. Hence the amounts of CaO of the two calcium fertilizer categories have to be converted into amounts of CaCO₃ and CaMg(CO₃)₂. This conversion is based on the integer figures of the molar weights provided in Chapter 11.10.2. This results in CaO conversion factors CaCO₃/CaO = 100/56 and CaMg(CO₃)₂/CaO = 184/56.

Table 11.11 shows the amounts of CO₂ producing carbon-containing fertilizers that are considered in the inventory. These amounts comprise the carbon-containing fertilizers applied in agriculture and forestry.

Der Kalkstein-Emissionsfaktor ist auf CaCO₃-Mengen und der Dolomit-Emissionsfaktor auf CaMg(CO₃)₂-Mengen anzuwenden (Kapitel 11.10.2). Daher ist eine Umrechnung der CaO-Mengen der beiden verschiedenen Düngekalkkategorien in CaCO₃- bzw. CaMg(CO₃)₂-Mengen erforderlich. Hierzu werden die in Kapitel 11.10.2 genannten ganzzahligen Molgewichte zugrunde gelegt. Mit den sich daraus ergebenden Umrechnungsfaktoren CaCO₃/CaO = 100/56 und CaMg(CO₃)₂/CaO = 184/56 sind die entsprechenden CaO-Mengen zu multiplizieren.

Table 11.11 zeigt die dem Inventar zugrunde gelegten Mengen von CO₂ produzierenden Kalkdüngern. Sie umfassen die Düngekalkmengen aus Landwirtschaft und Forst.

Table 11.11: Liming (agriculture and forest), amounts of carbon-containing fertilizers applied (Gg a⁻¹)

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Limestone without CAN (CaCO ₃)	4175.2	3820.4	3199.0	2793.9	2116.5	2580.2	2611.3	2833.9	3252.4	3392.3
Dolomite (CaMg(CO ₃) ₂)	763.0	668.2	738.2	542.6	455.3	425.0	428.2	426.1	432.5	387.9
calcium ammonium nitrate (CAN) (as CaCO ₃)	1143.7	1071.3	1014.5	974.5	842.0	925.0	888.6	849.7	835.2	842.0
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Limestone without CAN (CaCO ₃)	3791.2	3222.9	3399.9	3122.2	3171.5	3008.2	2884.7	3289.7	3319.2	3342.5
Dolomite (CaMg(CO ₃) ₂)	339.8	336.6	373.9	314.4	233.8	195.7	187.7	193.8	151.8	190.5
calcium ammonium nitrate (CAN) (as CaCO ₃)	897.3	760.5	721.9	698.1	708.5	705.6	682.8	560.0	686.2	531.5
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Limestone without CAN (CaCO ₃)	3164.0	3468.6	3661.4	3803.8	4369.4	4304.6	3795.3	4278.7	4733.3	
Dolomite (CaMg(CO ₃) ₂)	166.7	184.0	174.8	198.0	186.1	164.6	133.7	118.7	120.4	
calcium ammonium nitrate (CAN) (as CaCO ₃)	604.6	617.8	578.3	535.2	524.9	550.6	497.3	491.1	464.1	

11.10.1.4 Uncertainties of the activity data / Unsicherheit der Aktivitätsdaten

According to the quality report for STATBA FS 4, R 8.2, the results of the fertilizer statistics are classified as "reliable and precise" because it is a total survey without statistical errors with rare non-response. This is interpreted as uncertainty (95% confidence interval) <± 1% for the total amount of calcium fertilizers.

However, this uncertainty cannot simply be adopted for both the two categories "limestone" and "Dolomite", because additional uncertainties arise from dividing of the total amount of calcium fertilizers into these two categories (according to the expert judgment described in Chapter 11.10.1.2).

As these additional uncertainties cannot be calculated, it is conservatively estimated that the amounts of Dolomite are uncertain with a factor of 2 (95 % confidence interval). This leads, as percentages of the mean, to following boundaries of the 95 % confidence interval: [-50 %, +100 %]. According to IPCC (2006) the value "100 %" is to be used to characterize half the 95 % confidence interval in the Tier 1 uncertainty calculation scheme for the total uncertainty of the GHG emission inventory (see Chapter 14). A lognormal distribution is assumed.

Nach dem Qualitätsbericht zu STATBA FS 4, R 8.2 sind die Ergebnisse der Düngemittelstatistik als „zuverlässig und präzise“ einzustufen da es sich um eine Totalerhebung ohne statistischen Fehler mit seltenen Antwortausfällen handelt. Dies wird als Unsicherheit (95%-Konfidenzintervall) < ± 1 % für die Gesamtmenge an Düngekalk interpretiert.

Diese Unsicherheit kann aber nicht direkt für die Teilmengen der beiden Kategorien „Kalkstein“ und „Dolomit“ übernommen werden, da durch die Aufteilung zwischen diesen beiden Kategorien auf Grundlage des Expertenurteils (siehe Kapitel 11.10.1.2) weitere Unsicherheiten hinzu kommen.

Diese lassen sich rechnerisch allerdings nicht erfassen, weshalb in konservativer Weise für das 95 %-Konfidenzintervall der Dolomitmenge der Unsicherheitsfaktor 2 angenommen wird. In Prozenten ausgedrückt wird das 95 %-Konfidenzintervall somit durch [-50 %, +100 %] definiert, wovon nach IPCC (2006) der Wert 100 % als halbes 95 %-Konfidenzintervall in die Berechnung der Gesamtunsicherheit des THG-Inventars mit dem Tier-1-Ansatz (siehe Kapitel 14) eingeht. Es wird eine lognormale Verteilung angenommen.

The uncertainty of the amounts of limestone depends on the share of Dolomite of the total calcium fertilizer amounts. Based on the expert judgment the share of Dolomite is in the order of 3 % in the first half of the 1990s, while it is on the level of about 1 % as of 2010. This leads to an uncertainty (half the 95 % confidence interval) of the amounts of limestone of 3.3 % for the first half of the 1990s. For the years as of 2010 this uncertainty is 1.4 %. For the calculation of the uncertainty of the total GHG inventory with the IPCC Tier 1 approach (see Chapter 14) the uncertainty of the amounts of limestone is assumed to be 3 % for the entire time series (normal distribution).

11.10.2 Calculation of emissions / Emissionsberechnung

A Tier 1 methodology (IPCC (2006)-11.27) is used to calculate the CO₂-C emissions from liming by multiplying the amount of calcium fertilizer (in CaCO₃ or CaMg(CO₃)₂, see Chapter 11.10.1) and the CO₂-C emission factor. According to IPCC (2006)-11.27 the emission factors are 0.12 kg CO₂-C per kg CaCO₃ (i. e. limestone) and 0.13 kg CO₂-C per kg CaMg(CO₃)₂ (i. e. Dolomite).

For calcium ammonium nitrate with a weight fraction of N of 27 % (see Chapter 11.10.1.1) the CO₂-C emission factor related to CaCO₃ (0.12 kg kg⁻¹) converts, if related to the total mass of calcium ammonium nitrate, to an CO₂-C emission factor of 0.02748 kg kg⁻¹.

Note that these emission factors are based on the assumption that the total amount of C contained in the calcium fertilizers applied are emitted as CO₂. This unlikely. WEST & MCBRIDE (2005) found emission factors for the USA that are only half that high (0.059 kg CO₂-C per kg CaCO₃ and 0.064 kg CO₂-C per kg CaMg(CO₃)₂). Studies of this type for Central Europe are not known. Hence, until further notice, the IPCC default emission factors are used.

The uncertainties of emissions from application of calcium fertilizers are based on tolerance limits in the composition of fertilizers specified in the Fertilizers Act (DÜNGEMITTELVERORDNUNG, 2012, pg. 32 ff). The Fertilizers Act tolerates variations of only 2 to 4 %, depending on the type of calcium fertilizer. The total uncertainty (95 % confidence interval) for liming in agriculture varies for the different years since 1990, but has always been lower than 3 %. This value is considerably lower for liming in the forest sector. However, as emissions from agriculture and forest are reported as a total, the calculation of the the total uncertainty of the German GHG inventory is conservatively based on an uncertainty of the emissionfactor of 3 %.

In general, some of the C contained in calcium fertilizers is not converted into CO₂, causing additional uncertainties of the emissions. However, this cannot be taken into account due to lack of statistical data on the degree of conversion of C into CO₂. Hence, apart from composition tolerance limits, the calculated CO₂ emissions represent maximum possible emissions.

Die Unsicherheit der Kalksteinmengen hängt vom Dolomitanteil an der Gesamtkalkmenge ab. Aufgrund des Expertenurteils lässt sich der Dolomitanteil in der erste Hälfte der 1990er Jahre mit größenordnungsmäßig 3 % berechnen; ab 2010 liegt er dagegen auf dem Niveau von rund 1 %. Damit ergibt sich für die erste Hälfte der 1990er Jahre eine Unsicherheit (halbes 95 %-Konfidenzintervall) der Kalksteinmengen von 3,3 %, für die Zeit ab 2010 dagegen von 1,4 %. Für die Berechnung der Gesamtunsicherheit des THG-Inventars mit dem Tier-1-Ansatz (siehe Kapitel 14) wird für die gesamte Zeitreihe ein Wert von 3 % angesetzt. Es wird Normalverteilung angenommen.

Die CO₂-C-Emissionen aus Kalkung werden mit einer Tier-1-Methodik (IPCC (2006)-11.27) als Produkt aus Kalkungsmenge (in CaCO₃ bzw. CaMg(CO₃)₂, siehe Kapitel 11.10.1) und CO₂-C-Emissionsfaktor berechnet. Die Emissionsfaktoren werden von IPCC (2006)-11.27 für Kalkstein mit 0,12 kg CO₂-C pro kg CaCO₃ und für Dolomit mit 0,13 kg CO₂-C pro kg CaMg(CO₃)₂ angegeben. Für Kalkammonsalpeter mit einem N-Gewichtsanteil von 27 % (siehe Kapitel 11.10.1.1) ergibt sich aus dem auf CaCO₃ bezogenen CO₂-C-Emissionsfaktor von 0,12 kg kg⁻¹ ein auf das Kalkammonsalpeter-Gesamtgewicht bezogener CO₂-C-Emissionsfaktor von 0,02748 kg kg⁻¹.


Zu beachten ist, dass diese Emissionsfaktoren unterstellen, dass der gesamte im Düngekalk enthaltene Kohlenstoff als CO₂ wieder freigesetzt wird. Dies ist unwahrscheinlich. WEST & MCBRIDE (2005) ermittelten für die USA Emissionsfaktoren, die nur halb so hoch sind (0,059 kg CO₂-C pro kg CaCO₃ und 0,064 kg CO₂-C pro kg CaMg(CO₃)₂). Vergleichbare Studien für Mitteleuropa sind nicht bekannt, so dass vorerst die IPCC-Default-Emissionsfaktoren weiter angewendet werden.

Die Unsicherheiten für Emissionen aus der Kalkdüngung ergeben sich aus den Wirkstofftoleranzgrenzen der DÜNGEMITTELVERORDNUNG (2012), S. 32 ff. Diese toleriert Unsicherheiten bezüglich der Menge des Wirkstoffs von nur 2 - 4 %, je nach Art des Kalkdüngers. Die Gesamtunsicherheit (95 %-Konfidenzintervall) für die Kalkung in der Landwirtschaft variiert für die verschiedenen Jahre der Zeitreihe, ist aber nie größer als 3 %. Für den Forst ist die Gesamtunsicherheit zwar deutlich niedriger als 3 %; da aber die Emissionen aus der Kalkung als Kombination aus Landwirtschaft und Forst berichtet werden, wird in der Berechnung der THG-Gesamtunsicherheit die Unsicherheit der Emissionsfaktoren einheitlich mit 3 % angesetzt.

Unsicherheiten, die darauf zurückgehen, dass nicht das gesamte C in CO₂ umgewandelt wird, können hier nicht berücksichtigt werden, da die tatsächlich in CO₂ umgewandelte C-Menge nicht quantifizierbar ist. Daher stellen die berechneten Emissionen - abgesehen von der o. g. Wirkstofftoleranz - die Abschätzung einer maximal möglichen Emission dar.

11.11 CO₂ from application of urea / CO₂ aus Harnstoffanwendung

After the application of urea and ammonium nitrate urea (ANS) as fertilizers, urea reacts in the presence of water (and urease enzymes) and produces CO₂ emissions that have to be reported according to IPCC(2006)-11.32.



Nach der Anwendung von Harnstoff und von Ammoniumnitrat-Harnstoff-Lösungen (AHL) als Dünger entstehen durch die chemische Reaktion mit Wasser (in Anwesenheit von Urease) CO₂-Emissionen, die nach IPCC(2006)-11.32 zu berichten sind:

11.11.1 Activity data / Aktivitätsdaten

Data on amounts of fertilizers applied is not available. The missing data is estimated by the amounts of fertilizers sold which are recorded on federal state level (STATBA FS 4, R 8.2, annually). Concerning the associated systematic errors the reader is referred to Chapter 11.1.1 (activity data of mineral fertilizers).

STATBA FS 4, R 8.2, reports the amounts of urea sold as amounts of N, while the IPCC CO₂ emission factor refers to the total amount of urea (see Chapter 11.11.2). The conversion of amounts of urea N (including ammonium nitrate-urea solution) in total amounts of urea is carried out in a stoichiometric manner by multiplication with the molar weight ratio 60/28. Table 11.12 shows the resulting time series of total amounts of urea.

For the closure of data gaps in the underlying fertilizer statistics see Chapter 11.1.1.

Daten zu ausgebrachten Düngermengen sind nicht verfügbar. Daher wird mit den statistisch erfassten Düngerverkaufsmengen auf Bundeslandebene (STATBA FS 4, R 8.2, für jedes Jahr) gerechnet. Bzgl. der damit verbundenen systematischen Fehler wird auf Kapitel 11.1.1 (Mineraldünger-Aktivitätsdaten) verwiesen.

STATBA FS 4, R 8.2, berichtet die Harnstoffverkaufsmengen als N-Mengen, während sich der CO₂-Emissionsfaktor nach IPCC auf die Harnstoffgesamtmenge bezieht (siehe Kapitel 11.11.2). Die Umrechnung von Harnstoff-N-Menge (einschließlich Ammoniumnitrat-Harnstoff-Lösung) in Harnstoffgesamtmenge erfolgt auf stöchiometrischem Wege durch Multiplikation mit dem Molgewichtsverhältnis 60/28. Table 11.12 zeigt die so erhaltene Zeitreihe der Harnstoffgesamtmenge.

Zur Schließung von Datenlücken in der zugrunde liegenden Düngemittelstatistik siehe Kapitel 11.1.1.

Table 11.12: Amounts of urea sold in Germany (including urea solutions) (in Gg a⁻¹)

1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
654.0	591.4	542.6	615.0	569.3	650.8	655.8	676.6	704.1	763.4
2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
788.9	874.2	880.1	863.8	915.7	815.4	891.5	874.1	883.5	1084.1
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
801.0	1022.6	852.0	947.8	951.6	1167.6	1118.7	1048.3	776.7	

According to the quality report in STATBA FS 4, R 8.2 the results of the mineral fertilizer statistics are considered as "reliable and precise", as they are based on a comprehensive survey without statistical errors and very few gaps due to insufficient reporting. Hence the inventory assumes an uncertainty (95 % confidence interval of < ± 1 %. The inventory uses 1 %. In addition, a normal distribution is assumed.

The inaccuracies of the activity data associated with the systematic errors can not be quantified.

Nach dem Qualitätsbericht zu STATBA FS 4, R 8.2 sind die Ergebnisse der Düngemittelstatistik als „zuverlässig und präzise“ einzustufen, da sie auf einer Totalerhebung ohne statistischen Fehler mit seltenen Antwortausfällen basiert. Dies wird für das Inventar als Unsicherheit (95%-Konfidenzintervall) < ± 1 % interpretiert. Im Inventar wird mit ± 1 % gerechnet. Angenommen wird eine Normalverteilung.

Die mit den systematischen Fehlern verbundenen Ungenauigkeiten der Aktivitätsdaten können nicht quantifiziert werden.

11.11.2 Calculation of emissions / Emissionsberechnung

IPCC (2006) -11.32 uses Equation 11.13 to specify a Tier 1 methodology that assumes that all carbon contained in urea is emitted as CO₂:

IPCC (2006)-11.32 gibt mit Gleichung 11.13 eine Tier-1-Methodik an, die davon ausgeht, dass der gesamte im Harnstoff enthaltene Kohlenstoff als CO₂ emittiert wird:

$$E_{\text{CO}_2\text{-C, urea}} = m_{\text{urea}} \cdot EF_{\text{CO}_2\text{-C, urea}} \quad (11.1)$$

$E_{\text{CO}_2\text{-C, urea}}$	CO ₂ -C emission flux (in Gg a ⁻¹)
m_{urea}	amount of urea applied (in Gg a ⁻¹)
$EF_{\text{CO}_2\text{-C, urea}}$	emission factor ($EF_{\text{CO}_2, \text{urea}} = 0.2 \text{ Gg Gg}^{-1}$, see IPCC (2006)-11.34, Chapter 11.4.2, Tier 1)

The emissions are converted into CO₂ units by multiplying the result of Equation (11.11) with the ratio of molecular weights (44/12, see IPCC (2006)-11.27).

The Tier 2 methodology described in IPCC(2006)-11.32 differs from the Tier 1 methodology only in that it takes into account that, in reality, not all of the C in the urea is converted to CO₂. Since there is no routine area-wide data on this conversion factor, the German inventory calculates with the Tier 1 methodology described above. This procedure means a worst-case estimation of CO₂ emissions from urea.

Using the N tolerance for urea in the Fertilizers Act (DÜNGEMITTELVERORDNUNG, 2012), it is possible to derive an uncertainty of about 1 % of the total urea emission factor. The uncertainty range of $\pm 1 \%$ is interpreted as 95 % confidence interval (normal distribution).

In general, some of the C contained in calcium fertilizers is not converted into CO₂, causing additional uncertainties of the emissions. However, this cannot be taken into account due to lack of statistical data on the degree of conversion of C into CO₂. Hence, apart from composition tolerance limits, the calculated CO₂ emissions represent maximum possible emissions.

Durch Multiplikation mit dem Molgewichtsverhältnis von 44/12 (IPCC (2006)-11.27) erhält man die Emissionen in CO₂-Einheiten.

Die in IPCC (2006)-11.32 angegebene Tier-2-Methodik unterscheidet sich von der Tier-1-Methodik nur dadurch, dass sie berücksichtigt, dass in der Realität nicht das gesamte C im Harnstoff als CO₂ umgewandelt wird. Da es zu diesem Umwandlungsverhältnis keine routinemäßigen flächendeckenden Daten gibt, rechnet das deutsche Inventar mit der oben beschriebenen Tier-1-Methodik. Dieses Vorgehen entspricht einer worst-case-Abschätzung der CO₂-Emissionen aus Harnstoff.

Mithilfe der N-Toleranzangabe für Harnstoff in der DÜNGEMITTELVERORDNUNG (2012) lässt sich eine Unsicherheit des auf die gesamte Harnstoffmenge bezogenen Emissionsfaktors von rund 1 % ableiten. Der Unsicherheitsbereich von $\pm 1 \%$ wird als 95%-Konfidenzintervall interpretiert (Normalverteilung).

Unsicherheiten, die darauf zurückgehen, dass nicht das gesamte C in CO₂ umgewandelt wird, können hier nicht berücksichtigt werden, da die tatsächlich in CO₂ umgewandelte C-Menge nicht quantifizierbar ist. Daher stellen die berechneten Emissionen - abgesehen von der o. g. Wirkstofftoleranz - die Abschätzung einer maximal möglichen Emission dar.

11.12 NMVOC from cultivated crops / NMVOC aus landwirtschaftlichen Kulturen

As of Submission 2015, the German inventory calculates and reports NMVOC emissions from cultivated crops.

NMVOC emissions from cultivated crops are reported, but, like NMVOC emissions from manure management, are neglected regarding the NEC emission threshold, see Chapter 3.3.4.2.

Das deutsche Inventar berücksichtigt ab Berichterstattung 2015 NMVOC-Emissionen aus landwirtschaftlichen Kulturen.

NMVOC-Emissionen aus landwirtschaftlichen Kulturen werden zwar berichtet, aber wie NMVOC aus dem Wirtschaftsdünger-Management bzgl. der NEC-Emissionsobergrenze nicht angerechnet, s. Kapitel 3.3.4.2.

11.12.1 Activity data / Aktivitätsdaten

Table 11.13 shows the input data used for the calculations of NMVOC emissions from cultivated crops. Data on areas under cultivation and fresh matter yields are presented exemplarily for 1990 and 2013. Data on areas under cultivation and fresh matter yields are provided by the Federal Statistical Office in various publications (e.g. STATBA FS3 R3). Yields in 2018 were significantly lower than in the previous year due to the drought and were even lower for some crops than in 1990.

Conversion from mass of fresh matter into mass of dry matter is based on data of freshmatter contents given in the German Fertilizer Ordinance (DÜNGEVERORDNUNG, 2007). The data on “fraction of year emitting” for wheat, rye, rape and grass were taken from EMEP EMEP (2016)-3D-16, Table 3-3. The have been applied to other cultures accordingly.

Table 11.13 zeigt die Eingangsdaten für die Berechnung der NMVOC-Emissionen aus landwirtschaftlichen Kulturen. Für die Anbauflächen und die Frischmassenerträge sind exemplarisch Anfangs- und Endjahr der Zeitreihe dargestellt. Daten zu Anbauflächen und Frischmasseerträgen berichtet das Statistische Bundesamt in verschiedenen Veröffentlichungen (z. B. STATBA FS3 R3). Die Erträge waren 2018 aufgrund der Trockenheit deutlich niedriger als im Vorjahr und lagen für einige Kulturen sogar unter den Werten von 1990.

Die Umrechnung in Trockenmasseerträge erfolgt über die Trockenmassegehalte aus der DÜNGEVERORDNUNG (2007). Die relative Emissionsdauer („fraction of year emitting“) wurde für Weizen, Roggen, Raps und Gras aus EMEP (2016)-3D-16, Table 3-3, entnommen und sinngemäß auf die übrigen Kulturen übertragen.

Table 11.13: Activity data and parameters for the calculation of NMVOC from agricultural crops

crop	area of cultivation 1000 ha		fresh matter yield Mg ha ⁻¹		dry matter content kg kg ⁻¹	fraction of year emitting a a ⁻¹
	1990	2018	1990	2018		
wheat	2419.9	3005.6	6.3	6.7	0.86	0.3
rye	1067.1	523.0	3.8	4.2	0.86	0.3
barley	2612.5	1662.0	5.4	5.8	0.86	0.3
oats	533.5	151.4	4.4	4.1	0.86	0.3
triticale	77.4	357.6	5.1	5.4	0.86	0.3
Cereals, harvest of whole plants	0.0	87.3	0.0	23.0	0.35	0.3
grain maize	228.4	410.9	6.8	8.1	0.86	0.3
maize for silage	1365.4	2195.8	40.4	35.3	0.28	0.3
rape	557.5	1224.4	3.0	3.0	0.91	0.3
tuber crops	1249.6	666.1	40.6	52.7	0.22	0.3
clover, gras mixtures, alfalfa (fodder production)	856.6	574.6	34.0	27.3	0.20	0.5
pulses	121.2	191.6	3.4	2.8	0.86	0.3
pastures and meadows	5417.2	4519.4	31.6	24.5	0.20	0.5

Sources: see text

Quantitative judgements of the uncertainty of the areas do not exist for Germany, see Chapter 11.7.1.6. In addition, no uncertainties are available for yield data and dry matter contents.

Quantitative Aussagen zur Genauigkeit der Flächenangaben liegen nicht vor, siehe Kapitel 11.7.1.6. Zu Ertragswerten und Trockenmassegehalten sind ebenfalls keine Unsicherheitsangaben verfügbar.

11.12.2 Calculation of emissions / Emissionsberechnung

The methodological approach of EMEP (2016) for calculating NMVOC emissions is basically the same as in EMEP (2013). For the inventory, therefore, the Tier 2 methodology described in EMEP (2013)-3D-32 ff is maintained:

Der methodische Ansatz von EMEP (2016) zur Berechnung der NMVOC-Emissionen ist grundsätzlich der gleiche wie in EMEP (2013). Für das Inventar wird daher die in EMEP (2013)-3D-32 ff beschriebene Tier-2-Methodik beibehalten:

$$E_{\text{NMVOC, cult, } i} = \beta \cdot A_i \cdot m_{\text{FM, } i} \cdot x_{\text{DM, } i} \cdot t_i \cdot EF_{\text{NMVOC, cult, } i} \quad (11.14)$$

$E_{\text{NMVOC, cult, } i}$	NMVOC emissions from agricultural crop i (in kg a^{-1})
β	time units conversion factor ($\beta = 8760 \text{ h a}^{-1}$)
A_i	area of crop i (in ha)
$m_{\text{FM, } i}$	fresh matter yield of crop i (in kg ha^{-1})
$x_{\text{DM, } i}$	dry matter content of crop i (in kg kg^{-1})
t_i	fraction of year that crop i is emitting (in a^{-1})
$EF_{\text{NMVOC, cult, } i}$	NMVOC emission factor for crop i (in $\text{kg kg}^{-1} \text{ h}^{-1}$)

For the data on areas of cultivation, fresh matter yields, dry matter yields and fractions of emission times see Table 11.13 in Chapter 11.12.1.

The emission factors for wheat, rye, rape and grass were taken from EMEP (2013)-3D-34, Table A3-2. This table is identical to EMEP (2016)-3D-16, Table 3-3. Table 11.14 shows these emission factors.

For the crop categories “clover, grass mixtures, alfalfa” and “pastures and meadows” the inventory adopts the EMEP emission factor of grass, while for the other crops the EMEP emission factor of wheat is used in the inventory.

Die Daten zu Anbauflächen, Frischmasseerträgen, Trockenmassegehalten und relativen Emissionsdauern gehen aus Table 11.13 in Kapitel 11.12.1 hervor.

Die Emissionsfaktoren für Weizen, Roggen, Raps und Gras stammen aus EMEP (2013)-3D-34, Table A3-2. Diese Tabelle ist identisch mit EMEP (2016)-3D-16, Table 3-3. Table 11.14 zeigt diese Emissionsfaktoren.

Für die Kulturkategorien „Klee gras, Futtergras, Alfalfa“ sowie „Wiesen und Mähweiden“ übernimmt das Inventar den EMEP-Emissionsfaktor von Gras, während für die übrigen Kulturen der EMEP-Emissionsfaktor von Weizen angesetzt wird.

Table 11.14: NMVOC emission factors

culture	NMVOC emission factor ($\text{kg kg}^{-1} \text{ h}^{-1}$), related to dry matter
wheat	$2.60 \cdot 10^{-8}$
Rye	$1.41 \cdot 10^{-7}$
Rape	$2.02 \cdot 10^{-7}$
grass (15 °C)	$1.03 \cdot 10^{-8}$

Source: see text

The estimation of NMVOC emissions is prone to considerable uncertainties (EMEP (2016)-3D-7, EMEP (2016)-3D-8, EMEP (2016)-3D-29). Due to lack of better information the German inventory assumes that the uncertainty of the Tier 2 emission factors (i. e. the 95 % confidence interval) corresponds to the uncertainty of the Tier 1 emission factors given in EMEP (2016)-3D-12, Tabelle 3-1, that is described by a factor of 4. This means that the boundaries of the 95 % confidence interval are given by -75 % and +300 % of the mean emission factor. A lognormal distribution is assumed.

Die Bestimmung von NMVOC-Emissionen ist mit großen Unsicherheiten verbunden (EMEP (2016)-3D-7, EMEP (2016)-3D-8, EMEP (2016)-3D-29). Mangels besserer Informationen wird für das deutsche Inventar davon ausgegangen, dass die Unsicherheit der Tier-2-Emissionsfaktoren der Unsicherheit der Tier-1-Emissionsfaktoren in EMEP (2016)-3D-12, Tabelle 3-1, entspricht (Faktor 4). Unter der Annahme, dass diese Angabe das 95 %-Konfidenzintervall beschreibt, liegen dessen Grenzen bei -75 % und +300 % des mittleren Emissionsfaktors. Angenommen wird eine Lognormal-Verteilung.

11.13 Emissions of HCB / HCB-Emissionen

Hexachlorobenzene (HCB) is one of the listed persistent organic pollutants covered by the Aarhus Protocol on Persistent Organic Pollutants (POP) from 2009, Annex III, the Stockholm Convention and Directive 2016/2284 (NECD), Annex I from 2016.

These conventions and directives oblige parties to reduce their POP emissions (polychlorinated biphenyl (PCB), dioxins and furans, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and HCB) below their levels in 1990.

In Germany the application of HCB as a pesticide, in a pure form, has been prohibited since 1977 and thus no HCB emissions were reported.

HCB has never been contained in co-formulants of approved pesticides (personal communication, Federal Office of Consumer Protection and Food Safety, (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, BVL, 2015).

However, HCB can occur as an impurity in pesticide following active substances:

- Lindane (gamma-hexachlorocyclohexane, γ -HCH),
- DCPA (Dimethyl tetrachloroterephthalate, also known as chlorthal-dimethyl or Dacthal),
- PCP (Pentachlorophenol),
- Atrazine (2-Chloro-4-ethylamino-6-isopropylamino-1,3,5-triazine),
- Simazine (2,4-Bis(ethylamino)-6-chloro-1,3,5-triazine),
- Propazine (2,4-Bis(isopropylamino)-6-chloro-1,3,5-triazine) and PCNB (Pentachloronitrobenzene, also known as quintozone).

According to the BVL, no maximum permitted HCB concentrations have ever been legally established for the technical active substances atrazine, simazine, lindane and clopyralid, nor are such limits in place today. There is also no further information available to the BVL on sales volumes of atrazine, simazine and clopyralid. Therefore the substances are not considered.

In the past, some manufacturers listed maximum HCB concentrations in technical active substances in certain lindane-containing substances.

Obligations to report substance quantities sold did not take effect until 1998. For the other relevant active substances the BVL has no information.

Currently approved substances which are known having HCB impurities include chlorothalonil (fungicide), tefluthrin (insecticide) and picloram (herbicide). Tefluthrin is not emission relevant due to the application method (communication by Syngenta Agro, 2015) and thus, it is not considered in the amount of reported HCB emissions.

Hexachlorbenzol (HCB) ist einer der aufgelisteten persistenten organischen Schadstoffe, die unter das Aarhus-Protokoll über persistente organische Schadstoffe (POP) aus dem Jahr 2009, Anhang III, das Stockholmer Übereinkommen und die Richtlinie 2016/2284 (NECD), Anhang I aus dem Jahr 2016, fallen.

Mit den Übereinkommen und Richtlinien verpflichten sich die Vertragsparteien, die POP-Emissionen (Polychlorierte Biphenyle (PCB), Dioxine u. Furane, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und HCB) unter die Werte von 1990 zu senken.

Der Einsatz von HCB in reiner Wirkstoffform als Pflanzenschutzmittel ist in Deutschland seit 1977 verboten. Aus diesem Grund wurden keine HCB-Emissionen aus der Pestizid-Ausbringung berichtet.

HCB war zu keinem Zeitpunkt in Beistoffen zugelassener Pestizide enthalten (Persönliche Mitteilung, Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, BVL, 2015).

HCB kann jedoch als Verunreinigung in den Wirkstoffen verschiedener Pestizide auftreten:

- Lindan (gamma-hexachlorocyclohexan, γ -HCH),
- DCPA (Dimethyl tetrachloroterephthalat, auch bekannt als chlorthal-dimethyl or Dacthal),
- PCP (Pentachlorphenol),
- Atrazin (2-Chloro-4-ethylamino-6-isopropylamino-1,3,5-triazin),
- Simazin (2,4-Bis(ethylamino)-6-chloro-1,3,5-triazin),
- Propazin (2,4-Bis(isopropylamino)-6-chloro-1,3,5-triazin) and PCNB (Pentachlornitrobenzol, auch bekannt als Quintozin).

Für technische Wirkstoffe wie Atrazin, Simazin, Lindan und Clopyralid, die ebenfalls HCB-Verunreinigungen aufwiesen, gab es und gibt es nach Auskunft des BVL keine gesetzlichen Obergrenzen für HCB-Konzentrationen. Es liegen dem BVL auch keine weiteren Informationen über Absatzmengen von Atrazin, Simazin und Clopyralid vor. Die Stoffe können daher nicht berücksichtigt werden.

In der Vergangenheit wurden von den Pflanzenschutzmittelherstellern für einzelne Lindan-haltige Mittel Maximalgehalte an HCB im technischen Wirkstoff angegeben.

Die Verpflichtung, Substanzmengen zu berichten, wurde erst 1998 wirksam. Zu den übrigen Wirkstoffen liegen dem BVL keine Informationen vor.

Zu den derzeit zugelassenen Substanzen, von denen bekannt ist, dass sie HCB-Verunreinigungen aufweisen, gehören Chlorthalonil (Fungizid), Tefluthrin (Insektizid) und Picloram (Herbizid). Tefluthrin ist aufgrund der Anwendungsmethode (Mitteilung von Syngenta Agro, 2015) nicht emissionsrelevant und wird daher nicht für die Berechnung von HCB-Emissionen berücksichtigt.

11.13.1 Activity data / Aktivitätsdaten

As activity data, domestic sales of pesticides with the active substances chlorothalonil and picloram compiled by the BVL (BVL, 2019) were used (reports pursuant to § 64 of the Plant Protection Act (PflSchG, 2012)). The quantities sold domestically are assumed to be equivalent to the quantities used. The specific sales data used in the emissions calculation are considered to be business and operational secrets and thus have to be kept confidential. For this reason, the sold quantities are grouped (cf. Table 11.15).

Als Aktivitätsdaten wurden die vom BVL (BVL, 2019) erhobenen Inlandsverkäufe von Pflanzenschutzmitteln mit den Wirkstoffen Chlorthalonil und Picloram verwendet (Meldungen gemäß § 64 PflSchG, 2012). Es wird davon ausgegangen, dass die im Inland verkauften Mengen den verbrauchten Mengen entsprechen. Die in der Emissionsberechnung verwendeten spezifischen Verkaufsdaten gelten als Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse und werden daher vertraulich behandelt. Aus diesem Grunde werden die Mengen gruppiert angegeben (siehe Table 11.15).

Table 11.15: Pesticides, data on domestic sales of active substances (t a⁻¹)

	1990 - 2001	2002	2003	2004	2005 - 2015	2016 - 2017	2018
Chlorothalonil	no published data	25 – 100	100 - 250	25 - 100	250 - 1000	1000 - 2500	no published data ^{c)}
Picloram	no published data	not specified	not specified	not specified	1.5 – 10 ^{a)} / 1.0 – 2.5 ^{b)}	2.5 - 10	no published data ^{c)}

Source: BVL (2018) (Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit Braunschweig): Absatz an Pflanzenschutzmitteln in der Bundesrepublik Deutschland, Ergebnisse der Meldungen gemäß § 64 Pflanzenschutzgesetz für das Jahr 2017.

https://www.bvl.bund.de/EN/04_PlantProtectionProducts/01_ppp_tasks/02_ppp_AuthorisationReviewActSub/03_ppp_DomesticSalesExport

^{a)} The quantity data are for the years 2007 and 2011-2015.

^{b)} The quantity data are for the years 2005, 2006, 2008, 2009 and 2010.

^{c)} At the time the table was updated, December 2019 (BVL, 2018)

The HCB quantities are calculated in light of the maximum permitted concentrations of HCB impurities established by legal acts of the EU³². The approach is a highly conservative one that probably overestimates the actual emissions. The BVL has no information regarding the actual concentrations of impurities, either past or present, in pesticides placed on the market. Data were updated for the years 2017 and 2018 (BVL, 2019).

Die HCB-Mengen werden unter Berücksichtigung der höchstzulässigen Konzentrationen von HCB-Verunreinigungen berechnet, die durch Rechtsakte der EU³² festgelegt wurden. Es handelt sich um einen sehr konservativen Ansatz, der die tatsächlichen Emissionen wahrscheinlich überschätzt. Das BVL hat keine Informationen darüber, wie hoch der Gehalt der Verunreinigung in den in Verkehr gebrachten Pflanzenschutzmitteln tatsächlich war bzw. ist. Die Daten wurden für die Jahre 2017 und 2018 aktualisiert (BVL, 2019).

Chlorothalonil:

Before 2006 there was no legal regulation in Germany on the maximum content of HCB in the active substance chlorothalonil. However, with the implementation of Directive 91/414/EEC, manufacturers had to analyse their technical active substance for possible relevant impurities and, where appropriate, indicate a maximum level. These maximum levels had to be maintained. Information about the levels specified for chloro-

Chlorthalonil:

Vor 2006 gab es in Deutschland keine gesetzliche Regelung über den maximalen HCB-Gehalt im Wirkstoff Chlorthalonil. Bei der Umsetzung der Richtlinie 91/414/EWG mussten die Hersteller jedoch ihren technischen Wirkstoff auf mögliche relevante Verunreinigungen untersuchen und gegebenenfalls einen Höchstgehalt angeben. Diese Höchstwerte mussten beibehalten werden. Für den Zeitraum 1990 bis 1999 liegen

³² Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011 defines, for certain active substances and in connection with their approval, maximum levels of impurities that are of toxicological or ecotoxicological concern or that are of special concern due to the environmental risks they pose. Since the implementing regulation is a directly applicable law, the maximum levels are binding throughout Europe. In addition, in special cases the BVL may define maximum levels for impurities that the regulation does not cover. Conformance with such maximum levels is then included as a necessary condition for approval of relevant pesticides.

Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission legt für bestimmte Wirkstoffe und im Zusammenhang mit ihrer Zulassung Höchstgehalte an Verunreinigungen fest, die toxikologisch oder ökotoxikologisch bedenklich sind oder die aufgrund ihrer Umweltrisiken von besonderer Bedeutung sind. Da es sich bei der Durchführungsverordnung um ein direkt anwendbares Recht handelt, sind die Höchstwerte europaweit verbindlich. Darüber hinaus kann das BVL in besonderen Fällen Höchstgehalte für Verunreinigungen festlegen, die von der Verordnung nicht erfasst werden. Die Einhaltung dieser Höchstwerte wird dann als notwendige Voraussetzung für die Zulassung relevanter Pestizide aufgenommen.

thalonil for the years 1990 and 1999 for Germany is not known. So far (Rösemann et al., 2017), 100 mg kg⁻¹ were assumed. As described in the FAO specification (2015, p. 49) Chlorothalonil was reviewed by IPCS (INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY) in the Environmental Health Criteria (EHC) series in 1996. The limit for HCB in the FAO specification in 1998 for chlorothalonil was 0.3 g kg⁻¹ and the manufacturer stated in that report that the company had improved the manufacturing process (see FAO Specification, 2015, p. 51). For example, a maximum HCB concentration of 300 mg kg⁻¹ (IPCS, 1996) for Germany is taken into account for the emission calculation for the years 1990 to 1999.

Directive 2005/53/EC, which entered into force in 2006, established a maximum permitted HCB concentration of 10 mg kg⁻¹ in chlorothalonil as a technical active substance.

Due to a review by the FAO 5 (see FAO 2015, p.22 and p. 51) and taking into account the results of batch samples testing the impurity the maximum concentration was raised again up to 0.04 g kg⁻¹. Thus, the standard was raised to 40 mg kg⁻¹ in Directive 2006/76/EC.

For the years from 2000 onwards, there are significant differences in the manufacturer's data between the various pesticides, despite the EU regulation, in the maximum HCB concentrations in chlorothalonil as a technical active substance.– in some cases, despite the EU regulation, the values differ from year to year for the same pesticide. For the year 2000 an interim value was calculated by linear interpolation (170 mg kg⁻¹) for the inventory. For the years 2001 to 2004, the value of 40 mg kg⁻¹ is used.

The quantities of pesticide active substances sold, and reported pursuant to Art. 64 Plant Protection Act were used as a basis for deriving a weighted average for the maximum concentrations for 2000, 2005, 2010 and 2013 (cf. Table 11.17). The average was used to calculate the relevant HCB quantities for the period between 2005 and 2008. For the later years starting from 2009 onwards the information on the maximum concentration of 10 mg/kg is assumed which is indicated by the authorisation holders (Syngenta Agro, 2015).

Picloram

For picloram, a maximum concentration of 50 mg kg⁻¹ has been specified for some pesticides. Relevant pesticides were introduced in Germany in 2006. Picloram was added to Annex I with the Commission Directive 2008/69/EC and the HCB impurity is still set to 50 mg kg⁻¹ (FAO, 2012).

Lindane

The HCB quantities in lindane were determined with the help of historically reported lindane-quantity data (cf. Tab. 11.15) of the former Federal Biological Office for Agriculture and Forestry (Biologische Bundesanstalt

keine genauen Angaben über die zulässigen HCB-Gehalte in Chlorthalonil für Deutschland vor. Bisher (Rösemann et al., 2017) wurde 100 mg kg⁻¹ angenommen. Wie in der FAO-Spezifikation (2015, S. 49) beschrieben, wurde Chlorthalonil 1996 von IPCS (INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY) in der Reihe Environmental Health Criteria (EHC) überprüft. Der Grenzwert für HCB für Chlorthalonil in der FAO-Spezifikation von 1998 betrug 0,3 g kg⁻¹ und der Hersteller gab in diesem Bericht an, dass das Unternehmen den Herstellungsprozess verbessert habe (siehe FAO-Spezifikation, 2015, S. 51). So wird für die Jahre 1990 bis 1999 eine maximale HCB-Konzentration von 300 mg kg⁻¹ (IPCS, 1996) für Deutschland für die Emissionsberechnung berücksichtigt.

Mit Inkrafttreten der Richtlinie 2005/53/EG in 2006 wurde ein Maximalgehalt für HCB von 10 mg kg⁻¹ im technischen Wirkstoff Chlorthalonil festgesetzt.

Aufgrund einer Überprüfung durch die FAO (vgl. FAO 2015, S. 22 und S. 51) und unter Berücksichtigung der Ergebnisse von Chargenproben, in denen die Verunreinigungsgehalte geprüft wurden, ist die max. Konzentration wieder auf 0,04 g kg⁻¹ hoch gesetzt worden. Somit wurde die max. HCB-Verunreinigung in der Richtlinie 2006/76/EG auf 40 mg kg⁻¹ angehoben.

Für die Jahre ab 2000 sind in den Herstellerangaben zwischen den verschiedenen Pestiziden trotz der EU-Verordnung beträchtliche Unterschiede der maximalen HCB-Konzentrationen in Chlorthalonil als technischem Wirkstoff zu verzeichnen, zum Teil auch von Jahr zu Jahr für ein und dasselbe Pestizid. Aus diesem Grunde wurde für das Inventar für das Jahr 2000 ein Übergangswert über lineare Interpolation (170 mg kg⁻¹) berechnet. Für die Jahre 2001 bis 2004 wurde der Wert von 40 mg kg⁻¹ verwendet.

Die Pestizid-Verkaufsmengen, die nach Art. 64 des Pflanzenschutzgesetzes meldepflichtig sind, wurden als Grundlage für die Ableitung eines gewichteten Mittelwertes der maximalen HCB-Konzentrationen für 2000, 2005, 2010 und 2013 verwendet (siehe Table 11.17). Dieser Wert wurde dann für die Jahre zwischen 2005 und 2008 als Übergangswert angenommen. Für die späteren Jahre ab 2009 wird die Angabe der Zulassungsinhaber über die Maximalkonzentration von 10 mg kg⁻¹ angenommen (Syngenta Agro, 2015).

Picloram

Für Picloram wurde in einigen Pestiziden ein Maximalgehalt von 50 mg kg⁻¹ spezifiziert. Diese Pestizide wurden in Deutschland ab 2006 in den Verkehr gebracht. In der Richtlinie 2008/69/EG wurde Picloram in Anhang I aufgenommen. Der Wert ist immer noch auf 50 mg kg⁻¹ festgelegt (FAO, 2012).

Lindan

Die HCB-Gehalte in Lindan wurden mithilfe historischer Lindan-Daten (siehe Tab. 11.15) des Instituts für Folgenabschätzungen im Pflanzenschutz, Klein-Machnow, der früheren Biologischen Bundesanstalt für

für Land- und Forstwirtschaft; BBA), Institute of Pesticide Technology Assessment (Institut für Folgenabschätzungen im Pflanzenschutz, Kleinmachnow). Those data are based on information that producers provided voluntarily. For the years after 1997 no data are available because the application of Lindan was phased out in 1998. For lindane, a maximum concentration of 100 mg kg⁻¹ was specified for the years 1990 until 1994. For the years after 1994 a lower concentration (50 mg kg⁻¹) was assumed. Both figures are based on the information compiled of specifications by Bailey (2001), cf. Table 11.17.

Land- und Forstwirtschaft (BBA) abgeleitet. Diese Daten beruhen auf freiwilligen Herstellerangaben. Für die Jahre nach 1997 sind keine Daten verfügbar, da die Anwendung von Lindan ab 1998 auslief. Für Lindan wurde für die Jahre 1990 bis 1994 eine maximale HCB-Konzentration von 100 mg kg⁻¹ angesetzt. Für die Jahre nach 1994 wurde eine niedrigere Konzentration (50 mg kg⁻¹) angenommen. Beide Angaben basieren auf den gesammelten Informationen von Bailey (2001) (siehe Table 11.17).

Table 11.16: Pesticides, domestic sales of lindane 1990 – 1997 (t a⁻¹)

1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
119.34	126.28	73.05	46.59	36.67	25.97	36.57	28.74

Table 11.17: Pesticides, maximum concentrations of HCB impurities in relevant active substances (g t⁻¹)

	1990	1995	2000	2001 - 2004	2005 - 2008	2009 - 2018
Chlorothalonil	300	300	170	40	13.33 *	10
Picloram	50	50	50	50	50	50
Lindane	100	50	n/a	n/a	n/a	n/a

* weighted mean

n/a = not applicable

In recent years, the total HCB quantities in pesticide active substances (cf. Table 11.18) have been affected primarily by sales of chlorothalonil. While this results from the large quantities of chlorothalonil-containing pesticides sold, it is also due to the high chlorothalonil concentrations in such pesticides and to the high permitted maximum HCB concentrations (0.3 g kg⁻¹), in chlorothalonil as a technical active substance, that applied prior to 2000.

Due to the revised data of HCB impurities, changes in HCB quantities occur compared to the reported data in submission 2016.

The maximum HCB quantity for picloram, in the period under consideration, were lower, respectively, than the relevant quantities for chlorothalonil. For this reason, fluctuations in sales of picloram have very little impact on maximum HCB quantities.

For the calculation of emissions consumption figures (i. e. statistical figures) are used. Therefore, a standard error of HCB content is assumed as 2.5 % for the emission inventory. The 95 % confidence interval is therefore 5 %. A normal distribution is assumed.

Die Gesamt-HCB-Mengen aus Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen (siehe Table 11.18) werden in den letzten Jahren hauptsächlich durch den Absatz von Chlorthalonil geprägt. Dies ist allerdings nicht nur auf die hohen Verkaufszahlen Chlorthalonil-haltiger Pestizide zurück zu führen, sondern auch auf die hohen Chlorthalonil-Konzentrationen in diesen Pestiziden und den erlaubten hohen HCB-Verunreinigungsgrad (0,3 g kg⁻¹) in Chlorthalonil der Jahre vor 2000.

Aufgrund der überarbeiteten Angaben zu den Verunreinigungsgehalten kommt es zu Änderungen der HCB-Mengen im Vergleich zu den berichteten Daten der Berichterstattung 2016.

Die maximale HCB-Menge für Picloram war im Betrachtungszeitraum jeweils niedriger als die relevanten Mengen für Chlorthalonil. Aus diesem Grund haben Absatzschwankungen bei Picloram nur einen sehr geringen Einfluss auf die maximalen HCB-Mengen.

Für die Emissionsberechnung werden Verbrauchszahlen (d.h. statistische Zahlen) verwendet. Daher wird für das Emissionsinventar von einem Standardfehler der HCB-Gehalte 2,5 % ausgegangen. Das 95 %-Konfidenzintervall beträgt demnach 5 %. Es wird eine Normalverteilung angenommen.

Table 11.18: Pesticides, HCB quantities in domestically sold active substances in pesticides (kg)

1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
107.12	137.98	55.65	29.68	26.71	17.98	26.58	24.24	5.01	44.98
2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
18.58	0.79	1.00	9.61	1.59	11.43	12.07	9.88	9.59	5.25
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
6.30	6.68	5.48	5.84	10.22	9.03	11.70	14.39	8.80	

11.13.2 Calculation of emissions / Emissionsberechnung

In principle, the calculation of emissions is based on the Tier 1 method provided in EMEP (2016)-3Df/3I-5, Chapter 3. Here, the permissible maximum HCB content is calculated from the applied active ingredient of the pertinent pesticide.

$$E_{\text{HCB}} = EF_{\text{HCB}} \cdot \sum_i m_{\text{HCB},i} \cdot IF_i \quad (11.15)$$

E_{HCB}	total HCB emission from pesticides applied (in mg a ⁻¹ , to be reported in kg a ⁻¹),
EF_{HCB}	EF for individual active substance (volatile fraction of applied amount of the active substance),
$m_{\text{HCB},i}$	mass of ith active substance applied (kg a ⁻¹)
IF_i	Impurity factor (max. concentration of impurity) in the ith active substance (mg kg ⁻¹)

The HCB emission factor was modeled by using the Pesticide Leaching Model (PELMO 3.31) which is also used for the European registration process of pesticides. The one-dimensional pesticide leaching model has been extended to predict the pesticide volatilisation after agricultural applications under field conditions (Ferrari et al., 2005) however, it is also able to calculate the behaviour of impurities in the products. The model was developed by the Fraunhofer Institute for Molecularbiology and Applied Ecology (IME).

Due to its volatility behaviour in the presence of water vapor even at low temperatures, ambient HCB is usually found in the vapour phase and appears to volatilize from plant and soil surfaces during the first 24 hours after application (Klein, 2017). As a test substance chlorothalonil was used in the simulation. The simulation conditions are defined after annual applications in potatoes 14 days before harvest. A detailed description of the input parameters is available (Klein, 2017). It is assumed that the HCB volatilisation of the impurity in picloram is the same.

The result of the emission factor is 1 or 100%. Hence the amounts of HCB displayed in Table 11.18 were completely emitted. From 1990 until 2016, HCB emissions were reduced by 89 %. Restrictions and new approvals of substances with impurities of HCB lead to fluctuations in the emissions trend. Furthermore, relevant pesticides are only used when crops are at risk of infection.

By using a modelled emission factor for Germany, the method can be qualified as Tier 2 according to the definition of the Tier 2 Approach (EMEP, 2016).

The HCB emissions were calculated and updated for the years 2017 and 2018. HCB emissions are mainly dominated by the proportion of chlorothalonil.

According to the information of the BVL, a possible explanation for the increase of HCB emissions from 2005

Die für die Emissionsberechnung verwendete Gleichung ist sinngemäß in EMEP (2016)-3Df/3I-5, Kapitel 3, angegeben. Hierbei wird der zulässige Maximalgehalt an HCB aus dem applizierten Wirkstoff des Pflanzenschutzmittels errechnet.

Der HCB-Emissionsfaktor wurde mithilfe des Pesticide Leaching Model (PELMO 3.31) modelliert, das auch für die europäische Registrierung von Pestiziden verwendet wird. Das eindimensionale Pestizidauswaschungsmodell wurde erweitert, um die Pestizidverflüchtigung nach landwirtschaftlichen Anwendungen unter Feldbedingungen vorherzusagen (Ferrari et al., 2005). Gleichfalls ist es in der Lage, das Verhalten von Verunreinigungen in den Wirkstoffen zu berechnen. Das Modell wurde vom Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Ökologie (IME) entwickelt.

HCB weist in Gegenwart von Wasserdampf auch bei niedrigen Temperaturen eine hohe Verflüchtigungsrate auf, sodass sich HCB nach der Applikation der Wirkstoffe meist in der Dampfphase befindet und sich in den ersten 24 Stunden von Pflanzen- und Bodenoberflächen verflüchtigt (Klein, 2017). In der Simulation wurde als Testsubstanz Chlorthalonil verwendet. Für die Applikation wurde eine jährliche Anwendung in der Kartoffelproduktion 14 Tage vor der Ernte festgelegt. Eine detaillierte Beschreibung der Eingabeparameter ist verfügbar (Klein, 2017). Es wird davon ausgegangen, dass die Verflüchtigung der HCB-Verunreinigung sich bei Picloram ähnlich verhält.

Das Simulationsergebnis für den Emissionsfaktor ist 1 oder 100%, d. h. die gesamten in Table 11.18 genannten HCB-Mengen wurden emittiert. Von 1990 bis 2016 sind die HCB-Emissionen um 89 % zurückgegangen. Beschränkungen und Neuzulassungen von Substanzen mit HCB führen zu Schwankungen im Emissionstrend. Überdies werden Pestizide nur im Bedarfsfalle angewendet.

Durch die Verwendung eines modellierten Emissionsfaktors für Deutschland kann die Methode als Tier 2 gemäß der Definition des Tier-2-Ansatzes (EMEP, 2016) eingestuft werden.

Die HCB-Emissionen wurden für die Jahre 2017 und 2018 berechnet und aktualisiert. Die HCB-Emissionen werden hauptsächlich durch den Anteil von Chlorthalonil dominiert.

Nach den Informationen des BVL wäre eine mögliche Erklärung für den Anstieg der HCB-Emissionen ab 2005

onwards would be the renewed approval of Bravo 500. Possibly the first "sell-out" took place in 2014, because the approval end of "Bravo 500" was originally 30.04.2016 with a sales period until 30.10.2016 and a use-by period for users until 30.10.2017.

The end of the EU active substance approval for chlorothalonil was later extended to 31.10.2018 and again to 31.10.2019, and accordingly also the approvals for the pesticides in Germany. According to the Implementing Regulation (EU) 2019/677, the BVL revoked the last three approvals for plant protection products containing chlorothalonil as of 31 October 2019. A sales deadline of April 30, 2020 applies.

11.13.3 Recalculation / Rekalkulationen

No recalculations were made from 1990 until 2016.

die erneute Zulassung des Bravo 500. Möglicherweise fand 2014 der erste "Ausverkauf" statt, da das Genehmigungsende von "Bravo 500" ursprünglich der 30.04.2016 mit einer Verkaufsperiode bis zum 30.10.2016 und einer Verfallsperiode für Nutzer bis zum 30.10.2017 war.

Das Ende der EU-Wirkstoffzulassung für Chlorthalonil wurde später bis zum 31.10.2018 und erneut bis zum 31.10.2019 verlängert, und damit auch die Zulassungen für die Pestizide in Deutschland. Gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 2019/677 hat der BVL die letzten drei Zulassungen für chlorthalonilhaltige Pflanzenschutzmittel zum 31. Oktober 2019 widerrufen. Es gilt eine Verkaufsfrist bis zum 30. April 2020.

Es wurden keine Rekalkulationen für die Jahre 1990-2016 durchgeführt.

11.13.4 Uncertainty of activity data and emission factors / Unsicherheiten von Aktivitätsdaten und Emissionsfaktoren

For the calculation of emissions consumption figures (i. e. statistical figures) are used. Therefore, a standard error of HCB content is assumed as 2.5 % for the emission inventory. The 95% confidence interval is therefore 5 %. A normal distribution is assumed.

Für die Emissionsberechnung werden Verbrauchszahlen (d.h. statistische Zahlen) verwendet. Daher wird für das Emissionsinventar von einem Standardfehler der HCB-Gehalte 2,5 % ausgegangen. Das 95 %-Konfidenzintervall beträgt demnach 5 %. Es wird eine Normalverteilung angenommen.

The uncertainty for the emission factor was determined using the PELMO model. For this purpose, the applied amounts of HCB on the plant surface were calculated with a vapour pressure reduced by a factor of 10. In addition, the meteorological conditions for modelling were selected in such a way that a range of possible emission factors for different locations was distributed across Europe (from Porto, Portugal, to Jokioinen in Finland). This results in a minimum and maximum emission factor. The maximum range was 30 %; the arithmetic mean was 10 % uncertainty (personal communication, Klein, 2017). A conservative approach and thus 30 % uncertainty is chosen for the calculation of uncertainties. This results in a total uncertainty for HCB emissions of 30.4 % (95 % confidence interval, normal distribution).

Die Unsicherheit für den Emissionsfaktor wurde mithilfe des Modells PELMO ermittelt. Dazu wurden die HCB-Einträge auf der Pflanzenoberfläche mit einem um den Faktor 10 reduzierten Dampfdruck gerechnet. Des Weiteren wurden die meteorologischen Rahmenbedingungen für die Modellierung so ausgewählt, dass sich eine Spannbreite an möglichen Emissionsfaktoren für verschiedene Einsatzorte über Europa verteilt (von Porto, Portugal, bis Jokioinen in Finnland) ergab. Somit erhält man einen minimalen wie auch maximalen Emissionsfaktor. Die größte Spannbreite lag bei 30 %; das arithmetische Mittel bei 10 % Unsicherheit (persönliche Mitteilung, Klein, 2017). Für die Unsicherheitenberechnung wird ein konservativer Ansatz und somit 30 % Unsicherheit gewählt. Somit ergibt sich eine Gesamtunsicherheit für HCB-Emissionen von 30,4 % (95 %-Konfidenzintervall, Normalverteilung).

11.14 Emissions of particulate matter / Partikelemissionen

Soil cultivation and harvesting lead to emissions of particulate matter, with harvesting being the predominant source. Crop type, soil type, cultivation method and weather conditions determine the source strength. In emission reporting there are three categories of PM: TSP (total suspended matter; aerodynamic diameter $\leq 57 \mu\text{m}$), PM_{10} and $\text{PM}_{2.5}$ (particulate matter, aerodynamic diameter $< 10 \mu\text{m}$ and $< 2,5 \mu\text{m}$, respectively). For further details see EMEP (2013)-3D-35 and EMEP (2016)-3D-32.

Bodenbearbeitung und Ernte führen zu Partikelemissionen, wobei die Ernte die bedeutendere Quelle darstellt. Die Quellstärke hängt von Fruchtart, Bodenart, Bearbeitungsmethode und Wetterbedingungen ab. Zu berichten sind Emissionen von TSP (total suspended matter; aerodynamischer Durchmesser $\leq 57 \mu\text{m}$), PM_{10} und $\text{PM}_{2.5}$ (particulate matter, Partikelklassen mit aerodynamischem Durchmesser $< 10 \mu\text{m}$ bzw. $< 2,5 \mu\text{m}$). Zu weiteren Details siehe EMEP (2013)-3D-35 und EMEP (2016)-3D-32.

11.14.1 Activity data / Aktivitätsdaten

The areas of crop cultivation serve as activity data. These areas are provided by official statistics (STATBA FS 3, R 3.2.1 and 3.1.3, and before 2005: FS 3, R 1.1.1).

Als Aktivitätsdaten dienen die Anbauflächen-Daten aus Veröffentlichungen des Statistische Bundesamtes (STATBA FS 3, R 3.2.1 und 3.1.3, bzw. vor 2005: FS 3, R 1.1.1).

The Federal Statistical Office does not provide quantitative estimates of the uncertainties of cultivation areas. The inventory assumes an uncertainty (standard error) of 5 % (i. e. 10 % for half the 95 % confidence interval) with normal distribution.

Das Statistische Bundesamt macht keine quantitativen Aussagen zur Unsicherheit der Flächendaten. Angenommen wird eine Unsicherheit (Standardfehler) von 5 % (d. h. 10 % für das halbe 95 %-Konfidenzintervall) mit Normalverteilung.

11.14.2 Calculation of emissions / Emissionsberechnung

EMEP(2016)-3D-17 describes a Tier 2 methodology for the calculation of particle emissions from agricultural area sources. However, as the frequencies of the emission-generating operations in Germany are not known, a Tier 1 methodology is used (see EMEP(2016)-3D-11):

EMEP(2016)-3D-17 beschreibt eine Tier-2-Methode zur Berechnung von Partikelemissionen aus landwirtschaftlichen Flächenquellen. Da die Häufigkeiten der emissionserzeugenden Aktivitäten für Deutschland aber nicht bekannt sind, werden die PM-Emissionen nach der Tier-1-Methode (EMEP(2016)-3D-11) berechnet:

$$E_{\text{pollutant}} = A_a \cdot EF_{\text{pollutant}} \quad (11.16)$$

$E_{\text{pollutant}}$	emissions of TSP, PM_{10} or $\text{PM}_{2.5}$ from cropped areas (in kg a^{-1})
A_a	area of arable land (in ha)
$EF_{\text{pollutant}}$	emission factors for TSP, PM_{10} or $\text{PM}_{2.5}$ from cropped areas (in $\text{kg ha}^{-1} \text{a}^{-1}$)

The emission calculations are based on the emission factors given in EMEP(2016)-3D-12, Table 3-1: 1.56 kg ha^{-1} for TSP and PM_{10} , and 0.06 kg ha^{-1} for $\text{PM}_{2.5}$.

Es werden die Emissionsfaktoren aus EMEP(2016)-3D-12, Table 3-1, verwendet: $1,56 \text{ kg ha}^{-1}$ für TSP und PM_{10} sowie $0,06 \text{ kg ha}^{-1}$ für $\text{PM}_{2.5}$.

The approach given above only allows for a first estimate of the order of magnitude to be expected for these emissions. The emission factors of this methodology do not include emissions from fertilizer, pesticides or from grassland (e. g. hay making).

Das o. g. Berechnungsverfahren ermöglicht lediglich eine erste Schätzung der Größenordnung der Emissionen. Die Emissionsfaktoren schließen Emissionen aus Düngieranwendung, Pestiziden und aus Grünlandflächen (z. B. durch Heumachen) nicht ein.

The uncertainties of the emission factors of TSP, PM_{10} and $\text{PM}_{2.5}$ are defined by EMEP(2016)-3D-12, Table 3-1: the 95 % confidence interval for TSP and PM_{10} is given by 0.78 und $7.8 \text{ kg ha}^{-1} \text{a}^{-1}$, for $\text{PM}_{2.5}$ by 0.03 and $0.3 \text{ kg ha}^{-1} \text{a}^{-1}$. Hence, the difference between the lower boundary of the 95 % confidence interval and the mean emission factor is 50 % of the mean emission factor, while the difference between the upper boundary and the mean emission factor is 400 % of the mean emission factor. The distribution is asymmetric (lognormal distribution).

Zur Unsicherheit der Emissionsfaktoren von TSP, PM_{10} und $\text{PM}_{2.5}$ gibt EMEP(2016)-3D-12, Table 3-1, an, dass die Grenzen des 95 %-Konfidenzintervalls bei 0,78 und $7,8 \text{ kg ha}^{-1} \text{a}^{-1}$ für TSP und PM_{10} liegen, sowie bei 0,03 und $0,3 \text{ kg ha}^{-1} \text{a}^{-1}$ für $\text{PM}_{2.5}$. Damit beträgt die Differenz zwischen der Untergrenze des 95 %-Konfidenzintervalls und dem verwendeten mittleren Emissionsfaktor 50 % des Emissionsfaktors, die Differenz zwischen Emissionsfaktor und oberer Konfidenzintervallgrenze 400 %. Es liegt eine asymmetrischen Verteilung vor (Lognormal-Verteilung).

11.15 International comparison / Internationaler Vergleich

Within the framework of quality assurance a comparison of input data and inventory results was made on European level. (For details of the procedure of the comparison see Chapter 4.3.10.)

Table 11.19 compares the aggregated emission factors (IEF) for emissions of N₂O and NH₃ due to cultivation of agricultural soils. Table 11.19 also shows the indirect N₂O emissions due to N deposition and leaching/runoff, the calculation of which, for the German inventory, is described in Chapter 12.

Im Zuge der Qualitätssicherung wurde ein Vergleich von Eingangsdaten und Inventarergebnissen auf mitteleuropäischer Ebene durchgeführt. (Nähere Angaben zur Durchführung: Siehe Kapitel 4.3.10.)

Table 11.19 vergleicht die aggregierten Emissionsfaktoren (IEF) für N₂O und NH₃ aus der Nutzung landwirtschaftlicher Böden. Die Tabelle zeigt auch die indirekten N₂O-Emissionen infolge von N-Deposition und Auswaschung/Oberflächenabfluss, deren Berechnung für das deutsche Inventar in Kapitel 12 beschrieben wird.

Table 11.19: Soils and crops, 2017, international comparison of implied emission factors for N₂O and NH₃

	IEF									
	N ₂ O-N	N ₂ O-N	N ₂ O-N	N ₂ O-N	N ₂ O-N	N ₂ O-N	N ₂ O-N	N ₂ O-N	NH ₃ -N	NH ₃ -N
	synthetic fertilizer	manure	crop residues	minerali- zation	managed organic soils	grazing	deposi- tion	leaching	synthetic fertilizer	animal manures
	kg kg ⁻¹	kg kg ⁻¹	kg kg ⁻¹	kg kg ⁻¹	kg ha ⁻¹	kg kg ⁻¹	kg kg ⁻¹	kg kg ⁻¹	kg kg ⁻¹	kg kg ⁻¹
Austria	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	8.20	0.0168	0.0100	0.0075	0.0408	n/c
Belgium	0.0100	0.0100	0.0100	0.0121	8.00	0.0195	0.0100	0.0075	0.0331	0.105
Czech Republic	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	NO	0.0182	0.0100	0.0075	0.0563	n/c
Denmark ^a	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	9.06	0.0178	0.0100	0.0046	0.0257	0.077
France	0.0100	0.0100	0.0100	NO	8.02	0.0192	0.0100	0.0075	0.0610	n/c
Germany	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	4.68	0.0191	0.0100	0.0075	0.0468	0.160
Netherlands	0.0130	0.0087	0.0140	NO	4.45	0.0330	0.0120	0.0075	0.0321	0.099
Poland	0.0100	0.0100	0.0100	NO	8.00	0.0192	0.0100	0.0075	0.0443	n/c
Switzerland	0.0098	0.0100	0.0100	0.0100	8.00	0.0189	0.0264	0.0075	0.0469	0.202
United Kingdom	0.0072	0.0046	0.0100	0.0100	8.00	0.0047	0.0100	0.0075	0.0346	0.118
Median	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	8.00	0.0190	0.0100	0.0075	0.0445	0.112
IPCC (2006)-11.11, 11.24, IPCC (2014) ^b	0.01	0.01	0.01	0.01	8 (13 / 4.3 / 8.2 / 1.6) ^b	0.02 (cat- tle, pigs, poultry), 0.01 other animals	0.01	0.0075		
EMEP (2016)-3D-12									0.0412 ^c	--- ^d

Sources: Germany: Submission 2020; all other countries: UNFCCC (2019), CRF Tables; CEIP (2019), NFR Tables (IEFs for NH₃ from mineral fertilizers and for NMVOC are calculated from original data)

n/c, NO: no data available due to different reasons

^a Denmark without Greenland and Faroe Island

^b IPCC (2014) Wetlands Supplement, Table 2.5 (Cropland, drained / Grassland, drained, nutrient-poor / Grassland, deep-drained, nutrient rich / Grassland, shallow-drained, nutrient rich)

^c calculated by multiplying the EMEP Tier 1 default EF (given in NH₃ units) with 14/17 in order to obtain NH₃-N units

^d no EMEP default available in units kg kg⁻¹

For the application of mineral fertilizers and animal manures as well as for crop residues and mineralization of soil organic matter almost all countries which report this IEF (including Germany) use the IPCC (2006) default emission factor of 0.01 kg kg⁻¹.

As to the IEF for N₂O-N from organic soils six countries use the IPCC (2006) default value of 8 kg ha⁻¹ or similar values. The German IEF is little more than half the size, but is based on national emission factors (see Chapter 11.6.) and is well comparable with the Dutch IEF.

Most IEFs for N₂O-N from grazing are obviously based on a combination of the two IPCC (2006) default values where the contribution by "other animals" with their lower emission factor varies among countries due

Für die Ausbringung von Mineraldünger und Wirtschaftsdünger, Ernterückstände und Mineralisierung organischer Bodensubstanz entsprechen die N₂O-N-IEFs fast aller Länder, die diesen IEF berichten (incl. Deutschland), dem IPCC (2006)-Defaultwert von 0,01 kg kg⁻¹.

Beim IEF für N₂O-N aus organischen Böden verwenden sechs Länder den IPCC (2006)-Defaultwert von 8 kg ha⁻¹ oder ähnliche Werte. Der deutsche IEF ist wenig mehr als halb so groß, basiert aber auf nationalen Emissionsfaktoren (siehe Kapitel 11.6) und ist gut mit dem niederländischen IEF vergleichbar.

Die meisten IEFs für N₂O-N als Folge von Weidegang beruhen offensichtlich auf einer Kombination der beiden Defaultvorgaben von IPCC (2006), wobei der Anteil der „anderen Tiere“ mit dem niedrigeren EF von Land zu

to varying animal numbers. The IEFs of the Netherlands and the United Kingdom considerably deviate to the upper and the lower end, respectively. The German value is almost identical to the median; it is also close to the default value for cattle, pigs and poultry, which, as expected, reflects the fact that in Germany the population shares of the "other animals" are comparatively small.

Except for the Netherlands and Switzerland all countries, including Germany, use the IPCC (2006) default emission factor for indirect N₂O-N due to the deposition of reactive nitrogen.

As to the indirect N₂O-N from leaching and runoff all countries except Denmark use the emission factor provided in IPCC (2006).

The German NH₃-IEF for the application of mineral fertilizer is 10 % above the median.

Four countries do not report a NH₃-IEF for the application of manure. Among the other countries there is a variation of factor 2.6. Germany lies approximately in the middle between the values of Switzerland and the United Kingdom.

Table 11.20 compares the aggregated emission factors (IEF) for emissions of CO₂ and NMVOC.

Land variierend ins Gewicht fällt. Die Werte der Niederlande und des Vereinigten Königreichs weichen erheblich nach oben bzw. unten vom allgemeinen Bild ab. Der deutsche Wert ist nahezu identisch mit dem Median und liegt damit auch nahe am Defaultwert für Rinder, Schweine und Geflügel. Hierin kommt erwartungsgemäß zum Ausdruck, dass in Deutschland die Populationsanteile der „anderen Tiere“ vergleichsweise klein sind.

Mit Ausnahme der Niederlande und der Schweiz rechnen beim indirekten N₂O-N infolge Deposition reaktiven Stickstoffs alle Länder, also auch Deutschland, mit dem IPCC (2006)-Defaultwert.

Beim indirekten N₂O-N aus Auswaschung und Oberflächenabfluss folgen alle Länder außer Dänemark der Vorgabe in IPCC (2006).

Der deutsche NH₃-IEF für die Ausbringung von Mineraldünger liegt 10 % über dem Median.

Vier Länder berichten keinen NH₃-IEF für die Ausbringung von Wirtschaftsdünger. Bei den übrigen Ländern findet sich eine Variation von Faktor 2,6. Deutschland liegt etwa mittig zwischen den Werten der Schweiz und des Vereinigten Königreichs.

Table 11.20 vergleicht die aggregierten Emissionsfaktoren (IEF) für CO₂ und NMVOC.

Table 11.20: Soils and crops, 2017, international comparison of implied emission factors for CO₂ and NMVOC

	IEF				application of urea	NMVOC cultivated crops
	liming					
	Limestone	Dolomite	other C contain- ing fertilizers			
	kg CO ₂ per kg				kg ha ⁻¹	
Austria	0.12	NO	NA	0.20	n/c	
Belgium	0.12	0.13	NO	0.20	0.86	
Czech Republic	0.12	0.13	NO	0.20	n/c	
Denmark ^a	0.12	NO	0.03000	0.20	0.79	
France	0.12	0.13	NO	0.20	n/c	
Germany	0.12	0.13	0.02748	0.20	0.62	
Netherlands	0.12	0.13	NO	IE	n/c	
Poland	0.12	0.13	NO	0.20	n/c	
Switzerland	0.12	0.13	NO	0.20	0.44	
United Kingdom	0.12	0.13	NO	0.20	0.48	
IPCC (2006)-11.27	0.12	0.13		0.20		
EMEP (2016)-3D-12					0.86	

Sources: Germany: Submission 2020; all other countries: UNFCCC (2019), CRF Tables; CEIP (2019), NFR Tables (IEFs for NH₃ from mineral fertilizers and for NMVOC are calculated from original data)

n/c, NO, NA, IE: no data available due to different reasons

^a Denmark without Greenland and Faroe Island

It can be seen that all countries reporting CO₂ emissions from liming of dolomite and limestone use the IPCC (2006) default values as emission factors. The use of other calcium fertilizers is reported only by Denmark and Germany. If the German IEF were rounded to two decimals, it would be equivalent to the Danish value.

With the exception of the Netherlands all countries calculate CO₂ emissions from urea application using the IPCC (2006) default value.

Alle Länder, die CO₂-Emissionen aus der Kalkung von Dolomit und Kalkstein berichten, verwenden als Emissionsfaktoren die IPCC(2006)-Defaultwerte. Die Anwendung anderer kalkhaltiger Dünger wird nur von Dänemark und Deutschland berichtet; würde der deutsche IEF auf zwei Dezimalstellen gerundet, entspräche er dem dänischen Wert.

Außer den Niederlanden berechnen alle Länder die CO₂-Emissionen aus Harnstoffanwendung mithilfe des IPCC (2006)-Defaultwertes.

The IEF for NMVOC emissions from the cultivation of crops can, due to missing data on emissions and / or cultivated area for some countries, only be calculated for five countries. Belgium obviously used the EMEP default value for its emission calculations. The German IEF is considerably below the IPCC default value, but is located approximately in the middle of given range.

Table 11.21 enables a comparison of the so-called FRAC quantities for Central Europe. For the definitions of the FRAC quantities see Chapter 13.

In the German inventory the quantities $\text{Frac}_{\text{GASF}}$ and $\text{Frac}_{\text{GASM}}$ are not used as input variable. They are back calculated from input and output data once the emission calculations are terminated.

All three Frac quantities shown in Table 11.21 have a more or less wide range of variation. The German values deviate only a few percent from the respective median values.

Der IEF für NMVOC-Emissionen aus dem Anbau kann wegen fehlender Daten zu Emission und/oder Anbaufläche nur für fünf Länder verglichen werden. Belgien hat dabei offensichtlich mit dem EMEP-Defaultwert gerechnet. Der deutsche IEF liegt merklich unter dem EMEP-Defaultwert, liegt aber ungefähr mittig in dem durch die fünf Länder gegebenen Wertebereich.

Table 11.21 ermöglicht einen mitteleuropäischen Vergleich der so genannten FRAC-Größen. Zu den Definitionen der FRAC-Größen siehe Kapitel 13.

Die Größen $\text{Frac}_{\text{GASF}}$ und $\text{Frac}_{\text{GASM}}$ werden im deutschen Inventar nicht als Eingangsgröße verwendet, sondern aus Ein- und Ausgabedaten der abgeschlossenen Emissionsberechnungen ermittelt.

Bei allen drei in Table 11.21 gezeigten Frac-Größen zeigt sich eine mehr oder minder große Schwankungsbreite. Die deutschen Werte weichen nur um wenige Prozent von den jeweiligen Medianwerten ab.

Table 11.21: Soils and crops, 2017, international comparison of fractions

	$\text{Frac}_{\text{GASF}}$	$\text{Frac}_{\text{GASM}}$	$\text{Frac}_{\text{LEACH}}$
	kg kg ⁻¹	kg kg ⁻¹	kg kg ⁻¹
Austria	0.059	0.172	0.152
Belgium	0.070	0.176	0.300
Czech Republic	0.100	0.200	0.300
Denmark ^a	0.052	0.087	0.278
France	0.067	0.098	0.300
Germany	0.059	0.159	0.300
Netherlands	0.043	NA	0.130
Poland	0.100	0.200	0.300
Switzerland	0.060	0.229	0.178
United Kingdom	0.035	0.079	0.204
Median	0.060	0.172	0.289
IPCC(2006)-11.24	0.052	0.174	0.152

Sources: Germany: Submission 2020; other countries: UNFCCC (2019)

^a Denmark without Greenland and Faroe Island

11.16 References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung

The subsequent table lists the references to information provided in the data collection (see Chapter 2.4).

Die nachfolgende Tabelle enthält Verweise auf die Informationen in der Datensammlung (siehe Kapitel 2.4).

Table 11.22: Direct emissions from agricultural soils, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)

			from	to
Emissions	Emissionen	NH ₃ , mineral fertilizer	EM1001.001	
		NH ₃ , animal manure	EM1001.002	
		NH ₃ , sewage sludge	EM1001.003	
		NH ₃ , digested energy crops	EM1001.004	
		NH ₃ , grazing	EM1001.005	
		N ₂ O, mineral fertilizer	EM1001.007	
		N ₂ O, animal manure	EM1001.008	
		N ₂ O, sewage sludge	EM1001.009	
		N ₂ O, digested energy crops	EM1001.010	
		N ₂ O, grazing	EM1001.011	
		N ₂ O, crop residues	EM1001.012	
		N ₂ O, mineralization	EM1001.013	
		N ₂ O, histosols	EM1001.014	
		NO, mineral fertilizer	EM1001.025	
		NO, animal manure	EM1001.026	
		NO, sewage sludge	EM1001.027	
		NO, digested energy crops	EM1001.028	
		NO, grazing	EM1001.029	
		NMVOC, cultivated crops	EM1001.031	
		TSP, crop production	EM1001.032	
		PM ₁₀ , crop production	EM1001.033	
		PM _{2.5} , crop production	EM1001.034	
		CO ₂ , urea	EM1001.036	
		CO ₂ , liming (Lime application)	EM1001.037	
		CO ₂ , liming (Dolomite application)	EM1001.038	
		CO ₂ , liming (CAN application)	EM1001.039	
Activity data	Aktivitäten	mineral fertilizers (NH ₃)	AI1001.004	AI1001.009
		mineral fertilizers (N ₂ O, NO)	AC1001.001	
		animal manures	AC1001.002	
		sewage sludge	AC1001.008	
		digested energy crops	AC1001.007	
		grazing	AC1001.003	AC1001.005
		crop residues	AC1001.009	
		mineralization	AC1001.010	
		histosols	AC1001.011	
		areas for NMVOC and PM calculation	AC1001.012	AC1001.013
		urea	AC1001.015	
		liming (Limestone)	AC1001.016	
		Liming (Dolomite)	AC1001.017	
		Liming (CAN)	AC1001.018	
Emission factors	Emissionsfaktoren	NH ₃ , mineral fertilizer	IEF1001.001	
		NH ₃ , animal manure	IEF1001.002	
		NH ₃ , sewage sludge	IEF1001.003	
		NH ₃ , digested energy crops	IEF1001.004	
		NH ₃ , grazing	IEF1001.005	
		N ₂ O, mineral fertilizer	IEF1001.007	
		N ₂ O, animal manure	IEF1001.008	
		N ₂ O, sewage sludge	IEF1001.009	
		N ₂ O, digested energy crops	IEF1001.010	
		N ₂ O, grazing	IEF1001.011	
		N ₂ O, crop residues	IEF1001.012	
		N ₂ O, mineralization	IEF1001.013	
		N ₂ O, histosols	IEF1001.014	
		NO, mineral fertilizer	IEF1001.019	
		NO, animal manure	IEF1001.020	
		NO, sewage sludge	IEF1001.021	
		NO, digested energy crops	IEF1001.022	
		NO, grazing	IEF1001.023	
		NMVOC, cultivated crops	IEF1001.025	
		TSP, crop production	IEF1001.026	
		PM ₁₀ , crop production	IEF1001.027	
		PM _{2.5} , crop production	IEF1001.028	
		CO ₂ , urea	IEF1001.030	
		CO ₂ , liming (Lime application)	IEF1001.031	
		CO ₂ , liming (Dolomite application)	IEF1001.032	
		CO ₂ , liming (CAN application)	IEF1001.033	

12 Indirect N₂O emissions from agricultural soils / Indirekte N₂O-Emissionen aus landwirtschaftlichen Nutzflächen

N₂O Emissions from managed agricultural soils and cultures fall into two categories: direct emissions and indirect emissions.

Direct emissions are emissions that are a primary effect of soil management, like e. g. NH₃ from and N₂O after spreading of fertilizers, or emissions of particulate matter. For the direct emissions of N₂O see Chapter 11

Indirect emissions are N₂O emissions that are a secondary effect of agricultural activities, i. e. N₂O emissions from soils due to deposition of reactive nitrogen (NH₃ and NO) emitted from agricultural sources, and N₂O emissions that are a consequence of nitrogen leaching and runoff.

According to IPCC (2006), indirect N₂O emissions caused by the N management in animal housing and manure storage are attributed to animal husbandry (Sector 3.D), see Chapter 3.3.4.3.6. For indirect N₂O emissions in connection with digestion of energy crops see Chapter 10.2. All other indirect N₂O emissions are reported in the Sector “agricultural soils” (Sector 3.D). Their calculation is described in the following.

Table 12.1 gives an overview of the methodologies applied. At the time being, only Tier 1 calculation procedures are available.

Bei N₂O aus landwirtschaftlichen Nutzflächen wird zwischen direkter und indirekter Emission unterschieden.

Direkte Emissionen sind Emissionen, die sich unmittelbar aus der Bodennutzung ergeben, wie z. B. NH₃ und N₂O infolge der Ausbringung von Mineraldünger, oder auch Emissionen von Partikeln. Zu direktem N₂O siehe Kapitel 11.

Indirekte Emissionen sind N₂O-Emissionen, die sich als Sekundärfolge von landwirtschaftlichen Aktivitäten ergeben: N₂O-Emissionen aus dem Boden nach Deposition reaktiven Stickstoffs, der zuvor aus landwirtschaftlichen Quellen emittiert wurde, sowie N₂O-Emissionen infolge von N-Auswaschung bzw. -Oberflächenabfluss.

Indirekte N₂O-Emissionen die im Bereich Stall/Lager entstehen, werden nach IPCC (2006) der Tierhaltung (Sektor 3.B) zugeordnet (siehe Kapitel 3.3.4.3.6). Mit Ausnahme der indirekten N₂O-Emissionen aus der Vergärung von Energiepflanzen (siehe dazu Kapitel 10.2) werden alle übrigen indirekten N₂O-Emissionen im Sektor „Böden“ (Sektor 3.D) berichtet. Ihre Berechnung wird im Folgenden beschrieben.

Table 12.1 gibt eine Übersicht über die verwendeten Rechenverfahren. Derzeit sind nur Tier-1-Verfahren verfügbar.

Table 12.1: Agricultural soils, procedures used for the calculation of indirect N₂O emissions

Species	Origin	Tier	Method applied
N ₂ O	indirect, deposition	1	IPCC
N ₂ O	indirect, leaching	1	IPCC

12.1 Deposition of reactive nitrogen / Deposition von reaktivem Stickstoff

Atmospheric deposition of reactive nitrogen species results in N₂O emissions. For the agricultural emission inventory, the deposition of reactive nitrogen from agriculture is considered.

Die atmosphärische Deposition von reaktiven Stickstoff-Spezies führt zu N₂O-Emissionen. Für das landwirtschaftliche Emissionsinventar wird die Deposition von reaktivem N aus der Landwirtschaft berücksichtigt.

12.1.1 Activity data / Aktivitätsdaten

In the German inventory, the calculation of the indirect N₂O emissions caused by deposition assumes that all emissions of reactive nitrogen listed below are deposited:

- NH₃ and NO from fertilizer application,
- NH₃ and NO from application of animal manures (incl. digested manures),
- NH₃ and NO from application of digestate of energy crops,
- NH₃ and NO from application of sewage sludge,
- NH₃ and NO from grazing.

An uncertainty (standard error) of 25 % is assumed, corresponding to 50 % for half the 95 % confidence interval. It is further assumed that the distribution is (approximately) normal.

Das deutsche Inventar berechnet die depositionsbedingten N₂O-Emissionen unter der Annahme, dass alle nachstehend aufgeführten Emissionen reaktiven Stickstoffs der Deposition unterliegen:

- NH₃ und NO aus Mineraldüngeranwendung,
- NH₃ und NO aus Wirtschaftsdünger-Ausbringung (incl. vergorenem Wirtschaftsdünger),
- NH₃ und NO aus Ausbringung von Energiepflanzen-Gärresten,
- NH₃ und NO aus Ausbringung von Klärschlämmen,
- NH₃ und NO aus Weidegang.

Angenommen wird eine Unsicherheit (Standardfehler) von 25 %, was einem Wert von 50 % für das halbe 95 %-Konfidenzintervall entspricht. Die Verteilung wird als (angenähert) normal angenommen.

12.1.2 Calculation of emissions / Emissionsberechnung

A Tier 1 approach similar to the treatment of N₂O emissions from the application of mineral fertilizer is used (see Chapter 11.1.2.2):

Es wird ein Tier-1-Verfahren analog zur Beschreibung der N₂O-Emissionen aus der Mineraldünger-Anwendung eingesetzt (siehe Kapitel 11.1.2.2):

$$E_{N_2O-N,dep} = [(E_{NH_3-N} + E_{NO-N})_{fert} + (E_{NH_3-N} + E_{NO-N})_{SAM} + (E_{NH_3-N} + E_{NO-N})_{SEC} + (E_{NH_3-N} + E_{NO-N})_{SSS} + (E_{NH_3-N} + E_{NO-N})_{graz}] \cdot EF_{N_2O-N,dep} \quad (12.1)$$

$E_{N_2O-N, dep}$	indirect N ₂ O-N emissions resulting from the deposition of NH ₃ -N and NO-N emitted from agricultural soils (see Chapter 12.1.1) (in Gg a ⁻¹)
$(E_{NH_3-N} + E_{NO-N})_{fert}$	NH ₃ -N and NO-N emissions from mineral fertilizer (in Gg a ⁻¹), see Chapter 11.1
$(E_{NH_3-N} + E_{NO-N})_{SAM}$	NH ₃ -N and NO-N emissions from spreading of animal manures (in Gg a ⁻¹), see Chapter 11.2
$(E_{NH_3-N} + E_{NO-N})_{SEC}$	NH ₃ -N and NO-N emissions from spreading of digestate from energy crops (in Gg a ⁻¹), see Chapter 11.3
$(E_{NH_3-N} + E_{NO-N})_{SSS}$	NH ₃ -N and NO-N emissions from spreading of sewage sludge (in Gg a ⁻¹), see Chapter 11.4
$(E_{NH_3-N} + E_{NO-N})_{graz}$	NH ₃ -N and NO-N emissions from grazing (in Gg a ⁻¹), see Chapter 11.5
$EF_{N_2O-N, dep}$	N ₂ O-N emission factor for indirect emissions from deposition (in kg kg ⁻¹), see below

The N₂O-N emission factor $EF_{N_2O-N, dep}$ is given as 0.01 kg kg⁻¹ (IPCC(2006)-11.24, Table 11.3).

In IPCC(2006)-11.11, Table 11.3, an uncertainty range of 0.002 kg kg⁻¹ to 0.05 kg kg⁻¹ is given for the N₂O-N emission factor. This interval is assumed to be the 95 % confidence interval. The difference between the upper limit of the confidence interval and the emission factor amounts to 400 % of the emission factor. The difference between the lower limit of the confidence interval and the emission factor is 80 % of the emission factor. According to IPCC(2006)-3.29 the higher percentage (400 %) has to be used to estimate derive the overall uncertainty (see Chapter 14.6). Due to the asymmetry a lognormal distribution is assumed.

Der N₂O-N-Emissionsfaktor $EF_{N_2O-N, dep}$ wird mit 0,01 kg kg⁻¹ angesetzt (IPCC(2006)-11.24, Table 11.3).

In IPCC(2006)-11.11, Table 11.3, wird für den Emissionsfaktor ein Unsicherheitsbereich von 0,002 kg kg⁻¹ bis 0,05 kg kg⁻¹ angegeben. Dieser wird als 95 %-Konfidenzintervall aufgefasst. Dabei entspricht das Intervall zwischen oberer Konfidenzintervall-Grenze und verwendetem Emissionsfaktor 400 % des Emissionsfaktors, das Intervall zwischen unterer Konfidenzintervall-Grenze und Emissionsfaktor 80 %. Nach IPCC(2006)-3.29 geht in die Gesamtunsicherheit des deutschen Treibhausgasinventars (siehe Kapitel 14.6) der größere Prozentwert ein, d. h. 400 %. Aufgrund der Asymmetrie wird Lognormalverteilung angenommen.

12.2 Leaching and runoff of nitrogen / Ausgewaschener und abgeflossener Stickstoff

Nitrogen inputs into soils are to some extent liable to runoff and leaching. The inputs into surface and ground waters give rise to indirect nitrous oxide emissions.

N-Einträge in Böden können teilweise abfließen oder ausgelaugt werden. Die Einträge in Oberflächen- und Grundwasser führen zu indirekten Lachgasemissionen.

12.2.1 Activity data / Aktivitätsdaten

The amount of leached N (m_{leach}) that leads to indirect N_2O emissions is calculated by multiplying an amount of N (m_{N} , see Equation (12.3)) with the leaching factor $\text{Frac}_{\text{leach}}$. According to IPCC (2006)-11.24, Table 11.3, $\text{Frac}_{\text{leach}} = 0.3 \text{ kg kg}^{-1}$. The criterion for the application of $\text{Frac}_{\text{leach}} = 0.3 \text{ kg kg}^{-1}$ is the exceedance of the soil water-holding capacity, see IPCC (2006a)-11.24, Table 11.3. As there is groundwater recharge all over Germany (NEUMANN & WYCISK, 2002) it can be assumed, on an annual basis, that soil water-holding capacity is exceeded in Germany.

Die zur N_2O -Freisetzung führende ausgewaschene N-Menge m_{leach} wird ermittelt, indem eine Stickstoffmenge m_{N} (siehe Gleichung (12.3)) mit dem Auswaschungsfaktor $\text{Frac}_{\text{leach}}$ multipliziert wird. Dieser Faktor wird nach IPCC (2006)-11.24, Table 11.3, mit $0,3 \text{ kg kg}^{-1}$ angesetzt. Das Kriterium für die Anwendung dieses Defaultwertes ist die Überschreitung der Bodenwasserhaltekapazität, siehe IPCC (2006a)-11.24, Table 11.3. Von einer solchen Überschreitung ist im Jahresmittel für ganz Deutschland auszugehen, da überall in Deutschland Grundwasserneubildung stattfindet (NEUMANN & WYCISK, 2002).

$$m_{\text{leach}} = m_{\text{N}} \cdot \text{Frac}_{\text{LEACH}} \quad (12.2)$$

m_{leach}	amount of N leached (in Gg a^{-1})
m_{N}	amount of N available (in Gg a^{-1}), see Eq. (12.3)
$\text{Frac}_{\text{LEACH}}$	fraction to describe the ratio of m_{leach} to m_{N} (in kg kg^{-1}), see text

The amount of N available (m_{N}) is defined as follows:

Die N-Menge m_{N} setzt sich wie folgt zusammen:

$$m_{\text{N}} = m_{\text{fert}} + m_{\text{man}} + m_{\text{ec}} + m_{\text{graz}} + m_{\text{sl}} + m_{\text{cr}} + m_{\text{min}} \quad (12.3)$$

m_{N}	amount of N from which leaching is to be calculated (in Gg a^{-1})
m_{fert}	amount of synthetic fertilizer N applied (in Gg a^{-1}), see Chapter 11.1.1
m_{man}	amount of manure N available for spreading (in Gg a^{-1}), see Chapter 11.2.1
m_{ec}	amount of N available in digestate of energy crops to be spreaded (in Gg a^{-1}), see Chapter 11.3.1
m_{graz}	amount N excreted during grazing (in Gg a^{-1}), see Chapter 11.5.1
m_{sl}	amount of N in sewage sludge applied (in Gg a^{-1}), see Chapter 11.4.1
m_{cr}	amount of N available by decomposition of crop residues (minus straw N for bedding) (in Gg a^{-1}), see Chapter 11.7.1.1
m_{min}	amount of N available by mineralization of soil organic matter (in Gg a^{-1}), see Chapter 11.8.1

The uncertainty of the activity data m_{LEACH} is a combination of the uncertainties of the various amounts of N and $\text{Frac}_{\text{LEACH}}$.

The uncertainty (i. e. the standard error) of the N input data is assumed to be 30 %. A normal distribution seems to be appropriate.

For $\text{Frac}_{\text{LEACH}}$ IPCC(2006)-11.24, Table 11.3 gives an uncertainty range of 0.1 kg kg^{-1} to 0.8 kg kg^{-1} . This interval is assumed to be the 95 % confidence interval. The difference between the upper limit of the confidence interval and the emission factor amounts to 167 % of the emission factor. The difference between the lower limit of the confidence interval and the emission factor is 67 % of the emission factor. According to IPCC(2006)-3.29 the higher percentage (167 %) has to be used to estimate derive the overall uncertainty (see Chapter 14.6).

This leads, according to the calculation rules given in Chapter 14.2, to an overall uncertainty of the activity data m_{LEACH} of 170 %. Due to the asymmetry a lognormal distribution is assumed.

Die Unsicherheit der Aktivitätsdaten m_{LEACH} ergibt sich aus der Kombination der Unsicherheiten der N-Einträge und der Größe $\text{Frac}_{\text{LEACH}}$.

Die Unsicherheit (d. h. der Standardfehler) der N-Einträge wird dabei mit 30 % bei Normalverteilung angenommen.

Für $\text{Frac}_{\text{LEACH}}$ wird in IPCC(2006)-11.24, Table 11.3 ein Unsicherheitsbereich von $0,1$ bis $0,8 \text{ kg kg}^{-1}$ angegeben. Dieser wird als 95 %-Konfidenzintervall aufgefasst. Dabei entspricht das Intervall zwischen oberer Konfidenzintervall-Grenze und verwendetem Emissionsfaktor 167 % des Emissionsfaktors, das Intervall zwischen unterer Konfidenzintervall-Grenze und Emissionsfaktor 67 %. Nach IPCC(2006)-3.29 geht in die Gesamtunsicherheit des deutschen Treibhausgasinventars (siehe Kapitel 14.6) der größere Prozentwert ein, also 167 %.

Daraus ergibt sich nach der in Kapitel 14.2 beschriebenen Berechnungsmethode eine Gesamtunsicherheit der Aktivitätsdaten m_{LEACH} von 170 %. Aufgrund der Asymmetrie wird Lognormalverteilung angenommen.

12.2.2 Calculation of emissions / Emissionsberechnung

The N₂O emissions are calculated using a Tier 1 methodology according to IPCC(2006)-11.21, Equation 11.10:

$$E_{\text{N}_2\text{O-N, leach}} = m_{\text{leach}} \cdot EF_{\text{N}_2\text{O-N, leach}} \quad (12.4)$$

$E_{\text{N}_2\text{O-N, leach}}$ N₂O-N emissions due to leaching and runoff (in Gg a⁻¹)
 m_{leach} amount of N leached (in Gg a⁻¹), see Chapter 12.2.1
 $EF_{\text{N}_2\text{O-N, leach}}$ N₂O-N emission factor for N from leaching and runoff (in kg kg⁻¹)

The N₂O-N emission factor is 0.0075 kg kg⁻¹, see IPCC (2006)-11.24, Table 11.3.

In IPCC(2006)-11.24, Table 11.3, an uncertainty range of 0.005 kg kg⁻¹ to 0.025 kg kg⁻¹ is given for the N₂O-N emission factor. The latter is assumed to be the 95 % confidence interval. The difference between the upper limit of the confidence interval and the emission factor amounts to (rounded) 230 % of the emission factor. The difference between the lower limit of the confidence interval and the emission factor is (rounded) 90 % of the emission factor. According to IPCC(2006)-3.29 the higher percentage (230 %) has to be used to estimate derive the overall uncertainty (see Chapter 14.6). Due to the asymmetry a lognormal distribution is assumed.

Die N₂O-Emissionen werden nach IPCC(2006)-11.21, Gleichung 11.10, mit einem Tier-1-Verfahren berechnet:

Der N₂O-N-Emissionsfaktor ist 0,0075 kg kg⁻¹, siehe IPCC (2006)-11.24, Table 11.3.

In IPCC(2006)-11.24, Table 11.3, wird für den Emissionsfaktor ein Unsicherheitsbereich von 0,0005 kg kg⁻¹ bis 0,025 kg kg⁻¹ angegeben. Dieser wird als 95 %-Konfidenzintervall aufgefasst. Dabei entspricht das Intervall zwischen oberer Konfidenzintervall-Grenze und verwendetem Emissionsfaktor rund 230 % des Emissionsfaktors, das Intervall zwischen unterer Konfidenzintervall-Grenze und Emissionsfaktor rund 90 %. Nach IPCC(2006)-3.29 geht in die Gesamtunsicherheit des deutschen Treibhausgasinventars (siehe Kapitel 14.6) der größere Prozentwert ein, also 230 %. Aufgrund der Asymmetrie wird Lognormalverteilung angenommen.

12.3 International comparison of data / Internationaler Datenvergleich

Within the framework of quality assurance a comparison of input data and inventory results was made on European level. (For details of the procedure of the comparison see Chapter 4.3.10.)

The international comparison of the indirect N₂O emissions is made along with the comparison of the direct N₂O emissions, see Chapter 11.15.

Im Zuge der Qualitätssicherung wurde ein Vergleich von Eingangsdaten und Inventarergebnissen auf mitteleuropäischer Ebene durchgeführt. (Nähere Angaben zur Durchführung: Siehe Kapitel 4.3.10.)

Der internationale Vergleich für indirekte N₂O-Emissionen erfolgt zusammen mit dem Vergleich der direkten N₂O-Emissionen in Kapitel 11.15.

12.4 References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung

Table 12.2: Indirect N₂O emissions from agricultural soils, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)

			from	to
Emissions	Emissionen	N ₂ O, indirect, deposition	EM1001.018	EM1001.020
		N ₂ O, indirect, leaching	EM1001.015	EM1001.017
Activity data	Aktivitäten	N deposited	AC1001.022	AC1001.024
		N input liable to leaching	AC1001.019	AC1001.021
Emission factors	Emissionsfaktoren	N ₂ O, indirect, deposition	IEF1001.016	
		N ₂ O, indirect, leaching	IEF1001.015	

13 Fractions / Verhältniszahlen

The fractions described in the following have to be reported within the framework of IPCC (2006) emission reporting (CRF Table 3.D).

13.1 $\text{Frac}_{\text{GASF}}$

According to IPCC (2006)-11.21, Equation 11.9, $\text{Frac}_{\text{GASF}}$ is defined as the fraction of total N in synthetic fertilizers applied that is emitted as $\text{NH}_3\text{-N}$ and NO-N .

In the German inventory the quantity $\text{Frac}_{\text{GASF}}$ is not used as an input parameter. It is back-calculated from input and output data once the emission calculations are terminated.

The average $\text{NH}_3\text{-N}$ emission factor for mineral fertilizers is more than three times the NO-N emission factor. $\text{Frac}_{\text{GASF}}$ is thus primarily determined by $\text{NH}_3\text{-N}$ and, because of the different NH_3 emission factors of the various mineral fertilizer types, especially by the mineral fertilizer mix of the respective year: Because of the comparatively high emission factor of urea (see Chapter 11.1.2.1) there is a very good correlation of $\text{Frac}_{\text{GASF}}$ with the relative ratio r_{UN} of urea-N to total mineral fertilizer N.

Chapter 11.15 shows, for example, the German $\text{Frac}_{\text{GASF}}$ value for the penultimate time-series year. For the full time series, see the note in Chapter 13.5.

13.2 $\text{Frac}_{\text{GASM}}$

According to IPCC (2006)-11.21, Equation 11.9, $\text{Frac}_{\text{GASM}}$ is the fraction of total N applied with animal manures, digestate (digestate of manure and energy crops), sewage sludge and by grazing that is emitted as $\text{NH}_3\text{-N}$ and NO-N . (The $\text{Frac}_{\text{GASM}}$ definition in CRF 3.D is not the same as this definition and is thus ignored in German reporting.)

In the German inventory the quantity $\text{Frac}_{\text{GASM}}$ is not used as an input parameter. It is back-calculated from input and output data once the emission calculations are terminated.

Chapter 11.15 shows, for example, the German $\text{Frac}_{\text{GASM}}$ value for the penultimate time-series year. For the full time series, see the note in Chapter 13.5.

13.3 $\text{Frac}_{\text{LEACH}}$

$\text{Frac}_{\text{LEACH}}$ is defined as the relative fraction of N inputs into the soil that is lost via leaching and surface runoff ($\text{Frac}_{\text{LEACH}} = m_{\text{leach}}/m_{\text{soil}}$; for m_{leach} and m_{soil} see Chapter 12.2.1).

In the German inventory, $\text{Frac}_{\text{LEACH}}$ is an input value. The IPCC default value $\text{Frac}_{\text{LEACH}} = 0.30 \text{ kg kg}^{-1}$ (IPCC (2006)-11.24, Table 11.3) is used.

Die nachstehend beschriebenen Verhältniszahlen sind in der Treibhausgas-Emissionsberichterstattung nach IPCC (2006) zu berichten (CRF-Tabelle 3.D).

$\text{Frac}_{\text{GASF}}$ ist nach IPCC (2006)-11.21, Gleichung 11.9, der Anteil der mit Mineraldüngern ausgebrachten N-Menge an, der als $\text{NH}_3\text{-N}$ und NO-N emittiert wird.

Die Größe $\text{Frac}_{\text{GASF}}$ wird im deutschen Inventar nicht als Eingangsgröße verwendet, sondern für die Berichterstattung nachträglich aus Ein- und Ausgabedaten der abgeschlossenen Emissionsberechnung ermittelt.

Der mittlere $\text{NH}_3\text{-N}$ -Emissionsfaktor für Mineraldünger ist gut dreimal so groß wie der NO-N -Emissionsfaktor. $\text{Frac}_{\text{GASF}}$ wird also vorrangig durch $\text{NH}_3\text{-N}$ bestimmt und dabei, wegen der unterschiedlichen NH_3 -Emissionsfaktoren der verschiedenen Mineraldüngerarten, vor allem durch den Mineraldüngermix des jeweiligen Jahres: Wegen des vergleichsweise hohen Emissionsfaktors von Harnstoff (siehe Kapitel 11.1.2.1) ergibt sich eine sehr gute Korrelation von $\text{Frac}_{\text{GASF}}$ mit dem relativen Verhältnis r_{UN} von Harnstoff-N zu Gesamtmineraldünger-N.

Kapitel 11.15 zeigt beispielhaft den deutschen $\text{Frac}_{\text{GASF}}$ -Wert für das vorletzte Zeitreihenjahr. Zur vollständigen Zeitreihe siehe den Hinweis in Kapitel 13.5.

$\text{Frac}_{\text{GASM}}$ ist nach IPCC (2006)-11.21, Gleichung 11.9, der Anteil der mit Wirtschaftsdünger, Gärresten (von Wirtschaftsdünger und Energiepflanzen), Klärschlämmen und durch Weidegang ausgebrachten N-Menge, der als $\text{NH}_3\text{-N}$ und NO-N emittiert wird. (Die $\text{Frac}_{\text{GASM}}$ -Definition in CRF 3.D entspricht nicht dieser Definition und wird in der deutschen Berichterstattung ignoriert.)

Die Größe $\text{Frac}_{\text{GASM}}$ wird im deutschen Inventar nicht als Eingangsgröße verwendet, sondern für die Berichterstattung aus Ein- und Ausgabedaten der abgeschlossenen Emissionsberechnung ermittelt.

Kapitel 11.15 zeigt beispielhaft den deutschen Wert von $\text{Frac}_{\text{GASM}}$ für das vorletzte Zeitreihenjahr. Zur vollständigen Zeitreihe siehe den Hinweis in Kapitel 13.5.

$\text{Frac}_{\text{LEACH}}$ gibt den relativen Anteil des N-Eintrags in Böden an, der durch Auswaschung und Oberflächenabfluss verloren geht ($\text{Frac}_{\text{LEACH}} = m_{\text{leach}}/m_{\text{soil}}$; zu m_{leach} und m_{soil} siehe Kapitel 12.2.1).

$\text{Frac}_{\text{LEACH}}$ ist im deutschen Inventar eine Eingangsgröße. Es wird der IPCC-Defaultwert $\text{Frac}_{\text{LEACH}} = 0,30 \text{ kg kg}^{-1}$ (IPCC (2006)-11.24, Tabelle 11.3) verwendet.

13.4 International comparison of data / Internationaler Datenvergleich

Within the framework of quality assurance a comparison of input data and inventory results was made on European level. (For details of the procedure of the comparison see Chapter 4.3.10.)
The international comparison of the Frac parameters is made along with the comparison of the direct N₂O emissions, see Chapter 11.15.

Im Zuge der Qualitätssicherung wurde ein Vergleich von Eingangsdaten und Inventarergebnissen auf mitteleuropäischer Ebene durchgeführt. (Nähere Angaben zur Durchführung: Siehe Kapitel 4.3.10.)
Der internationale Vergleich der Frac-Größen erfolgt zusammen mit dem Vergleich der direkten N₂O-Emissionen in Kapitel 11.15.

13.5 References to information in the data collection / Verweise auf Informationen in der Datensammlung

Table 13.1: Fractions Frac_x, related tables provided in the data collection (see Chapter 2.4)

Frac _{GASF}	AI1001.001
Frac _{GASM}	AI1001.002

14 Overall emission inventory uncertainty / Emissionsinventar-Gesamtunsicherheit

14.1 Overview / Überblick

In parallel to the establishment of the inventory, the total uncertainties of the German agricultural GHG emission inventory and of the German agricultural Ammonia emission inventory were calculated according to IPCC (2006a) and EMEP (2016), respectively.

These uncertainties are a measure for the accuracy (precision) of the inventory results, but not for the correctness, as is discussed in IPCC (2006a). (Correctness is a question of systematic errors (e. g. in the derivation of modelling parameters) that cannot be judged by analysis of uncertainties arising from random errors in activity data and emission factors.)

The assessment of the overall uncertainty of the emissions is achieved by combining the uncertainties (amount and type of distribution) of the respective implied emission factors (IEF) and activity data (animal numbers, areas). The measure of uncertainty is described in Chapter 14.2.

The quantification of the overall uncertainty of the national GHG and ammonia inventories is difficult and complex due to the multitude of emission generating processes. In addition, the number of input parameters is vast; as a rule they do not exhibit normal distributions and they do not always satisfy the criterion of being independent from each other.

The only method to correctly solve the problem is the Monte Carlo methodology as described in IPCC (2006a) as Approach 2. Monte Carlo calculations are very time intensive and costly. Therefore, IPCC (2006a) also provides a simpler estimate (Approach 1) that is based on Gaussian error propagation calculations. By convention, this simpler approach allows the use of the Gaussian error calculation irrespective of the fact that in some cases the input data are not independent and that normal distribution often is not existent.

As in the report at hand Approach 1 is used to estimate the overall uncertainty of the national GHG and NH₃ inventories (the EMEP (2016) methodology is nearly identical to Approach 1 of IPCC (2006a)), the rules of the Gaussian error propagation calculation are described in Chapter 14.2 along with a description of the calculation of the 95 % confidence interval.

The application of Approach 1 in the agricultural inventory assumes that the emission factors are correlated over the years, whereas the activity data are not. Thus, the calculation scheme described in IPCC (2006a)-3.31 is used without modification.

Chapters 14.3 bis 14.5 discuss the uncertainties of all relevant implied emission factors.

The resulting overall uncertainties (amounts and trends of GHG and NH₃) are provided in Chapters 14.6 and 14.7.

Parallel zu den Emissionberechnungen erfolgte die Berechnung der Gesamtunsicherheiten des deutschen landwirtschaftlichen Treibhausgas-Inventars und des deutschen landwirtschaftlichen Ammoniak-Inventars nach IPCC (2006a) bzw. EMEP (2016).

Diese Unsicherheiten sind ein Maß für die Genauigkeit (Präzision) der Inventarergebnisse, nicht aber für die Korrektheit, siehe IPCC (2006a)-3.8. (Korrektheit ist eine Frage von systematischen Fehlern, z. B. in der Ableitung von Modellparametern, und kann nicht anhand von Unsicherheiten beurteilt werden, die aus zufälligen Fehlern in Eingangsdaten und Emissionsfaktoren folgen.)

Zur Beurteilung der Unsicherheit der nationalen Gesamtemission einer Spezies werden – neben der Unsicherheit der Aktivität (Tierzahl, Fläche) – die Unsicherheiten (Betrag und Verteilungstyp) von aggregierten Emissionsfaktoren (IEF) benötigt. Zur Wahl des Unsicherheitsmaßes siehe Kapitel 14.2.

Die Ermittlung der Gesamtunsicherheit von nationalem THG-Inventar und nationalem NH₃-Inventar ist wegen der Vielzahl und Komplexität der emissionserzeugenden Prozesse sowie der großen Anzahl der eingehenden, i. d. R. nicht-normalverteilten und auch nicht immer voneinander unabhängigen Größen und deren Unsicherheiten eine komplexe Aufgabe.

Die einzige Methode zur korrekten Bewältigung dieser Aufgabe ist die Monte-Carlo-Methode, die in IPCC (2006a) als Approach 2 genannt wird. Monte-Carlo-Berechnungen sind sehr aufwändig, weshalb IPCC (2006a) auch eine einfache Schätzmethode (Approach 1) angibt, basierend auf den Regeln der Gaußschen Fehlerrechnung. Dieses vereinfachte Verfahren vernachlässigt per Konvention, dass die Gaußsche Fehlerrechnung unabhängige und normalverteilte Größen voraussetzt.

Da Approach 1 im vorliegenden Bericht zur Schätzung der Gesamtunsicherheit von nationalem THG-Inventar und nationalem NH₃-Inventar eingesetzt wird (die EMEP (2016)-Methodik entspricht weitgehend dem Approach 1 von IPCC (2006a)), werden in Kapitel 14.2 die Rechenregeln der Gaußschen Fehlerrechnung beschrieben und um die Beschreibung der Berechnung des 95 %-Konfidenzintervalls ergänzt.

Die Anwendung des Approach 1 im landwirtschaftlichen Inventar geht davon aus, dass die Emissionsfaktoren über die Jahre miteinander korreliert sind, während die Aktivitätsdaten es nicht sind. Damit kommt direkt das Rechenschema zum Einsatz, das in IPCC (2006a)-3.31 beschrieben ist.

Die Kapitel 14.3 bis 14.5 gehen auf die Unsicherheiten aller relevanten aggregierten Emissionsfaktoren ein.

Die resultierenden Gesamtunsicherheiten des Inventars (Höhe der Emissionen und Trend bei THG und NH₃) finden sich in Kapitel 14.6 und 14.7.

14.2 Gaussian error propagation and 95 % confidence interval / Gaußsche Fehlerfortpflanzung und 95 %-Konfidenzintervall

The standard error $s(y)$ of a quantity y which is calculated from a number of quantities x_i ($i = 1, 2, \dots, n$), is derived from the standard errors of the input data $s(x_i)$ using the Gaussian error propagation procedure:

$$s(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial y}{\partial x_i} \cdot s(x_i) \right)^2} \quad (14.1)$$

The relative standard error $r(y)$ is defined by

$$r(y) = \frac{s(y)}{y} \quad (14.2)$$

If y is a sum of n quantities x_i ($i = 1, 2, \dots, n$) that can have positive or negative signs, Equations (14.1) und (14.2) lead to the following calculation procedure for the combined relative standard error:

$$r(y) = \frac{\sqrt{[r(x_1) \cdot x_1]^2 + [r(x_2) \cdot x_2]^2 + \dots + [r(x_n) \cdot x_n]^2}}{|x_1 + x_2 + \dots + x_n|} \quad (14.3)$$

If y is a product of n quantities x_i ($i = 1, 2, \dots, n$), Equations (14.1) und (14.2) lead to the following calculation procedure for the combined relative standard error:

$$r(y) = \sqrt{[r(x_1)]^2 + [r(x_2)]^2 + \dots + [r(x_n)]^2} \quad (14.4)$$

This procedure is valid without change if one or more x_i are divisors.

When the function y becomes a function $y' = c \cdot y$ by multiplying with a constant factor c , the standard error calculated using Equation (14.1) becomes $s(y') = c \cdot s(y)$. Hence, it can be derived from Equation (14.2) that the relative standard error of y' equals that of y : $r(y') = r(y)$.

Any calculation combining the basic arithmetical operations can be dealt with by combining step by step the error propagation methods described above. However, this leads only to an approximation to the correct value that would be obtained from a strict application of Equation (14.1).

Instead of the standard error $r(y)$, IPCC (2006a) und EMEP (2016) require half the 95 % confidence interval to be reported as uncertainty, expressed as percentage of the mean value. In the following this quantity is denoted $U(y)$.

For a normal distribution half the 95 % confidence interval is about twice the value of the standard error (IPCC (2006a)-3.17). Using this approximation and Equations (14.1) und (14.2) one obtains for $U(y)$ the following equation that is used in the inventory (in % units):

Der Standardfehler $s(y)$ einer Größe y , die sich aus mehreren Größen x_i ($i = 1, 2, \dots, n$) berechnet, ergibt sich nach dem Gaußschen Fehlerfortpflanzungsgesetz aus den Standardfehlern $s(x_i)$ der eingehenden Größen:

Für den relativen Standardfehler $r(y)$ gilt:

Wenn y eine Summe von n Größen x_i ($i = 1, 2, \dots, n$) ist, wobei die x_i auch negativ sein können, führen Gleichung (14.1) und (14.2) zur folgenden Regel für den kombinierten relativen Standardfehler:

Wenn y ein Produkt aus n Größen x_i ($i = 1, 2, \dots, n$) ist, führen die Gleichungen (14.1) und (14.2) zur folgenden Regel für den kombinierten relativen Standardfehler:

Diese Regel gilt ohne Veränderung auch für den Fall, dass ein oder mehrere x_i als Divisoren auftreten.

Wird Funktion y durch Multiplikation mit einer Konstanten c zu $y' = c \cdot y$, so ergibt sich aus Gleichung (14.1) der Standardfehler mit $s(y') = c \cdot s(y)$. Damit folgt schließlich aus Gleichung (14.2), dass der relative Standardfehler von y' gleich demjenigen von y ist: $r(y') = r(y)$.

Soll für eine Berechnung, in der die vier Grundrechenarten kombiniert sind, eine Fehlerfortpflanzungsrechnung durchgeführt werden, ist eine schrittweise Kombination der oben angeführten Regeln möglich. Das Ergebnis ist allerdings nur eine Näherung des korrekten Ergebnisses von Gleichung (14.1).

Nach IPCC (2006a) und EMEP (2016) ist nicht der relative Standardfehler $r(y)$ als Unsicherheit zu berichten, sondern das halbe 95 %-Konfidenzintervall, dividiert durch den Mittelwert und als Prozentzahl ausgedrückt. Diese Größe wird hier mit dem Symbol $U(y)$ bezeichnet.

Bei einer Normalverteilung entspricht das halbe 95 %-Konfidenzintervall näherungsweise dem Zweifachen des Standardfehlers (IPCC (2006a)-3.17). Mit dieser Näherung und den Gleichungen (14.1) und (14.2) ergibt sich für $U(y)$ die im Inventar verwendete Rechenvorschrift ($U(y)$ mit der Einheit %:

$$U(y) = 100 \cdot 2 \cdot r(y) \quad (14.5)$$

As the factors (100 and 2) are constant, the calculation rules derived for $r(y)$ (see Equation (14.3) and (14.4)) apply to $U(y)$ as well, see IPCC (2006a)-3.28 and EMEP (2016), Part A, Chapter 5, Equations (2) and (3).

The approximative method „Approach 1“ given by IPCC (2006) for the estimation of the total uncertainty of the GHG inventory applies the Gaussian error propagation method also to quantities that are not normally distributed. Such quantities can be emission factors, the 95 % confidence interval of which is often defined by $[M/X_1, M \cdot X_2]$ where M is the mean emission factor and X_1 und X_2 are given factors > 1 (often with $X_2 = X_1$). Hence, the error distribution is asymmetric with two different “halves” of the 95 % confidence interval: U_{low} below the mean value and U_{high} above the mean value. The U_{low} and U_{high} are given by (in percent of the mean value):

$$U_{low} = 100 \cdot \left(1 - \frac{1}{X_1} \right) \quad (14.6)$$

$$U_{high} = 100 \cdot (X_2 - 1) \quad (14.7)$$

The application of the calculation rules (14.3) and (14.4) to combine partial uncertainties can lead to large uncertainties. If this is the case, it can be assumed the error distribution is not normal. For this specific case, IPCC (2006a), Chapter 3.7.3, provides a correction method for the resulting uncertainty and a specific method for the estimation of U_{low} and U_{high} . The latter leads to an increase of the U values calculated without the method. It applies, however only to U values lower than 230 %. However, the inventory at hand has U values up to 400 %, so that the forementioned correction method could not be applied. Hence, in order to avoid inconsistencies, the German inventory did not use any corrections of the U values.

IPCC (2006a)-3.29 requires for asymmetric error distributions that, when using the Approach 1 method, the larger of the two intervals U_{low} and U_{high} be used (see specifications in IPCC (2006a) to fill the columns E and F in IPCC Table 3.2).

Da die Faktoren (100 und 2) konstant sind, sind die für $r(y)$ abgeleiteten Rechenregeln (14.3) und (14.4) direkt auch für $U(y)$ anwendbar, siehe IPCC (2006a)-3.28 und EMEP (2016), Part A, Kapitel 5, Gleichungen (2) und (3).

Der IPCC-Näherungsansatz „Approach 1“ zur Abschätzung der Gesamtunsicherheit des THG-Emissionsinventars wendet die Gaußsche Fehlerrechnung auch auf nicht normalverteilte Größen an. Dies betrifft z. B. Emissionsfaktoren, deren 95 %-Konfidenzintervall oftmals durch $[M/X_1, M \cdot X_2]$ charakterisiert wird, wobei M der Mittelwert des Emissionsfaktors ist und X_1 und X_2 feste Faktoren > 1 sind (wobei oftmals $X_2 = X_1$). Es handelt sich dann also um eine asymmetrische Verteilung mit zwei unterschiedlichen „Hälften“ des 95 %-Konfidenzintervalls: U_{low} unterhalb und U_{high} oberhalb des Mittelwertes M , beide Größe in Prozent des Mittelwertes:

Entstehen durch die Anwendung der Rechenregeln (14.3) und (14.4) große Unsicherheiten aus der Kombination von Teil-Unsicherheiten, ist davon auszugehen, dass es sich nicht um eine Normalverteilung des Fehlers handelt. Für diesen Fall bietet IPCC (2006a), Kapitel 3.7.3, ein Korrekturverfahren für die resultierende Unsicherheit sowie ein besonderes Schätzverfahren zur Berechnung von U_{low} und U_{high} an. Dieses Korrekturverfahren führt zu einer Vergrößerung der U -Werte, kann aber nur für U -Werte kleiner als 230 % angewendet werden. Da im vorliegenden Inventar aber auch U -Werte größer als 400 % vorkommen, für die dann keine Korrektur möglich wäre, wurde zur Vermeidung von Inkonsistenzen generell auf eine U -Korrektur verzichtet.

Für asymmetrische Fehler-Verteilungen schreibt IPCC (2006a)-3.29 vor (siehe dortige Vorschrift zum Füllen der Spalten E und F in IPCC-Tabelle 3.2), dass bei Anwendung der Approach-1-Methode von den beiden Intervallen U_{low} und U_{high} das größere zu verwenden ist.

14.3 IEF uncertainty for methane / IEF-Unsicherheit für Methan

14.3.1 Methane from enteric fermentation / Methan aus der Verdauung

For the calculation of methane emissions from enteric fermentation see also Chapter 3.3.2. The assessment of the respective uncertainty using the Gaussian error propagation calculation remains problematic as not all input data can be characterized by adequate

Die Berechnung von Methanemissionen aus der Verdauung erfolgt nach Kapitel 3.3.2. Die Ermittlung der Unsicherheit des Emissionsfaktors ist mithilfe der Gaußschen Fehlerfortpflanzungsrechnung problematisch, da nicht für alle eingehenden Größen Unsicherheiten be-

uncertainties. Hence, the uncertainty of the emission factor is fixed to 20 % in accordance with IPCC(2006)-10.33 (30 % for sheep and goats).

kannt sind. Daher wird entsprechend der Diskussion in IPCC(2006)-10.33 eine Unsicherheit des Emissionsfaktors von 20 % angesetzt (30 % für Schafe und Ziegen).

14.3.2 Methane from manure management / Methan aus dem Wirtschaftsdünger-Management

The calculation of methane emissions from manure management follows IPCC(2006)-10.37, see also Chapter 3.3.4.1 Again, many of the input data cannot be characterized by their uncertainties. Hence, a Gaussian error propagation cannot be applied. Instead, the uncertainty (half the 95 % confidence interval) of 20 % as recommended by IPCC(2006)-10.48 is used.

Zur Berechnung von Methanemissionen aus der Wirtschaftsdünger-Management siehe Kapitel 3.3.4.1. Nicht für alle eingehenden Größen sind Unsicherheiten bekannt, so dass die Gaußschen Fehlerfortpflanzungsrechnung nicht angewendet werden kann. Es wird stattdessen nach IPCC(2006)-10.48 eine Unsicherheit (halbes 95 %-Konfidenzintervall) von 20 % angesetzt.

14.4 IEF uncertainties for N₂O, NO and N₂ / IEF-Unsicherheiten für N₂O, NO und N₂

14.4.1 IEF uncertainty for N₂O from manure management / IEF-Unsicherheit für N₂O aus dem Wirtschaftsdünger-Management

The calculation of the uncertainty U (half the 95 % confidence interval) of the IEF for N₂O emissions from manure management uses the Gaussian error propagation calculation on national scale. Following Approach 1 (see Chapter 14.1) it is assumed that the preconditions for the application of the Gaussian error propagation be satisfied. According to Equation (14.5) U can be derived from the relative standard error r the calculation of which is described in the following.

The N₂O emission factors used in the inventory are related to the mount of N excreted. Hence, the implied emission factor (IEF) which is related to the animal place is given by:

Die Berechnung der Unsicherheit U (halbes 95 %-Konfidenzintervall) des IEF für N₂O-Emission aus dem Wirtschaftsdünger-Management beruht auf der Anwendung des Gaußschen Fehlerfortpflanzungsgesetzes auf nationaler Ebene. Im Sinne von Approach 1 (siehe Kapitel 14.1) wird angenommen, dass die Voraussetzungen dafür erfüllt seien. Nach Gleichung (14.5) lässt sich U auf den relativen Fehler r zurückführen. Dieser wird im Folgenden abgeleitet.

Die im Inventar verwendeten N₂O-Emissionsfaktoren beziehen sich auf die ausgeschiedene N-Menge. Daher gilt für den auf den Tierplatz bezogenen aggregierten Emissionsfaktor (IEF):

$$IEF_{N_2O-N, MM} = N_{\text{housing}} \cdot EF_{N_2O-N, MM} \quad (14.8)$$

$IEF_{N_2O-N, MM}$	implied N ₂ O-N emission factor for manure management (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
N_{housing}	N excreted in the house (in kg pl ⁻¹ a ⁻¹)
$EF_{N_2O-N, MM}$	partial N ₂ O-N emission factor for manure management, related to N (in kg kg ⁻¹)

Then, according to Chapter 14.2, the relative standard error of the IEF is given by:

Nach Kapitel 14.2 gilt dann für die relative Standardfehler:

$$r(IEF_{N_2O-N, MM}) = \sqrt{r^2(N_{\text{housing}}) + r^2(EF_{N_2O-N, MM})} \quad (14.9)$$

$r(IEF_{N_2O-N, MM})$	relative standard error of the implied N ₂ O-N emission factor for manure management (in kg kg ⁻¹)
$r(N_{\text{housing}})$	relative standard error of the amount of N excreted in the house (in kg kg ⁻¹)
$r(EF_{N_2O-N, MM})$	relative standard error of the partial N ₂ O-N emission factor for manure management (in kg kg ⁻¹)

IPCC (2006), Table 10.21, describes the uncertainty range of the emission factors of direct N₂O from all management systems with non-zero emission factors with a factor of 2, i. e. from -50 % to +100 % (95 % confidence interval). According to the convention for Approach 1, the larger of the two percentages is to be applied in the calculation of the overall uncertainty of the GHG inventory (see Chapter 14.2), i.e. +100 %, corresponding to 50 % for the relative standard error.

Regarding the uncertainty of the N-excretions, EMEP (2016) provides uncertainties between 7% for sheep and

IPCC (2006), Tabelle 10.21, gibt für die von Null verschiedenen Emissionsfaktoren für direktes N₂O aus allen Managementsystemen einen Unsicherheitsfaktor von 2 an, der einer Unsicherheit (95 %-Konfidenzintervall) von -50 % / + 100 % entspricht. Gemäß der Konvention für das Approach-1-Verfahren zur Berechnung der Gesamtunsicherheit des THG-Inventars (siehe Kapitel 14.2) ist das größere der beiden Intervalle zu verwenden, also +100 % (d. h. 50 % für den relativen Standardfehler).

Bzgl. der Unsicherheit der N-Ausscheidungen gibt EMEP (2016) unter Verweis auf „Webb (2000)“, womit

30% for pigs (referring to "Webb (2000)", which actually means "Webb (2001)"). This information was derived for the United Kingdom using the methodologies available at the time to calculate the N excretions. Such an investigation is not known for Germany. It is clear, however, that the determination of N excretions in the German inventory has been considerably refined since the early days of inventories (see Döhler et al., 2002) for many animal categories, mainly by differentiated models (especially for pigs), but also by excretion data taken from technical literature. Therefore, an uncertainty (half 95% confidence interval) of 10% is considered appropriate for the current inventory (normal distribution). This corresponds to a standard error of about 5%. There is no distinction between different animal categories.

Based on this data Equation (14.9) leads to a relative standard error of the IEF of slightly more than 50 %. This means that in comparison to the relative standard error of the emission factor the relative standard error of the N excretion rates seem to be negligible. Correspondingly, the 95 % confidence interval of the IEF is assumed to be equivalent to that of the partial emission factor, i.e. -50 % and +100 %. As mentioned above, the Approach 1 estimate of the overall uncertainty of the GHG inventory uses the higher percentage only, i.e. 100 %. A lognormal distribution is assumed.

14.4.2 IEF uncertainty for NO and N₂ from manure management / IEF-Unsicherheit für NO und N₂ aus dem Wirtschaftsdünger-Management

The ZSE data base of Umweltbundesamt requires uncertainties for NO and N₂ emission factors. No default values are available. However, as the NO and N₂ emissions are calculated proportional to the N₂O emissions, the uncertainties of the N₂O emission factors as described in Chapter 14.4.1 are applied to these gases. This also applies to the distribution.

aber Webb (2001) gemeint ist, Unsicherheiten zwischen 7 % für Schafe und 30 % für Schweine an. Diese Angaben wurden für das Vereinigte Königreich unter der Verwendung der seinerzeit verfügbaren Methodiken zur Berechnung der N-Ausscheidungen abgeleitet. Eine solche Untersuchung ist für Deutschland nicht bekannt. Es steht aber fest, dass die Ermittlung der N-Ausscheidungen im deutschen Inventar seit den Anfangszeiten der Inventarerstellung (siehe Döhler et al., 2002) für zahlreiche Tierkategorien erheblich verfeinert wurde, überwiegend durch differenzierte Modelle (insbesondere auch für Schweine), aber auch durch Ausscheidungsdaten aus der Fachliteratur. Daher erscheint für das aktuelle Inventar eine Unsicherheit (halbes 95 %-Konfidenzintervall) von 10 % angemessen (Normalverteilung). Dies entspricht einem Standardfehler von ca. 5 %. Es wird dabei nicht zwischen verschiedenen Tierkategorien unterschieden.

Damit ergibt sich mit Gleichung (14.9) ein relativer Standardfehler des IEF von knapp über 50 %. Der Einfluss des relativen Standardfehlers der N-Ausscheidung ist also praktisch vernachlässigbar im Vergleich zum relativen Standardfehler des Emissionsfaktors. Dementsprechend wird das 95 %-Konfidenzintervall des IEF demjenigen für den partiellen Emissionsfaktor gleich gesetzt: -50 % / + 100 %. In die Abschätzung der Gesamtunsicherheit des THG-Inventars geht wie oben erwähnt nur der höhere Prozentbetrag (100 %) ein. Es wird lognormale Verteilung angenommen.

Angaben zur Unsicherheit des IEF für NO und N₂ werden für die ZSE-Datenbank des Umweltbundesamtes benötigt. Allerdings sind keine Defaultangaben verfügbar. Da die Emissionen von NO und N₂ im deutschen Inventar proportional zu den Emissionen von N₂O berechnet werden, werden die in Kapitel 14.4.1 beschriebenen N₂O-Unsicherheiten sowie die Verteilungsform übernommen.

14.4.3 IEF uncertainty for N₂O from agricultural soils / IEF-Unsicherheit für N₂O aus landwirtschaftlichen Böden

For the sectors to be reported, standard emission factors according to IPCC(2006)-11.11 are used. Uncertainties for these emission factors are also provided in this document. However, the uncertainties are not symmetric with respect to the mean. A lognormal distribution is assumed. In this case, IPCC(2006a)-3.29 proposes to use the higher percentage between mean and the limits of confidence. The resulting uncertainties are given in Table 14.1.

Für die zu berichtenden Bereiche werden Standard-Emissionsfaktoren nach IPCC(2006)-11.11 verwendet, für die an gleicher Stelle auch Unsicherheitsbereiche angegeben werden. Die Unsicherheitsbereiche sind nicht symmetrisch zum Mittelwert; es ist von lognormalen Verteilungen auszugehen. Daher wird entsprechend der Empfehlung in IPCC(2006a)-3.29, die größere Prozentzahl zwischen Mittelwert und Konfidenzgrenze verwendet, siehe Table 14.1.

Indirect emissions originate from the deposition of reactive nitrogen as well as from runoff and leaching of N.

Indirekte N₂O-Emissionen entstehen infolge von Deposition von reaktivem Stickstoff, sowie aus ausgewaschenem und abgeflussem N.

For the uncertainties listed in Table 14.1 see Chapters 12.1.2 and 12.2.2.

Zu den in Table 14.1 eingehenden Unsicherheiten siehe Kapitel 12.1.2 und 12.2.2.

14.5 IEF uncertainty for NH₃ from manure management / IEF-Unsicherheit für NH₃ aus dem Wirtschaftsdünger-Management

The calculation of the uncertainty U (half the 95 % confidence interval) of the implied emission factor $IEF_{\text{NH}_3\text{-N, MM}}$ for NH₃ emissions from manure management without spreading (i.e. for the emissions from housing plus storage) is based on the partial NH₃ emission factors and the different amounts of TAN present at housing and storage. Following Approach 1 (see Chapter 14.1) it is assumed that the preconditions for the application of the Gaussian error propagation be satisfied. According to Equation (14.5) U can be derived from the relative standard error r the calculation of which is described in the following. In order to simplify notation, indices are introduced to denote the origin of the emissions from the house (1) and the storage system (2):

$$IEF_{\text{NH}_3\text{-N, MM}} = IEF_{\text{NH}_3\text{-N, 1}} + IEF_{\text{NH}_3\text{-N, 2}} \quad (14.10)$$

$IEF_{\text{NH}_3\text{-N, MM}}$ implied NH₃-N emission factor for manure management (housing plus storage) (in kg pl⁻¹ a⁻¹)
 $IEF_{\text{NH}_3\text{-N, j}}$ implied NH₃-N emission factor for compartment j (in kg pl⁻¹ a⁻¹)
 j = compartment index (j = 1: housing, j = 2: storage)

Each implied emission factor is defined as

Dabei ist jeder IEF wie folgt definiert:

$$IEF_{\text{NH}_3\text{-N, j}} = TAN_j \cdot EF_{\text{NH}_3\text{-N, j}} \quad (14.11)$$

$IEF_{\text{NH}_3\text{-N, j}}$ implied NH₃-N emission factor for compartment j (in kg pl⁻¹ a⁻¹)
 j = compartment index (j = 1: housing, j = 2: storage)
 TAN_j TAN entering compartment j (in kg pl⁻¹ a⁻¹)
 $EF_{\text{NH}_3\text{-N, j}}$ partial NH₃-N emission factor for compartment j, related to TAN (in kg kg⁻¹)

According to the N flow scheme (see Chapter 3.3.4.3.5) TAN_2 is defined by:

Gemäß dem N-Fluss-Schema (siehe Kapitel 3.3.4.3.5) gilt für TAN_2 :

$$TAN_2 = TAN_1 \cdot (1 - EF_{\text{NH}_3\text{-N, 1}}) \quad (14.12)$$

TAN_2 TAN entering storage (in kg pl⁻¹ a⁻¹)
 TAN_1 TAN excreted in the housing (in kg pl⁻¹ a⁻¹)
 $EF_{\text{NH}_3\text{-N, 1}}$ partial NH₃-N emission factor for housing, related to TAN (in kg kg⁻¹)

Using this one arrives at the following equation for the NH₃-IEF for housing plus storage:

Damit ergibt sich für den aggregierten Emissionsfaktor für NH₃-Emissionen aus Stall und Lager:

$$IEF_{\text{NH}_3\text{-N, MM}} = TAN_1 \cdot (EF_{\text{NH}_3\text{-N, 1}} + EF_{\text{NH}_3\text{-N, 2}} - EF_{\text{NH}_3\text{-N, 1}} \cdot EF_{\text{NH}_3\text{-N, 2}}) \quad (14.13)$$

$IEF_{\text{NH}_3\text{-N, MM}}$ implied NH₃-N emission factor for manure management (housing plus storage) (in kg pl⁻¹ a⁻¹)
 TAN_1 TAN excreted in the housing (in kg pl⁻¹ a⁻¹)
 $EF_{\text{NH}_3\text{-N, j}}$ partial NH₃-N emission factor for compartment j, related to TAN (in kg kg⁻¹)
 j = compartment index (j = 1: housing, j = 2: storage)

Hence, according to Equation (14.1), the standard error s is:

Für den Standardfehler s gilt dann nach Gleichung (14.1):

$$s(IEF_{NH_3-N, MM}) = \sqrt{\left(\frac{\partial IEF_{NH_3-N, MM}}{\partial TAN_1} \cdot s(TAN_1)\right)^2 + \sum_{j=1}^2 \left(\frac{\partial IEF_{NH_3-N, MM}}{\partial EF_{NH_3-N, j}} \cdot s(EF_{NH_3-N, j})\right)^2} \quad (14.14)$$

$s(IEF_{NH_3-N, MM})$	standard error of the implied NH_3 -N emission factor for manure management (housing plus storage) (in $kg\ pl^{-1}\ a^{-1}$)
TAN_1	TAN excreted in the housing (in $kg\ pl^{-1}\ a^{-1}$)
$EF_{NH_3-N, j}$	partial NH_3 -N emission factor for compartment j, related to TAN (in $kg\ kg^{-1}$)
j	j = compartment index (j = 1: housing, j = 2: storage)
$s(EF_{NH_3-N, j})$	standard error of the partial NH_3 -N emission factor for compartment j, related to TAN (in $kg\ kg^{-1}$)

According to Chapter 14.2, the relative standard error is

Der relative Standardfehler folgt dann entsprechend Kapitel 14.2 aus

$$r(IEF_{NH_3-N, MM}) = \frac{s(IEF_{NH_3-N, MM})}{IEF_{NH_3-N, MM}} \quad (14.15)$$

$r(IEF_{NH_3-N, MM})$	relative standard error of the implied NH_3 -N emission factor for manure management (housing plus storage)
$s(IEF_{NH_3-N, MM})$	standard error of the implied NH_3 -N emission factor for manure management (housing plus storage) (in $kg\ pl^{-1}\ a^{-1}$)
$IEF_{NH_3-N, MM}$	implied NH_3 -N emission factor for manure management (housing plus storage) (in $kg\ pl^{-1}\ a^{-1}$)

The uncertainty calculation uses the partial emission factors for NH_3 -N from housing and storage the uncertainties of which, however, are not known. EMEP (2007)-B1090-19 provided an uncertainty of 30 % for Tier 1 emission factors. In the following this uncertainty is assumed to be valid for the partial emission factors (95 % confidence interval). This leads to a relative standard error of the emission factors of ± 15 %.

The relative standard error of TAN inputs to the house is estimated as follows: Based on Dämmgen et al. (2009b) it is assumed that the assessment of N excretions can be achieved with an uncertainty < 10 % (standard error). It is further assumed that this applies to TAN excretions as well. Hence, the inventory uses 10 % as a standard error, i.e. 20 % for half the 95 % confidence interval.

Considering that the standard error for EF_1 und EF_2 is assumed to be equal (here denoted as $r(EF)$, it is found that the resulting $r(IEF_{NH_3-N, MM})$ is always lower than r_{max} :

In die Unsicherheitsberechnung gehen die partiellen Emissionsfaktoren für NH_3 -N aus Stall und Lager ein, deren Unsicherheit allerdings nicht bekannt ist. EMEP (2007)-B1090-19 gab für Tier-1-Emissionsfaktoren eine Unsicherheit von 30 % an. Diese Unsicherheit wird im Folgenden auch für die partiellen Emissionsfaktoren unterstellt (95 %-Konfidenzintervall). Der relative Standardfehler liegt entsprechend bei ± 15 %.

Die Unsicherheit der TAN-Mengen wird wie folgt geschätzt: In Anlehnung an Dämmgen et al. (2009b) wird angenommen, dass die tierischen N-Ausscheidungen eine Unsicherheit < 10 % haben (relativer Standardfehler). Es wird weiterhin angenommen, dass die TAN-Unsicherheit gleich der der N-Ausscheidungen ist. Für das Inventar wird also von einem relativen Standardfehler der TAN-Menge von 10 % ausgegangen.

Unter Berücksichtigung des für EF_1 und EF_2 als gleich angenommenen relativen Standardfehlers, der hier mit $r(EF)$ bezeichnet wird, ist $r(IEF_{NH_3-N, MM})$ stets kleiner als r_{max} :

$$r(IEF_{NH_3-N, MM}) < r_{max} = \sqrt{[r(TAN_1)]^2 + [r(EF)]^2} \quad (14.16)$$

$r(IEF_{NH_3-N, MM})$	relative standard error of the implied NH_3 -N emission factor for manure management (housing plus storage)
r_{max}	maximum possible value of $r(IEF_{NH_3-N, MM})$
$r(TAN_1)$	relative standard error of the TAN excreted in the housing
$r(EF)$	relative standard error for each of the NH_3 -N emission factors for housing and storage

The upper threshold r_{max} is used as an uncertainty that does not depend on animal category, because it does not account for category-specific emission factors and frequencies of housing and storage systems. This simplification seems justified in the light of the vague basis of the uncertainty value adopted from EMEP

Die Obergrenze r_{max} wird als eine für alle Tiere einheitliche Unsicherheit verwendet, die von individuellen Emissionsfaktoren und Häufigkeitsverteilungen von Stall- und Lagersystemen unabhängig ist. Diese Vereinfachung erscheint in Anbetracht der relative vagen Ausgangsbasis (EMEP (2007)-B1090-19) gerechtfertigt. Für

(2007)-B1090-19. The upper threshold $r_{\max}$ is found to be 0.18 or 18 %. This means, according to Chapter 14.2, 36 % for U ($IEF_{\text{NH}_3\text{-N, MM}}$) (half the 95 % confidence interval).

The frequency distribution of the errors can be assumed to be normal due to the numerous data influencing the results.

$r_{\max}$ ergibt sich 0,18 bzw. 18 %. Die Unsicherheit U (halbes 95 %-Konfidenzintervall) wird nach Kapitel 14.2 als das Zweifache berechnet: U ($IEF_{\text{NH}_3\text{-N, MM}}$) = 36 %.

Die Verteilung der Fehler kann wegen der Vielzahl der eingehenden Einflussfaktoren als normal angenommen werden.

14.6 Total uncertainty of the German agricultural GHG inventory / Gesamtunsicherheit des deutschen landwirtschaftlichen THG-Inventars

14.6.1 Calculation methodology / Berechnungsmethodik

The estimation of the overall uncertainty of the GHG emissions inventory uses the IPCC approximation approach "Approach 1" (IPCC (2006a) -3.31). The basics for using this approximation approach are described in Chapters 14.1 to 14.5.

For the uncertainties of the activity data and the emission factors used in the overall uncertainty calculations see Chapters 4 bis 11. Special features are discussed in Chapters 14.6.2 und 14.6.3.

The effect of these uncertainties on the German national agricultural greenhouse gas inventory is discussed in Chapter 14.6, in particular see Table 14.1.

Die Abschätzung der Gesamtunsicherheit des THG-Emissionsinventars verwendet den IPCC-Näherungsansatz „Approach 1“ (IPCC (2006a)-3.31). Die Grundlagen für die Nutzung dieses Näherungsansatzes werden in den Kapiteln 14.1 bis 14.5 beschrieben.

Zu den Unsicherheiten der Aktivitätsdaten und der Emissionsfaktoren siehe entsprechende Angaben in den Kapiteln 4 bis 11. Auf Besonderheiten gehen Kapitel 14.6.2 und 14.6.3 ein.

Auf die resultierende Gesamtunsicherheit des deutschen landwirtschaftlichen Treibhausgas-Inventars wird in Kapitel 14.6 eingegangen, siehe besonders Table 14.1.

14.6.2 Special features of the uncertainties of activity data / Besonderheiten von Unsicherheiten der Aktivitätsdaten

For cattle numbers, the uncertainty has decreased over the past years. The uncertainty used is an estimated mean uncertainty. A sensitivity analysis showed that the accuracy of this estimated uncertainty has no significant impact on the overall uncertainty of the greenhouse gas inventory.

The uncertainties of the activity data regarding direct N_2O emissions from agricultural soils are influenced by a comparatively large number of quantities and their respective uncertainties. It is assumed that the overall uncertainty of the activity data does not exceed 20 to 30 % which is markedly less than the relative uncertainty of the emission factors (see Chapter 14.4.3). Hence the latter uncertainty dominates the overall uncertainty to such an extent that a more accurate assessment of the uncertainty of the activities appears unnecessary.

Bei den Tierzahlen von Rindern hat die Unsicherheit mit den Jahren abgenommen. Daher wird mit einem geschätzten Mittelwert gerechnet. Vergleichsrechnungen haben gezeigt, dass der exakte Wert dieser geschätzten Unsicherheiten ohne signifikanten Einfluss auf die Gesamtunsicherheit des Treibhausgas-Inventars ist.

Die Unsicherheiten der Aktivitätsdaten bei direkten N_2O -Emissionen aus landwirtschaftlichen Böden (N-Menge) sind eine Funktion einer größeren Anzahl an Einflussgrößen und deren Unsicherheiten. Es ist davon auszugehen, dass die Gesamtunsicherheit der Aktivitätsdaten nicht höher als 20 bis 30 % und damit deutlich geringer als die relative Unsicherheit der Emissionsfaktoren (siehe Kapitel 14.4.3) ist. Letztere dominiert somit die relative Unsicherheit der Gesamt- N_2O -Emissionen, womit eine genauere Bestimmung der Aktivitätsunsicherheiten nicht erforderlich erscheint.

14.6.3 Special features of the uncertainties of emission factors / Besonderheiten der Unsicherheiten von Emissionsfaktoren

The relative uncertainties of the emission factors for CH_4 and N_2O can be transferred directly into uncertainties of CO_2 equivalents. The multiplication with a constant factor has no effect on the relative uncertainty (see Chapter 14.2).

Die relativen Emissionsfaktor-Unsicherheiten für CH_4 und N_2O können direkt für die Darstellung in CO_2 -Äquivalenten übernommen werden, da letztere nur durch Multiplikation mit einem konstanten Faktor entstehen, der keinen Einfluss auf die relative Unsicherheit hat (siehe Kapitel 14.2).

14.6.4 Uncertainty table / Unsicherheitstabelle

Table 14.1 displays the various input data and their uncertainties as well as intermediate results obtained

Table 14.1 zeigt die verschiedenen Eingabedaten und ihre Unsicherheiten sowie Zwischenergebnisse zur Be-

during the calculation of the overall uncertainty of the agricultural greenhouse gas emission inventory.

For Table 14.1 the emissions of the greenhouse gases were transformed in CO₂ equivalents using the following global warming potentials (GWP) defined by IPCC (2007): 25 kg kg⁻¹ for CH₄, and 298 kg kg⁻¹ for N₂O.

The overall uncertainty (as percentage of the total emissions of the last year of the time series) is listed at the very bottom of column H. The other values in column H, however, are auxiliary data required for the uncertainty calculations. These values are proportional to the contributions of the various sub-sources to the total variance of the greenhouse gas inventory, cf. footnote in Table 14.1.

The percentage uncertainties of the trend of the overall emissions from German agriculture are given at the bottom of column M. (For the meaning of the values in column M see the footnote Table 14.1.)

Since the emission factors are the same for all years of the time series (full correlation), the values in column K, as given in IPCC (2006a)-3.31, were calculated as the product of columns I and F of the same row, respectively.

The activity data of all years of the time series, however, are uncorrelated. Therefore, as given in IPCC (2006a)-3.31, the values in column J were calculated as the product of the columns J and E of the same row and the factor $\sqrt{2}$, respectively.

In emissions reporting the application of the various categories of mineral fertilizers is considered to be a single emission source. Therefore, the uncertainties of the activity data and the emission factors of the various mineral fertilizer categories are aggregated using error propagation calculation (see Section 14.2). Only the aggregated uncertainties are included in the calculation of the total uncertainty of the GHG inventory. The reporting category "total manure spreading of all animals" is dealt with by analogy: Before calculating the total uncertainty of the GHG inventory, the uncertainties of the activity data and the emission factors are aggregated from the corresponding uncertainties of the contributions of the individual animal categories.

Obviously the uncertainties of the emission factors are significantly higher than the uncertainties of the activity data. They dominate the combined uncertainties given in column G („Combined uncertainty as % of total national emissions“).

The total uncertainty of GHG emissions from German agriculture is 26.4% (valid for 2018). The uncertainty of the trend 1990 - 2018 is 11.5%. Comparison of the data values in column H reveals that the overall uncertainty of the agricultural greenhouse gas inventory is caused mainly by the uncertainties of the N₂O emissions from agricultural soils.

rechnung der Gesamtunsicherheit des landwirtschaftlichen Treibhausgas-Inventars.

Die Umrechnung der in Table 14.1 eingehenden Treibhausgas-Emissionen in CO₂-Äquivalente wurde mit den durch IPCC (2007) vorgeschriebenen Umrechnungsfaktoren (GWP, Global Warming Potential) durchgeführt: 25 kg kg⁻¹ für CH₄ und 298 kg kg⁻¹ für N₂O.

Die Gesamtunsicherheit (in Prozent der Gesamtemission des letzten Jahres der Zeitreihe) findet sich in Spalte H ganz unten. Die übrigen Daten in Spalte H stellen eine für die Berechnung erforderliche Zwischengröße dar, die proportional zu den Beiträgen der einzelnen Teilquellen zur Gesamtvarianz des THG-Inventars ist (siehe dazu auch Fußnote in Table 14.1).

Die prozentuale Unsicherheit des Trends der Gesamtemissionen aus der deutschen Landwirtschaft ist in Spalte M ganz unten dargestellt. (Zur Bedeutung der Werte in Spalte M siehe Fußnote in Table 14.1.)

Da die Emissionsfaktoren für alle Jahre der Zeitreihe gleich sind (vollständige Korrelation), wurden die Werte in Spalte K wie in IPCC (2006a)-3.31 angegeben als Produkt aus den Spalten I und F der jeweils gleichen Zeile berechnet.

Die Aktivitätsdaten aller Jahre der Zeitreihe sind dagegen nicht untereinander korreliert. Daher wurden die Werte in Spalte J wie in IPCC (2006a)-3.31 angegeben als Produkt aus den Spalten J und E der jeweils gleichen Zeile sowie dem Faktor $\sqrt{2}$ berechnet.

Die Ausbringung der verschiedenen Mineraldüngerkategorien wird in der Berichterstattung als eine einzige Emissionsquelle angesehen. Daher werden die Unsicherheiten jeweils der Aktivitätsdaten und der Emissionsfaktoren der verschiedenen Mineraldüngerkategorien mittels Fehlerfortpflanzungsrechnung (siehe Kapitel 14.2) aggregiert. Nur die aggregierten Unsicherheiten gehen in die Berechnung der Gesamtunsicherheit des THG-Inventars ein. Analog werden für die Berichtskategorie „Gesamt-Wirtschaftsdüngerausbringung aller Tiere“ vor der Berechnung der Gesamtunsicherheit des THG-Inventars die Unsicherheiten jeweils der Aktivitätsdaten und der Emissionsfaktoren aus den entsprechenden Unsicherheiten der Ausbringungsbeiträge der einzelnen Tierkategorien aggregiert.

In Table 14.1 ist deutlich zu erkennen, dass die Unsicherheiten der Emissionsfaktoren i. d. R. erheblich über denen der Aktivitätsdaten liegen, so dass sie die kombinierte Unsicherheit in Spalte „Combined uncertainty as % of total national emissions“ dominieren.

Die Gesamtunsicherheit der THG-Emissionen der deutschen Landwirtschaft beträgt 26,4 % (gültig für das Jahr 2018). Die Unsicherheit des Trends 1990 – 2018 liegt bei 11,5 %. Der Vergleich der Daten in Spalte H zeigt, dass die Gesamtunsicherheit des landwirtschaftlichen Treibhausgas-Inventars überwiegend durch Unsicherheiten von N₂O-Emissionen aus dem Bereich der landwirtschaftlich genutzten Böden verursacht wird.

Table 14.1: Uncertainty calculation for the German agricultural GHG inventory

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Source category	Gas	Base year (1990) emissions, in CO ₂ -eq.	Year 2018 emissions, in CO ₂ -eq.	Activity data uncertainty (half the 95 % confidence interval)	Emission factor uncertainty (half the 95 % confidence interval)	Combined uncertainty (half the 95 % confidence interval)	Auxiliary quantity, proportional to the contribution to the total variance in 2016 (*)	Type A sensitivity	Type B sensitivity	Uncertainty in trend in national emissions introduced by emission factor uncertainty	Uncertainty in trend in national emissions introduced by activity data uncertainty	Square of the uncertainty introduced into the trend (*)
EntFer = Enteric Fermentation MM = Manure Management (housing, storage, spreading) DEC = Digestion of Energy Crops		(GWP _{CH₄} = 25 kg kg ⁻¹ , GWP _{N₂O} = 298 kg kg ⁻¹)										
		Gg a ⁻¹	Gg a ⁻¹	%	%	%	(%) ²	%	%	%	%	(%) ²
EntFer, dairy cows	CH ₄	19,074.7	14,125.3	4	20	20.4	20.5	0.01	0.18	0.29	1.01	1.10
EntFer, calves	CH ₄	496.3	305.5	4	20	20.4	0.0	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00
EntFer, heifers	CH ₄	7,307.4	5,175.2	4	20	20.4	2.8	0.01	0.07	0.17	0.37	0.17
EntFer, male beef cattle	CH ₄	5,808.6	2,905.9	4	20	20.4	0.9	0.02	0.04	0.44	0.21	0.24
EntFer, suckler cows	CH ₄	789.8	1,237.0	4	20	20.4	0.2	0.01	0.02	0.15	0.09	0.03
EntFer, mature males > 2 years	CH ₄	464.4	190.4	4	20	20.4	0.0	0.00	0.00	0.05	0.01	0.00
EntFer, sows	CH ₄	211.0	136.6	4	20	20.4	0.0	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
EntFer, weaners	CH ₄	51.2	51.8	4	20	20.4	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EntFer, fattening pigs	CH ₄	409.9	450.4	4	20	20.4	0.0	0.00	0.01	0.03	0.03	0.00
EntFer, boars	CH ₄	5.7	0.9	20	20	28.3	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EntFer, sheep	CH ₄	518.2	293.7	10	30	31.6	0.0	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00
EntFer, goats	CH ₄	11.3	18.1	20	30	36.1	0.0	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
EntFer, horses	CH ₄	204.6	177.8	10	30	31.6	0.0	0.00	0.00	0.01	0.03	0.00
MM, dairy cows	CH ₄	2,640.6	2,176.3	4	20	20.4	0.5	0.00	0.03	0.02	0.16	0.02
MM, calves	CH ₄	111.0	117.0	4	20	20.4	0.0	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
MM, heifers	CH ₄	1,069.8	591.1	4	20	20.4	0.0	0.00	0.01	0.07	0.04	0.01
MM, male beef cattle	CH ₄	1,250.7	587.8	4	20	20.4	0.0	0.01	0.01	0.10	0.04	0.01
MM, suckler cows	CH ₄	130.3	160.7	4	20	20.4	0.0	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
MM, mature males > 2 years	CH ₄	62.1	22.6	4	20	20.4	0.0	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
MM, sows	CH ₄	512.6	332.4	4	20	20.4	0.0	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00
MM, weaners	CH ₄	194.6	155.8	4	20	20.4	0.0	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
MM, fattening pigs	CH ₄	1,965.5	1,787.8	4	20	20.4	0.3	0.00	0.02	0.05	0.13	0.02
MM, boars	CH ₄	11.9	1.9	20	20	28.3	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MM, sheep	CH ₄	22.5	12.7	10	30	31.6	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MM, goats	CH ₄	0.5	0.8	20	30	36.1	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MM, horses	CH ₄	38.8	33.7	10	30	31.6	0.0	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
MM, laying hens	CH ₄	54.5	58.3	10	20	22.4	0.0	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
MM, broilers	CH ₄	13.2	50.7	10	20	22.4	0.0	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
MM, pullets	CH ₄	6.8	4.1	10	20	22.4	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MM, geese	CH ₄	0.6	0.2	10	20	22.4	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MM, ducks	CH ₄	1.7	1.8	10	20	22.4	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MM, male turkeys	CH ₄	8.3	23.8	10	20	22.4	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MM, female turkeys	CH ₄	4.3	12.3	10	20	22.4	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MM, dairy cows	N ₂ O	1,028.5	741.5	4	100	100.1	1.4	0.00	0.01	0.10	0.05	0.01

MM, calves	N ₂ O	169.1	139.1	4	100	100.1	0.0	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
MM, heifers	N ₂ O	489.9	332.4	4	100	100.1	0.3	0.00	0.00	0.08	0.02	0.01
MM, male beef cattle	N ₂ O	334.2	207.5	4	100	100.1	0.1	0.00	0.00	0.08	0.01	0.01
MM, suckler cows	N ₂ O	104.0	118.0	4	100	100.1	0.0	0.00	0.00	0.04	0.01	0.00
MM, mature males > 2 years	N ₂ O	25.3	10.0	4	100	100.1	0.0	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
MM, sows	N ₂ O	134.2	86.1	4	100	100.1	0.0	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00
MM, weaners	N ₂ O	18.5	29.0	4	100	100.1	0.0	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
MM, fattening pigs	N ₂ O	219.1	360.1	4	100	100.1	0.3	0.00	0.00	0.23	0.03	0.05
MM, boars	N ₂ O	4.7	0.8	20	100	102.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MM, sheep	N ₂ O	28.5	16.0	10	100	100.5	0.0	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
MM, goats	N ₂ O	1.6	2.6	20	100	102.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MM, horses	N ₂ O	60.1	52.3	10	100	100.5	0.0	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
MM, laying hens	N ₂ O	20.6	25.6	10	100	100.5	0.0	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
MM, broilers	N ₂ O	8.0	25.7	10	100	100.5	0.0	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
MM, pullets	N ₂ O	2.7	2.0	10	100	100.5	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MM, geese	N ₂ O	0.2	0.1	10	100	100.5	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MM, ducks	N ₂ O	0.7	0.8	10	100	100.5	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MM, male turkeys	N ₂ O	3.0	9.5	10	100	100.5	0.0	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
MM, female turkeys	N ₂ O	1.8	5.9	10	100	100.5	0.0	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
MM, indirect N ₂ O, all animals	N ₂ O	1,258.3	1,031.9	40	400	402.0	42.6	0.00	0.01	0.12	0.74	0.56
Soils, mineral fertilizers	N ₂ O	10,132.1	7,008.6	0.5	100.6	100.6	123.1	0.01	0.09	1.41	0.06	1.99
Soils, spreading of manure	N ₂ O	5,540.0	4,743.3	9.3	92.9	93.3	48.5	0.00	0.06	0.35	0.79	0.74
Soils, sewage sludge	N ₂ O	128.4	66.2	20	200	201.0	0.0	0.00	0.00	0.09	0.02	0.01
Soils, crop residues	N ₂ O	2,274.7	2,356.4	50	200	206.2	58.4	0.01	0.03	1.34	2.10	6.22
Soils, organic soils	N ₂ O	2,660.6	2,658.6	1	200	200.0	70.0	0.01	0.03	1.33	0.05	1.76
Soils, mineralization	N ₂ O	11.6	8.7	20.1	200	201.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Soils, grazing	N ₂ O	1,965.3	1,285.3	20	200	201.0	16.5	0.00	0.02	0.73	0.46	0.74
Soils, indirect N ₂ O (deposition)	N ₂ O	1,741.4	1,232.6	50	400	403.1	61.1	0.00	0.02	0.82	1.10	1.88
Soils, indirect N ₂ O (leaching, runoff)	N ₂ O	4,300.7	3,342.6	170	230	286.0	226.2	0.00	0.04	0.30	10.13	102.77
DEC, digester and storage	CH ₄	0.3	1,342.6	10	20	22.4	0.2	0.02	0.02	0.34	0.24	0.17
DEC, storage, direct N ₂ O	N ₂ O	0.1	251.7	10	100	100.5	0.2	0.00	0.00	0.32	0.04	0.10
DEC, storage, indirect N ₂ O (deposition)	N ₂ O	0.0	12.9	10	400	400.1	0.0	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00
DEC, soils, direct N ₂ O	N ₂ O	0.2	1,398.1	10	200	200.2	19.4	0.02	0.02	3.53	0.25	12.49
DEC, soils, indirect N ₂ O (deposition)	N ₂ O	0.0	231.4	10	400	400.1	2.1	0.00	0.00	1.17	0.04	1.36
DEC, soils, indirect N ₂ O (leaching, runoff)	N ₂ O	0.1	314.6	10	230	230.2	1.3	0.00	0.00	0.91	0.06	0.84
Liming (agriculture and forest), without Dolomite & CAN ^(#)	CO ₂	1,837.1	2,082.7	3	3	4.2	0.0	0.01	0.03	0.02	0.11	0.01
Liming (agriculture and forest), Dolomite	CO ₂	363.7	57.4	100	3	100.0	0.0	0.00	0.00	0.01	0.10	0.01
Liming (agriculture and forest), CAN ^(#)	CO ₂	503.2	204.2	3	3	4.2	0.0	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
Application of urea	CO ₂	479.6	569.5	1	1	1.4	0.0	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
Total		79,305.2	63,564.9				26.4	← Uncertainty of 2018 emissions (percentage) Uncertainty of the trend (percentage) →				11.5

^(#) CAN: Calcium ammonium nitrate

^(*) Columns H and M: While the calculation procedures given in IPCC (2006a)-3.31, Table 3.2, have been used, the heads of the columns (H: Contribution to Variance by Category, M: Uncertainty introduced into the trend in total national emissions) had to be modified in order to correspond correctly to the calculation procedures used. The units had to be modified into (%)² in order to be consistent with the calculation procedures.

14.7 Uncertainty of the German agricultural ammonia inventory / Unsicherheit des Ammoniak-Inventars für die deutsche Landwirtschaft

For the ammonia inventory of the German agriculture, a calculation of uncertainties has been carried out according to EMEP (2016), Part A, Chapter 5. This approach is in line with the IPCC approach to calculate the overall uncertainty of GHG inventory, see Chapter 14.6.

Note: These calculations do not include the emissions from digestion of energy crops (including spreading of the digestate), as these emissions are reported but not taken into account when compliance of the total German NH₃ emissions with the emission ceiling is checked (Adjustment, see Chapter 1).

Table 14.2 shows input data, calculation details and the resulting overall uncertainty of the German ammonia emission inventory. (For the content of columns H and M see the footnote in Table 14.2.)

Input data for the calculations in Table 14.2 were the emissions of the first and of the last year of the time series as well as the uncertainties of the activity data and the emission factors. For the uncertainties see Chapters 4 to 11. In addition it has to take into account:

- For cattle numbers, the uncertainty decreased over the past years. The uncertainty used is an estimated mean uncertainty. A sensitivity analysis showed that the accuracy of this estimated uncertainty has no visible impact on the overall uncertainty of the greenhouse gas inventory.
- The uncertainties of emission factors for manure management are described in Chapter 14.5.

For the collective categories "mineral fertilizer application" and "commercial fertilizer application", by analogy to the procedure for the overall uncertainty of the GHG inventory (see Chapter 14.6.4), the uncertainties of activity data and emission factors of the respective sub-categories are aggregated using error propagation calculation (see Chapter 14.2). Only the aggregated uncertainties are included in the calculation of the total uncertainty of the ammonia inventory.

The overall uncertainty is expressed as percentage of the total emissions of the last year of the time series and is listed at the very bottom of column H. The other values in column H, however, are auxiliary data required for the uncertainty calculations. These values are proportional to the contributions of the various sub-sources to the total variance of the ammonia inventory, cf. footnote in Table 14.2. The total uncertainty of ammonia emissions from German agriculture is 10.7 % (valid for 2018). The overall uncertainty is largely determined by the uncertainties in the manure management of dairy cows and fattening pigs as well as in the application of mineral fertilizers and, above all, the spreading of animal manures.

The percentage uncertainties of the trends of the overall emissions of ammonia from German agriculture is given at the bottom of column M. (For the meaning of the values in column M see the footnote Table 14.2.). The uncertainty of the trend 1990 - 2018 is 3.9%.

Für das Ammoniak-Inventar der deutschen Landwirtschaft wurde eine Unsicherheitsberechnung nach EMEP (2016), Part A, Kapitel 5, durchgeführt. Die Vorgehensweise entspricht dem IPCC-Ansatz zur Berechnung der Gesamtunsicherheit des THG-Inventars, siehe Kapitel 14.6.

Anmerkung: Die Emissionen aus der Vergärung von Energiepflanzen (incl. Ausbringung der Gärreste) wurden nicht berücksichtigt, da sie zwar berichtet werden, aber vor Überprüfung der deutschen NH₃-Gesamtemissionen auf Einhaltung der Emissionsobergrenze durch Adjustment wieder abgezogen werden, siehe Kapitel 1.

Table 14.2 zeigt Inputdaten, Berechnungsdetails und Ergebnisse der Unsicherheitsberechnung für das deutsche Ammoniak-Inventar. (Zum Inhalt der Spalten H und M siehe die Fußnote in Table 14.2.)

Als Inputdaten dienten die Emissionen des ersten und letzten Zeitreihenjahres sowie die Unsicherheiten der Aktivitätsdaten und Emissionsfaktoren. Für die Unsicherheiten wird auf entsprechende Unterkapitel in Kapitel 4 bis 11 verwiesen. Ergänzend ist zu berücksichtigen:

- Bei den Rinderzahlen hat sich die Unsicherheit der Tierzahl über die Jahre verringert. Es wurde mit einem geschätzten Mittelwert der Unsicherheit gerechnet. Der exakte Wert dieser geschätzten Unsicherheit erwies sich als ohne sichtbaren Einfluss auf die Gesamtunsicherheit des Ammoniak-Inventars.
- Zu den Emissionsfaktor-Unsicherheiten für das Wirtschaftsdünger-Management siehe Kapitel 14.5.

Analog zur Vorgehensweise bei der Gesamtunsicherheit des THG-Inventars (siehe Kapitel 14.6.4) werden bei den Sammelkategorien „Mineraldüngeranwendung“ und „Wirtschaftsdüngerausbringung“ die Unsicherheiten von Aktivitätsdaten und Emissionsfaktoren der jeweiligen Unterkategorien mittels Fehlerfortpflanzungsrechnung (siehe Kapitel 14.2) aggregiert. Nur die aggregierten Unsicherheiten gehen in die Berechnung der Gesamtunsicherheit des Ammoniak-Inventars ein.

Die Gesamtunsicherheit des landwirtschaftlichen Ammoniak-Inventars (in Prozent der Gesamtemission des letzten Jahres der Zeitreihe) findet sich in Spalte H ganz unten. Die übrigen Daten in Spalte H stellen eine für die Berechnung erforderliche Zwischengröße dar, die proportional zu den Beiträgen der einzelnen Teilquellen zur Gesamtvarianz des Ammoniak-Inventars ist (siehe dazu auch Fußnote in Table 14.2). Die Gesamtunsicherheit der Ammoniak-Emissionen der deutschen Landwirtschaft beträgt 10,7 % (gültig für das Jahr 2018). Die Gesamtunsicherheit wird überwiegend bestimmt durch die Unsicherheiten im Wirtschaftsdünger-Management von Milchkühen und Mastschweinen sowie in der Ausbringung von Mineraldünger und, vor allem, Wirtschaftsdünger.

Die prozentuale Unsicherheit des Trends der Gesamtemissionen aus der deutschen Landwirtschaft ist in Spalte M ganz unten dargestellt. (Zur Bedeutung der Werte in Spalte M siehe Fußnote in Table 14.2.) Die Unsicherheit des Trends 1990 – 2018 liegt bei 3,9 %.

Table 14.2: Uncertainty calculation for the German agricultural ammonia inventory (without emissions from storage and spreading of digestate of energy crops)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Source category	Gas	Base year (1990) emissions	Year 2018 emissions	Activity data uncertainty (half the 95 % confidence interval)	Emission factor uncertainty (half the 95 % confidence interval)	Combined uncertainty (half the 95 % confidence interval)	Auxiliary quantity, proportional to the contribution to the total variance in 2016 (*)	Type A sensitivity	Type B sensitivity	Uncertainty in trend in national emissions introduced by emission factor uncertainty	Uncertainty in trend in national emissions introduced by activity data uncertainty	Square of the uncertainty introduced into the trend (*)
		Gg a ⁻¹	Gg a ⁻¹	%	%	%	(%) ²	%	%	%	%	(%) ²
Manure management, dairy cows	NH ₃	75.0	64.2	4	36	36.2	18.0	0.01	0.09	0.37	0.50	0.39
Manure management, calves	NH ₃	14.3	11.2	4	36	36.2	0.5	0.00	0.02	0.02	0.09	0.01
Manure management, heifers	NH ₃	45.5	33.8	4	36	36.2	5.0	0.00	0.05	0.03	0.26	0.07
Manure management, male beef cattle	NH ₃	31.5	18.5	4	36	36.2	1.5	0.01	0.03	0.26	0.14	0.09
Manure management, suckler cows	NH ₃	7.8	9.3	4	36	36.2	0.4	0.00	0.01	0.17	0.07	0.03
Manure management, mature males > 2 years	NH ₃	2.2	0.9	4	36	36.2	0.0	0.00	0.00	0.04	0.01	0.00
Manure management, sows	NH ₃	33.4	18.2	4	36	36.2	1.4	0.01	0.03	0.35	0.14	0.14
Manure management, weaners	NH ₃	7.1	4.8	4	36	36.2	0.1	0.00	0.01	0.03	0.04	0.00
Manure management, fattening pigs	NH ₃	75.3	67.4	4	36	36.2	19.9	0.01	0.09	0.52	0.53	0.55
Manure management, boars	NH ₃	1.3	0.2	20	36	41.2	0.0	0.00	0.00	0.04	0.01	0.00
Manure management, sheep	NH ₃	2.6	1.4	10	36	37.4	0.0	0.00	0.00	0.02	0.03	0.00
Manure management, goats	NH ₃	0.1	0.2	20	36	41.2	0.0	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
Manure management, horses	NH ₃	6.7	5.9	10	36	37.4	0.2	0.00	0.01	0.04	0.11	0.01
Manure management, laying hens	NH ₃	13.1	9.7	10	36	37.4	0.4	0.00	0.01	0.01	0.19	0.04
Manure management, broilers	NH ₃	3.7	9.3	10	36	37.4	0.4	0.01	0.01	0.33	0.18	0.14
Manure management, pullets	NH ₃	1.3	0.8	10	36	37.4	0.0	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
Manure management, geese	NH ₃	0.2	0.1	10	36	37.4	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Manure management, ducks	NH ₃	0.4	0.4	10	36	37.4	0.0	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
Manure management, turkeys	NH ₃	3.9	10.6	10	36	37.4	0.5	0.01	0.01	0.38	0.21	0.19
Manure spreading, all animals	NH ₃	302.6	196.6	9.3	15.2	17.9	41.1	0.04	0.27	0.67	3.56	13.14
Animal grazing	NH ₃	14.5	8.7	20.0	150.0	151.3	5.8	0.00	0.01	0.46	0.34	0.32
Mineral fertilizers	NH ₃	78.4	73.5	0.5	32.4	32.4	19.0	0.02	0.10	0.64	0.07	0.41
Sewage sludge	NH ₃	3.7	1.9	20	50	53.9	0.0	0.00	0.00	0.06	0.07	0.01
Total		724.8	547.8				10.7	← Uncertainty of 2018 emissions (percentage) Uncertainty of the trend (percentage) →				3.9

(*) For columns H and M the calculation procedures and the column heads differ from that described in EMEP (2016), Part A, Chapter 5, as the procedures and column heads given in IPCC (2006a)-3.31, Table 3.2, have been used in order to keep the similarity to Table 14.1. However, the heads of the columns given by IPCC (2006a) (H: Contribution to Variance by Category, M: Uncertainty introduced into the trend in total national emissions) had to be modified in order to correspond correctly to the calculation procedures used. The units had to be modified into (%)² in order to be consistent with the calculation procedures.

15 References / Quellenverzeichnis

- AARHUS PROTOCOL ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (2009) United Nation: Aarhus Protocol on Long-range Transboundary Air Pollution, Persistent Organic Pollutants, 1998 - Amendment - (on Annexes V and VII) Decision 2009. Status In force (since Dec 13, 2010), Annex III.
- ADR – ARBEITSGEMEINSCHAFT DEUTSCHER RINDERZÜCHTER (1993, and subsequent years) Rinderproduktion in Deutschland 1992 (and subsequent years). Arbeitsgemeinschaft Deutscher Rinderzüchter, Bonn
- AMI – AGRARMARKT INFORMATIONEN-GMBH. Markt Bilanz Milch (2011)
- AMI – AGRARMARKT INFORMATIONEN-GMBH. Markt Bilanz Milch (2012)
- AMI – AGRARMARKT INFORMATIONEN-GMBH. Markt Bilanz Milch (2013)
- AMI – AGRARMARKT INFORMATIONEN-GMBH. Markt Bilanz Milch (2014)
- AMI – AGRARMARKT INFORMATIONEN-GMBH. Markt Bilanz Milch (2015)
- AMI – AGRARMARKT INFORMATIONEN-GMBH. Markt Bilanz Milch (2017)
- AMI – AGRARMARKT INFORMATIONEN-GMBH. Markt Bilanz Milch (2018)
- AMI – AGRARMARKT INFORMATIONEN-GMBH. Markt Bilanz Milch (2019)
- AMON B, AMON TH, BOXBERGER J, ALT CH (2001) Emissions of NH₃, N₂O, and CH₄ from dairy cows housed in a farmyard manure tying stall (Housing, Manure Storage, Manure Spreading). Nutrient Cycling in Agroecosystems, 60, 103-113
- ANONYMUS (2001a) Legeleistungsprüfung für Hühner 1998 bis 2000. DGS Magazin 5/2001, Ulmer, Stuttgart, 12-18
- ANONYMUS (2003) Legeleistungsprüfung für Hühner 2001/2002. DGS Magazin 31/2003, Ulmer, Stuttgart, 23-30
- ANONYMUS (2005) Legeleistungsprüfung für Hühner 2002/2004. DGS Magazin 1/2005, Ulmer, Stuttgart, 15-19
- ANONYMUS (2007a) Drei Futter – vergleichbare Wirtschaftlichkeit. DGS Magazin 1/2007, Ulmer, Stuttgart, 27-30
- ANONYMUS (2007b) Legehennen-Alleinfutter im Test. DGS Magazin 22/2007, Ulmer, Stuttgart, 26-32
- ANONYMUS (2007c) Legehennen-Alleinfutter im Test. Geringerer Unterschied bei braunen Hennen. DGS Magazin 48/2007, Ulmer, Stuttgart, 20-25
- ASSE M, ZACHARIAS B (2011) Erste Ergebnisse zur Schweinemast aus dem Schweinereport Baden-Württemberg 2010/2011.– Teil 1: Biologische Auswertung. https://www.landwirtschaft-bw.info/servlet/PB/show/1355163/LSZ_Teil1_Schweinemast_Schweinereport2011%20biol.pdf [13.06.2012]
- ASSE M, ZACHARIAS B (2012a) Ergebnisse aus dem Schweinereport Baden-Württemberg 2010/2011. Ferkelerzeugung mit Verkauf von 8 kg Ferkeln – Teil 1: Biologische Auswertung. http://www.landwirtschaft-mlr.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/show/1359215_1/LSZ_Teil%201_Ferkelerzeugung%208%20kg%20Ferkel_Schweinereport2011%20E2%80%A6.pdf [13.06.2012]
- ASSE M, ZACHARIAS B (2012b) Erste Ergebnisse zur Schweinemast aus dem Schweinereport Baden-Württemberg 2011/2012.– Teil 1: Biologische Auswertung. <https://www.landwirtschaft-bw.info/servlet/PB/show/1382703/index.pdf> [06.05.2013]
- ASSE M, ZACHARIAS B (2012c) Erste Ergebnisse zur Ferkelerzeugung aus dem Schweinereport Baden-Württemberg 2011/2012.– Teil 1: Biologische Auswertung. <https://www.landwirtschaft-bw.info/servlet/PB/show/1382704/index.pdf> [06.05.2013]
- ASSE M, ZACHARIAS B (2013a) Erste Ergebnisse zur Ferkelerzeugung aus dem Schweinereport Baden-Württemberg. – Teil 1: Biologische Auswertung 2012/2013. <http://www.landwirtschaft-mlr.baden-wuerttemberg.de/pb/,Lde/664332?QUERYSTRING=Schweinereport+2012> [31.03.2014]
- ASSE M, ZACHARIAS B (2013b) Erste Ergebnisse zur Schweinemast aus dem Schweinereport Baden-Württemberg 2012/2013. – Teil 1: Biologische Auswertung. <http://www.landwirtschaft-mlr.baden-wuerttemberg.de/pb/,Lde/664332?QUERYSTRING=Schweinereport+2012> [31.03.2014]
- ASSE M, ZACHARIAS B (2015a) Erste Ergebnisse zur Ferkelerzeugung aus dem Schweinereport Baden-Württemberg. – Teil 1: Biologische Auswertung 2013/2014. <http://www.lsz-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Wissen/Schweinereport> [14.07.2015]
- ASSE M, ZACHARIAS B (2015b) Erste Ergebnisse zur Schweinemast aus dem Schweinereport Baden-Württemberg 2013/2014. – Teil 1: Biologische Auswertung. <http://www.lsz-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Wissen/Schweinereport> [14.07.2015]
- ASSE M, ZACHARIAS B (2016a) Erste Ergebnisse zur Ferkelerzeugung aus dem Schweinereport Baden-Württemberg. – Teil 1: Biologische Auswertung 2014/2015. <http://www.lsz-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Wissen/Schweinereport> [05.04.2016]
- ASSE M, ZACHARIAS B (2016b) Erste Ergebnisse zur Schweinemast aus dem Schweinereport Baden-Württemberg 2014/2015. – Teil 1: Biologische Auswertung. <http://www.lsz-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Wissen/Schweinereport> [05.04.2016]
- ASSE M, ZACHARIAS B (2017a) Erste Ergebnisse zur Ferkelerzeugung aus dem Schweinereport Baden-Württemberg 2015/16. – Teil 1: Biologische Auswertung. roesemann:<https://www.landwirtschaft-bw.info/pb/MLR.LSZ,Lde/Startseite/Wissen/Schweinereport> [22.03.2017]
- ASSE M, ZACHARIAS B (2017b) Erste Ergebnisse zur Schweinemast aus dem Schweinereport Baden-Württemberg 2015/2016. – Teil 1: Biologische Auswertung. <https://www.landwirtschaft-bw.info/pb/MLR.LSZ,Lde/Startseite/Wissen/Schweinereport> [22.03.2017]
- BACHMAIER H, GRONAUER A (2007) Klimabilanz von Biogasstrom. Klimabilanz der energetischen Nutzung von Biogas aus Wirtschaftsdüngern und nachwachsenden Rohstoffen. LfL-Information, Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Freising-Weihenstephan, 12 p
- BAILEY RE (2001) Global hexachlorobenzene emissions. Chemosphere, 43(2), 167-182.
- BAYERISCHES LANDESAMT FÜR STATISTIK UND DATENVERARBEITUNG, München
see Statistische Landesämter
- BELITZ HD, GROSCH W, SCHIEBERLE P (2008) Lehrbuch der der Lebensmittelchemie. 6. Auflage. Springer, 1118 p
- BERK J (2010) Faustzahlen zur Haltung von Mastgeflügel. Geflügeljahrbuch 2011. Ulmer, Stuttgart, 145

- BEYER M, CHUDY A, HOFFMANN L, JENTSCH W, LAUBE W, NEHRING K, SCHIEMANN R (2004) Rostocker Futterbewertungssystem. Kennzahlen des Futterwertes und Futterbedarfs auf der Basis von Nettoenergie. Dummerstorf: Forschungsinstitut für die Biologie landwirtschaftlicher Nutztiere. 392 p
- BD - BERATUNGSDIENST SCHWEINEHALTUNG UND SCHWEINEZUCHT E.V. (2011): Schweinereport Baden-Württemberg. Wirtschaftsjahr 2009/2010. Heft 5, Bad Mergentheim.
- BGBL - Bundesgesetzblatt (2004) DirektZahlVerpflV; Direktzahlungen-Verpflichtungenverordnung vom 4. November 2004 (BGBl. I S. 2778), zuletzt geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 15. Dezember 2011 (eBAZ 2011 AT144 V1); Verordnung über die Grundsätze der Erhaltung landwirtschaftlicher Flächen in einem guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand.
- BLE – BUNDESANSTALT FÜR LANDWIRTSCHAFT UND ERNÄHRUNG (2018) Milcherzeugung und –verwendung. http://www.ble.de/DE/BZL/Daten-Berichte/Milch-Milcherzeugnisse/milch-milcherzeugnisse_node.html#doc8985378bodyText5 [08.10.2018]
- BLE – BUNDESANSTALT FÜR LANDWIRTSCHAFT UND ERNÄHRUNG (2019) Milcherzeugung und –verwendung. http://www.ble.de/DE/BZL/Daten-Berichte/Milch-Milcherzeugnisse/milch-milcherzeugnisse_node.html#doc8985378bodyText5 [07.08.2019]
- BLUM JW (2002) Fütterung von Equiden. http://www.vetmed.unibe.ch/studvet/download/year23/NOZ/NOZ%20ss%202003/Pferdef%FCttering_Total.pdf
- BMEL – BUNDESMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG UND LANDWIRTSCHAFT (2016): Konzept zur Erstellung von THG-Emissions- und Kohlenstoffinventaren der Quell- und Senkengruppen Landwirtschaft und LULUCF durch das Johann Heinrich von Thünen Institut (TI) im Zuständigkeitsbereich des BMEL. Stand 16.09.2016.
- BMELF - BUNDESMINISTER FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN (1981) Verordnung über die Güteprüfung und Bezahlung der Anlieferungsmilch (Milch-Güteverordnung). BGBl. I, 878; zuletzt geändert am 17. Dezember 2010, BGBl. I, 2132
- BMELV - BUNDESMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND VERBRAUCHERSCHUTZ (2011) Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch - LFGB). BGBl. I, 1770, zuletzt geändert am 15. März 2012, BGBl. I, 476
- BMELV – BUNDESMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND VERBRAUCHERSCHUTZ (2012): Konzept zur Erstellung von THG-Emissions- und Kohlenstoffinventaren der Quell- und Senkengruppen 4 und 5 durch das Johann Heinrich von Thünen Institut (vTI) im Zuständigkeitsbereich des BMELV. Stand 20.03.2012. AZ: 521 – 65408/0002
- BMPII (2009) „Biogas-Messprogramm II - 61 Biogasanlagen im Vergleich“; Johann Heinrich von Thünen-Institut (vTI), Hrsg. Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR), 2009, 1. Auflage, 111
- BÖRJESSON P, BERGLUND M (2007) Environmental systems analysis of biogas systems—Part II: The environmental impact of replacing various reference systems. Biomass and Bioenergy 31 (2007) 326–344
- BREHME G (2007) Emissionspapier Pekingentenhaltung. Unpublished, 23 p
- BRS – BUNDESVERBAND RIND UND SCHWEIN (2018, and subsequent years) Rinder- und Schweineproduktion in Deutschland 2018 (and subsequent years). Bundesverband Rind und Schwein, Bonn
- BUNDESGESETZBLATT Jahrgang 2008 Teil I Nr. 52: Verordnung zur Durchführung des Fleischgesetzes und zur Änderung handelsklassenrechtlicher Vorschriften für Schlachtkörper von Rindern, Schweinen und Schafen. Ausgegeben zu Bonn am 18. November 2008
- BlmSchG - BUNDESIMMISSIONSSCHUTZGESETZ (1974). Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG). Bundesgesetzblatt I (1974), pp. 721-1193; latest updated published version dd 26 September 2002 (Bundesgesetzblatt I 2002, pg. 3830); latest changes dd 26 November 2010 (Bundesgesetzblatt I 2010, pg. 1728).
- BUNDESMINISTER FÜR WIRTSCHAFT (1969) Gesetz über Einheiten im Meßwesen. BGBl. 1969, Teil I, 709-712
- BUNDESMINISTER FÜR WIRTSCHAFT (1970) Ausführungsverordnung zum Gesetz über Einheiten im Meßwesen. BGBl. 1970, Teil I, 981-991
- BVL - BUNDESAMT FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND LEBENSMITTELSICHERHEIT (2012) Amtliche Sammlung von Untersuchungsverfahren nach § 64 LFGB, § 35 Vorläufiges Tabakgesetz, § 28 b GenTG. L 01.00-10-1. Kjeldahl-Verfahren (nach DIN EN ISO 8968 Teil 1).
- BVL - BUNDESAMT FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND LEBENSMITTELSICHERHEIT (2015) Persönliche Mitteilung der Wirkstoffdaten, 2015.
- BVL - BUNDESAMT FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND LEBENSMITTELSICHERHEIT (2019) Persönliche Mitteilung der Wirkstoffdaten, 2019.
- CAI Z, LAUGHLIN RJ, STEVENS RJ (2001) Nitrous oxide and dinitrogen emissions from soil under different water regimes and straw amendment. Chemosphere 42, 113-121
- CEIP – CENTRE ON EMISSIONS INVENTORIES AND PROJECTIONS (2019) CLRTAP Inventory Submissions 2019. http://www.ceip.at/ms/ceip_home1/ceip_home/status_reporting/2019_submissions/
- COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 540/2011 OF 25 MAY 2011 implementing Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the list of approved active substances. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011R0541> [20.12.2017]
- COUNCIL DIRECTIVE 91/414/EEC OF 15 JULY 1991 concerning the placing of plant protection products on the market. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31991L0414> [20.12.2017]
- DAENISCHESSEN (2006) Die dänische Eier- und Geflügelproduktion. http://www.daenischessen.de/produktion_markt/produktionszweige/gefluegel.htm.
- DAMME K (2000) Faustzahlen zur Betriebswirtschaft. Jahrbuch für die Geflügelwirtschaft 2001. Ulmer, Stuttgart, pp. 197-207
- DAMME K (2001) Faustzahlen zur Betriebswirtschaft. Jahrbuch für die Geflügelwirtschaft 2002. Ulmer, Stuttgart, pp. 181-192
- DAMME K (2002) Faustzahlen zur Betriebswirtschaft. Jahrbuch für die Geflügelwirtschaft 2003. Ulmer, Stuttgart, pp. 193-204
- DAMME K (2003) Faustzahlen zur Betriebswirtschaft. Jahrbuch für die Geflügelwirtschaft 2004. Ulmer, Stuttgart, pp. 68-79
- DAMME K (2004) Faustzahlen zur Betriebswirtschaft. Geflügeljahrbuch 2005. Ulmer, Stuttgart, 74-89
- DAMME K (2005) Faustzahlen zur Betriebswirtschaft. Geflügeljahrbuch 2006. Ulmer, Stuttgart, 60-76
- DAMME K (2006) Faustzahlen zur Betriebswirtschaft. Geflügeljahrbuch 2007. Ulmer, Stuttgart, 67-85

- DAMME K (2009) Faustzahlen zur Betriebswirtschaft. Geflügeljahrbuch 2010. Ulmer, Stuttgart, 87
- DAMME K (2009) Deutliche Unterschiede zwischen den Genotypen. DGS Magazin 45/2009. Ulmer, Stuttgart, 17-21
- DAMME K (2010) Faustzahlen zur Betriebswirtschaft. Geflügeljahrbuch 2011. Ulmer, Stuttgart, 70
- DAMME K (2013) Faustzahlen zur Betriebswirtschaft. Geflügeljahrbuch 2014. Ulmer, Stuttgart, 79
- DAMME K (2014) Faustzahlen zur Betriebswirtschaft. Geflügeljahrbuch 2015. Ulmer, Stuttgart, 89
- DAMME K (2015) Faustzahlen zur Betriebswirtschaft. Geflügeljahrbuch 2016. Ulmer, Stuttgart, 93
- DAMME K (2016) Faustzahlen zur Betriebswirtschaft. Geflügeljahrbuch 2017. Ulmer, Stuttgart, 71
- DAMME K (2017) Faustzahlen zur Betriebswirtschaft. Geflügeljahrbuch 2018. Ulmer, Stuttgart, 91
- DAMME K, LEMME A (2010) Bessere Mast mit CreAmino®. DGS Magazin 26/2010, Ulmer Stuttgart, 10-14
- DÄMMGEN U (ed.) (2003): Calculations of Emissions from German Agriculture – National Emission Inventory Report (NIR) 2004 for 2002. Landbauforsch Völknerode, Special Issue 260
- DÄMMGEN U (2005) Statistical Data for Animal Numbers in German Emission Inventories. Landbauforsch Völknerode Special Issue 291, 223-230
- DÄMMGEN U, AMON B, GYLDENKÆRNE S, HUTCHINGS NJ, KLEINE KLAUSING H, HAENEL H-D, RÖSEMANN C (2011a) Reassessment of the calculation procedure for the volatile solids excretion rates of cattle and pigs in the Austrian, Danish and German agricultural emission inventories. Landbauforsch 61, 115 – 126
- DÄMMGEN U, AMON B, HUTCHINGS NJ, HAENEL H-D, RÖSEMANN C (2012a) Data sets to assess methane emissions from untreated cattle and pig slurry and manure storage systems in the German and Austrian emission inventories. Landbauforsch 62, 1 – 20
- DÄMMGEN U, BRADE W, SCHULZ J, KLEINE KLAUSING H, HUTCHINGS NJ, HAENEL H-D, RÖSEMANN C (2011b) The effect of feed composition and feeding strategies on excretion rates in German pig production. Landbauforsch 61, 327-342
- DÄMMGEN U, DÖHLER H, LÜTTICH M, EURICH-MENDEN B, OSTERBURG B, HAENEL H-D, DÖRING U, STROGIES M (2006) Die Analyse von Stickstoff-Flüssen in der Landwirtschaft zum Zweck der Politikberatung und der Berichterstattung – eine Übersicht über Datenflüsse und Datenmanagement. Teil 1. Emissionen. Landbauforsch Völknerode Special Issue 291, 5-9
- DÄMMGEN U, ERISMAN JW (2005) Emission, transmission, deposition and environmental effects of ammonia from agricultural sources. In: Kuczyński T, Dämmgen U, Webb J, Myczko (eds) Emissions from European Agriculture. Wageningen Academic Publishers, Wageningen, 97-112
- DÄMMGEN U, GRÜNHAGE L (2001) Trace gas emissions from German agriculture as obtained from the application of simple or default methodologies. Environ Pollut 117, 23-34
- DÄMMGEN U, HAENEL H-D, RÖSEMANN C, CONRAD J, LÜTTICH M, DÖHLER H, EURICH-MENDEN B, LAUBACH P, MÜLLER-LINDENLAUF M, OSTERBURG B (2009a) Calculations of emissions from German Agriculture – National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007. Methods and Data (GAS-EM). vTI Agricultural and Forestry Research, Special Issue 324, 9-385
- DÄMMGEN U, HAENEL H-D, RÖSEMANN C, HUTCHINGS NJ, BRADE W, LEBZIE P (2009b) Improved national calculation procedures to assess energy requirements, nitrogen and VS excretions of dairy cows in the German emission model GAS-EM. Landbauforsch 59, 233-252
- DÄMMGEN U, HAENEL H-D, RÖSEMANN C, BRADE W, MÜLLER-LINDENLAUF M, EURICH-MENDEN B, DÖHLER H, HUTCHINGS NJ (2010a) An improved data base for the description of dairy cows in the German emission model GAS-EM. vTI Agricultural and Forestry Research 60, 87 - 100
- DÄMMGEN U, HAENEL H-D, RÖSEMANN C, EURICH-MENDEN B, DÖHLER H (2010b) Derivation of TAN related ammonia emission factors in pig production. Landbauforsch 60, 241-248
- DÄMMGEN U, HUTCHINGS NJ (2005) The assessment of emissions of nitrogen species from agriculture using the methodology of the atmospheric emission inventory guidebook. In: Kuczyński T, Dämmgen U, Webb J, Myczko A (eds) Emissions from European agriculture. Wageningen Academic Publishers, Wageningen, 51-62
- DÄMMGEN U, HUTCHINGS NJ (2008) Emissions of gaseous nitrogen species from manure management - a new approach. Environmental Pollution 154, 488-497
- DÄMMGEN U, LÜTTICH M, DÖHLER H, EURICH-MENDEN B, OSTERBURG B (2002) GAS-EM – ein Kalkulationsprogramm für Emissionen aus der Landwirtschaft. Landbauforsch Völknerode 52, 19-42
- DÄMMGEN U, LÜTTICH M, DÖHLER H, EURICH-MENDEN B, OSTERBURG B (2005) Calculations of Emissions from German Agriculture – National Emission Inventory Report (NIR) 2006 for 2004. Landbauforsch Völknerode Special Issue 291, 47-222
- DÄMMGEN U, MEYER U, RÖSEMANN C, HAENEL H-D, HUTCHINGS NJ (2013) Methane emissions from enteric fermentation as well as nitrogen and volatile solids excretions of German calves – A national approach. Landbauforsch 63, 37-46
- DÄMMGEN U, RÖSEMANN C, HAENEL H-D, HUTCHINGS NJ (2012b) Enteric methane emissions from German dairy cows. Agriculture and Forest Research 1/2, 21 – 32
- DÄMMGEN U, SCHULZ J, KLEINE KLAUSING H, HUTCHINGS NJ, HAENEL H-D, RÖSEMANN C (2012c) Enteric Methane emissions from German pigs. Agriculture and Forest Research 3, 83-96
- DBFZ (2014): DBFZ – Biogasanlagendatenbank. Unveröffentlichtes Manuskript.
- DENIER VAN DER GOON HAC, BLEEKER A, LIGTHART T, DUIJZER JH, KUIKMAN PJ, VAN GROENINGEN JW, HAMMINGA W, KROEZE C, DE WILDE HPJ, HENSEN A (2004) Indirect nitrous oxide emissions from the Netherlands; source strength, methodologies, uncertainties and potential for mitigation. TNO report R 2004/275. TNO Apeldoorn, 131 p
- DEUTSCHER BÜFFELVERBAND (2008) Büffelhaltung in Deutschland. <http://www.bueffelverband-deutschland.de/haltung.html> [24.7.2008]
- DIETERLE M (2012) Schätzung regionaler Daten mithilfe von Small Area-Schätzmethoden. Wirtschaft und Statistik, Statistisches Bundesamt, Dezember 2011, 2012 – 2018.
- DIRECTIVE 2005/53/EC: COMMISSION DIRECTIVE 2005/53/EC OF 16 SEPTEMBER 2005 amending Council Directive 91/414/EEC to include chlorothalonil, chlorotoluron, cypermethrin, daminozide and thiophanate-methyl as active substances 2005/53/EC C.F.R. (2005).

- DIRECTIVE 2006/76/EC: COMMISSION DIRECTIVE 2006/76/EC OF 22 SEPTEMBER 2006 amending Council Directive 91/414/EEC as regards the specification of the active substance chlorothalonil (Text with EEA relevance) 2006/76/EC C.F.R. (2006).
- DIRECTIVE 2008/69/EC: COMMISSION DIRECTIVE 2008/69/EC OF 1 JULY 2008 amending Council Directive 91/414/EEC to include clofentazine, dicamba, difenoconazole, diflubenzuron, imazaquin, lenacil, oxadiazon, picloram and pyriproxyfen as active substances 2008/69/EC C.F.R. (2008).
- DIRECTIVE 2016/2284/EU: DIRECTIVE (EU) 2016/2284 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 14 DECEMBER 2016 on the reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants, amending Directive 2003/35/EC and repealing Directive 2001/81/EC
- DLG - DEUTSCHE LANDWIRTSCHAFTSGESELLSCHAFT (1986) Grundfutteraufnahme und Grundfutterverdrängung bei Milchkühen. DLG-Information 2/1986. Frankfurt/M., Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft, 8 p
- DLG - DEUTSCHE LANDWIRTSCHAFTSGESELLSCHAFT (2001): Empfehlungen zum Einsatz von Mischrationen bei Milchkühen. DLG-Information 1/2001, DLG-Verlag, Frankfurt am Main
- DLG - DEUTSCHE LANDWIRTSCHAFTSGESELLSCHAFT (ed.) (2005) Bilanzierung der Nährstoffausscheidungen landwirtschaftlicher Nutztiere. Arbeiten der DLG/Band 199. DLG-Verlag, Frankfurt/Main., 69 p
- DLG - DEUTSCHE LANDWIRTSCHAFTSGESELLSCHAFT (2008) Empfehlungen zur Sauen- und Ferkelfütterung. DLG-Information 1/2008. DLG-Verlag, Frankfurt/M., 55 p
- DÖHLER H, EURICH-MENDEN B, DÄMMGEN U, OSTERBURG B, LÜTTICH M, BERGSCHMIDT A, BERG W, BRUNSCH R (2002) BMVEL/UBA-Ammoniak-Emissionsinventar der deutschen Landwirtschaft und Minderungsszenarien bis zum Jahr 2010. Forschungsbericht 299 42 256/02. Texte 05/02. Umweltbundesamt, Berlin
- DÜNGEMITTELVERORDNUNG (2012) Verordnung über das Inverkehrbringen von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln (Düngemittelverordnung - DüMV). In der Fassung vom 5. Dezember 2012 (BGBl. I pg. 2482)
- DÜNGEVERORDNUNG (2007) Verordnung über die Anwendung von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln nach den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis beim Düngen (Düngerverordnung – DüV). In der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Februar 2007 (BGBl. I pg.221).
- DÜNGEVERORDNUNG (2017) Verordnung über die Anwendung von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln nach den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis beim Düngen (Düngerverordnung – DüV). In der Fassung vom 26. Mai 2017 (BGBl. I pg.1305).
- DWA - DEUTSCHE VEREINIGUNG FÜR WASSERWIRTSCHAFT, ABWASSER UND ABFALL E.V. (ed.) (2004) Klärschlämme - Inhaltsstoffe und Bewertung. DWA, Hennef, 138 p
- EEA (2014) Non-methane volatile organic compounds (NMVOC) emissions (APE 004) - Assessment published Jan 2014.
<http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/eea-32-non-methane-volatile-1/assessment-4#toc-1>
- EEC – EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY (1986) Council Directive 86/278/EEC of 12 June 1986 on the protection of the environment, and in particular of the soil, when sewage sludge is used in agriculture. Official Journal L 181 , 04/07/1986 P. 0006 – 0012 40
- ELLIS JL, KEBREAB E, ODONGO NE, MCBRIDE BW, OKINE EK, FRANCE J (2007) Prediction of Methane Production from Dairy and Beef Cattle. J Dairy Sci 90, 3456-3466
- EMEP (2007) Joint EMEP/CORINAIR Atmospheric Emission Inventory Guidebook. 5rd ed., Technical Report No 16/2007.
<http://www.eea.europa.eu/publications/EMEP-CORINAIR5>
- EMEP (2009) -EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2009, Technical Report No 6/2009.
<http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-emission-inventory-guidebook-2009>
- EMEP (2013) -EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2013, Technical Report No 12/2013.
<http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2013>
- EMEP (2016) -EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook - 2016 – EEA Report No 21/2016.
<http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016>
- ERZEUGERRING WESTFALEN (2016) Jahresbericht 2015.
<http://www.erzeugerring.com/jahresberichte/jahresberichte.html> [06.04.2016]
- ERZEUGERRING WESTFALEN (2017) Jahresbericht 2016.
<http://www.erzeugerring.com/jahresberichte/jahresberichte.html> [16.06.2017]
- ERZEUGERRING WESTFALEN (2018) Jahresbericht 2017.
<http://www.erzeugerring.com/jahresberichte/jahresberichte.html> [04.06.2018]
- ERZEUGERRING WESTFALEN (2019) Jahresbericht 2018.
<http://www.erzeugerring.com/jahresberichte/jahresberichte.html> [08.08.2019]
- EU (1991): Directive 91/676/EEC concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources. Official Journal of the European Communities, L 375/1, December 31, 1991.
- EURICH-MENDEN B, DÖHLER H, VAN DEN WEGHE H (2011) Ammoniakemissionsfaktoren im landwirtschaftlichen Emissionsinventar – Teil : Geflügel und Mastschweine. Landtechnik 66, 60-63
- FAO - FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (2012) FAO Specifications and Evaluations for Picloram, Table 2, pg. 23. <http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/jmps/ps-new/en/>. [20.12.2017]
- FAO - FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (2015) FAO Specifications and Evaluations for Chlorothalonil, pg. 51 <http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/jmps/ps-new/en/>. [20.12.2017]
- FAUSTZAHLEN FÜR LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU. 12th ed., Landwirtschaftsverlag, Münster, 1993
- FELDHAUS L, SIEVERDING E (2007) Putenmast. 3rd edition, Ulmer, Stuttgart
- FERRARI F, KLEIN M, CAPRI E, TREVISAN M (2005) Prediction of pesticide volatilization with PELMO 3.31. Chemosphere, 60 (5), 705-713.
- FREIBAUER A (2003) Regionalised inventory of biogenic greenhouse gas emissions from European agriculture. European Journal of Agronomy 19(2), 135-160

- GÄRTNER S, MÜNCH J, REINHARDT G, VOGT R (2008) Materialband: E. Ökobilanzen. In: BMU-Bericht „Optimierungen für einen nachhaltigen Ausbau der Biogaserzeugung und -nutzung in Deutschland“, FKZ: 0327544.
- GAUGER T, DÄMMGEN U, VERMEULEN A, BLEEKER A, ERISMAN J-W, SCHAAP M, RÖSEMANN C; NAGEL H-D, SPRANGER T, KLIMONT Z (2006) Die Analyse von Stickstoff-Flüssen in der Landwirtschaft zum Zweck der Politikberatung und der Berichterstattung – eine Übersicht über Datenflüsse und Datenmanagement. Teil 2. Transmission und Deposition. *Landbauforsch Völknerode Spezial Issue* 291, 11-19
- GEFLÜGELJAHRBUCH (2005) Jahrbuch des Zentralverbandes der Deutschen Geflügelwirtschaft e.V. und seiner Mitgliedsverbände. Ulmer, Stuttgart, 328 p
- GEHMAN AM, KONONOFF PJ, MULLINS CR, JANICEK BN (2008) Evaluation of nitrogen utilization and the effects of monensin in dairy cows fed Brown Midrib Corn silage. *J Dairy Sci* 91, 288-300
- GERMAN STANDARD VDI 2450 PART 1 (1977) Messen von Emission, Transmission und Immission luftverunreinigender Stoffe. Begriffe, Definitionen, Erläuterungen. Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf, 4 p
- GFE – GESELLSCHAFT FÜR ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGIE, AUSSCHUSS FÜR BEDARFSNORMEN (1987) Energie- und Nährstoffbedarf landwirtschaftlicher Nutztiere. Nr. 4. Schweine. Frankfurt/M., DLG
- GFE – GESELLSCHAFT FÜR ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGIE, AUSSCHUSS FÜR BEDARFSNORMEN (2000) Energie- und Nährstoffbedarf landwirtschaftlicher Nutztiere, Nr. 7. Empfehlungen zur Energie- und Nährstoffversorgung der Legehennen und Masthühner 2000. Frankfurt/Main., DLG, 185 p
- GFE – GESELLSCHAFT FÜR ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGIE, AUSSCHUSS FÜR BEDARFSNORMEN (2001) Energie- und Nährstoffbedarf landwirtschaftlicher Nutztiere. Nr. 6. Empfehlungen zur Energie- und Nährstoffversorgung der Milchkühe und Aufzuchttrinder. Frankfurt/M., DLG, 135 p
- GFE – GESELLSCHAFT FÜR ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGIE, AUSSCHUSS FÜR BEDARFSNORMEN (2006) Energie- und Nährstoffbedarf landwirtschaftlicher Nutztiere. Nr. 10. Empfehlungen zur Energie- und Nährstoffversorgung von Schweinen. Frankfurt/M., DLG, 247 p
- HAENEL H-D, DÄMMGEN U (2007a) Consistent time series of data to model volatile solids and nitrogen excretions of poultry. 1. General considerations and pullets. *Landbauforsch Völknerode* 57(4), 349-362
- HAENEL H-D, DÄMMGEN U (2007b) Consistent time series of data to model volatile solids and nitrogen excretions of poultry. 2. Laying hens. *Landbauforsch Völknerode* 57(4), 363-390
- HAENEL H-D, DÄMMGEN U (2009a) Consistent time series of data to model volatile solids and nitrogen excretions of poultry. 3a. Broilers. Fattening procedures and animal properties. *Landbauforsch*, 59(1), 61-86
- HAENEL H-D, DÄMMGEN U (2009b) Consistent time series of data to model volatile solids and nitrogen excretions of poultry. 3b. Broilers. Modelling using official statistical data. *Landbauforsch* 59(2), 87-104
- HAENEL H-D, DÄMMGEN U, LAUBACH P, RÖSEMANN C (2011a) Update of the calculation of metabolizable energy requirements for pigs in the German agricultural emission inventory. *Landbauforsch* 61(3), 217-228
- HAENEL H-D, DÄMMGEN U, RÖSEMANN C (2011b) Estimating numbers of piglets, weaners and fattening pigs for the German agricultural emission inventory. *Landbauforsch* 61(3), 229-236
- HAENEL H-D, RÖSEMANN C (2018) Review and update of the excretion rates of sheep and horses in the German emission inventory. Thünen Institute of Climate-Smart Agriculture, Working Group on Emission Inventories, Braunschweig/Germany (unpublished)
- HAENEL H-D, RÖSEMANN C, DÄMMGEN U, DÖHLER H, EURICH-MENDEN B, LAUBACH P, MÜLLER-LINDENLAUF M, OSTERBURG B (2010) Calculations of Emissions from German Agriculture – National Emission Inventory Report (NIR) 2010 for 2008. Methods and Data (GAS-EM). *Landbauforsch, Special Issue* 334, 13 – 428
- HAENEL H-D, RÖSEMANN C, DÄMMGEN U, PODDEY E, FREIBAUER A, DÖHLER H, EURICH-MENDEN B, WULF S, DIETERLE M, OSTERBURG B (2012) Calculations of gaseous and particulate emissions from German agriculture 1990–2010. Report on methods and data (RMD). Submission 2012. *Landbauforsch, Special Issue* 356, 394 p
- HAENEL H-D, RÖSEMANN C, DÄMMGEN U, DÖRING U, WULF S, EURICH-MENDEN B, FREIBAUER A, DÖHLER H, SCHREINER C, OSTERBURG B (2018) Calculations of gaseous and particulate emissions from German agriculture 1990–2016. Report on methods and data (RMD). Submission 2018. Thünen Institute Braunschweig, Germany. Thünen Report 57, 424 p
- HAENEL H-D, WULF S (2016): Berechnung von CH₄-, N₂O-, NO-, N₂- und NH₃-Emissionen durch Vergärung von Gülle, Mist und Energiepflanzen ab Emissionsberichterstattung 2015. Thünen-Institut, Braunschweig, und KTBL, Darmstadt. Unveröffentlichtes Manuskript.
- HALLE I (2002) Einfluss einer gestaffelten Supplementierung von Lysin und Methionin während der Aufzucht auf das Wachstum und auf Leistungsmerkmale der Hennen in der folgenden Legeperiode bei einer gestaffelten Protein- und Energieversorgung. *Arch. Geflügelk.* 66, 66-74
- HALLE I, TZSCHENTKE B (2009) Ein Grad mehr kann viel bewirken. *DGS Magazin* 31/2009, Ulmer, Stuttgart, 28-32
- Häusler H (2012) Wie viel Milch geben Mutterkühe. http://www.raumberg-gumpenstein.at/filearchive/fodok_1_11728_12_2012_haeusler_milchleistung_mutterkuh.pdf [01.07.2019]
- HARTMANN W, HEIL G (1992) Amtliche Legeleistungsprüfung 1990/91: Zusammenfassende Auswertung. *DGS Deutsche Geflügelwirtschaft und Schweineproduktion* 8/1992, Ulmer, Stuttgart, 219-229
- HAUS DÜSSE (2008) Bringen 7-Phasen-Futterkonzepte in der Putenmast Vorteile? Versuchsberichte 2008. http://www.duesse.de/tierhaltung/gefluegel/versuche/puten/2008_7_phasen_putenmast.pdf [2011-05-05]
- HEIDECHE C, KREINS P, STONNER R, GÖMANN H (2011) Global change impacts on agricultural land use in the Baltic Coastal Zones of Germany. In: Schernewski G, Hofstede J, Neumann T (eds): *Global Change and Baltic Coastal Zones*. Coastal Research Library. Springer, Dordrecht, The Netherlands, 71-89.
- HEIL G, HARTMANN W (1993) Amtliche Legeleistungsprüfung 1991/92: Zusammenfassende Auswertung. *DGS Deutsche Geflügelwirtschaft und Schweineproduktion* 8/1993, Ulmer, Stuttgart, 7-15
- HEIL G, HARTMANN W (1994) Amtliche Legeleistungsprüfung 1992/93: Zusammenfassende Auswertung. *DGS Deutsche Geflügelwirtschaft und Schweineproduktion* 8/1994, Ulmer, Stuttgart, 6-14

- HEIL G, HARTMANN W (1995) Amtliche Legeleistungsprüfung 1993/94: Zusammenfassende Auswertung. DGS Magazin 13/1995, Ulmer, Stuttgart, 18-29
- HEIL G, HARTMANN W (1996) Amtliche Legeleistungsprüfung 1994/95: Zusammenfassende Auswertung. DGS Magazin 18/1996, Ulmer, Stuttgart, 10-21
- HEIL G, HARTMANN W (1997) Amtliche Legeleistungsprüfung 1995/96: Zusammenfassende Auswertung. DGS Magazin 36/1997, Ulmer, Stuttgart, 12-22
- HEIL G, HARTMANN W (1998) Amtliche Legeleistungsprüfung 1996/97: Zusammenfassende Auswertung. DGS Magazin 40/1998, Ulmer, Stuttgart, 20-31
- HEIL G, HARTMANN W (2000) Amtliche Legeleistungsprüfung 1997/99: Zusammenfassende Auswertung. DGS Magazin 9/2000, Ulmer, Stuttgart, 10-17
- HENRICHSMEYER W, CYPRIIS CH, LÖHE W, MEUTH M, ISERMAYER F, HEINRICH I, SCHEFSKI A, NEANDER E, FASTERDING F, NEUMANN M, NIEBERG H (1996) Entwicklung des gesamtdeutschen Agrarsektormodells RAUMIS96. Endbericht zum Kooperationsprojekt. Forschungsbericht für das BMELF (94 HS 021), Bonn, Braunschweig
- HESSISCHES STATISTISCHES LANDESAMT, WIESBADEN
see Statistische Landesämter
- HILLER P, MEYER A, SIMON I, STEGEMANN J (2011) "Gesundes" Futterkonzept im Test. DGS Magazin 26/2011, Ulmer Stuttgart, 14-18
- HILLER P, NANNEN A (2015) Runter vom Gas. Slow Growth in der Hähnchenmast. DGS Magazin 49/2015, Ulmer Stuttgart, 20-23.
- HMULV – HESSISCHES MINISTERIUM FÜR UMWELT, LÄNDLICHEN RAUM UND VERBRAUCHERSCHUTZ (2005) Jahresagrarbericht 2005.
- HMULV – HESSISCHES MINISTERIUM FÜR UMWELT, LÄNDLICHEN RAUM UND VERBRAUCHERSCHUTZ (2006) Jahresagrarbericht 2006.
- HMULV – HESSISCHES MINISTERIUM FÜR UMWELT, LÄNDLICHEN RAUM UND VERBRAUCHERSCHUTZ (2007) Jahresagrarbericht 2007.
- HMULV – HESSISCHES MINISTERIUM FÜR UMWELT, LÄNDLICHEN RAUM UND VERBRAUCHERSCHUTZ (2008) Jahresagrarbericht 2008.
http://www.hmuv.hessen.de/irj/HMULV_Internet?uid=24607118-ff12-701b-e592-63b5005ae75d
- HMULV – HESSISCHES MINISTERIUM FÜR UMWELT, LÄNDLICHEN RAUM UND VERBRAUCHERSCHUTZ (2009) Jahresagrarbericht 2009.
- HMULV – HESSISCHES MINISTERIUM FÜR UMWELT, LÄNDLICHEN RAUM UND VERBRAUCHERSCHUTZ (2010) Jahresagrarbericht 2010.
- HMULV – HESSISCHES MINISTERIUM FÜR UMWELT, LÄNDLICHEN RAUM UND VERBRAUCHERSCHUTZ (2011) Jahresagrarbericht 2011.
http://www.hessen.de/irj/HMULV_Internet?cid=8527e1d18ef246c2c1d4d79017bb47ec [20.7.2011]
- HUBER J (undated): <http://www.anderlbauer.de/0000009bb40e00207/0000009bb40ea1921/0000009bce0c7d84c/index.html> [12.10.2016]
- IGZ – INSTITUT FÜR GEMÜSE- UND ZIERPFLANZENBAU, GROßBEEREN/ERFURT (2011) Düngung im Freilandgemüsebau (3. Auflage).
https://www.igzev.de/publikationen/IGZ_Duengung_im_Freilandgemuesebau.pdf
- IPCC – INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (2000) Good Practice Guidance and Uncertainty Measurement in National Greenhouse Gas Inventories. IPCC National Greenhouse Gas Inventories programme. <http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gp/english/>
- IPCC – INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (2006) 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 4 Agriculture, Forestry and Other Land Use. <http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html>
- IPCC – INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (2006a) 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 1 General Guidance and Reporting. <http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol1.html>
- IPCC – INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (2007): Fourth Assessment Report (AR4), Climate Change 2007.
https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-10-2.html [2016-04-18]
- IPCC – INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (2014) 2013 Supplement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Wetlands. <http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/wetlands/>
- IPCS (1996) Chlorothalonil. Environmental Health Criteria, 183. 145pp. WHO, Geneva, Switzerland. ISBN 92-4-157183-7. C12138614.7.
http://www.ceip.at/fileadmin/inhalte/emep/Adjustments/Decision_2014_1.pdf [20.12.2017]
- IUPAC – INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED CHEMISTRY (1993) Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry. 2nd ed., Blackwell, London, 160 p
- IUPAP – INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED PHYSICS (1987) Symbols, Units, Nomenclature and Fundamental Constants in Physics. Physica 146A, 1-68
- JARVIS SC, PAIN BF (1994) Greenhouse gas emissions from intensive livestock systems: their estimation and technologies for reduction. Climatic Change 27, 27-38
- JEROCH H, DÄNICKE S (2005) Faustzahlen zur Geflügelfütterung. Jahrbuch für die Geflügelwirtschaft 2006. Ulmer, Stuttgart, pp. 143-176
- JGS-ANLAGENV (1998). Verordnung zur Umsetzung von Artikel 4 und 5 der Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 12. Dezember 1991 zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigungen durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen.
<http://www.umwelt-online.de/recht/wasser/laender/nrw/jgs.htm> [15 Sept 2015]
- JILG T (2009) Phasenfütterung in der intensiven Lämmermast. http://www.landwirtschaft-mlr.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1109109_l1/index1215773518694.html [2009-12-17]
- JOHNSON HA, BALDWIN RL (2008) Evaluating model predictions of partitioning nitrogen excretion using the dairy cow model, Molly. Animal Feed Sci Tech-nol 143, 104-126
- JUNGKUNST H F, FREIBAUER A (2005) Overview on emissions observations in Europe. In: Leip A (ed.) N₂O emissions from agriculture. Report on the expert meeting on "Improving the quality for greenhouse gas inventories for N₂O emissions from agricultural soils" under the mandate of the working group on annual inventories, Climate Change Committee, Joint Research Centre, 21-22 October 2004, Ispra, 48-54
- KASIMIR-KLEMEDTSSON Å, KLEMEDTSSON L (2002) A critical analysis of nitrous oxide emissions from animal manure. In: Petersen SO, Olesen JE (eds.) Greenhouse Gas Inventories for Agriculture in the Nordic Countries. Proc international workshop Helsingør, Denmark, 24-25 January 2002. Danish Institute of Agricultural Sciences. DIAS report Plant Production no. 81, 107-121

- KEBREAB E, FRANCE J, BEEVER, DE, CASTILLO AR (2001) Nitrogen pollution by dairy cows and its mitigation by dietary manipulation. *Nutr Cycl Agroecosyst* 60, 275-285
- KEBREAB E, FRANCE J, MILLS JA, ALLISON R, DIJKSTRA J (2002) A dynamic model of N metabolism in the lactating dairy cow and an assessment of N excretion on the environment. *J Animal Sci* 80, 248-259
- KIRCHGESSNER M, ROTH F X, SCHWARZ F J, STANGL G I (2008) Tierernährung. 12. Auflage. DLG-Verlag, Frankfurt a.M., 635 p
- KIRCHGESSNER M, WINDISCH W, MÜLLER HL (1994) Methane release from dairy cows and pigs. In: Aguilera JF (ed) *Proc XIII Symp on energy metabolism of farm animals*. EAAP Publ 76, 399-402
- KLEIN M (2017) Calculation of emission factors for impurities in organic pesticides with PELMO. Personal communication. [Description available, Umweltbundesamt, FG I 2.6, Emissionssituation].
- KOCH C, LANDFRIED K (2009) <http://www.hofgut-neumuehle.de/pdfs/2009-laemmer.pdf> [12.10.2016]
- KÖNIG G, BRUNDA M, PUXBAUM H, HEWITT CN, DUCKHAM SC, RUDOLPH J (1995) Relative contribution of oxygenated hydrocarbons to the total biogenic VOC emissions of selected Mid-European agricultural and natural plant species. *Atmospheric Environment* 29, 861-874
- KRISTENSEN VF, KRISTENSEN T, AES O, HANSEN OK (1998) The amount and composition of cattle faeces and urine and the excretion of N, P and K in faeces and urine. In: Poulsen HG, Kristensen VF (eds.) (1998) *Standard Values for Farm Manure. A Revaluation of the Danish Standard Values concerning the Nitrogen, Phosphorus and Potassium Content of Manure*. DIAS report 7. Danish Institute of Agricultural Sciences, Foulum, 108 – 141
- KRUIF A DE, MANSFELD R, HOEDEMAKER M (2006): Tierärztliche Bestandsbetreuung beim Milchrind. Stuttgart: Enke, 113
- KTBL – KURATORIUM FÜR TECHNIK UND BAUWESEN IN DER LANDWIRTSCHAFT (ed.) (2004) *Betriebsplanung Landwirtschaft 2004/05*. KTBL-Datensammlung. 19th ed., Darmstadt: KTBL, 573 p
- KTBL – KURATORIUM FÜR TECHNIK UND BAUWESEN IN DER LANDWIRTSCHAFT (ed.) (2005a) *Faustzahlen für die Landwirtschaft*. 13th ed., Darmstadt: KTBL, 1095 p
- KTBL – KURATORIUM FÜR TECHNIK UND BAUWESEN IN DER LANDWIRTSCHAFT (2005b): *Methodenaktualisierung für die Emissionsberechnung 2003*. F+E Vorhaben 203 412 53 des UFOPLAN 2003. Teilvorhaben 04: EF Landwirtschaft: Landwirtschaft – Ermittlung und Anpassung von Emissionsfaktoren (CRF 4). Abschlussbericht. KTBL, Darmstadt, 90 p
- KTBL – KURATORIUM FÜR TECHNIK UND BAUWESEN IN DER LANDWIRTSCHAFT (ed.) (2006a) *Nationaler Bewertungsrahmen Tierhaltungsverfahren. Methode zur Bewertung von Tierhaltungsanlagen hinsichtlich Umweltwirkungen und Tiergerechtigkeit*. KTBL-Schrift 446, Darmstadt: KTBL, 778 p
- KTBL – KURATORIUM FÜR TECHNIK UND BAUWESEN IN DER LANDWIRTSCHAFT (ed.) (2006b) *Betriebsplanung Landwirtschaft 2006/07*. KTBL-Datensammlung. 20th ed., Darmstadt: KTBL, 672 p
- KTBL – KURATORIUM FÜR TECHNIK UND BAUWESEN IN DER LANDWIRTSCHAFT (ed.) (2008) *Betriebsplanung Landwirtschaft 2008/09*. KTBL-Datensammlung. 21st ed., Darmstadt: KTBL, 752 p
- KTBL – KURATORIUM FÜR TECHNIK UND BAUWESEN IN DER LANDWIRTSCHAFT (ed.) (2009) *Faustzahlen für die Landwirtschaft*. 14th ed., Darmstadt: KTBL, 1179 p
- KTBL – KURATORIUM FÜR TECHNIK UND BAUWESEN IN DER LANDWIRTSCHAFT (ed.) (2010) *Betriebsplanung Landwirtschaft 2010/11*. KTBL-Datensammlung. 22nd ed., Darmstadt: KTBL, 784 p
- KTBL – KURATORIUM FÜR TECHNIK UND BAUWESEN IN DER LANDWIRTSCHAFT (2013a) *Faustzahlen Biogas*, 3. Auflage. KTBL, Darmstadt, 360 p
- KTBL – KURATORIUM FÜR TECHNIK UND BAUWESEN IN DER LANDWIRTSCHAFT (2015) *KTBL-Produktivdatenbank: KTBL-Stoffliste*, Stand 31. Januar 2015 (unpublished), Darmstadt, Germany.
- KTBL – KURATORIUM FÜR TECHNIK UND BAUWESEN IN DER LANDWIRTSCHAFT (ed.) (2016) *Betriebsplanung Landwirtschaft 2016/17*. KTBL-Datensammlung. 25nd ed., Darmstadt: KTBL, 768 p
- KTBL – KURATORIUM FÜR TECHNIK UND BAUWESEN IN DER LANDWIRTSCHAFT (2019a) *Documentation on the generation of activity data on biogas for the National Inventory Report, Submission 2020 for 2018*, Darmstadt, Germany.
- KTBL – KURATORIUM FÜR TECHNIK UND BAUWESEN IN DER LANDWIRTSCHAFT (2019b) *Ableitung der Standard-N-Ausscheidung einer Mutterkuh für das Emissionsinventar*, Darmstadt, Germany.
- LABER H (2005) Biologische N₂-Fixierung von Gemüseerbsen und -buschbohnen. In: Infodienst 02/2005 für Beratung und Schule der Sächsischen Agrarverwaltung. Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft (Hrsg.) (2005), 81-89.
- LAMPE C, DITTERT K, SATTELMACHER B, WACHENDORF M, LOGES R, TAUBE F (2006) Sources and rates of nitrous oxide emissions from grazed grassland after application of ¹⁵N-labelled mineral fertilizer and slurry. *Soil Biol Biochem* 38, 2602-2613
- LANDESAMT FÜR DATENVERARBEITUNG UND STATISTIK NORDRHEIN-WESTFALEN, Düsseldorf
see Statistische Landesämter
- LANDESBETRIEB FÜR DATENVERARBEITUNG UND STATISTIK BRANDENBURG, Potsdam (until 2006)
see Statistische Landesämter
- LEIP A, DÄMMGEN U, KUIKMAN P, VAN AMSTEL A (2005) The quality of European (EU-15) greenhouse gas inventories from agriculture. *Environmental Sciences* 2, 177-192
- LEPPELT T, DECHOW R, GEBBERT S, FREIBAUER A, LOHILA A, AUGUSTIN J, DRÖSLER M, FIEDLER S, GLATZEL S, HÖPER H, JÄRVEOJA J, LÆRKE PE, MALJANEN M, MANDER Ü, MÄKIRANTA P, MINKKINEN K, OJANEN P, REGINA K, STRÖMGREN M (2014) Nitrous oxide emission hotspots from organic soils in Europe. *Biogeosciences Discuss.*, 11, 9135–9182
- LFL – BAYERISCHE LANDESANSTALT FÜR LANDWIRTSCHAFT (ed.) (2003): *Leitfaden für die Düngung von Acker- und Grünland*. 7. überarbeitete Auflage 2003, 82 p
- LFL – BAYERISCHE LANDESANSTALT FÜR LANDWIRTSCHAFT (ed.) (2004a) *Basisdaten für die Ermittlung des Düngedarfs und Umsetzung der Düngeverordnung*, Stand Dezember 2004. <http://www.lfl.bayern.de/iab/duengung/mineralisch/10536/>
- LFL – BAYERISCHE LANDESANSTALT FÜR LANDWIRTSCHAFT (2004b) *Futterberechnungen für Schweine*. 14th ed. Freising. LfL. http://www.lfl.bayern.de/publikationen/daten/informationen_url_1_27.pdf [23.03.2011]
- LFL – BAYERISCHE LANDESANSTALT FÜR LANDWIRTSCHAFT (2004c) *Perspektiven, Strukturentwicklung und Wettbewerbsfähigkeit der Ferkelerzeugung in Bayern*. <http://www.lfl.bayern.de/internet/stmlf/lfl/ilb/tier/05645/index.php>

- LFL – BAYERISCHE LANDESANSTALT FÜR LANDWIRTSCHAFT (2006a) Basisdaten zur Berechnung des KULAP-Nährstoffsaldos 2006, Stand: August 2006. Tabelle 8: Nährstoffgehalte tierischer Produkte. http://www.alf-kf.bayern.de/pflanzenbau/linkurl_0_4_0_2.pdf [20.02.2013]
- LFL – BAYERISCHE LANDESANSTALT FÜR LANDWIRTSCHAFT (2006b) Tabellen zum ILB-Internet-Beitrag „Ferkelerzeugung 2995/96: Rückgang in der Wirtschaftlichkeit trotz Leistungsprüfung“. http://www.lfl.bayern.de/ilb/tier/23602/linkurl_0_10.pdf [24.07.2007]
- LFL – BAYERISCHE LANDESANSTALT FÜR LANDWIRTSCHAFT (ed.) (2011) Gruber Tabellen zur Fütterung der Milchkühe, Zuchtrinder, Mast-rinder, Schafe, Ziegen. 33th ed., Freising, LfL. http://www.lfl.bayern.de/publikationen/daten/informationen/p_36967.pdf [25.05.2011]
- LINDERMAYER H (2010) Emissionsberichterstattungspflicht für Schweinehalter – Was kommt auf die Landwirte aus Sicht der Schweinefütterung zu? http://www.lfl.bayern.de/mam/cms07/ite/dateien/27497_emissionsinventar.pdf [04.07.2013]
- LIU X J, MOSIER A R, HALVORSON A, REULE C A, ZHANG F S (2007) Dinitrogen and N₂O emissions in arable soils: Effects of tillage, N source and soil moisture. *Soil Biol. Biochem.* 39, 2362-2370
- LKV-BY – LANDESKURATORIUM DER ERZEUGERRINGE FÜR TIERISCHE VEREDELUNG IN BAYERN (2003) Fleischleistungsprüfung in Bayern. www.bayern.de/media/FLP-JAHRESBERICHT2003.pdf
- LKV-BY – LANDESKURATORIUM DER ERZEUGERRINGE FÜR TIERISCHE VEREDELUNG IN BAYERN E. V. (2011) Fleischleistungsprüfung in Bayern 2011. http://www.lksh.de/fileadmin/dokumente/Landwirtschaft/Tier/Schweine/Schweinereport_2011.pdf [13.06.2012]
- LKV-BY – LANDESKURATORIUM DER ERZEUGERRINGE FÜR TIERISCHE VEREDELUNG IN BAYERN E. V. (2012) Fleischleistungsprüfung in Bayern 2012. http://www.lkv.bayern.de/media/flp_jahresbericht2012.pdf [06.05.2013]
- LKV-BY – LANDESKURATORIUM DER ERZEUGERRINGE FÜR TIERISCHE VEREDELUNG IN BAYERN E. V. (2015a) LKV Fleischleistungsprüfung 2014 - Zuchtsauenhaltung. http://www.lkv.bayern.de/lkv/medien/Jahresberichte/flp_14_fe.pdf [14.07.2015]
- LKV-BY – LANDESKURATORIUM DER ERZEUGERRINGE FÜR TIERISCHE VEREDELUNG IN BAYERN E. V. (2015b) LKV Fleischleistungsprüfung 2014 - Schweinemast. http://www.lkv.bayern.de/lkv/medien/Jahresberichte/flp_14_sm.pdf [14.07.2015]
- LKV-BY – LANDESKURATORIUM DER ERZEUGERRINGE FÜR TIERISCHE VEREDELUNG IN BAYERN E. V. (2016a) LKV Fleischleistungsprüfung 2015- Zuchtsauenhaltung. http://www.lkv.bayern.de/lkv/medien/Jahresberichte/flp_15_fe.pdf [05.04.2016]
- LKV-BY – LANDESKURATORIUM DER ERZEUGERRINGE FÜR TIERISCHE VEREDELUNG IN BAYERN E. V. (2016b) LKV Fleischleistungsprüfung 2015 - Schweinemast. http://www.lkv.bayern.de/lkv/medien/Jahresberichte/flp_15_sm.pdf [05.04.2016]
- LKV-BY – LANDESKURATORIUM DER ERZEUGERRINGE FÜR TIERISCHE VEREDELUNG IN BAYERN E. V. (2018a) LKV Fleischleistungsprüfung 2016 - Ferkelerzeugung. http://www.lkv.bayern.de/lkv/medien/Jahresberichte/flp_16_fe.pdf [27.03.2018]
- LKV-BY – LANDESKURATORIUM DER ERZEUGERRINGE FÜR TIERISCHE VEREDELUNG IN BAYERN E. V. (2018b) LKV Fleischleistungsprüfung 2016 - Schweinemast. http://www.lkv.bayern.de/lkv/medien/Jahresberichte/flp_16_sm.pdf [27.03.2018]
- LKV-BY – LANDESKURATORIUM DER ERZEUGERRINGE FÜR TIERISCHE VEREDELUNG IN BAYERN E. V. (2019) Fleischleistungsprüfung in Bayern 2017. http://www.lkv.bayern.de/lkv/medien/Jahresberichte/flp_jahresbericht2017.pdf [08.08.2019]
- LKV-SN – SÄCHSISCHER LANDESKONTROLLVERBAND E.V. (2012) Jahresbericht 2011. http://www.lkvsachsen.de/fileadmin/lkv/redaktion/download/administratives/verband/LKV_Jahresbericht_2011.pdf [07.05.2013]
- LKV-SN – SÄCHSISCHER LANDESKONTROLLVERBAND E.V. (2013) Jahresbericht 2012. http://www.lkvsachsen.de/fileadmin/lkv/redaktion/download/administratives/verband/LKV_Jahresbericht_2012_WEB_01.PDF [07.05.2013]
- LKV-SN – SÄCHSISCHER LANDESKONTROLLVERBAND E.V. (2014) Jahresbericht 2013. <http://www.lkvsachsen.de/fileadmin/lkv/redaktion/news/aktuelles/Jahresbericht2013.pdf> [30.06.2014]
- LKV-SN – SÄCHSISCHER LANDESKONTROLLVERBAND E.V. (2015) Jahresbericht 2014. http://www.lkvsachsen.de/fileadmin/lkv/redaktion/download/administratives/verband/Jahresbericht_2014.pdf [05.04.2016]
- LKV-ST – LANDESKONTROLLVERBAND FÜR LEISTUNGS- UND QUALITÄTSPRÜFUNG SACHSEN-ANHALT E.V. (2005) Jahresbericht 2004. <http://www.lkv-st.de/index.php?name=content&csid=7>
- LKV-ST – LANDESKONTROLLVERBAND FÜR LEISTUNGS- UND QUALITÄTSPRÜFUNG SACHSEN-ANHALT E.V. (2006) Jahresbericht 2005. <http://www.lkv-st.de/index.php?name=content&csid=7>
- LKV-ST – LANDESKONTROLLVERBAND FÜR LEISTUNGS- UND QUALITÄTSPRÜFUNG SACHSEN-ANHALT E.V. (2007) Jahresbericht 2007. <http://www.lkv-st.de/index.php?name=content&csid=7>
- LKV-ST – LANDESKONTROLLVERBAND FÜR LEISTUNGS- UND QUALITÄTSPRÜFUNG SACHSEN-ANHALT E.V. (2008) Jahresbericht 2008. <http://www.lkv-st.de/index.php?name=content&csid=7>
- LKV-ST – LANDESKONTROLLVERBAND FÜR LEISTUNGS- UND QUALITÄTSPRÜFUNG SACHSEN-ANHALT E.V. (2009) Jahresbericht 2009. <http://www.lkv-st.de/index.php?name=content&csid=7>
- LKV-ST – LANDESKONTROLLVERBAND FÜR LEISTUNGS- UND QUALITÄTSPRÜFUNG SACHSEN-ANHALT E.V. (2010) Jahresbericht 2010. <http://www.lkv-st.de/index.php?name=download&dldid=187> [20.07.2011]
- LKV-ST – LANDESKONTROLLVERBAND FÜR LEISTUNGS- UND QUALITÄTSPRÜFUNG SACHSEN-ANHALT E.V. (2011) Jahresbericht 2011. <http://www.lkv-st.de/index.php?name=download&dldid=219> [13.06.2012]
- LKV-ST – LANDESKONTROLLVERBAND FÜR LEISTUNGS- UND QUALITÄTSPRÜFUNG SACHSEN-ANHALT E.V. (2012) Jahresbericht 2012. <http://www.lkv-st.de/index.php?name=download&dldid=253> [07.05.2013]
- LKV-ST – LANDESKONTROLLVERBAND FÜR LEISTUNGS- UND QUALITÄTSPRÜFUNG SACHSEN-ANHALT E.V. (2013) Jahresbericht 2013. <http://www.lkv-st.de/index.php?name=content&csid=7> [29.04.2014]
- LKV-ST – LANDESKONTROLLVERBAND FÜR LEISTUNGS- UND QUALITÄTSPRÜFUNG SACHSEN-ANHALT E.V. (2014) Jahresbericht 2014. <http://www.lkv-st.de/index.php?name=content&csid=7> [14.07.2015]
- LKV-ST – LANDESKONTROLLVERBAND FÜR LEISTUNGS- UND QUALITÄTSPRÜFUNG SACHSEN-ANHALT E.V. (2015) Jahresbericht 2015. <http://www.lkv-st.de/index.php?name=content&csid=7> [05.04.2016]
- LKV-ST – LANDESKONTROLLVERBAND FÜR LEISTUNGS- UND QUALITÄTSPRÜFUNG SACHSEN-ANHALT E.V. (2016) Jahresbericht 2016. <https://www.lkv-st.de/index.php?name=content&csid=7> [20.03.2017]

- LKV-ST – LANDESKONTROLLVERBAND FÜR LEISTUNGS- UND QUALITÄTSPRÜFUNG SACHSEN-ANHALT E.V. (2019) Jahresbericht 2018.
<https://www.lkv-st.de/?name=content&csid=7> [08.08.2019]
- LSZ-BW – LANDESANSTALT FÜR SCHWEINEZUCHT BOXBERG, Baden-Württemberg (2007) Kurzfassung Schweinereport Baden-Württemberg, Wirtschaftsjahr 2005/2006. http://www.landwirtschaft-mlr.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/show/1202507_1/LSZ_Schweinereport%20Kurzfassung-07.pdf [24.07.2007]
- LSZ-BW – LANDESANSTALT FÜR SCHWEINEZUCHT BOXBERG, Baden-Württemberg (2008a) Erste Ergebnisse zur Schweinemast aus dem Schweinereport Baden-Württemberg 2007/2008. http://www.landwirtschaft-mlr.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/show/1232304_1/LSZ_Schweinemast_Schweinereport_doc.pdf [17.06.2008]
- LSZ-BW – LANDESANSTALT FÜR SCHWEINEZUCHT BOXBERG, Baden-Württemberg (2008b) Erste Ergebnisse zur Ferkelerzeugung aus dem Schweinereport Baden-Württemberg 2007/2008. http://www.landwirtschaft-mlr.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/show/1233125_1/LSZ_Ferkelerzeugung_Schweinereport.pdf [17.06.2008]
- LSZ-BW – LANDESANSTALT FÜR SCHWEINEZUCHT BOXBERG, Baden-Württemberg (2009a) Erste Ergebnisse zur Schweinemast aus dem Schweinereport Baden-Württemberg 2008/2009. <http://www.landwirtschaft-bw.info/servlet/PB/show/1277103/index.pdf> [17.05.2010]
- LSZ-BW – LANDESANSTALT FÜR SCHWEINEZUCHT BOXBERG, Baden-Württemberg (2009b) Erste Ergebnisse zur Ferkelerzeugung aus dem Schweinereport Baden-Württemberg 2008/2009. http://www.landwirtschaft-mlr.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/show/1284923_1/LSZ_Ferkelerzeugung_Schweinereport2009.pdf [17.05.2010]
- LSZ-BW – LANDESANSTALT FÜR SCHWEINEZUCHT BOXBERG, Baden-Württemberg (2010) Erste Ergebnisse zur Ferkelerzeugung aus dem Schweinereport Baden-Württemberg 2009/2010. https://www.landwirtschaft-bw.info/servlet/PB/show/1313448_1/LSZ_Teil%201_Ferkelerzeugung_Schweinereport2010%20biol.pdf [20.07.2011]
- LSZ-BW – LANDESANSTALT FÜR SCHWEINEZUCHT BOXBERG, Baden-Württemberg (2018) Schweinereport Baden-Württemberg. Wirtschaftsjahr 2016/2017. Heft 12.
- LSZ-BW – LANDESANSTALT FÜR SCHWEINEZUCHT BOXBERG, Baden-Württemberg (2019) Schweinereport Baden-Württemberg. Wirtschaftsjahr 2017/2018. Heft 13.
- LWK-NI – LANDWIRTSCHAFTSKAMMER NIEDERSACHSEN (2007) Düngeempfehlungen Stickstoff. Getreide, Raps, Hackfrüchte. <http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/2/nav/341/article/8200.html>
- LWK-NW – LANDWIRTSCHAFTSKAMMER NORDRHEIN-WESTFALEN (2004 to 2011) Milchleistungsfutter im Test. Energetische Futterwertprüfungen. <<http://www.riswick.de/versuche/tierhaltung/futterwertpruefung/index.htm>> [quoted 04.05.2012]
- LWK-NW – LANDWIRTSCHAFTSKAMMER NORDRHEIN-WESTFALEN (2006) Verfahrenstechnik in der Broilermast. <http://www.landwirtschaftskammer.de/fachangebot/tierproduktion/gefluegelhaltung/management/broilermast.htm> [15.03.2008]
- LWK-SH – LANDWIRTSCHAFTSKAMMER SCHLESWIG-HOLSTEIN (2010) Schweinereport 2010. http://www.lwksh.de/cms/fileadmin/user_upload/Downloads/Tier/Tier_2010/Schweinereport_2010.pdf [20.07.2011]
- LWK-SH – LANDWIRTSCHAFTSKAMMER SCHLESWIG-HOLSTEIN (2011) Schweinereport 2011. http://www.lksh.de/fileadmin/dokumente/Landwirtschaft/Tier/Schweine/Schweinereport_2011.pdf [13.06.2012]
- LWK-SH – LANDWIRTSCHAFTSKAMMER SCHLESWIG-HOLSTEIN (2012) Schweinereport 2012. http://www.lksh.de/fileadmin/dokumente/Landwirtschaft/Tier/Schweine/Schweinereport_2012.pdf [07.05.2013]
- LWK-SH – LANDWIRTSCHAFTSKAMMER SCHLESWIG-HOLSTEIN (2013) Schweinereport 2013. http://www.lksh.de/fileadmin/dokumente/Landwirtschaft/Tier/Schweine/Schweinereport_2013.pdf [29.04.2014]
- LWK-SH – LANDWIRTSCHAFTSKAMMER SCHLESWIG-HOLSTEIN (2014) Schweinereport 2014. http://www.lksh.de/fileadmin/dokumente/Landwirtschaft/Tier/Schweine/Schweinereport_2014.pdf [14.07.2015]
- LWK-SH – LANDWIRTSCHAFTSKAMMER SCHLESWIG-HOLSTEIN (2015) Schweinereport 2015. http://www.lksh.de/fileadmin/dokumente/Landwirtschaft/Tier/Schweine/Schweinereport_2015_LWK.pdf [05.04.2016]
- LWK-SH – LANDWIRTSCHAFTSKAMMER SCHLESWIG-HOLSTEIN (2016) Schweinereport 2016. http://www.lksh.de/fileadmin/dokumente/Landwirtschaft/Tier/Schweine/Schweinereport_2016_LK.pdf [03.03.2017]
- LWK-SH – LANDWIRTSCHAFTSKAMMER SCHLESWIG-HOLSTEIN (2017) Schweinereport 2017. https://www.lksh.de/fileadmin/dokumente/Landwirtschaft/Tier/Schweine/Schweinereport_2017.pdf [27.03.2018]
- LWK-SH – LANDWIRTSCHAFTSKAMMER SCHLESWIG-HOLSTEIN (2017) Schweinereport 2018. <https://www.ssbsh.de/wp-content/uploads/2019/01/Schweinereport-2018-allgemein.pdf> [08.08.2019]
- MATHIEU O, LÉVÊQUE J, HÉNAULT C, MILLOUX M-J, BIZOUARD F, ANDREUX F (2006) Emissions and spational variability of N₂O, N₂ and nitrous oxide mole fraction at the field scale, revealed with ¹⁵N isotopic techniques. *Soil Biol Biochem* 38, 941-951
- MAYER H, HOLST TH, BRUGGER U, KIRCHGÄSSNER A (2005) Trends der forstlich relevanten Klimavariablen Lufttemperatur und Niederschlag im Südwesten Deutschlands von 1950 bis 2000. *Allg Forst Jagd Z* 176, 45-56
- MEG – MARKTINFO EIER UND GEFLÜGEL (ab 2009). MEG-Marktbilanz Eier und Geflügel. Ulmer, Stuttgart
- MENKE A (2010) Futter für die Kälberaufzucht und Rindermast im Test. Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen. <http://www.riswick.de/versuche/tierhaltung/futterwertpruefung/rindermastfutter-527.htm> [13.01.2011]
- MENKE A (2011) Milchleistungsfutter im Test. Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen. <http://www.riswick.de/versuche/tierhaltung/futterwertpruefung/milchleistungsfutter-540.htm> [26.05.2011]

- MLUR-BB - MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT, UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG DES LANDES BRANDENBURG (2002) Agrarbericht 2002. Bericht zur Lage der Land- und Ernährungswirtschaft des Landes Brandenburg. http://www.mlur.brandenburg.de/cms/media.php/2320/agb_2002.pdf.
- MLUR-BB - MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT, UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG DES LANDES BRANDENBURG (2007) Agrarbericht 2007. Bericht zur Lage der Land- und Ernährungswirtschaft des Landes Brandenburg. http://www.mluv.brandenburg.de/cms/media.php/2320/agb_2007.pdf
- MLUV-BB – MINISTERIUM FÜR LÄNDLICHE ENTWICKLUNG, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ, BRANDENBURG (2005) Agrarbericht 2005 zur Land- und Ernährungswirtschaft des Landes Brandenburg. http://www.brandenburg.de/cms/media.php/2320/agb_2005.pdf
- MLUV-BB – MINISTERIUM FÜR LÄNDLICHE ENTWICKLUNG, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ, BRANDENBURG (2006) Agrarbericht 2006 zur Land- und Ernährungswirtschaft des Landes Brandenburg. http://www.brandenburg.de/cms/media.php/2320/agb_2006.pdf
- MLUV-BB – MINISTERIUM FÜR LÄNDLICHE ENTWICKLUNG, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ, BRANDENBURG (2007) Agrarbericht 2007 zur Land- und Ernährungswirtschaft des Landes Brandenburg. http://www.brandenburg.de/cms/media.php/2320/agb_2007.pdf
- MLUV-BB – MINISTERIUM FÜR LÄNDLICHE ENTWICKLUNG, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ, BRANDENBURG (2008) Agrarbericht 2008 zur Land- und Ernährungswirtschaft des Landes Brandenburg. http://www.brandenburg.de/cms/media.php/2320/agb_2008.pdf
- MMB (2016) Berechnung des potenziellen Legehennenbestandes auf neuer Basis. DGS Magazin 28/2016, Ulmer, Stuttgart, 6
- MONTEITH JL (1984) Consistency and convenience in the choice of units for agricultural science. *Expl Agric* 20, 105-117
- MONTENY GJ, ERISMAN JW (1999) Ammonia emission from dairy cow buildings: a review of measurement techniques, influencing factors and possibilities for reduction. *Netherlands J Agric Sci* 46, 225-247
- MOSIER AR, GUENZI WD, SCHWEIZER EE (1986) Soil losses of Dinitrogen and Nitrous Oxide from Irrigated Crops in Northeastern Colorado. *Soil Sci Soc Amer J* 50, 344-347
- MUNLV - MINISTERIUM FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ, LANDWIRTSCHAFT UND VERBRAUCHERSCHUTZ DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN (2001) Abfälle aus Kläranlagen in Nordrhein-Westfalen. Teil B. Klärschlamm Entsorgung in Europa. *Berichte zur Umwelt. Bereich Abfall*, Vol. 6., 374 p
- NEUMANN J, WYCISK P (2002) Mittlere jährliche Grundwasserneubildung. *Nationalatlas Bundesrepublik Deutschland – Relief, Boden und Wasser*, 144 – 145. http://archiv.nationalatlas.de/wp-content/art_pdf/Band2_144-145_archiv.pdf [27.09.2016]
- NIEDERSÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR STATISTIK, HANNOVER
see Statistische Landesämter
- NIR 2018 – National Inventory Report for the German Greenhouse Gas Inventory 1990 – 2016, Federal Environment Agency (Umweltbundesamt), Dessau, Germany. <https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/submission-under-the-united-nations-framework-3>
- NMELF – NIEDERSÄCHSISCHES MINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN. TIERPRODUKTION IN NIEDERSACHSEN. Annual reports. <http://edok.ahb.niedersachsen.de/07/365398365.htm>
- OFFERMANN F, BANSE M, FREUND F, HAß M, KREINS P, LAQUAI V, OSTERBURG B, PELIKAN J, RÖSEMANN C, SALAMON P (2018) Thünen-Baseline 2017 – 2027: Agrarökonomische Projektionen für Deutschland. Braunschweig, Johann Heinrich von Thünen-Institut, Thünen Report 56, 116
- OSTERBURG B, DÄMMGEN U (2009) Annahmen für die Prognose der Gasemissionen aus der deutschen Landwirtschaft im Jahr 2010, 2015 und 2020. In: Dämmgen U (ed) (2009) Calculations of emissions from German Agriculture – National Emission Inventory Report (NIR) 2009 for 2007. *vTI Agricultural and Forestry Research, Special Issue* 324, 397-410
- OURA N, SHINDO J, FUMOTO T, TODA H, KAWASHIMA H (2001) Effects of nitrogen deposition on nitrous oxide from the forest floor. *Water Air Soil Pollut* 130, 673-687
- PENNSYLVANIA COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES (2011) Calf Rumen Images. <http://www.das.psu.edu/research-extension/dairy/nutrition/calves/rumen> [15.02.2011]
- PETERSEN J (1993) Faustzahlen zur Betriebswirtschaft. *Jahrbuch für die Geflügelwirtschaft* 1994. Ulmer, Stuttgart, 160-173
- PETERSEN J (1994) Faustzahlen zur Betriebswirtschaft. *Jahrbuch für die Geflügelwirtschaft* 1995. Ulmer, Stuttgart, 164
- PETERSEN J (1995) Faustzahlen zur Betriebswirtschaft. *Jahrbuch für die Geflügelwirtschaft* 1996. Ulmer, Stuttgart, 181
- PETERSEN J (1996) Faustzahlen zur Betriebswirtschaft. *Jahrbuch für die Geflügelwirtschaft* 1997. Ulmer, Stuttgart, 176-191
- PETERSEN J (1997) Faustzahlen zur Betriebswirtschaft. *Jahrbuch für die Geflügelwirtschaft* 1998. Ulmer, Stuttgart, 192
- PETERSEN J (1998) Faustzahlen zur Betriebswirtschaft. *Jahrbuch für die Geflügelwirtschaft* 1999. Ulmer, Stuttgart, 193
- PETERSEN J (1999) Faustzahlen zur Betriebswirtschaft. *Jahrbuch für die Geflügelwirtschaft* 2000. Ulmer, Stuttgart, 186-200
- PFLSCHG (2012) Gesetz zur Neuordnung des Pflanzenschutzgesetzes, *Bundesgesetzblatt (BGBl)*, Jahrgang 2012, Teil I, Nr. 7, § 64.
- POTTGÜTER R (2016) Längere Legeperiode optimal unterstützen. Fütterung von Legehennen in verlängerter Produktion. *DGS Magazin* 18/2016, Ulmer, Stuttgart, 21-24
- PTB – PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT (2007) Themenschwerpunkt: Das Internationale Einheitensystem (SI). PTB-Mitteilungen, Fachorgan für Wirtschaft und Wissenschaft, Amts- und Mitteilungsblatt der PTB Braunschweig und Berlin. Sonderdruck aus 117. Jahrgang, Heft 2, Juni 2007. <http://www.ptb.de/cms/fileadmin/internet/publikationen/DasInternationaleEinheitensystem.pdf>
- QNETICS (2019) Jahresbericht Thüringen 2018. https://www.tvlev.de/cms/sites/default/files/downloads/publikationen/QControl_2018.pdf [08.08.2019]
- RAMIRAN – RECYCLING AGRICULTURAL, MUNICIPAL AND INDUSTRIAL RESIDUES IN AGRICULTURE NETWORK (2003) Glossary of terms on livestock manure management 2003. <http://www.ramiran.net/DOC/Glossary2003.pdf>

- REGULATION (EU) 2019/677: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/677 of 29 April 2019 concerning the non-renewal of the approval of the active substance chlorothalonil, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/677/oj
- REICHENBACH S (2011) <http://www.kamerunschafe-aus-eichelborn.de/kamerunschafe/fuetterung/fuetterung-der-mutterschafe-und-laemmeraufzucht/> [12.10.2016]
- REIDY B, DÄMMGEN U, DÖHLER H, EURICH-MENDEN B, HUTCHINGS NJ, LUESINK HH, MENZI H, MISSELBROOK TH, MONTENY G-J, WEBB J (2008) Comparison of models used for the calculation of national NH₃ emission inventories from agriculture: liquid manure systems. *Atmospheric Environment* 42, 3452-3467
- REIFSNYDER WE, MCNAUGHTON KG, MILFORD JR (1991) Symbols, units, notation. A statement of journal policy. *Agric Forest Meteorol* 54, 389-397
- RHG – RAIFFEISEN HAUPTGENOSSENSCHAFT HANNOVER (2006) Geflügel-Mischfutter Sackwaren-Programm mit Einsatzempfehlung. <http://www.rhg-hannover.de/pdf/futtermittel/gefluegelfutterflyer.pdf> [12.10.2006]
- ROLSTON DE, HOFFMAN DL, TOY DW (1978) Field measurement of denitrification: I. Flux of N₂ and N₂O- *Soil Sci Soc Amer J* 42, 863-869
- ROM HB, SORENSEN CG (2001) Sustainable Handling and Utilisation of Livestock Manure from Animals to Plants. Proceedings, NJF-Seminar no. 320, Denmark, 16-19 January 2001. DIAS report Animal Husbandry no. 21. <http://www.agrsci.dk/djfpublikation/djfpdf/djfh21.pdf>
- ROßKOPF N, FELL H, ZEITZ J (2015) Organic soils in Germany, their distribution and carbon stocks; *Catena* 133 (2015) 157–170
- RÖSEMANN C, HAENEL H-D, PODDEY E, DÄMMGEN U, DÖHLER H, EURICH-MENDEN B, LAUBACH P, DIETERLE M, UND OSTERBURG B (2011) Calculations of gaseous and particulate emissions from German Agriculture 1990 – 2009. *Landbauforsch, Special Issue* 342, 389 p
- RÖSEMANN C, HAENEL H-D, DÄMMGEN U, PODDEY E, FREIBAUER A, WULF S, EURICH-MENDEN B, DÖHLER H, SCHREINER C, BAUER B, OSTERBURG B (2013) Calculations of gaseous and particulate emissions from German Agriculture 1990 – 2011. *Thünen Report* 1, 386 p
- RÖSEMANN C, HAENEL H-D, DÄMMGEN U, FREIBAUER A, WULF S, EURICH-MENDEN B, DÖHLER H, SCHREINER C, BAUER B, OSTERBURG B (2015) Calculations of gaseous and particulate emissions from German Agriculture 1990 – 2013. *Thünen Report* 27, 372 p
- RÖSEMANN C, HAENEL H-D, DÄMMGEN U, FREIBAUER A, DÖRING U, WULF S, EURICH-MENDEN B, DÖHLER H, SCHREINER C, OSTERBURG B (2017) Calculations of gaseous and particulate emissions from German Agriculture 1990 – 2015. *Thünen Report* 46, 424 p
- RÖSEMANN C, HAENEL H-D, DÄMMGEN U, FREIBAUER A, DÖRING U, WULF S, EURICH-MENDEN B, DÖHLER H, SCHREINER C, OSTERBURG B (2019) Calculations of gaseous and particulate emissions from German Agriculture 1990 – 2017. *Thünen Report* 67, 432 p
- ROTH U, DÖHLER H, HARTMANN S, WULF S (2011) Treibhausgasbilanzen und CO₂eq-Vermeidungskosten landwirtschaftlicher Biogasanlagen. In: *Biogas in der Landwirtschaft – Stand und Perspektiven*. KTBL-Schrift 488, Darmstadt, 196-208
- RUDAZ AO, WÄLTJ E, KYBURZ G, LEHMANN P, FUHRER J (1999) Temporal variation in N₂O and N₂ fluxes from a permanent pasture in Switzerland in relation to management, soil water content and temperature. *Agriculture Ecosystems Environment* 73, 83-91
- SCHOLZ A, ZACHARIAS B (2008) Schweinereport Baden-Württemberg 2006/2007. *Landinfo* 1/2008. [http://www.landwirtschaft-mlr.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/show/1220152/landinfo_Schweinereport%20\(Scholz,%20Dr.%20Zacharias\).pdf](http://www.landwirtschaft-mlr.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/show/1220152/landinfo_Schweinereport%20(Scholz,%20Dr.%20Zacharias).pdf)
- SCHULTHEIS U, KLAGES-HABERKERN S, DÖHLER H (2000) Auswirkungen rechtlicher Regelungen auf die landbauliche Verwertung von Sekundärrohstoffdüngern, insbesondere Klärschlamm. KTBL, Darmstadt
- SEGGER V (Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft und der ländlichen Räume, Schwäbisch Gmünd) (2005a) Ferkelproduktion in Süddeutschland – Chancen und Grenzen aus betriebswirtschaftlicher Sicht. http://www.landwirtschaft-mlr.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/show/1187451_l1/Ferkelproduktion_in_%20Suedd_kurz_051125.pdf
- SEGGER V (Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft und der ländlichen Räume, Schwäbisch Gmünd) (2005b) Schweinemast in Süddeutschland – Chancen und Risiken. http://www.landwirtschaft-bw.info/servlet/PB/show/1187452/Schweinemast_in_Sueddeutschl_kurz_291105.pdf
- SESKEVICIENE J, JANKOWSKI J, KOZLOWSKI S (2005) Effect of probiotic preparation and phytogeneous feed additive on digestibility of nutrients, metabolizability of gross energy and content of metabolizable energy of a practical feed ration for fattening turkeys. *Arch. Geflügelkd.* 69, 107-109
- SIMON I, STEGEMANN J (2009) Mit Weizen die Futterkosten senken. *DGS Magazin* 45/2009, Ulmer, Stuttgart, 38-42
- SLL – SÄCHSISCHE LANDESANSTALT FÜR LANDWIRTSCHAFT (2004). Sächsischer Tierzuchtbericht 2003. <http://www.landwirtschaft.sachsen.de/landwirtschaft/9203.htm>
- SLL – SÄCHSISCHE LANDESANSTALT FÜR LANDWIRTSCHAFT (2007). Umsetzung der Düngeverordnung. Hinweise und Richtwerte für die Praxis. <https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/15242>
- SLULG – SÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT UND GEOLOGIE (2019). Datensammlung Düngerecht. Tabelle 3: Nährstoffgehalte von Gemüsekulturen und Erdbeeren. https://www.landwirtschaft.sachsen.de/download/Tab_3_Naehrstoffgehalte_Gemuese_Erdbeeren_2019-02-19.pdf
- SMIL V (1999) Nitrogen in crop production: An account of global flows. *Global Biogeochem Cycles* 13, 647-662
- SMUL – STAATSMINISTERIUM FÜR UMWELT UND LANDWIRTSCHAFT, SACHSEN (2000). Sächsischer Agrarbericht 2000. http://www.smul.sachsen.de/de/wu/aktuell/downloads/3_erzeugung_und_vermarktung.pdf
- SMUL – STAATSMINISTERIUM FÜR UMWELT UND LANDWIRTSCHAFT, SACHSEN (2002). Sächsischer Agrarbericht 2002. http://www.smul.sachsen.de/de/wu/aktuell/downloads/agrarbericht_2002.pdf

- SMUL – STAATSMINISTERIUM FÜR UMWELT UND LANDWIRTSCHAFT, SACHSEN (2003). Sächsischer Agrarbericht 2003. http://www.smul.sachsen.de/de/wu/aktuell/downloads/Agrarbericht_2003_2_MB.pdf
- SMUL – STAATSMINISTERIUM FÜR UMWELT UND LANDWIRTSCHAFT, SACHSEN (2005). Sächsischer Agrarbericht 2004 http://www.smul.sachsen.de/de/wu/aktuell/downloads/pdf_agrarbericht2004.pdf
- SMUL – STAATSMINISTERIUM FÜR UMWELT UND LANDWIRTSCHAFT, SACHSEN (2007). Sächsischer Agrarbericht 2006 <https://publikationen.sachsen.de/bdb/showDetails.do?id=9223>
- SMUL – STAATSMINISTERIUM FÜR UMWELT UND LANDWIRTSCHAFT, SACHSEN (2008). Schweine-Report 2007 http://www.smul.sachsen.de/lfi/publikationen/download/3965_1.pdf
- SMUL – STAATSMINISTERIUM FÜR UMWELT UND LANDWIRTSCHAFT, SACHSEN (2009). Schweine-Report 2008 http://www.smul.sachsen.de/lfi/publikationen/download/4560_1.pdf
- SMUL – STAATSMINISTERIUM FÜR UMWELT UND LANDWIRTSCHAFT, SACHSEN (2010). Agrarbericht in Zahlen 2010. <https://publikationen.sachsen.de/bdb/showDetails.do?id=4303100>
- SMUL – STAATSMINISTERIUM FÜR UMWELT UND LANDWIRTSCHAFT, SACHSEN (20012). Tierzuchtreport 2012 <https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/14730/documents/17599> [13.06.2012]
- SNEATH RW, CHADWICK DR, PHILLIPS VR, PAIN BF (1997). A UK inventory of nitrous oxide emissions from farmed livestock. Commissions WA 0604 and WA 0605, SRI/IGER, May 1997.
- SOMMER SG (2001): Effect of composting on nutrient loss and nitrogen availability of cattle deep litter. *European Journal of Agronomy* 14, 123-133
- SPEK WJ, DIJKSTRA J, VAN DUINKERKEN G, HENDRIKS WH, BANNINK A (2013): Prediction of urinary nitrogen and urinary urea nitrogen excretion by lactating dairy cattle in northwestern Europ and North America: A meta-analysis. *J. Dairy Sci.* 96, 4310-4322
- SPIEKERS H (2002): Empfehlungen zur Fütterung der Hochleistungskuh in den Phasen Laktationsende, Trockenstehzeit und Laktationsbeginn. 29. Viehwirtschaftliche Tagung, Bundesanstalt für alpenländische Landwirtschaft Gumpenstein 2002, pg. 3
- Spindler B (2008) Planungsdaten für die Haltung von Wasserbüffeln. KTBL-Fachartikel. https://www.ktbl.de/fileadmin/user_upload/Artikel/Tierhaltung/Andere_Tiere/Wasserbueffel/Wasserbueffelhaltung.pdf [19.07.2019]
- STATBA FS3 R3 - Statistisches Bundesamt (annual reports). Fachserie 3: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei. Reihe 3: Landwirtschaftliche Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung. Wiesbaden : Statistisches Bundesamt
- STATBA FS3 R3.1.3 - Statistisches Bundesamt (annual reports). Fachserie 3: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei. Reihe 3.1.3: Gemüseerhebung – Anbau und Ernte von Gemüse und Erdbeeren. Wiesbaden : Statistisches Bundesamt
- STATBA FS3 R3.2.1 - Statistisches Bundesamt (annual reports). Fachserie 3: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei. Reihe 3.2.1: Wachstum und Ernte - Feldfrüchte. Wiesbaden : Statistisches Bundesamt
- STATBA FS3 R4 - Statistisches Bundesamt (annual reports). Fachserie 3: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei. Reihe 4: Viehbestand und tierische Erzeugung. Wiesbaden : Statistisches Bundesamt
- STATBA FS3 R4.1 - Statistisches Bundesamt (annual reports). Fachserie 3: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei. Reihe 4.1: Viehbestand (annual reports). Wiesbaden : Statistisches Bundesamt
- STATBA FS3 R4.2.1 - Statistisches Bundesamt (annual reports). Fachserie 3: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei. Reihe 4.2.1 Schlachtungen und Fleischerzeugung. Statistisches Bundesamt, Wiesbaden
- STATBA FS3 R4.2.2 - Statistisches Bundesamt (annual reports). Fachserie 3: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei. Reihe 4.2.2 Milcherzeugung und –verwendung. Statistisches Bundesamt, Wiesbaden
- STATBA FS3 R4.2.3 - Statistisches Bundesamt (annual reports). Fachserie 3: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei. Reihe 4.2.3 Geflügel. Statistisches Bundesamt, Wiesbaden
- STATBA FS4 R8.2 - Statistisches Bundesamt (annual reports). Fachserie 4: Produzierendes Gewerbe. Reihe 8.2 Düngemittelversorgung. Statistisches Bundesamt, Wiesbaden
- STATISTISCHE LANDESÄMTER
- Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Hamburg und Kiel
 - Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin
 - Statistisches Amt Saarland, Saarbrücken
 - Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart
 - Statistisches Landesamt Berlin, Berlin (until 2006)
 - Statistisches Landesamt Bremen, Bremen
 - Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz
 - Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Bad Ems
 - Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle/Saale
- Reihen (published in 19XX or 20XX) by Statistische Landesämter
- Reihe C III 2-j/XX Schlachtungen und Fleischerzeugung
 - Reihe C III 3-j/XX Milcherzeugung
 - Reihe C III 6-j/XX Brut und Schlachtungen von Geflügel
 - Reihe C III 7-j/XX Legehennenhaltung und Eierzeugung
 - Reihe C III-1-j/XX Viehbestand
 - Reihe C II-j/XX Ernteberichterstattung und Feldfrüchte
 - Reihe C I-j/XX: Bodennutzung
- STATISTISCHES BUNDESAMT GENESIS Online-Datenbank. <https://www-genesis.destatis.de/genesis/online/logon>
- STEHFEST E, BOUWMAN L (2006) N₂O and NO emission from agricultural fields and soils under natural vegetation: summarizing available measurement data and modelling of global emissions. *Nutr. Cycl. Agroecosyst.* 74, 207-228
- STEVENS RJ, LAUGHLIN RJ (1998) Measurement of nitrous oxide and di-nitrogen emissions from agricultural soils. *Nutrient Cycling in Agroecosystems* 52, 131-139

- STMELF - BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN (o.J.): HI-Tier – Datenbank.
<http://www.hi-tier.de/zdb-adress.html>
- STOCKHOLM CONVENTION (2001) The Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, opened for signature May 23, 2001, UN Doc. UNEP/POPS/CONF/4, App. II (2001), reprinted in 40 ILM 532 (2001). <http://irptc.unep.ch/pops/>
- STREITZ E (2008) Die Reserven aufspüren. DGS Magazin 5/2008, Ulmer, Stuttgart, 10-14
- SYNGENTA AGRO (2015) Dep. „Zulassung und Produktsicherheit“, personal communication.
- THMLNU – THÜRINGISCHES MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT, NATURSCHUTZ UND UMWELT (2002) Bericht zur Entwicklung der Landwirtschaft in Thüringen 2002 (Berichtsjahr 2001). <http://www.tll.de/agb01/pdf/agb02-2.pdf>
- THMLNU – THÜRINGISCHES MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT, NATURSCHUTZ UND UMWELT (2003) Bericht zur Entwicklung der Landwirtschaft in Thüringen 2003 (Berichtsjahr 2002). http://www.tll.de/agb03/pdf/agb03_1.pdf
- THMLNU – THÜRINGISCHES MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT, NATURSCHUTZ UND UMWELT (2005) Bericht zur Entwicklung der Landwirtschaft in Thüringen 2003 (Berichtsjahr 2002). <http://www.tll.de/agb05pdf/agb052pdf>
- THMLNU – THÜRINGISCHES MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT, NATURSCHUTZ UND UMWELT (2006) Bericht zur Entwicklung der Landwirtschaft in Thüringen 2006 (Berichtsjahr 2005). <http://www.tll.de/agb06/pdf/agb06.pdf>
- THMLNU – THÜRINGISCHES MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT, NATURSCHUTZ UND UMWELT (2007) Bericht zur Entwicklung der Landwirtschaft in Thüringen 2007 (Berichtsjahr 2006). <http://www.tll.de/agb07/pdf/agb07.pdf>
- THMLNU – THÜRINGISCHES MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT, NATURSCHUTZ UND UMWELT (2009) Bericht zur Entwicklung der Landwirtschaft in Thüringen 2009 (Berichtsjahre 2007 und 2008).
<http://www.thueringen.de/de/publikationen/pic/pubdownload1013.pdf>
- THÜRINGER LANDESAMT FÜR STATISTIK, Erfurt
 see Statistische Landesämter
- THÜRINGER LANDESANSTALT FÜR LANDWIRTSCHAFT (2012) Merkblatt „Eigenschaften von Biogasgülle“.
<http://www.db-thueringen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-26323/bwx21012.pdf> [10 June 2013]
- TI - JOHANN HEINRICH VON THÜNEN-INSTITUT (2016): Ausführungsbestimmung zur Erstellung von Emissions- und Kohlenstoffinventaren und deren Qualitätsmanagement für den Bereich der Quellgruppen Landwirtschaft und LULUCF. Anlage zum Konzept Emissions- und Kohlenstoffinventare im nachgeordneten Bereich des BMEL vom 16.09.2016. Version 2.01, Stand vom 16.09.2016
- TIEMEYER B, BORRAZ EA, AUGUSTIN J, BECHTOLD M, BEETZ S, BEYER C, DRÖSLER M, EBELI M, EICKENSCHIEDT T, FIEDLER S, FÖRSTER C, FREIBAUER A, GIEBELS M, GLATZEL S, HEINICHEN J, HOFFMANN M, HÖPER H, JURASINSKI G, LEIBER-SAUHEITL K, PEICHL-BRAK M, ROSSKOPF N, SOMMER M, ZEITZ J (2016) High emissions of greenhouse gases from grasslands on peat and other organic soils. *Global Change Biology*, Vol. 22, 4134-4149
- TLL – THÜRINGER LANDESANSTALT FÜR LANDWIRTSCHAFT (2011): Entwicklung der Tierzucht in Thüringen, Berichtsjahr 2010. Schriftenreihe Landwirtschaft und Landschaftspflege in Thüringen, Heft 4/2011.
http://www.tll.de/ainfo/pdf/tzb_0611.pdf
- TMLFUN – THÜRINGER MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT, FORSTEN, UMWELT UND NATURSCHUTZ (2011) Bericht zur Entwicklung der Landwirtschaft in Thüringen 2011 (Berichtsjahre 2009 - 2010).
<http://www.thueringen.de/de/publikationen/pic/pubdownload1232.pdf> [13 June 2012]
- TÜLLER R (1989) Faustzahlen zur Geflügelmast. Jahrbuch für die Geflügelwirtschaft 1990. Ulmer, Stuttgart, 54-56
- TÜLLER R (1999) Faustzahlen zur Geflügelmast. Jahrbuch für die Geflügelwirtschaft 2000. Ulmer, Stuttgart, 120-135
- TVL – THÜRINGER VERBAND FÜR LEISTUNGS- UND QUALITÄTSPRÜFUNGEN IN DER TIERZUCHT E.V. (2014) Jahresbericht 2013.
<http://www.tvlev.de/cms/sites/default/files/downloads/publikationen/SKBR%20Jahresbericht%202013.pdf> [04.05.2016]
- TVL – THÜRINGER VERBAND FÜR LEISTUNGS- UND QUALITÄTSPRÜFUNGEN IN DER TIERZUCHT E.V. (2015) Jahresbericht 2014.
http://www.tvlev.de/cms/sites/default/files/downloads/publikationen/SKBR%20Jahresbericht%202014_0.pdf [04.05.2016]
- TVL – THÜRINGER VERBAND FÜR LEISTUNGS- UND QUALITÄTSPRÜFUNGEN IN DER TIERZUCHT E.V. (2016) Jahresbericht 2015.
http://www.tvlev.de/cms/sites/default/files/downloads/publikationen/TVL%20Jahresbericht%202015_Endfassung_01-04-16.pdf [15.05.2016]
- TVL – THÜRINGER VERBAND FÜR LEISTUNGS- UND QUALITÄTSPRÜFUNGEN IN DER TIERZUCHT E.V. (2017) Jahresbericht 2016.
<http://www.tvlev.de/cms/sites/default/files/downloads/publikationen/TVL%20Jahresbericht%202016.pdf> [22.03.2017]
- TVL – THÜRINGER VERBAND FÜR LEISTUNGS- UND QUALITÄTSPRÜFUNGEN IN DER TIERZUCHT E.V. (2018) Jahresbericht 2017.
<https://www.tvlev.de/cms/sites/default/files/downloads/publikationen/TVL%20Jahresbericht%202017.pdf> [27.03.2018]
- UBA – UMWELTBUNDESAMT (2008) Deutsches Treibhausgasinventar 1990 – 2006. Nationaler Inventarbericht 2008. Berichterstattung unter der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen. Umweltbundesamt, Berlin, 534 p
- UBA – UMWELTBUNDESAMT (2010): Qualitätssystem Emissionsinventare. Handbuch zur Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung bei der Erstellung von Emissionsinventaren und der Berichterstattung unter der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen sowie der EU-Entscheidung 280/2004/EG, Dessau-Roßlau. Stand 16.09.2010.
- UBA – UMWELTBUNDESAMT (2016a): Aktualisierung der Eingangsdaten und Emissionsbilanzen biogener Energienutzungspfade. UBA-Texte 09/2016. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau, 191 p
- UBA – UMWELTBUNDESAMT (2016b): Qualitätssystem Emissionsinventare – QSE Handbuch. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau, 235 p, unveröffentlicht.
- UFOP – UNION ZUR FÖRDERUNG VON OEL- UND PROTEINPFLANZEN (2004) Anbauratgeber Süßlupine. UFOP-Praxisinformationen.
www.ufop.de/downloads/Praxisinfo_blaueSuesslupine.pdf
- UNECE (1991). Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution Concerning the Control of Emissions of Volatile Organic Compounds or Their Transboundary Fluxes.
www.unece.org/env/lrtap/full%20text/1991.VOC.e.pdf

- UNECE (1999) V. Guidance document on control techniques for preventing and abating emissions of ammonia. Seventeenth session, Gothenburg (Sweden), 29 - 3 Dec 1999, EB.AIR/1999/2
- UNFCCC – UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (2019) National Inventory Submissions 2019. <https://unfccc.int/process-and-meetings/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/greenhouse-gas-inventories-annex-i-parties/national-inventory-submissions-2019>
- URSELMANS S, DAMME K (2011) Deutliche Leistungsunterschiede zwischen den Genotypen. 8. Bayerischer Herkunftsvergleich von Legehybriden in Bodenhaltung. DGS Magazin 1/2011, Ulmer, Stuttgart, 23-30
- URSELMANS S, DAMME K (2012) Deutliche Unterschiede. 9. Bayerischer Herkunftsvergleich von Legehybriden. DGS Magazin 18/2012, Ulmer, Stuttgart, 10-16
- URSELMANS S, DAMME K (2015) Eine Option für Direktvermarkter. Längere Nutzung von Legehennen. DGS Magazin 27/2015, Ulmer, Stuttgart, 29-33
- VAN CLEEMPUT O (1998) Subsoils: chemo- and biological denitrification, N₂O and N₂ emissions. Nutrient Cycling Agroecosystems 52, 187-194
- VANDRÉ R, WULF S, HÄUBERMANN U, HORLACHER, D (2012) N₂O emissions from solid manure storage. Calculation of a national emission factor. Association for Technology and Structures in Agriculture (Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft, KTBL). Darmstadt, 15 p
- VANDRÉ R, WULF S, HÄUBERMANN U, HORLACHER, D (2012) N₂O emissions from solid manure storage - Calculation of a national emission factor. LANDTECHNIK 68(1), 38-42
- VERMOESEN A, VAN CLEEMPUT O, HOFMAN G (1996) Long-term measurements of N₂O emissions. Energy Convers Management 6-8, 1279-1284
- VERSUCHSWESSEN PFLANZENBAU RHEINLAND-PFALZ (2005) Versuchsbericht Körnerleguminosen 2005. Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum. Bericht 6 / 2005. Bad Kreuznach: Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum, 44 p
- VTI - JOHANN HEINRICH VON THÜNEN-INSTITUT (2012): Ausführungsbestimmung zur Erstellung von Emissions- und Kohlenstoffinventaren und deren Qualitätsmanagement für den Bereich der Quellgruppen 4 und 5. Anlage zum Konzept Emissions- und Kohlenstoffinventare im nachgeordneten Bereich des BMELV vom 01.03.2012. Version 1.01, Stand vom 31.08.2012
- WALENZIK G (1996) Auswirkungen von Bodenverdichtungen durch landwirtschaftliche Nutzung auf die N₂- und N₂O-Emissionen aus dem Boden. PhD Thesis Universität Hannover, Fachbereich Gartenbau, 130 p
- WEBB J (2001) Estimating the potential for ammonia emissions from livestock excreta and manures. Environmental Pollution 111, 395-406.
- WEIER KL, MACRAE IC, MYERS RJK (1993) Denitrification in a clay soil under pasture and annual crop: estimation of potential losses using intact soil cores. Soil Biol Biochem 25, 991-997
- WEIß J (2010) Grundfutterleistung einheitlich berechnen. <http://www.dlg.org/fileadmin/downloads/fachinfos/futtermittel/grundfutter.pdf> [29.06.2010]
- WEINGARTEN P (1995) Das „Regionalisierte Agrar- und Umweltinformationssystem für die Bundesrepublik Deutschland“ (RAUMIS). Ber Landwirtschaft 73, 272-302
- WEST TO, MCBRIDE AC (2005) The contribution of agricultural lime to carbon dioxide emissions in the United States: dissolution, transport, and net emissions. Agriculture, Ecosystems and Environment 108, 145-154
- WHG (2010): Wasserhaushaltsgesetz – Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes. http://www.gesetze-im-internet.de/whg_2009/BJNR258510009.html#BJNR258510009BJNG000100000 [15 Sept 2014]
- WIEDMANN S, DAMME K (2008) Klare Unterschiede in der Leistung. DGS Magazin 9/2008, Ulmer, Stuttgart, 24-34
- ZDS – ZENTRALVERBAND DER DEUTSCHEN SCHWEINEPRODUKTION E.V. (1991 to 2014) Zahlen aus der Deutschen Schweineproduktion. Annual reports. ZDS, Bonn
- ZMB – ZENTRALE MILCHMARKT BERICHTERSTATTUNG GMBH (2009). ZMB-Jahrbuch Milch. ZMB, Berlin
- ZMP – ZENTRALE MARKT- UND PREISBERICHTSTELLE FÜR ERZEUGNISSE DER LAND-, FORST- UND ERNÄHRUNGSWIRTSCHAFT GMBH (1990 to 2008). Eier und Geflügel. Annual reports. ZMP, Bonn
- ZMP – ZENTRALE MARKT- UND PREISBERICHTSTELLE FÜR ERZEUGNISSE DER LAND-, FORST- UND ERNÄHRUNGSWIRTSCHAFT GMBH (1990 to 2008). Milch. Annual reports. ZMP, Bonn

Thünen Report

Bereits in dieser Reihe erschienene Hefte – *Volumes already published in this series*

1 - 55	siehe http://www.thuenen.de/de/infothek/publikationen/thuenen-report/
56	Frank Offermann, Martin Banse, Florian Freund, Marlen Haß, Peter Kreins, Verena Laquai, Bernhard Osterburg, Janine Pelikan, Claus Rösemann, Petra Salamon Thünen-Baseline 2017 – 2027: Agrarökonomische Projektionen für Deutschland
57	Hans-Dieter Haenel, Claus Rösemann, Ulrich Dämmgen, Ulrike Döring, Sebastian Wulf, Brigitte Eurich-Menden, Annette Freibauer, Helmut Döhler, Carsten Schreiner, Bernhard Osterburg Calculations of gaseous and particulate emissions from German agriculture 1990 - 2016 Berechnung von gas- und partikelförmigen Emissionen aus der deutschen Landwirtschaft 1990 – 2016
58	Anja-Kristina Techen Reduzierung von landwirtschaftlichen Stickstoffeinträgen in Gewässer: die Wirksamkeit von Beratung am Beispiel der hessischen WRRL-Beratung
59	Katja Oehmichen, Susann Klatt, Kristin Gerber, Heino Polley, Steffi Röhling, Karsten Dunger Die alternativen WEHAM-Szenarien: Holzpräferenz, Naturschutzpräferenz und Trendfortschreibung Szenarienentwicklung, Ergebnisse und Analyse
60	Anne Margarian Strukturwandel in der Wissensökonomie: Eine Analyse von Branchen-, Lage- und Regionseffekten in Deutschland
61	Meike Hellmich Nachhaltiges Landmanagement vor dem Hintergrund des Klimawandels als Aufgabe der räumlichen Planung - Eine Evaluation im planerischen Mehrebenensystem an den Beispielen der Altmark und des Landkreises Lüchow-Dannenberg -
62	Bernd Degen, Konstantin V. Krutovsky, Mirko Liesebach (eds.) German Russian Conference on Forest Genetics - Proceedings - Ahrensburg, 2017 November 21-23
63	Jutta Buschbom Exploring and validating statistical reliability in forensic conservation genetics
64	Anna Jacobs, Heinz Flessa, Axel Don, Arne Heidkamp, Roland Prietz, René Dechow, Andreas Gensior, Christopher Poeplau, Catharina Riggers, Florian Schneider, Bärbel Tiemeyer, Cora Vos, Mareille Wittnebel, Theresia Müller, Annelie Säurich, Andrea Fahrion-Nitschke, Sören Gebbert, Rayk Hopfstock, Angélica Jaconi, Hans Kolata, Maximilian Lorbeer, Johanna Schröder, Andreas Laggner, Christian Weiser, Annette Freibauer Landwirtschaftlich genutzte Böden in Deutschland – Ergebnisse der Bodenzustandserhebung
65	Jörn Sanders, Jürgen Heß (Hrsg.) Leistungen des ökologischen Landbaus für Umwelt und Gesellschaft
66	Patrick Küpper, Jan Cornelius Peters Entwicklung regionaler Disparitäten hinsichtlich Wirtschaftskraft, sozialer Lage sowie Daseinsvorsorge und Infrastruktur in Deutschland und seinen ländlichen Räumen



- 67 Claus Rösemann, Hans-Dieter Haenel, Ulrich Dämmgen, Ulrike Döring, Sebastian Wulf, Brigitte Eurich-Menden, Annette Freibauer, Helmut Döhler, Carsten Schreiner, Bernhard Osterburg, Roland Fuß
Calculations of gaseous and particulate emissions from German agriculture 1990 – 2017
Berechnung von gas- und partikelförmigen Emissionen aus der deutschen Landwirtschaft 1990 – 2017
- 68 Alexandra Purkus, Jan Lüdtkke, Georg Becher, Matthias Dieter, Dominik Jochem, Ralph Lehnert, Mirko Liesebach, Heino Polley, Sebastian Rüter, Jörg Schweinle, Holger Weimar, Johannes Welling
Evaluation der Charta für Holz 2.0: Methodische Grundlagen und Evaluationskonzept
- 69 Andreas Tietz
Bodengebundene Einkommensteuern in einer strukturschwachen ländlichen Gemeinde
- 71 Thomas Schmidt, Felicitas Schneider, Dominik Leverenz, Gerold Hafner
Lebensmittelabfälle in Deutschland – Baseline 2015 –
- 72 Friederike Mennicke, Martin Ohlmeyer, Vera Steckel, Jörg Hasener, Julia Borowka, Joachim Hasch
Entwicklung einer Prüfmethode für die schnelle Bestimmung von VOC aus Holzprodukten zur frühzeitigen Ableitung des langfristigen Emissionsverhaltens und Qualitätskontrolle bei der Herstellung von Holzwerkstoffen
- 73 Thomas Schmidt, Sandra Baumgardt, Antonia Blumenthal, Bernhard Burdick, Erika Claupen, Walter Dirksmeyer, Gerold Hafner, Kathrin Klockgether, Franziska Koch, Dominik Leverenz, Marianne Lörchner, Sabine Ludwig-Ohm, Linda Niepagenkemper, Karoline Owusu-Sekyere, Frank Waskow
Wege zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen - Pathways to reduce food waste (REFOWAS)
Maßnahmen, Bewertungsrahmen und Analysewerkzeuge sowie zukunftsfähige Ansätze für einen nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln unter Einbindung sozio-ökologischer Innovationen - Volume 1
- 73 Thomas Schmidt, Sandra Baumgardt, Antonia Blumenthal, Bernhard Burdick, Erika Claupen, Walter Dirksmeyer, Gerold Hafner, Kathrin Klockgether, Franziska Koch, Dominik Leverenz, Marianne Lörchner, Sabine Ludwig-Ohm, Linda Niepagenkemper, Karoline Owusu-Sekyere, Frank Waskow
Wege zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen - Pathways to reduce food waste (REFOWAS)
Maßnahmen, Bewertungsrahmen und Analysewerkzeuge sowie zukunftsfähige Ansätze für einen nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln unter Einbindung sozio-ökologischer Innovationen - Volume 2 (Anhang)
- 74 Jan T. Benthien, Susanne Gäckler, Martin Ohlmeyer
Entwicklung eines Verfahrens zur Bestimmung der Durchtrittbeständigkeit von Pferdebox-Ausfachungsbohlen sowie Entwicklung von Alternativen zu derzeit verwendeten Ausfachungsmaterialien für den Bau von Pferdeboxen
- 75 Sophie Drexler, Gabriele Broll, Axel Don, Heinz Flessa
Standorttypische Humusgehalte landwirtschaftlich genutzter Böden Deutschlands
- 76 Mirko Liesebach (ed.)
Forstpflanzenzüchtung für die Praxis, 6. Tagung der Sektion Forstgenetik/Forstpflanzenzüchtung vom 16. bis 18. September 2019 in Dresden, Tagungsband
- 77 Hans-Dieter Haenel, Claus Rösemann, Ulrich Dämmgen, Ulrike Döring, Sebastian Wulf, Brigitte Eurich-Menden, Annette Freibauer, Helmut Döhler, Carsten Schreiner, Bernhard Osterburg, Roland Fuß
Calculations of gaseous and particulate emissions from German agriculture 1990 – 2018
Berechnung von gas- und partikelförmigen Emissionen aus der deutschen Landwirtschaft 1990 – 2018



THÜNEN

Thünen Report 77

Herausgeber/Redaktionsanschrift

Johann Heinrich von Thünen-Institut
Bundesallee 50
38116 Braunschweig
Germany

www.thuenen.de

ISBN 978-3-86576-210-8

